




NP: 24996 PK-8°

94P

~~71 18~~
~~74~~

2-7 343.

N 471



НИКОЛАЯ РОЗЕНЪ
ФОНЪ РОЗЕНШТЕЙНА,

СЪВЕРНОЙ ЗВѢЗДЫ КАВАЛЕРА и КОРО-
ЛЕВСКАГО ШВЕДСКАГО АРХІАТЕРА,

РУКОВОДСТВО

КЪ

ПОЗНАНІЮ и ВРАЧЕВАНІЮ
МЛАДЕНЧЕСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ,

Съ Шведскаго на Нѣмецкой языкъ пере-
веденное и примѣчаніями, умноженное

Гоанномъ Андреемъ Мурраемъ,

Королевскаго Ордена Вазы Кавалеромъ
и проч.

*На Россійскій языкъ переложилъ Мо-
сковскаго Генеральнаго Госпиталя
Операторъ Василій Григоровскій.*



М. И. М. И. С. В. Е. Т. И. Н. А.

МОСКВА,

Въ Университетской Типографіи,
у Ридигера и Клаудія.

1794



* * *

О Д О Б Р Е Н І Е.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господь Кураторовъ я читалъ сію книгу, подъ заглавіемъ: *М. Р. Ф. Розенштейна Руководство къ изнанію и врачеванію младенческихъ болѣзней* и не нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, данному мнѣ о разсмаиваніи печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ; почему оная и напечатана быть можетъ. — Логикѣ и Метаматематики Профессоръ и печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ Цензоръ,


Андрей Брянецовъ.



ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
КОЛЛЕГІИ

Нижайше подноситъ

Трудившійся въ переводѣ:





ОТДѢЛЕНІЕ I.

О

Кормилицы.

Для соблюденія младенческаго здоровья потребна хорошая и изобильная пища. Не лѣзя оспаривать, что для него полезнѣе всякой другой молоко собственнѣйшей матери; ибо сіе единственно бываетъ причиною, что младенецъ, вскармливаемый собственною матерью, часто находится здоровъ, даже и въ такомъ случаѣ, когда ея молоко не имѣетъ въ себѣ всѣхъ нѣхъ хорошихъ качествъ, безъ которыхъ мы ни одной кормилицы не признаемъ годною. Напротивъ же того, естли бы то же самое молоко сосало чужое дитя, то бы оно въ скорости не избѣгло различныхъ болѣзней. Слѣдовательно каждая мать, которая только въ состояніи сама кормить, непремѣнно къ тому обязана. Она даже и для себя много чрезъ то выигрываетъ. По малой мѣрѣ скоро выздоравливаетъ послѣ родовъ. Обыкновенно избавляется молочною лихорадкой и красной сыпью, равно какъ и воспаленія матки, въ случаѣ прилитія къ оной молока. Не бываетъ также подвержена молочнымъ опухольямъ, въ пахахъ случающимся, которыя часто

патниваются и превращаются въ язвы. Равнымъ образомъ не имѣетъ она въ такомъ случаѣ причины опасаться печенія бѣли, не гдѣко отъ сей же причины происходящаго. (Смотри *Fabre Traité de Maladies veneriennes* р. 65). И такъ все сіе не доваѣшъ ли къ поощренію роженицы кормить свое дитя по крайней мѣрѣ въ нѣдѣли, въ которыхъ она и кромѣ того повинна сидѣть дома? Первое молоко собиравенной матери лучше всего испраждаетъ первый дѣтскій калъ и предохраняетъ чрезъ шо младенца отъ многихъ припадковъ. Сверхъ того каждому дитяти съ молокомъ матери вливаются ея душевныя качества и прочія склонности. Такъ на пр. примѣчено, что молодые львы, когда имъ давали сосать коровье, либо козье молоко, дѣлались почти ручными; а собаки напротивъ того, вскармливаемые волчицею, перемѣнялись въ хищныхъ звѣрей.

Но естли у матери нѣтъ молока, либо она имѣетъ слишкомъ малые, либо великіе, короткіе, либо затвердѣлые, либо къ концу такъ тонкіе соски, что младенецъ не въ состояніи бываешъ ихъ ртомъ захватить и сосать; либо она сама нездорова, имѣетъ слабое шѣдосложеніе, страждетъ чахоткою, каменною или другою какою нибудь болѣзнію, могущею чрезъ воздоеніе перейти на младенца; либо ея духъ радостію или печалію легко можетъ быть возмущенъ; либо она не въ состояніи избѣгать частыхъ досадъ: въ такомъ случаѣ не должно ее принуждать кормить,

мнѣ , но лучше сыскать для ея дитяти хоро-
шую кормилицу.

Кормилица должна быть тихаго , поспоянна-
го , веселаго и добродѣтельнаго нрава ; возрастомъ
отъ 20 до 30 лѣтъ , нѣсколько прежде самой ма-
тери родившая и уже воспитывавшая дѣтей , со-
вершенно здоровая и неимѣющая никакой болѣзни ,
могушей заразить ея инимомъ. А дабы она не
была также и цыготная , то должно порядочно
ислѣдовать , не боляшѣ ли у нее десны , и крѣ-
дн ли отъ ? Инаице же рачительно должно испы-
тывать , нѣтъ ли въ ней припичивой какой ни-
будь болѣзни , либо не примѣнался ли на нѣтъ
цыпи , лишевъ , отворѣвая железь , или подоб-
ныхъ тому признаковъ , означающихъ испорчен-
ные соки.

Лучше , естли она нѣсколько жирна , нежели
суха , во всего лучше , естли нѣблосложениемъ во
всемъ сходна съ матерью. Она должна быть въ
состоянии кормить двумя пищками , и соски на
онихъ имѣть средней величины. Си же притомъ
должны быть чувствительны такъ , что естли
поводить по нихъ слегка перстомъ , тобы они
отъ того грубѣли . во противномъ же случаѣ не
издають они отъ себя молока.

Сколько явлено , чтобъ кормилица имѣла до-
вольно молока . столько необходимо , чтобъ оно
было и хорошаго качества. О добротѣ же его мож-
но судить :

1) По цвѣту, которой долженъ быть избѣ-
да синій,

2) По запаху, котораго хорошее молоко во-
все не имѣетъ.

3) По вкусу, который долженъ быть совер-
шенно сладокъ, ни мало несолонъ и негорекъ;
также и не шаконъ каковъ свойственъ первому
молоку, бывающему тотчасъ послѣ родовъ, когда
онъ еще только начинаетъ претворяться въ со-
вершенное молоко. Словомъ: наилучше, еслили оно
вкусомъ таково, каково бываетъ обыкновенное мо-
локо, немного разведенное водою и подслащен-
ное сахаромъ.

4) По густотѣ. Жидкое молоко предпочи-
тается густому. Слѣдовательно, еслили бы налить
его нѣсколько капель на ноготь и поморочить
онимъ кось въ нѣтъ: тобы оно тотчасъ съ него
спекло; а еслили бы шряхнуть рукою, то бы ни ма-
лѣйшаго знака бѣлой черны на ногтѣ не осталось.

5) По ощупительности. Въ молоко не дол-
жна быть ни малѣйшая острота, еслили онаго
влишь каплю въ глазъ,

6) Сшвороживая оное посредствомъ шелячь-
яго желудка. Когда такимъ образомъ шворожен-
ное молоко много даетъ отъ себя шворогу, то
оно не годится (*).

7)

(*) Въ домоводствѣ обыкновенно употребляютъ
для дѣланія изъ коровьяго молока шворогу толь-
ко шелячий желудокъ; однако сіе свойство имѣ-
етъ

7) Оставляя его на нѣсколько времени въ стеклянномъ сосудѣ безъ движенія. Еслили въ такомъ случаѣ на ономъ много бываетъ сливокъ, то сіе не хорошимъ починяется знакъ. Сіе самое можно заключить и изъ тяжести молока; ибо чѣмъ оно легче, тѣмъ больше имѣетъ въ себѣ сливокъ.

8) По давности онаго. Чѣмъ старѣе молоко, тѣмъ оное бываетъ гуще, и для младенца несовсѣе. По сей причинѣ, еспли выторъ издѣлѣн на двухъ кормилицъ, изъ которыхъ бы одной было 30 лѣтъ, но ея молоко только однимъ мѣсяцомъ старѣе матерняго, а другой только 20 лѣтъ, но 6 или 7 мѣсяцовъ ея молоку: то пер-

А 5

вая

етъ не оліянь оный, но и веѣхъ животиныхъ какъ травю, такъ и мясомъ питающихся. Для того можно бы думать, что толѣтій желудокъ (такъ какъ его мясники свѣжій и несоленый продаютъ) и надъ женскимъ молокомъ равное оказываеъ дѣйствіе, попому что челоѣческій желудокъ надъ нимъ оное оказываеъ, и безъ сумнѣнія Г. Ф. Р. сіе заключеніе сдѣлаъ отъ подобія: однако опыты доказали, что молоко женщины, питающейя вмѣстѣ съ растительною пищею мясомъ, ни отъ естественной теплоты шваа, ни отъ варенія до зквашенія не створоживается. Жаль только, что Г. Проф. Бергій, оные описавшій (K. Ustenk. Acad. Nat. 1772, t. 87) не повторилъ ихъ также и надъ молокомъ женщины, питающейя одними только растѣніями; ибо можетъ быть изъ шде и различныя произошли бы слѣдствія. М.

лая изъ нихъ, естѣли только прочія ихъ обстоя-
тельствѣныя суть равны, заслуживаетъ преимуще-
ство

Но естѣли не можно достать никакой корми-
лицы, а сама мать кормить не въ состояніи: то
должно пригласить младенца сосать рожокъ; оный
въ Ост-Ботнии съ великою пользою употребля-
ютъ (*); только должно его всегда держать въ
чистотѣ. Для сего употребляется обыкновенный
рогъ; къ тонкому о его концу привязывается ли-
бо изъ коровьей шкурки, либо, естѣли оной до-
стать не можно, другую каку о нѣмудъ тонкую
кожу, пропкнутъ прежде въ ней нѣсколько не-
большихъ дырочекъ. Въ оный вливается по споль-
зу сырого козьего, либо коровьяго молока, сколько по
разсужденію для младенца на одинъ разъ можетъ
быть довольно. Оно должно нѣсколько развѣстываю
и подсластитъ сахаромъ. Когда дитя подрастетъ,
то

(*) Г. Армстронгъ (*Diseases most fatal to infants* р.
108) рожокъ порочитъ за то, что сквозь сква-
жины оная проходитъ только самая тонкая
вища, каковой для насыщенія младенца потреб-
но бываетъ великое количество; а отъ сего мо-
жетъ прийти въ слабость желудокъ и удобно
воспаленъ поносъ. Для сего онъ предпо-
читаетъ ему шавъ называемый *Boat*, который
Немецкій переводчикъ вышеписанной книги
(страни 60) уподобляетъ испанскому сосуду,
въ подобіе корабля сдѣланному, имѣющему
въ себѣ отъ шрежъ до четырехъ столовыхъ
дюлокъ. М.

но его больше кормить должно щадѣ, какъ о томъ ниже сего будетъ упомянуто.

Не довольно, чтобъ только избрать кормилицу вышеписанныхъ качествъ: на соблюденіе материческаго здоровья пресбуетъ еще, чтобъ доставить ей и хорошее содержаніе. Для того, естли только можно, должно ей опивать пространную, свѣжій воздухъ въ себѣ содержащую и не шемную коринду. И въ оной должна быть всегда одинакая умѣренная теплота; она должна быть всегда выметена и чиста. ибо въ пропитомъ случаѣ происходитъ въ ней вонючій запахъ, а отъ того какъ корчилица, такъ и ся шимедъ могутъ получить чесотку. Кормилица не должна выходить безъ нужды на холодъ, и никогда не покрывши хорошо груди. Естли же ея шипшки сдѣлаются нѣсколько холодны, то она, не согрѣвъ ихъ, не должна давать сосать ребенку, дабы онъ отъ того не занемогъ насморкомъ и кашлемъ. Впрочемъ я не советую всегда ей и сидѣть въ заперти. Напротивъ того она повинна, когда захочетъ, прохаживаться, и отправлять домашнія работы. Я весьма явственно примѣтилъ, что молоко одной хорошей кормилицы испортилось отъ сырости; а напротивъ того она опять чрезъ двѣ недѣли поправилось, когда она начала по двору прохаживаться, имѣть шлодвиженіе и отправлять легкую работу.

Въ пищу она все можетъ употреблять, только должна ѣсть въ опредѣслныя времена. Можнъ также ей позволить и слабое пиво, которое она

моженъ пишь споль часто и по спольку, сколько ей будущъ угодно, полькобъ онъ не было кислое, молодое, либо съ дряжками смѣшенное, или будучи нацѣжено, чрезъ ночь въ покоѣ спольное. Напрошивъ того виноградное и горячее вино (*), крѣпкое пиво и кофій для нее не годятся. Чай съ молокомъ можно ей давать, однако не часто. Сосудъ, для ея питья опредѣленный, ежедневно должно вымывать, всего лучше, ссѣли онъ изъ глинны. Нѣкоторые имѣютъ обыкновение лишь въ кормилицыно пиво сыропъ; однако я примѣтилъ, что онъ сего младенцамъ приключается сильный поносъ. Въ выборѣ пищи не слишкомъ должно быть разборчиву, обыкновенно для кормилицы всякая та пища, къ которой она больше привыкла, и которая ей вкусомъ пріятнѣе, наилучше. Однако она должна убѣгать кислаго и пріянаго кушанья. Соленое можно ей, смотря по обстоятельствамъ,

(*) Одинъ здоровый и крѣпкого сложенія младенецъ, воспитываемый также здоровою и крѣпкою кормилицею, находясь въ городѣ, всегда былъ здоровъ; но живучи цѣлое лѣто въ деревнѣ, каждое Воскресенье былъ боленъ. Я не могъ себя представить, отъ чего бы сіе происходило; ибо думалъ, что кормилица тоже все въ пищу употребляетъ и въ сіи дни, что и въ прочіе. Горячаго вина ей не давали, а полько по деревенскому обыкновению давали оное другимъ служанкамъ. Однако послѣдкомъ я спровѣдалъ, что онъ и ей отъ себя по нѣскольку удвѣяли. Послѣ того, когда сіе запретили, то дитя было здорово равно и по Воскресеньямъ, какъ въ прочіе дни.

естьямъ, либо позволимъ, либо запрешимъ. Если она будетъ въ семь годовъ, рѣпу и капусту: то отъ того у младенца дѣлаются въ брюхѣ ветры.

Для кормилицы нужно, чтобъ ее всякой день слабило; а какъ только который день ее не пославишь, то она должна о семъ сказывать. Сему недосыпству можно пособить клистиромъ, изъ двухъ драхмъ меду и одной драхмы соли составленнымъ, который вѣлѣть ей, смазавши левъ-инымъ масломъ, вложить въ задній проходъ. Слабительныхъ же лѣкарствъ ей никогда не должно давать, ибо когда во время приниманія ихъ не довольно въ кишкахъ находится молока, и она немного спустя ставешъ кормить ребенка: то слабительное не окажетъ въ ней никакого дѣйствія, но будетъ слабить младенца, и чрезъ то можешъ подвергнуть опасности его жизнь. Если же кормилица занеможетъ поносомъ, то должно ей дать полдрахмы ревеню, и спустя послѣ того 8 часовъ въ случаѣ надобности небольшою чайною ложечку кашки конского чеснока (*Hi Stachium Diascordij*). Младенцу же поспѣе стараніе-ся доставить другую пищу.

У кормилицы, которая порядочно кормитъ дитя, рѣдко бываетъ мѣсячное кровотеченіе. Если же оное случится, то по большей части бываешъ съ рѣзью въ животѣ. Я довольно примѣнилъ, что когда дѣти въ то время сосали грудь, то они были нездоровы. Для того наилучше, еслили кормилица будетъ давать въ сіи дни

дли высасывать с сои пища какой либо женщиной, а дитя между темъ кормить яичкою сыворопкомъ. Сію сыворопку можно приготовлять изъ молока, съ яйцами сплорожденного. Оная бывашъ пакогокъ свойства, елика достается при дѣланіи съ яйцами сыру. Только должно бую, либо естли и что другое младенца въ пищу употребляеиъ, рачительно изкрывать, дабы шуда не впа-ло какое нибудь насѣкомое, либо подобное тому.

Для того полезно всегда заблаговременно приу-чать младенца къ другой пищѣ. Но покамѣстѣ онъ еще весьма малъ, то должно его кормить такъ, какъ я выше упомянулъ, наипаче рожкомъ. После можно ему давать сырое молоко, и естли въ немъ бѣлазешъ жаръ, то можно его разжи-дить въваромъ сорочинскаго пшена, либо перловой крупы. Естли онъ спрѣдеиъ запоромъ, то можно оное смѣшать съ протѣженнымъ супомъ изъ овсяной крупы, и распустилъ въ немъ немного чистаго меду. Жидкая изъ муки камина нѣкогда для дѣтей не годится. Изъ оной выдѣлывается питательный сокъ клейкій, густый и склиз-лый, кошерый причиняетъ запоры въ брижсечныхъ железахъ, ошвердѣние желудка, кислоту, вѣтры и многія другія болѣзни, истребляющія по малой мѣрѣ половину младенцевъ въ нашей землѣ. 263 Морисовы и нѣкоторые Г. Циммерманомъ въ Цирхерсехъ сочиненіяхъ описанныя наблюденія до-вольно сіе доказываютъ. Можно также читать изрядную его книгу опытъ (von der Erfahrung Th. I. 6. 264) на Нѣмецкомъ языкѣ, въ которой нѣдѣ-

ное сие наставленіе пространнѣе изложено. Когда младенцу минуло уже полгода, то можно начинать его кормить сырымъ молокомъ, смѣшаннымъ съ небольшимъ количествомъ ржаныхъ сухарей, изъ хорошо выквашенаго хлѣба; приготовленныхъ и размоченныхъ прежде въ теплой водѣ.

Кормилица должна вовсе оставить любовныя дѣла, ибо въ прошедшемъ случаѣ младенецъ бываеѣтъ нездоровъ, и молоко становится соленымъ и вреднымъ. Слѣдовательно благоразуміе требуетъ пресѣчь въ случаѣ замужней кормилицы обхождение имѣть съ своимъ мужемъ. Если же она того нечѣтитъ, то уже не годится быть кормилицею. Сие самое обѣнѣе сказать можно также и тогда, когда она обрюхатѣетъ (*). Тѣлодвиженіе для кормилицы, какъ въ разсужденіи собствен-

(*) Еще обѣи ономъ пунктѣ врачи между собою не согласны, котораго рѣше не однако для общества весьма важно. Слѣдствія любовной страсти и опасность, чтооу какъ известно, такъ и зародышъ при новой беременности не претерпѣла недосыпѣка въ началѣ, съ одной стороны запрещаютъ любовныя сообщенія. Но съ другой стороны убытокъ въ размноженіи народа отъ столь долгаго воздержанія женщины, когда она по малой мѣрѣ чреѣзъ двѣ шреини того времени, въ которое бы могла понести, не совокупляется съ мужемъ, происходящій; равно какъ и нѣкоторыя наблюденія, доказывающія беззредность совокупленія, заслуживаютъ вниманіе. Можно о семъ чинѣть, какъ въ врачебныхъ наставленіяхъ о воспитаніи дѣтей Г. Вруцѣта

свеннаго ея здоровья, такъ и для отдѣленія въ ней хорошаго молока, не снискать густаго и къ окладу не столько склоннаго, необходимо нужно. По сей причинѣ непременно должно ее сдѣлать къ тому побужданію, либо засыпавши что нибудь рабочаго, на пр. всыпавъ ей малость пшеницу въ кормовыхъ, кашу бѣлую, либо что нибудь другое дѣлать до примѣшной иеринны. Однако она къ сему пристунавть не должна шопчасъ послѣ кушанья, но лучше за часъ прежде оного.

Когда дитя столько безпокойно, что кормилица за нимъ не можетъ довольно уснуть: то отъ того можетъ въ ней воспослѣдовать жаръ, молоко оскановившись, сдѣлаться слѣднымъ и нездоровымъ. Въ такомъ случаѣ должно къ ней прибавить няньку, дабы она могла съмъ или восемь часовъ въ сутки пользоваться сномъ.

Должно уметь ее отводиль отъ гнѣва; еслили же она разсердившись станеть кормиль млада, то отъ шопчасъ отъ того получить себѣ вредъ; приключатся ему судорги, либо другая какая нибудь опасная болѣзнь, могущая прекрат-

цетна (Education Medicinale des Enfants Tom. 1, p 161, 205, fgg.) такъ и въ Комментаріяхъ Г. (ф. Сьипена (Commentar in В. Арал. Tom. 4. p. 669, 673. fgg.) Оса они строгое заповѣдїе нѣсколько ограничиваютъ. Впрочемъ всякъ можетъ сказать, что каждая неумѣренность со стороны кормилицы, либо самой матери, сугубой вредъ причиняетъ М.

вратить его жизни. Докторъ Албинъ упоминаетъ объ одномъ младенцѣ, которому уже минулъ одинъ годъ, какъ онъ сосалъ грудь своей матери въ то время, когда она была весьма разгнѣвана. Слѣдствие отъ сего было такое, что ему произошло сильное кровоотеченіе изъ глазъ, изъ ушей, изъ носа, изъ рта, изъ задняго прохода и проч. и внаслѣдокъ онъ лишился жизни. Подобной сему примѣръ описанъ въ сведѣніи о родимцахъ подъ N. 3, для того всячески должно стараться, чтобы никто въ домѣ, а особливо изъ служанокъ не подавалъ ни какой причины кормилицѣ досадовать. Еслили же она дѣйствительно уже получила досаду, то запретили ей кормить младенца до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ ея гнѣвъ, грудь же ея велѣть хорошо высосать какой нибудь женщиной, а ей самой дать принять въ водѣ порошокъ, изъ 10 грановъ чистой селитры и 30 грановъ лимонныхъ лешешекъ составленный. (*) Я нарочно сказалъ, что питаніе должно велѣть хорошо высосать; для того что выдоивать ихъ, какъ обыкновенно сіе дѣлаютъ, не хорошо и вредно.

(*) Въ Шведскихъ Аптекахъ лимонныя лешешки (Troschitsen salt) обыкновенно составляютъ изъ куска сахару цедру (Oleum de cedro) облитого: съ оными великое имѣетъ сходство введенная у насъ въ употребленіе Essentia citri sicca, составленная изъ желтосажи лимонной корки и сахару. М.

Равнымъ образомъ вредно для младенца давать сосать грудь и тогда, когда кормилица испугается. Слѣдовательно она должна и въ такомъ случаѣ дать оную высосать, а по томъ принять 30 капель янтарнаго оленорожнаго росолу (*Liquor sodii seleni fuscipatus*), прежде нежели опять начнетъ кормить. Что страхъ скоро должно прекращать, то сіе явствуетъ само собою.

Когда кормилица находится въ заботахъ и печалится, то отъ сего ея питьеменъ худѣетъ. Въ такомъ случаѣ должно стараться открыть тому причину; и еслии не можно прекратитъ сего душевнаго ея безпокойства, то должно сыскать другую кормилицу.

Еслии по причинѣ вышеписанныхъ обстоятельствъ необходимость потребуетъ перемѣнить кормилицу; то всякой опасности можно избѣгнути, когда выбрать новую вышеписанный качества и имѣющую вѣсколько младше молоко, нежели каково было у прежней. Однако оно не должно быть моложе шести недѣль; ибо въ противномъ случаѣ младенцу можетъ приключиться жестокий поносъ.

Кормилица должна давать сосать грудь младенцу только тогда, когда онъ захочетъ есть, а не каждой разъ какъ только онъ заплачетъ либо закричитъ, что чрезъ то ослабѣваетъ его желудокъ и пища не сваривается; но слѣдуетъ естественной своей перемѣнѣ, окисаетъ, дѣлается острою и причиняетъ рвоту и рѣзъ въ животѣ. Рвоту сего рода

кормилицы и матери починаютъ для дѣтей по-
лезною: но она столькожъ имъ бываетъ полезна,
сколько и взрослымъ, естли они споль много и
споль часто ѣдятъ и пьютъ, что многократно
должны претерпѣвать рвошу. Слѣдственно умно
поступаетъ кормилица, естли она приучаетъ
своего питомца сосать только въ извѣстные ча-
сы и тогда, когда онъ проголодается. А что онъ
хочетъ ѣсть, то сіе можно узнать изъ ниже-
слѣдующихъ признаковъ: 1) естли онъ уже
чрезъ долгое время не сосалъ; 2) естли при-
стально глядитъ на кормилицу, и кула она ни
пойдетъ, обращаетъ въ слѣдъ за нею свои глаза;
3) естли примѣчается на глазахъ его радость,
коль скоро кормилица обнажитъ свою грудь; и
4) естли онъ сосетъ перстъ, ему въ ротъ вло-
женный (который однако долженъ быть чистъ).

Не хорошо поступаетъ кормилица, когда
она шотчасъ послѣ кушанья кормитъ младенца,
ибо въ такомъ случаѣ молоко скоро окисаетъ и
причиняетъ рѣзъ въ животѣ. Равнымъ образомъ
не должна она также и пошшу прежде зашприм-
ка давать ему груди, поному что въ то время
ся мооко принимаетъ на себя ошпру.

Естли у нее уменьшается молоко, то она
должна пить коровье молоко, разведенное водою,
съ укроинымъ сѣмевемъ вареное. Но естли она
беременна, то уже сіе пособить не можетъ.

Дабы младенецъ не могъ сдѣлаться косо-
скимъ, то должна кормилица давать ему сосать

обѣ шитьки попеременно. Для сей же причины не хорошо его и носить всегда на одной рукѣ.

Весьма нужно ей умѣть хорошо повивать младенца. Иначе не должна она крѣпко стягивать его пеленками, а особливо грудь и брюхо. Равнымъ образомъ нужно ей помнить то, что, если она одинъ разъ повивала младенца на правую руку, то въ другой уже должна повивать на лѣвую. Въ противномъ же случаѣ его шѣло можетъ сдѣлаться косымъ. Еслили младенецъ шопчасъ, какъ только его сповивтъ, закричитъ, то должно его распеленать; ибо сіе значитъ, что его либо жменъ (уоецъ), либо колеснъ булава, либо во время повиванія рука вышла съ своего мѣста (*). Коль скоро младенецъ помарается, или помочится, то должно его шопчасъ распеленать; иначе же могутъ подѣлаться на шѣлѣ его ранки. При сповиваніи должно наблюдать, чинобъ дверь была зашворена; въ противномъ же случаѣ удоб-

(*) Случилось однажды, что трехмѣсячный младенецъ, лишь только его сповили, необычайно началъ кичаться. Для прекращенія сего, довольно въ семъ искусившійся спарикъ, въ то время при немъ случившійся, далъ ему Д. Михаила (Specieum serphicum) нѣсколько красныхъ порошковъ, одинъ за другимъ однако крикъ его отъ того не переставалъ. Тогда пришло на мысль одной знатной молодой госпожѣ приказать распеленать младенца. Не успѣли сего сдѣлать, какъ онъ шопчасъ уиикъ. Послѣ того узнали, что при сповиваніи правая рука завернулась къ синиъ и начинала уже синѣть.

удобно сквозь оную можетъ войти холодный воз-
духъ. Но наилучше бы вовсе уничтожили сповиваніе
младенцевъ. Врачи многократно доказали справед-
ливость сего убѣдительными примѣрами: и Г.
Проф. фонъ Шульценгейнъ, а съ нимъ и другіе
въ нашей землѣ показали похвальный сему при-
мѣръ надъ собственными дѣтьми; ибо естли бы
взрослый человѣкъ принужденъ былъ такимъ об-
разомъ сповиваться, то не счелъ ли бы онъ
за великую себѣ тяжесть? Однако мы не имѣемъ
надъ невинными дѣтьми нашими никакой жалости.

Кормилица часто должна перемѣнять на мла-
денцѣ шапочку и никогда на него не надѣвать
узкой; ибо отъ того головка сжимается и не ско-
ро растетъ. Къ темячку обыкновенно привязыва-
ють кусокъ полотна для теплоты: однако луч-
ше пришивать оный къ шапочкѣ, либо ее на семь
мѣстѣхъ погуще вытягивать. Сіе самое должно на-
блюдать и въ разсужденіи темя, находящагося
позади висковъ, потому что и оное у нѣкоторыхъ
младенцевъ не скоро зарастаетъ.

Нечистоту, на младенцѣ послѣ рожденія
остающуюся, должно водою съ мыломъ хорошо и
съ осторожностію, въ случаѣ надобности, поча-
ще смывать. Въ противномъ же случаѣ отъ оной
можетъ воспослѣдовать сыпь. Склизь, на кожѣ на-
ходящуюся, должно омывать теплою водою; а
иначе она высыхаетъ и опадаетъ наподобіе че-
нуи. Въ Швеціи въ такомъ случаѣ женщины го-
ворятъ, что это сходитъ языческая кожа.

Сонливой кормилицѣ не должно позволять сидѣть съ ребенкомъ возлѣ жаровни. (*) Печальныя примѣры намѣ вредность сего доказали. Уголья также въ оную классть должно такіе, которыя бы не выпускали отъ себя ни малѣйшаго угару, ибо отъ онаго иногда младенцы лишаются жизни. Самые легчайшіе отъ сего припадка суть: головная боль и рвота, которыя однако онѣ возвращаются прикладываніемъ ко лбу полотенца, обмоченнаго въ теплый розовый уксусъ. Припадки же, кормилицѣ отъ угару восприимчивыя, скоро проходятъ, когда она выдетъ въ холодную горницу и приложитъ себѣ ко лбу кусокъ дерну.

При сповиваніи младенца ввечеру, либо ночью, должно свѣчу ставишь всегда въ его ногахъ; ибо онѣ всегда смотритъ на свѣтъ. Для того онѣ привыкаетъ косо глядѣть, когда свѣча спойтъ въ сторону. Сей припадокъ у самыхъ малолѣтнихъ дѣтей отъвращается тѣмъ, елики завязать другой глазъ, который еще не косъ, и держать оный такимъ образомъ чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ. Симъ способомъ онѣ принужденъ бываетъ порядочно глядѣть косымъ глазомъ, и тѣмъ приводить его въ надлежащее положеніе.

Когда младенецъ худо сосетъ, то наши женщины говорятъ, что у него приросъ языкъ, и про-

(*) Чадолюбивая мать всегда должна имѣть смѣрныя за сонливую кормилицю. Удушеніе въ постелѣ младенцевъ часто бываетъ слѣдствіемъ ея небреженія. М.

просятъ, чтобъ его подрѣзали. Однако я еще никогда сего припадка не видѣлъ. Обыкновенною сему причиною бываетъ то, что либо онъ имѣетъ рѣзь въ животѣ, либо молоко потеряло свой вкусъ. Но большею частію препяисваемъ въ томъ бывающіе соски кормилицы или матери, о чемъ уже выше упомянуто: а именно, когда младенецъ не въ состояніи бываетъ ихъ захватить ртомъ и сосать: въ такомъ случаѣ онъ, сосучи чавкаетъ ртомъ. Сего порока исправить не лзя, но не обходимостъ требуетъ сыскать другую кормилицу. Прирастѣніе языка узнается по тому, когда младенецъ во время крику не прижимаетъ его къ поднебенью, либо не можетъ высовывать изъ рта; при томъ концы онаго бываетъ не овальный, но какъ бы раздвоенный; иначе же его приросшимъ считать не должно. Но еслили необходимостъ требуетъ его подрѣзать, то никогда не должно процинывать ногтями, но потребно для сего сыскать искуснаго человѣка. Въ противномъ же случаѣ можно повредить кровеносные сосуды; отъ чего воспослѣдуетъ сильное кровоизліченіе, котораго иногда и прижизни не лзя, еслили младенецъ глотаетъ кровь. Таковыя несчастныя случаи описываетъ Морисо въ 30 своемъ наблюденіи, и Дюансій въ сочиненной имъ книгѣ о Хирургическихъ операціяхъ (сир. 626). Еслили безъ нужды подрѣзать подъязычную уздочку, то отъ того можетъ иногда и задушиться младенецъ; ибо его языкъ заворачивается назадъ и опускается въ гортань. Таковыя примѣры упоминаетъ Пешитъ въ

— 24 —
запискахъ Французской Академіи Наукъ, въ 1741
году изданныхъ.

Младенецъ, начинающая жизнь, имѣетъ только
слабый слухъ. Для того не должно шопотомъ
говорить въ его горнищъ, но мало помалу прі-
учать его къ голосу. Кормилица должна притомъ
въ младенческомъ рту пальцемъ водить взадъ и
впередъ, а особливо по деснамъ, дабы удобнѣе
могли прорѣзаться зубы.

Когда кормилица держитъ дитя прямо, то
она должна всегда поддерживать его голову. Рав-
нымъ образомъ должно его и класть всегда голою-
кою нѣсколько выше прочаго тѣла; ибо въ противномъ
случаѣ можетъ ему приключиться ударъ. Не хорошо также оставлять младенца всегда, ли-
бо и чрезъ долгое время лежать на одномъ боку,
но должно его, коль скоро онъ со сна закричитъ,
либо пробудится, поворачивать на другой.

Желательно бы, чтобъ вовсе уничтожено бы-
ло вредное обыкновеніе качать младенцевъ. У
всѣхъ отъ качанія кружится голова, и они стано-
вятся, какъ бы пьяными. Молоко также отъ
того въ желудкѣ удобно свораживается. При-
томъ сонъ шопъ не годится, который стараются
ему доставить качаньемъ. Споятъ только
истребить причину его крику, то онъ и безъ то-
го спокойно уснетъ. Наши крестьяне обыкновенно
употребляютъ всякія колыбели, которыхъ ка-
чаніе еще не такъ бываетъ сильно. Г. фонъ Сви-
тенъ (Comment. Том. 4. р. 68.) упоминаетъ объ
одномъ осмилѣтнемъ мальчикѣ, котораго тона-
рица,

рици, съ нимъ игравшіе, положили въ колыбель, и придержавши его въ оной сильно качали: опъ чего онъ впалъ въ глубокий обморокъ, и по шомъ блевалъ желчью зеленою, какъ ярь.

Младенцевъ вездѣ можно ставить нѣ колыбели, только бы оная не стояла возлѣ очага, возлѣ печки, либо возлѣ спѣны, гдѣ идетъ труба изъ той горницы, которая топится: ибо опъ сего они весьма привыкаютъ къ теплотѣ; и коль скоро ихъ пошомъ принести къ окну, то они получаютъ насморкъ. Въ разсужденіи положенія колыбели еще и то наблюдать должно, чпобъ она не стояла тамъ, гдѣ великій свѣтъ прямо на младенческіе глаза падаетъ; ибо и взрослому чело-вѣку потчасъ бываетъ примѣтно, сколь тяжело для его глазъ, есшн онъ, сидя за столомъ про-шивъ окна, чшо нибудь дѣлаетъ.

Дабы сберечь младенца опъ чесотки, то не довольно шого, чпобъ держать въ чистотѣ его горницу; но для сего должна также и корми-ца быть около себя опрятна; пришомъ дѣтскія пологонды, простыни, пеленки и сивальники хорошо мыть и часто перемѣнять.

Обыкновенно младенца кормятъ грудью до тѣхъ поръ, пока не вырастетъ у него 16 мо-лыхъ зу овъ; однако времени для сего опредѣ-лить не можно. Слабому дитяти обыкновенно нужѣе бываетъ сосать долѣе, нежели крѣпкому. Впрочемъ его всегда мало помалу должно опъ груди отучать такъ, чпобъ онъ на первый слу-чай сосалъ только предъ наступленіемъ ночи.

Если же его хотятъ совершенно оплучить опъ оной, то должно нѣсколько помазать ссски полынною эссенціею (essentia absinthii), чѣмъ его скорѣ можно оплучить опъ сей пищи.

Когда младенца оплучаютъ опъ груди, то сначала онъ подверженъ бываетъ небольшому запору. При всемъ томъ ѣсть много; а опъ того страдаетъ незвареніемъ желудка и чувствуетъ въ ономъ боль. Для того иногда нужно бываетъ ему дать немного маннаго сахару, либо нѣсколько разъ водоренеевой настойки (apina thei), которая имѣетъ ту пользу, что испребляетъ кислоту и укрѣпляетъ желудокъ и кишки.

у малолѣтнихъ дѣтей часто мокнетъ за ушми, хотябы они впрочемъ и совершенно были здоровы. Въ семъ случаѣ не должно употреблять згоняющихъ внутрь лѣкарствъ; ибо они легко могутъ прогнать сію мокроту къ глазамъ. Такъ напр: помазалъ нѣкико однажды для залѣченія сего припадка сыну знатнаго господина бѣлальною мазью; опъ чего хотя за ушми спало сухо, однако вмѣсто того на глазныхъ вѣкахъ такія открылись ранки и самые глаза такъ покрасѣли, что опасались, чшобъ онъ не лишился зрѣнія. Впрочемъ онъ выпользованъ опъ сей болѣзни нарывнымъ пластыремъ, за ушми приложеннымъ, а красною Сенивиевскою мазью (*), которою по-
сред-

(*) Сія мазь составляется слѣдующимъ образомъ
R. Butyr. pop. saliti 3ij Возми свѣжаго не соленаго
osae albae 3j коровьяго масла двѣ драхмы,
 воску бѣлаго одну драхму.

средствомъ шовкой кисточки помазывали глазныя вѣки.

Весьма хорошо, еслили маленецъ не имѣетъ никакой причины кричать, ибо онъ много крику протсходящъ весьма худыя сладствія. Во время продолженія онато кровь останавливается въ мозгу, и хошя она протгоняется въ легочныя бѣоущія жилы, однако оншуда возвращаться не можетъ. Я не упоминаю о томъ, что у младенца онъ сего спановится сухо въ горлѣ, дѣлается въ нѣбѣ жаръ и легко можетъ воспослѣдовать грыжа.

Все искусство успокоить младенца состоитъ въ томъ, чтобъ 1) либо исцѣпить причину его крику, либо 2) чѣмъ нибудь занять его мыслъ, дабы онъ ту причину какъ бы забылъ, или пренебрегъ.

Когда онъ кричитъ онъ того, что нибудь у него болитъ, какъ сіе заключать можно, еслили у него нѣтъ нанизъ, либо онъ марается зеленымъ каломъ, либо смоченныя мочою его пеленки, высохши особливый будущъ имѣть дѣшъ; либо предшествовали предъ шѣмъ наружныя причины

Mercurii praescriptum rubri 3℔. Красной ртути полдрахмы.

M. super len igne in mortario vitreo. Смѣшай все на легкомъ огнѣ въ стеклянной ступкѣ.

Бурганъ. (*Morb. oculorum* Ed. Gott. p. 56.) примѣниваетъ къ сей мази еще 2 или 3 грана оливы (оранж.). М.

чины, какъ то: сдѣлавшіяся гдѣ нибудь на пѣ-
лѣ ранки, парывы или подобное тому: то корми-
лица пошчасъ должна о семъ увѣдомить родите-
лей, дабы немедленно можно было ему подать
надлежащую помощь.

Есѣли дитя голодно, то должно его покор-
мить, есѣли же оно пересосало, то оно до тѣхъ
поръ не можетъ быть спокойно, пока его не
вырешѣ.

Смотрѣть должно также, чтобъ колыбеля
его была тепла.

Есѣли младенецъ лежалъ долго на одномъ
боку, и овый у него опъ того заболѣлъ: то дол-
жно его перевернуть на другую сторону.

Есѣли онъ крѣпко сжатъ пеленками, либо
во сѣ какой нибудь членъ перележалъ; либо по-
марался и помочился то можно его крикъ пре-
драшить распеленаніемъ, согрѣваніемъ предъ кан-
форкою ногъ и перемѣненіемъ его бѣлья. Опъ шу-
таго повиванія кровь нуде стремится къ головѣ,
для того даже и такое дитя, у котораго ничто
не болитъ, бываетъ веселѣе, когда развяжутъ
его пеленки.

Младенецъ можетъ также кричать и опъ
того, когда слышитъ у своей колыбели чей ни-
будь необычайной для него голосъ. Сіе надобно
опмѣнить; либо щакový чловѣкъ долженъ
молчать.

Есѣли пропущено то время, въ которое
обыкновенно его кормятъ, либо жадуетъ спать:

то должно впрядь шакъ не дѣлать; ибо всякое упущеніе того, къ чему младенецъ привыкъ, можетъ быть причиною его крику.

Должно осмѣдомаясь, не имѣешь ли кормилица мѣсячнаго кровотеченія; ибо въ семъ случаѣ обыкновенно младенцѣ бываетъ безпокоенъ. Главная сему причина та, что женщины въ то время бывающъ чувствительнѣе и нѣжнѣе.

Естьли же не можно доискаться настоящей причины его крику, либо не лзя се въ скорости изпреоить: то въ такомъ случаѣ должно употреблять другія средства. На сей конецъ можно показывать ему что нибудь для него удивительное, либо цвѣтшое, блестящее или раскрашенное. Должно его приносить къ окну, къ зеркалу, гремѣть предъ нимъ, звонить въ маленький колокольчикъ, стучать обо что нибудь звонкое, прибивать ему, покусать его (только не тотчасъ послѣ сосанія груди), понести въ другую горницу, дать кому нибудь, кого онъ любилъ на руки, показывать ему, естьли онъ женскаго; пола, дѣвочекъ, а когда мужскаго, лошадь и проч. При семъ особливаго примѣчанія достойно бываетъ то, онъ чего онъ перестаетъ плакать. Наипаче должно поела наблюдать, чтобъ кормилица не давала ему филои, есрѣяку, или подобнаго тому; ибо младенцы, копорымъ даютъ снвещи, становятся неразторопны, непонятны, претерпѣваютъ судорги и умирающъ.

Изъ всего сего заключить можно, сколь многихъ младенческихъ болѣзней кормилица можетъ
быть

быть причиною; сколь должно быть осторожену въ выборѣ оной, и сколь строго родители должны смотрѣть за ея поступками. Отъ ея шѣлосложенія зависить здоровье, либо болѣзнь младенца, и въ ея смотрѣннн состоятъ либо предостеречь его отъ изуродованій, либо оныя ему причинить. Кто въ пользу важномъ дѣлѣ не полагается на одно щастіе, тотъ употребляетъ для себя средства, въ пользу его дѣшей Провидѣніемъ нпзпосланные.

ОТДѢЛЕНІЕ 2.

О запорѣ въ брюхѣ.

Новорожденнаго младенца первыя сутки не должно прикладывать къ груди, (*) но вмѣсто этого должно ему давать сосать завернутъ въ тонкое полотенце небольшое количество маннаго сахара или манной кашки (Elecluarium de manna phar-macop. Willemb); ибо въ первые два или три дня нужно, чтобъ его по три либо по четыре раза въ сутки слабнло, дабы тѣмъ совершнню могъ испраздниться первый дѣтскій калъ; а послѣ сего довольно, еснли онъ и два раза въ день ма-
ра-

(*) Безъ сомнѣнія, Авторъ сіе софтуслъ въ шаконѣ случаѣ, когда днша кормитъ кормилица; ибо извѣстно, что нѣтъ ничего лучше для младенца въ первыя сутки, какъ матернее молоко. Г.

рается. Чѣмъ больше младенецъ сосетъ грудь, тѣмъ чаще долженъ мара́ться.

Когда младенца чрезъ цѣлыя сутки ни разъ не слабилъ, то онъ спрѣдетъ запоромъ и требуетъ скорой помочи. Самымъ надежнымъ въ семъ случаѣ можешь служить лѣкарствомъ вышеписанная манная кашка. Оной должно взять одинъ унцъ и даватьъ ему по чайной ложечки чрезъ два часа до тѣхъ поръ, пока по ворчанью въ брюхѣ будетъ примѣчено, что она уже оказала свое дѣйствіе. Полугодовалому младенцу можно давать по двѣ чайныя ложечки за однимъ разомъ. Если же, не смотря на то, никакого дѣйствія не воспользуется, то должно пособлять природѣ посредствомъ клистира, который можно сдѣлать изъ сала, обмоча оное въ деревянное масло; либо взять для сего винную ягоду, и вынувъ изъ оной зернушки, онымъ же масломъ смазавъ, вложить въ задній проходъ. Тѣ младенцы, которымъ спятиваютъ крѣпко пеленками брюхо, только тогда мараются, когда ихъ расповьютъ.

Жидкая мясная похлебка почти вся входитъ въ кровь. Но съ молокомъ сего не бываетъ. Для того отъ оного отдѣляется много калу. Сверхъ того младенцы бывають слабы, и не такъ хорошо варить ихъ желудокъ. Кишки у нихъ также въ сравненіи съ тѣломъ длиннѣе, нежели у взрослыхъ людей. По той причинѣ много отъ него ослабѣетъ въ ихъ желудкѣ; и исцраженіе низмѣ у нихъ соравнительно бываетъ въ большемъ количествѣ, нежели у взрослыхъ.

Когда


Когда кормилица имѣетъ старое молоко, то большую частію воспитываемый ею младенецъ бываетъ подверженъ запору. Нѣкоторые имѣютъ обыкновеніе для вспоможенія природѣ давать по уграмъ кормилицѣ вѣшь по нѣсколькѣ копченыхъ небольшихъ сельдей (*); ибо она послѣ нихъ больше пьетъ; а молоко отъ питья разжижается. Но если сіе не помогаетъ, то необходимо нужно сыскать другую кормилицу, которой однако молоко не должно быть моложе 6 мѣсяцевъ.

Еслили младенецъ, оплаченный уже отъ груди, спрощетъ запоромъ, то должно каждый день пощипать его брюхо теплою рукою надъ желудкомъ и надъ кишками, давать ему по явного молока, съ овсянымъ изваромъ и мёломъ смѣшенною; заспавляя нѣсколько побѣгая и скоро послѣ того стараться побудить природу въ опредѣленное время къ испражненію. Когда сіе дѣлать чрезъ нѣсколько дней сряду по уграмъ въ одинакое время, то напослѣдокъ нужное сіе испражненіе можетъ быть приведено въ надлежащій порядокъ. Еслили же всегда употребляютъ лѣкарства, то пѣмъ еще нуде можно умножить болезнь, ибо отъ оныхъ кишки становящіяся чувствительными.

Ма-

(*) Оныя суть нѣсколько опитѣнны отъ извѣстныхъ сельдей (*clupea harengus*) и бываютъ гораздо ихъ меньше. Ихъ соленыхъ даютъ въ шѣхъ домахъ, гдѣ царствуютъ еще древнія простоты, люлямъ завтракать. Впрочемъ сія рыба также употребляется и при столахъ. М.

Масло деревянное и коровье равно какъ и сало вредятъ желудку, уменьшаютъ свивающіеся движеніе кишекъ, и имѣтъ такимъ не довольно сладятъ. Яичный желтокъ не годится также потому, что въ немъ находится великое количество масла. Сего же самаго ожидать должно и отъ молока самой матери либо кормилицы, если оно жирно (смотри Г. Галлера Елемента рудол Т. 6. стран. 200. и Т. 7. стран. 90 и 103; также Г. Тиссона Avis au peuple). Для сей-то причины Швейцарцы, которые питаются жирнымъ молокомъ своихъ матерей, великие прѣмы слабительныхъ употребляютъ (Тиссонъ въ сказанной книгѣ стран. 573).



ОТДѢЛЕНІЕ 3.

О выпаденіи заднепроходной кишки.

Ие рѣдко случается, что у младенцевъ, страдающихъ поносомъ, выходитъ заднепроходная кишка (*). Если сіе поспѣетъ не будетъ пре-

(*) Заднепроходная кишка отъ случившагося гдѣ либо разслабленія, либо только выпадаетъ, либо еще сверхъ того отъ сужившагося задняго прохода вмѣсто спягивается и принимаетъ на себя цвѣтъ изнема - красный или похожій на свинегъ. Сей припадокъ не знающіе люди считаютъ за почечуй, однако оный въ младенческомъ возрастѣ бываетъ весьма рѣдокъ, и развѣ только чрезъ прикладываніе къ сему мѣсту наружныхъ лѣкарствъ произведенъ бытъ можеть М.

вскрадено, то можеть перемѣниться въ привычку. Для исправленія сего порока я не находилъ никогда лучшаго средства, какъ припариваніе мягкою грецкою губкою, въ теплое вино обмоченною. Равнымъ образомъ помогаетъ мѣлая сажа, либо сполченая и просѣянная сосновая кора, естли копорю нибудь изъ сихъ кишку осторожно присыпать и ее вправишь. Полезно также оную куришь масшикою.

Естли сей припадокъ упрямъ, то конечно его можно вылѣчить шѣмъ, когда сажашь младенца надъ судномъ на высокомъ стулѣ, для испраженія, такъ, чѣобъ онъ не доставалъ ногами до земли. Ибо въ такомъ случаѣ не выходитъ кишка. Родители не должны о семъ беспокоиться. Сія слабость проходитъ сама собою, какъ только младенецъ войдетъ въ лѣта, и получитъ въ тѣлѣ большую жѣлость.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 4.

О обопрѣлостяхъ.

Обопрѣлости скоро заживающъ, естли ихъ присыпать порошкомъ корня волчей лапы (farina licopodii) (*). Заспарѣлыя же изъ оныхъ должно помазывать слѣдующею мазью:

Р

(*) Сей порошокъ во всякомъ домѣ извѣстенъ, и потому желательно, чѣобъ не пакъ часто имѣло онаго употребляли пудру и свинцовыя бѣлавы. Пудра какъ явствуетъ изъ наблюдений

Г.

R. ungu. roma. \mathfrak{z}^{β} Folium
Zinc.

Farin. lycopod. aa $\mathfrak{z}j$ misce
exacte.

Возьми яблочной мази съ
воскомъ слѣпанной под-
унца, двѣшовъ цинко-
выхъ, порошка корня
волчей лапы по одной
драхмѣ, смѣшай хорошо
вмѣстѣ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е Б.

О вѣтреной грыжѣ (pneumatocèle)

Болезнь, которую разумѣютъ подъ именемъ
вѣтреной младенческой грыжи (•) удобно
испробляется, когда фланель, либо хлопчатую бу-
магу, накуривъ мастикою часто къ оной приклады-
вать.

Г. Линней (на пр. Атосп. ас. V. 1. 5. стран. 95)
посредствомъ содержащихся въ ней червячковъ
не рѣдко производитъ чесотку; а присыпаніе
бѣлилами напаче не поволяетъ Г. Бакеръ
(Medical Transactions Vol 1. p. 311) который при-
мѣтилъ, что онъ того происхолятъ судорги М.

(•) Нѣкоторые младенцы рождаются на свѣтъ съ
сего болѣзнію, а нѣкоторые получаютъ оную
уже послѣ рожденія, а особливо отъ сильнаго и
долвремениаго крику. Теперь извѣстно, что
сей припадокъ, младенцамъ мужеска пола при-
ключающійся, состоитъ не въ накопленіи въз-
духа въ мошонкѣ, какъ нѣкоторые древніе и
новѣйшіе писатели думали, и какъ онъ еще
и теперь на многихъ Европейскихъ языкахъ
обыкновенно подъ именемъ вѣтреной грыжи раз-
умѣется; но напрошивъ того свѣтъ происхо-
дитъ 1.) либо отъ скопленія не большого коли-
чества воды въ наружной шлуястной оболочкѣ
(intra)

взять. Нѣкоторые какъе припариваютъ сію грыжу подопицами, намоченными извѣстковою водою, съ небольшимъ количествомъ Французской водки смѣшенной, либо вмѣсто того съ пользою употребляютъ

(*l'huile végétale*), когда она еще имѣетъ сообщеніе съ брюшною впадиною, 2) либо онѣ есть не что иное, какъ настоящія грыжи, хотя впрочемъ и небольшія, содержащая въ себѣ кишку, (смотри между прочимъ доказательство Гейстера о небытіи воздуха, въ его Хирургіи, и Потовы обстоятельнѣйшія о семъ объясненія въ его *Treatise on the Hydrocele* Ed 2. p. 3. 93. 208), 3) либо иногда бываетъ скопленіе воды въ капсулѣй мошоночною оболочкѣ (*hydrocele tertia*), которая иногда простирается до самой крайней плоти. Въ семъ случаѣ глупыя Французскія няньки стараются, по ихъ мнѣнію скопившійся воздухъ, высасывать; но тѣмъ самымъ только умножаютъ бѣдствіе (*Levet in Art des Accoucheurs* Ed 3. p. 258). Изъ сего явствуетъ, что лѣченіе въ сей болѣзни дожно быть не одинаково. Хотя г. Фонъ Розенштейнъ сихъ трехъ случаевъ не описалъ подробно, однако кажется для всѣхъ ихъ предписалъ пристойныя средства. Въ первомъ случаѣ, когда еще каналъ въ брюшинѣ, изъ которой, послѣ оуспѣвшихся въ мошонку шудяшъ, дѣлается наружная шудяшная оболочка, остается открытымъ, полезно, кромѣ предписанныхъ окуриваній, припаровъ и пластыря, лежать больному на спинѣ, ласы вода оныя въскладъ въ брюхо, и прижимать въ извѣстномъ мѣстѣ. Если же се будетъ узждено до того, что оный каналъ сроснется, то необходимость пребудетъ, когда малолѣтній подростетъ, предпринять Хирургическое лѣченіе, въ которомъ случаѣ Елсѣ при-
жи-

блѣютъ Рудандовъ сѣрной пластырь (*Emplastrum diafulphuris Rulandi*) (*)

В 2

Про-

жиганіе предпочиняетъ прочимъ способамъ. — Упругія повязки отъ грыжи полезны бывають только во второмъ случаѣ послѣ исправленія выпавшей части — Третій видъ проходитъ часто самъ собою, либо отъ употребленія вышеписанныхъ окуриваній и припарокъ; либо отъ припарокъ, съ крѣпительными и пряными препаратами въ винѣ карековыми, дѣлаемыхъ. Между тѣмъ должно стараться прекратить причины младенческаго крику. Пуцозъ также примѣнилъ (*Traite des Acc ischemeis* p. 317.) что послѣдній сей видъ грыжи миновался отъ перемѣны кормилицы М.

(*) Мартыновъ Рудандъ старшій, описываетъ сей пластырь изъ Салута I. singulorum еспруга-
тис р. 58. откуда Клейнъ заимствуетъ его составъ. Онъ его дѣлаетъ слѣдующимъ образомъ:

R Balsam. sulphur. Ru- В. бальзаму сѣрнаго Ру-
land. ℥iij. дандова три унца.

cerae ℥β v. ℥vj. Воску полунца, или шесть
драхмъ.

Colophon. ℥iij. Конифоли три драхмы.

Myrrhae ad pondus от- Смирны, сколько по коли-
янт. честву всѣхъ сихъ вещей.

F. S. A. Emplastrum. Сдѣлай по правиламъ
искусства пластырь.

Сѣрный же бальзамъ, для составу сего пласты-
ря употребляемый, составляется слѣдующимъ
образомъ

R olei lini opt ℥iij Возьми самого чистаго
льнянаго масла два фунта.

Тех-

Простые люди обыкновенно не стараются о излѣченіи сего припадка, и потому дѣлаются не способными къ тяжелой работѣ. Отсюда происходитъ, что всегда между осмью мужиками одинъ бываетъ съ грыжею. Младенцамъ удобно она можетъ приключиться для того, что брюшина у нихъ бываетъ слаба. Мѣсна, изъ которыхъ обыкновенно случается грыжа, описываетъ Г. Галлеръ (Element. pl. anat. Т. 6. р. 378) и Г. Арнольдъ (Memoirs de Chirurgie). Самымъ надежнымъ средствомъ для излѣченія оной бывающъ повязки съ стальными пружинами.

ОТДѢЛЕНІЕ 6.

О насморкѣ.

Насморкъ мѣшаетъ спать младенцамъ и сосать грудь. Сей болѣзни подвержены бывающъ нѣ младенцы, которыхъ шепло содержатъ, либо ихъ колыбельку ставятъ воздѣ печи, или кладутъ на сквозномъ воздухѣ. Оную излѣчить можно посредствомъ помазыванія въ носу мажораннымъ масломъ, либо вдуваніемъ въ оный по немногу мѣлкаго сахару. Впрочемъ я не находилъ для сего лучшаго средства, какъ яичное масло, естльмъ цнымъ.

Terebenthinae ℥ij.

Sulphuris citrin. ℥ij.

Liquatur sulphur, tunc.

adde olea et bullant igne

leno.

Терпентину три унца.

Сѣры два унца.

Распони сѣру и потомъ

прибавь масла и вскипяти

на легкомъ огнѣ. М.

онимъ въ носу мазать. Когда носъ такъ сильно
залегъ, что младенецъ сосать не можетъ, то въ
онъ должно вкладывать теплой кусочикъ по-
дошна, обмоченный въ составъ, изъ полуца ма-
йоранной воды, одного или двухъ грановъ бѣлаго
хуноросу и равнаго количества бѣлаго властерія
или соку ослиного огурца сдѣланный.



ОТДѢЛЕНІЕ 7.

О рѣзѣ въ животѣ.

Когда младенецъ беспокоится, часто, незна-
и громко вскрикиваетъ, корчится, бьетъ
ногами, не можетъ хорошо спать, во снѣ усми-
хается, иногда съ жадностію сосетъ, грудь ча-
сто беретъ, однако оную толчасъ изъ рта вы-
пускаетъ: то онъ имѣетъ рѣзъ въ животѣ.

Въ такомъ случаѣ его калъ либо уже зеленъ бы-
ваетъ, либо скоро послѣ того получаетъ онъ цвѣтъ;
либо его пеленки высохшія спановятся зелеными.
Кромѣ того въ ономъ примѣчается кислый запахъ,
равно какъ и рыгается больному кислымъ. Еслили
еще долго продолжается, то калъ спановится похожъ
на яичницу. Когда младенецъ больше обыкновен-
наго мочится такъ, чію, какъ говорятъ, по уши
бываетъ мокры; то скоро послѣ того слѣдуетъ
рѣзъ, чаятельно потому, что послѣ сего быва-
етъ запоръ.

Весьма нужно въ семъ случаѣ искать скорой
помощи. Ибо рѣзъ обыкновенно перемѣняется

въ сунурги, либо въ родимецѣ. Достойно примѣчанія, что младенцѣ спражлушій рѣзью, еспьли его держать прямо предѣ кормилицею, когда захочетѣ сосать грудь, безѣ затрудненія оную беретѣ и сколько хочетѣ сосетѣ. (*)

Спражлушій рѣзью младенцѣ иногда потверженѣ бываешѣ запору, а иногда иѣтъ. Въ первомѣ случаѣ безѣ замѣлѣнія должно спаранься посредствомѣ мавней кашки досаваивѣ ему свободное испражнение низомѣ; либо, еспьли долго ждѣть, посредствомѣ промывашельнаго, которое соспаивѣ должно изѣ шести сподовыхѣ ложекѣ молока, чешырехѣ деревяннаго масла и не большаго количества сахару, все сіе хорошо вмѣсто смѣшавѣ. Еспьли же его доволно слабишѣ, то скоро можно прекратишѣ его мученіе прикладываніемѣ къ брюику шеплой левешки, сдѣланной изѣ небольшого количества деревяннаго масла, муки и одного яичнаго желтка, которую должно спечь на сковородѣ. Можно также Шерцовѣ бальзамѣ (**) въ ложкѣ распопивши и намазавши на лайкѣ къ пузку прикладывать: однако оный привосиѣ

облет-

(*) Можетѣ быѣть, что такимѣ образомѣ иѣсколько опускаеѣся внизѣ кислопта опѣ верхняго желудочнаго отверстія, которое всеѣма изобилуетѣ чувствительными жилами, и потому бываешѣ раздражительно.

(**) Въ Шведскихѣ Апшекахѣ сей бальзамѣ (Pharm Suec Ed 2. p. 58), balisatum aromaticum называемый, приготавлиеѣся слѣдующимѣ образомѣ:

Roi.

облегченіе только на короткое время. Всасывающіе порошки также малолыпнымъ дѣтямъ приносятъ нѣкоторую пользу: но трудно узнать, довольно ли количество оныхъ употреблено. Бѣлая магнезія, по Эдинбургской фармакопее дѣлаемая, всего лучше въ семь случаевъ потому, что она испредаляетъ кислоту и слабитъ. Оную можно давать въ обыкновенномъ млеческомъ пищѣ, въ миндальномъ молокѣ, либо въ укропной водѣ. При томъ я велю матерѣ или кормилицѣ, принимать по скрупулу порошка для кормилицъ, четыре или пять разъ въ день въ теплой водѣ. Сей порошокъ составляется слѣдующимъ образомъ: Взявъ одинъ унцъ бѣлой магнезии, желстости слаб-

В 5 - - - - - лой

<i>R. ol. Nuc. moschat. expr. ℥i</i>	Возьми выжатого масла
<i>cerac flav. ℥ij.</i>	мушкетнаго орѣха одинъ
	унцъ.
<i>Modico igne liqnatis et</i>	Воску желтаго двѣ драх-
<i>inde remotis aude: Olei</i>	мы, расплавиши на умѣ-
<i>scaphophyll.</i>	ренномъ огнѣ; прибавь ма-
	сала гвоздичнаго.
<i>Lavendul aa ℥ij.</i>	Лаванднаго поодной драх-
	мѣ.
<i>Succin. rest ff. ʒß.</i>	Янтарнаго крѣпкаго пол-
	скрупула.

По Брандербургской фармакопее (стр. 37.) и Клейновой (*Selectus rationalis Medic. p. 23*) называется сей бальзамъ *Balsamum cerphaleum scherzeri et Weltschii*, и къ оному прибавляется еще больше перегонныхъ маселъ, только исключается гвоздичное, которыя однако, по причинѣ изобилія предписанныхъ въ семь рецептовъ, во все излишними быть кажутся.

лой и сухой померанцовой корки, сладкаго укроп-
наго сѣмя и бѣлаго сахару по двѣ драхмы и смѣ-
шавши все вмѣсто, стереть въ порошокъ. Ес-
ли его принимать не противно, либо болѣзнь нѣ-
которымъ образомъ возираждается: то должно его
давать чрезъ долгое время кормилицѣ и всегда,
какъ только младенецъ захвораетъ рѣзью. Я
знаю одну кормилицу, которая, назадъ шому че-
тыре года, чрезъ восемь мѣсяцовъ сряду по утра
и въ вечеру каждый день оный принимать при-
нуждена была. Ибо коль скоро она переставала
принимать сей порошокъ; то тотчасъ млада-
нецъ становился не здоровъ и имѣлъ рѣзъ въ жи-
вотѣ. Впрочемъ онъ обае теперь живы и здоровы.

Самому младенцу я заранѣе начинаю давать
по немного, но часто, желе оленьяго рогу, только
безъ кислопы приготовленнаго; при томъ даю по
чайной чашкѣ каждый часъ или чрезъ полчаса
либо всякой разъ, когда онъ пробудился слѣдую-
щее младенческое молоко.

R aqu. flor. Tiliae.	℥ij.	Возьми воды липовыхъ цвѣ- товъ два унца.
Cerafor. nigr.		Волы черныхъ вишенъ.
Olei Amigdal. rec. et frigide express. aa	℥j.	Миндальнаго масла изъ сы- раго и свѣжаго миндаля выжатаго по одному унцу.
Sal. Tartar. ℞j.		Соли щелочной винокамеш- ной одинъ скрупуль.
Vitell. oui. rec. ℥iij.		Свѣжаго яичнаго желтка три драхмы.
Mucilag. gum. arabic	℥j	Клею бѣлой камеди одну драхму.
M. P. S. lac. pro infante.		Смѣшай и вздвини: мо- локо для младенца.

Естьльж

Ешали бы можно при томъ давать ему не-
большія пилюли весомъ въ полграна, соспавлен-
ныя изъ желчи на пр. угровой, смѣшенной съ не-
большимъ количествомъ шафрану : то бы оба сіи
средства вмѣстѣ не только испребляли кислоту,
но и помогали пищеваренію. Мыло также могло бы
служить хорошимъ лѣкарствомъ, ешали бы оно
не такъ скоро горѣкло. (Зри о семъ г. Vanlieweten Com-
ment. Т. 4. р. 884. и о пользѣ желчи вообще Haller
Element-physiol. Т. 6. р. 608).

Кормилица въ семъ случаѣ должна доволь-
ствоваться однимъ только мясомъ и жидкими
мясными похлебками, съ яичнымъ желткомъ ва-
ренными; при томъ убѣгать всего кислаго и кисло-
ту производящаго. Нужно также ей приспавить
помощницу, дабы ея молоко отъ беспокойства и
бессонницы не испортилось. Тѣлодвиженіе до лег-
кой испарины не только въ сіе время, но и всег-
да ей весьма полезно. Ибо я примѣшилъ, что
отъ непрестаннаго смѣнія самое лучшее корми-
лицино молоко чрезъ четырнадцать дней испор-
тишься можетъ, а чрезъ надлежащее тѣлодвиже-
ніе опять оное чрезъ столько же дней поправ-
ляется. Но ешали для сего всего вышеписаннаго
не довольно; то должна прѣискать другую кор-
милицу, только бы ея молоко не имѣло въ себѣ
ни малой кислоты и было бы нѣсколько моложе,
нежели каково было у прежней.

Младенцамъ въ деревняхъ часто приклю-
чается рѣзь, а особливо лѣтомъ, потому что
большая часть пищи ихъ матерой состоитъ изъ
жир-

кислаго молока. Весьма многіе изъ нихъ чрезъ то даже лишаются жизни. Ибо послѣ рѣзи при-
ключающіяся судорги и родимецъ, а попомъ ударъ.

Естьли бы сіи матери не находились въ без-
преспанномъ тѣлодвиженіи и не работали бы какъ
на поляхъ, такъ и въ лѣсахъ; отъ чего большая
часть кислоты прищипывается: то бы не многіе
изъ ихъ дѣтей осматривались въ живыхъ.

Полезно для шакowychъ младенцевъ, естьли
ихъ матери нѣсколько разъ въ день даютъ имъ
въ водѣ по спольку, сколько можно захватить
кончикомъ ножа, порошка изъ черепашекъ до
тѣхъ поръ, пока ихъ калъ не потеряешь своего
зеленаго цвѣту и кислаго запаха. Самая же мать
должна имѣть для себя въ готовноснн бутылку
рѣчной воды, въ которой растворено полуца ще-
лочной соли виннаго камня. Оной она должна
принимать по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ
день, пока младенецъ не выздоровѣетъ. Но за
сіе потчасъ должно приниматься, какъ только
младенецъ заеможенъ рѣзью. Ибо естьли,
какъ сіе обыкновенно случается, дожидаться до
тѣхъ поръ, пока онъ получитъ судорги; то
надежда османется сумнительною.



ОТДѢЛЕНІЕ 8.

О трудномъ или тяжеломъ прорѣзѣ зубовъ.

Какъ только младенецъ, которому уже минуло четыре мѣсяца, чѣмъ нибудь занеможетъ: то мы потчасъ вину его болѣзни возлагаемъ на прорѣзъ зубовъ, не смотря на то, что онъ чаще сего совсѣмъ другимъ страждетъ. Поступая такимъ образомъ, допускаемъ мы словолъзни вкореняясь, возрастать и прекращать жизнь. Для того не должно скоропостижно приступать къ лѣченію; но прежде нужно рачительно развѣдать, точно ли отъ прорѣзу зубовъ происходятъ происходящія его припадки.

О семъ же легко можно заключить по нижеслѣдующимъ признакамъ (*)

1)

(*) Первый знакъ прорѣзу зубовъ, по примѣчанію Г Фонъ Свишена (с. шпент. Т. 4. р. 745.) есть, когда верхній край челюсти начинаетъ расширяться, т. е. когда двѣ бляшки составляющія челюсть между собою раздаются такъ, что зубы чрезъ то получаютъ себѣ мѣсто къ выходу. Мнѣ случилось видѣть младенцевъ, которые чрезъ цѣлыя три недѣли, прежде прорѣзу зубовъ описанные подъ N. 1. и 2 знаки имѣли, и при томъ по шести и по семи дней весьма были больны, однако послѣ того выздоровѣли. Спустия оныя три недѣли напоследокъ я примѣчалъ на краю десенъ не большую дыру, послѣ чего чрезъ день или чрезъ два выходили зубы безъ затрудненія. Сие кажется служить до-

1) Когда младенецъ свои персты, либо другую какую нибудь въ руки ему попадающую вещь, часто въ ротъ себѣ суешь, либо соски трудные сильно кусаетъ. Сии знаки предвѣщаютъ, что зубъ скоро имѣетъ прорѣзаться, и слабымъ своимъ давленіемъ производитъ въ деснахъ зудъ.

2) Когда у него много течетъ изо рта слюны, либо онъ ее глотаетъ. Въ последнемъ случаѣ большею частію бываетъ рвота, либо поносъ; но при этомъ зубы скорѣе прорѣзываются.

3) Когда десны болятъ, распухаютъ, либо совершенно воспалены бываютъ. Сіе отчасти можно видѣть глазами, а отчасти кормилица можетъ заключать изъ того, когда у младенца бываетъ во рту жаръ, и онъ словно жалуется, когда захочетъ сосать.

4) Когда миндалины, либо глаза, либо щеки распухаютъ и краснѣютъ. Сии признаки означаютъ трудной прорѣзъ зубовъ. И въ такомъ случаѣ все происходитъ вышеписаннымъ образомъ. Еще не столько бываетъ тяжело для младенца, когда за каждымъ разомъ прорѣзывается по одному только зубу. Но еслили ихъ вдругъ прорѣ-

зы-

доказательствомъ тому, что Гаррисъ (*de morbis infantum*) утверждаетъ; и что прорѣзъ зубовъ имѣетъ два степеня. Первый, когда бляшки челюсти начинаютъ расходиться, и потому кожа и десны, покрывающія зубы, растягиваются и дѣлаются ширѣ; второй, когда зубъ вышеупомянутую кожу и десны прорываетъ.

зывается много, то приключается горючка, безсонница, судорги въ лицѣ, вдругъ прерывающійся сонъ, родимецъ и въ опасныхъ случаяхъ сонливость, которая предвѣщаетъ самую смерть. Когда младенецъ родился на свѣтъ въ надлежащее время и отъ здоровыхъ родителей, мать его во время беременности никакимъ спросамъ не была предана, не имѣла вольный и веселой духъ и не употребляла никакой худой пищи; дитя сосало послѣ того здоровое молоко: то всегда зубы прорѣзываются въ свое время и легко. Чѣмъ больше недоспизаетъ выщипанныхъ обшопательствъ, тѣмъ тяжелѣе бываетъ прорѣзъ зубовъ и тѣмъ большая для младенца настоящій опасность. Такъ называемые глазные зубы и противъ оныхъ въ нижней челюсти находящіяся, всѣхъ шрудѣе прорѣзываются, естли они, пропимъ обыкновеннаго выходятъ не прежде первыхъ коренныхъ потому, что они въ семъ случаѣ должны проходить между сими и разсѣкающими, часно весьма между собою сближающимися.

Прорѣзывающійся зубъ долженъ проходить сквозь десны. Слѣдовательно, естли онъ не довольно твердъ; то не можеть ихъ надлежащимъ образомъ лавить. Естли же десны весьма плотны, то больше времени требуется для его прорѣзу. Но въ такомъ случаѣ больше волоконъ разорваться должно. Отъ сего происходитъ раздраженіе же и боль. Отъ раздраженія же рождается жаръ, избылѣйшее прилище мокротъ, опухль, возженіе, безсонница и болъ и прох.

Изъ

Изъ сего слѣдуетъ, что для удобнѣйшаго прорѣзу зубовъ должно стараться, чтобъ сдѣлать зубы твердыми, а десны тонкими и нечувствительными. Для достиженія перваго мать или кормилица должна имѣть хорошее молоко. Впрочемъ же способствуетъ то, когда кормилица, по прошествии трехъ мѣсяцовъ, младенцу чаще десны перстомъ поглаживаетъ. Ибо отъ сего слабаго, однако часто повторяемаго шреян напоследокъ десны такъ сплюсываются тонкими, что зубы почти безо всякой боли могутъ прорѣзаться. Я се говорю не по одному умствованію, но будучи удостовѣренъ многими опытами. Свою самую пользу также имѣть можетъ волчий зубъ, либо другое какое либо твердое тѣло, естли его давали младенцу жевать. Только отъ сего происходитъ невыгода, что онъ имѣя играя, можетъ повредить лицо, а особливо глаза. Естли же сихъ предосторожностей не принято, либо оныя рѣдко были въ употребленіи, и младенецъ дѣйствительно при прорѣзѣ зубовъ имѣетъ невыносимыя припадки то должно стараться, десны опчастн размягчить, а опчастн доводить до того, чтобъ боль, давлениемъ зуба причиняемая, какъ можно меньше была чувствительна.

Для достиженія перваго намѣренія: должно весьма рачительно помазывать десны на больномъ и распухломъ мѣстѣ теплымъ медомъ, либо фіялковымъ сиропомъ большаго просвирияка, хорошимъ Перуанскимъ масломъ, холо цновыжатымъ миндаальнымъ, не соленымъ жиромъ, свѣжимъ

жировымъ масломъ, свѣжимъ заячьимъ либо телѣчьимъ мозгомъ, или другимъ сему подобнымъ. Изъ всѣхъ сихъ лѣкарствъ по почитается наилучшимъ, которос больше смягчитъ и долѣе остается на деснахъ.

Еслили младенецъ привыкъ, чтобъ ему во рту гадали; то можно къ пораженному воспаленіемъ мѣсту прикладывать печеную винную ягоду, либо мягкую гредкую губку, обмоченную въ шеплой изварѣ желшой моркови, либо въ молоко съ винными ягодами, корнемъ большаго просвирняка и не большимъ количествомъ шафрану вареное. Отъ сего невѣроятное дѣлается облегченіе, только часто должно его перемѣнять. Нѣкоторые варятъ цѣлый корень большаго просвирняка въ меду и даютъ дѣтямъ жевать, и се также приноситъ великую пользу: только въ семъ па исвыгода, что они, имѣя возженные десны, ничего не жуютъ. Когда возженіе столь сильно, что исполнитъ опасность Антонова огня: то часто должно прикладывать къ тому мѣсту, которое равномъ бываетъ изтемна, красно - розовый медъ, смѣшанный съ нѣсколькими каплями спирту поваренной соли (*Spiritus salis satini*). Смотри фонъ Свитена *Commentar*. Т. 4. Р. 748.

Второе можно сдѣлать посредствомъ маковаго сырова (*figuris e melleo phagmasor. Londineasis*), еслили онаго младенцу дать столько, сколько требуется для его успокоенія. Какое же онаго количество должно употреблять на одинъ пріемъ каждый разъ, когда младенецъ по причинѣ боли

начнешь плакать; то сему можно научиться, давая онаго по немногу и повпоря до тѣхъ поръ, пока младенецъ спянешъ спокоенъ. Ибо общаго приема для всѣхъ опредѣлить не лзя. Для одного бываешъ нужно больше, а для другаго меньше. Слѣдовательно наилучше давать онаго по полскрупулу каждыя полчаса и пересташъ, коль скоро примѣчено, что младенцу спало легче и онъ успокоился. И такъ ешлы для сего издержана будетъ одна драхма: то безъ сумнѣнїя опять, ешлы младенецъ чрезъ 5 или 6 часовъ начнешъ плакать, на столькожъ времени его симъ количествомъ успокоить можно. Однако должно при томъ продолжать снаружи употребленіе вышеписанныхъ лѣкарствъ, и велѣть кормилицѣ довольствовашся пищею и пишемъ одними только холодительными. Впрочемъ должно въ семъ случаѣ смотрѣшь, не подобно ли иногда младенцу данъ такого количества манной кашки, чшобъ сго довольно послабило, либо для сего нѣсколько разъ наставить промывательное. Ибо сыропъ имѣешъ шу невытуду, что послѣ онаго слѣдуетъ запоръ; изъ опытовъ же извѣстно, что, когда слабить, то припадки бывающъ легче.

Ешлы же все сие паче чаянїя не помогаетъ, (хотя то маѣ и не случалось никогда, чшобъ оное вообще употребленно было) и младенецъ тоскуешъ, бесцрессанно кричитъ и не спитъ, имѣешъ горячку, въ лицѣ судорги, безвокойствыя и другіе припадки, предзнаменующіе родимецъ: то лучше всего пусшишь кровь, либо приставить за ушми
пїя-

пятицы, а когда и сие не приноситъ облегченія, то должно ему дать большій прѣмъ макягусъ-ропу, либо одну или двѣ капли жидкаго Сиден-томова Лэвдана (*Liquidum Sydenhami*) въ ономъ же сырѣ; но сие разумѣется, когда болѣзнь еще въ своемъ началѣ. Симъ способомъ часто можно отвратить судороги, онѣ боли прѣисходящія. Но естли и сие не помогаетъ, десны уже весьма покраснѣли и распухли; то должно оныя потчасъ разрѣзать. Сѣе не составляетъ никакой опасности, только вы при томъ наблюдаема была на предоспородность, что въ одно волокно на зубъ не оспалось, ибо въ противномъ случаѣ припадки буѣе увеличиваются и продолжаются до тѣхъ поръ, пока не разрѣзано будетъ и послѣднее. По разрѣзаніи десенъ должно оныя рачительнѣе припаривать грецкою губкою, обмоченною въ теплѣе вино, смѣшенное съ чистымъ сахаромъ.

Правила, случается иногда по разрѣзаніи десенъ, что одно волокно, либо и большіе ихъ остаются на зубѣ; однако сие часшо можетъ воспослѣдовать и тогда, когда сами собою прорѣзывались зубы. Въ такомъ случаѣ думаютъ, что зубъ уже прорѣзался; однако младенецъ все еще остается равно боленъ. Но естли тогда все порядочно изслѣдовать; то можно примѣнить, что одно волокно, или нѣсколько ихъ остаются дѣлая. По сей причинѣ, естли ихъ разрѣзать, то младенцу потчасъ становиться легче, вмѣсто того что чрезъ онущеніе надлежащаго осмотра ю рту, онъ можетъ лишиться жизни.

Сколько бываетъ въ семъ случаѣ полезнаго и небольшой поносъ, столько напрошивъ того сильной вреденъ. Самая бессонница уже изнуряетъ; а естли еще къ тому присоединится и сильной поносъ, то младенецъ истощается, и можетъ отъ сего получить судорги и умереть. Изъ здѣланнаго мною описанія въ особливомъ отдѣленіи о поносѣ можно заключить, въ какомъ случаѣ его сильнымъ считать должно. Равнымъ образомъ въ ономъ же предписаны и надѣльны прошивъ онаго лѣкарства.

Изъ вышесказаннаго доселѣ легко усмотрѣть можно.

1.) У которыхъ дѣтей зубы прорѣзываются въ надлежащее время и легко.

2.) У которыхъ напрошивъ того выходятъ поздно и съ принадлежками.

3.) Сколь много описъ, зараженный какою либо болѣзнию, и мать въ своей беременности много печалившаяся, либо подверженная шблестнымъ страстямъ, или употреблявшая нездоровую пищу; такъ какъ и кормилица, имѣющая не здоровое и испорченное молоко, могутъ быть причиною толкихъ мученій, которыя младенецъ при прорѣзѣ зубовъ и тогда претерѣваетъ, а часто и самую жизнь теряетъ.

4.) Сколько нужно заблаговременно прѣучать младенцевъ, чтобъ они позволяли себѣ во рту пощипать.

5.) И сколь важно болѣзни хорошо распознавать, одну отъ другой различать. Сего же распознаванія

ванія должно требовать не опѣ повивальной бабки, ни опѣ няньки.


6.) Что смягчительныя лѣкарства только тогда полезны, когда въ деснахъ чувствуется боль и воспаленіе.

7.) Что зачатый мозгъ, либо кровь изъ гребня чернаго пѣтуха, не имѣетъ никакого пріимущества предъ другими смягчительными лѣкарствами; равно какъ и полированный хрусталь предъ волчьимъ зубомъ, либо сей предъ другимъ какимъ нибудь твердымъ тѣломъ.

8.) Въ которое время десны должно прорѣзывать. Сначала не разумно бы было оныя разрѣзывать, но навослѣдокъ сіе нужно бываешь, когда болѣе ничто не помогаетъ.

9.) Что рвоту, либо легкій поносъ въ семъ случаѣ прекращать не должно.

10.) Что причины болѣзни не должно возлагать на зубы, когда младенецъ, имѣющій уже 20 зубовъ, сѣбѣается нездоровъ. Ибо онъ болѣе 20 до семи лѣтъ ни одного получить не можетъ.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 9.

О

Молочницѣ.

Молочницю (arthritis) называютъ плакую болѣзнь, когда младенецъ имѣетъ во рту пупырышки, сшруномъ скоро покрывающіеся.

Г 3

Она

Онаѣ сопряжена бывашѣ со многими припадками, а иногда и жизнь вьсѣлетъ въ опасность. Ибо младенцы не только, по причинѣ чувствуйемой ими боли, почти день и ночь кричатѣ, но и не въ состоянн бьвають сосать грудь; и слѣдовательно сиражуютъ голодомъ и жаждою. Бывали же они сосущѣ, то во большой часпн на соскахъ кормилицыной груди дѣлаются пупырышки и ранки. Когда молочница займетъ пище-прѣемное гортло; то отъ того спановишся шуживое глотаніе. Бывали проспираленъ въ жеду къ, то отъ сего дѣлается сильная рвота и икота. А когда распространяется и въ кишкахъ; то питательный сокъ не въ состоянн бывашѣ входить въ кровь, но съ поносомъ испражняется тою. Слѣловательно когда сіе чрезъ нѣсколько времени продолжится, то младенецъ долженъ лишиться жизни отъ недостатку въ питанн.

Въ молочницѣ пузыри обыкновенно бывающѣ бѣлаго цвѣту и прозрачны, либо желтоваты. Чѣмъ они чернѣе, тѣмъ опаснѣе. Ибо всѣ черные пупырышки бьвають пораженъ Антоновымъ огнемъ. Чѣмъ чаще и чемъ глубже сіи пузырьки бьвають, тѣмъ опаснѣе сія болѣзнь. Равнымъ образомъ опасны бьвають и тѣ, которые пропадають, но послѣ оныхъ скоро и еще въ большемъ количествѣ появляются.

Находится также между ими различіе и въ разсуденн мѣста, на кономъ они выходятъ. 1) Тѣ, которые примѣчаются во первыхъ на губахъ, на деснахъ, на языкѣ, на внутренней по-
вер-

верхности щекъ, на поднебень, на язычкѣ и миндалинахъ, весьма удобно извѣчиваются. 2) Тѣ, которые занимающъ пищеварительное горло и глотку, желудокъ и кишки, бываютъ съ великою опасностію сопряжены. 3) Тѣ, которые простираются въ дыхательное горло, еще хуже. 4) А которые съ начала появляются въ желудкѣ, либо въ кишкахъ, и простираются по пищеварительному горлу черевъ въ ротъ, всѣхъ опаснѣе.

Когда спрутъ чрезъ долгое время оспаешся, а послѣ того опадетъ, то обыкновенно слѣдуетъ у младенцевъ сильное печеніе слины, смѣшанной съ кровью. Еслили онъ опадетъ въ кишкахъ, то онъ становится весьма чувствительны, и въ то время младенцамъ часто приключается мучъ съ кровью, либо кровавый поносъ.

Сии виды легко можно между собою различить. Ибо первый можно видѣть глазами, а второй опчасти можно зрѣніемъ прихвѣтити, и опчасти заключить изъ того, что младенцу приключается икота и рвота, а наипаче во время сосанія; либо поносъ и испражненіе на низъ молока. Въ претъемъ видѣ младенецъ сипитъ, часто кашляетъ, и голосъ его бываетъ похожъ на звукъ, сквозь мѣдальничскую трубу проходящій. Четвертый видъ узнается поному, когда младенецъ, имѣвъ уже чрезъ нѣсколько дней сряду горячку съ сильнымъ поносомъ, сдѣлается наконецъ весьма безпокоенъ, икаетъ, имѣетъ какъ огонь красный языкъ, и не можетъ въ себѣ держать молока.

Молочницы наибаче подвержены бывають тѣ младенцы, которымъ не вытццали рта, и которые сосуть молоко спарое, густое, либо остроу въ себя итццщее. При томъ тѣ, которые засыпають у груди: ибо часто имъ приходитъ сонъ въ то самое время, когда еще у нихъ въ сколько оспасеся во рту молока, которое въ шадомъ случатъ окисаетъ и дѣлается острымъ. Равнымъ образомъ часто она примѣчается и у тѣхъ младенцевъ, которые въ горячкѣ имѣли сильной поносъ. Впрочемъ молочница обыкновенно примѣчается наибаче тогда, когда зубы итццпають прѣрѣзываться.

Оная чаще всего бываетъ во рту. Отъ молочницы обыкновенно можно предоберечь младенца, естли кормилица ежедневно будетъ ему смощрѣть въ ротъ и хорошо его вытццать. Наилуше для сего чистые шалфейные листочки, которые сваривъ въ одной водѣ, либо смѣшенной съ небольшимъ количествомъ бѣлаго французскаго вина, опварѣ процѣдить и смѣшать съ небольшимъ количествомъ чистаго меду. Въ сей соснавъ кормилица должна обмочить чистую пеленку, обвернуть оную свой перстъ и вытирать имъ слегка ротъ, а особливо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она примѣнитъ бѣлыя пятнушки.

Естли же сѣ опущено, и младенецъ уже дѣйствительно молочницею боленъ, то должно 1) кормилицѣ давать вышенисанный для кормилицъ порошокъ каждой день по четыре или пять разъ,

и при томъ наблюдашь, чтобъ онъ нѣсколько больше обыкновеннаго пилъ, 2) всѣмъ сдѣлать составъ изъ киселя моршковаго (rob diapot), киселя орѣховаго (rob diapisc) и розоваго меду, взявъ каклаго изъ нихъ по полудрамы; послѣ прибавить туда нѣсколько капель разведенной купоросной кислоты, дабы онъ имѣлъ нѣсколько кислый вкусъ. Въ оный обмоча кисточку, должно намазывати во рту младенца по пяти или по десяти разъ въ день на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ примѣчаются пулырышки, и послѣ каждаго разу велѣть кормилицѣ прежде, нежели она будетъ давать сосать младенцу грудь, вымолочивать рожокъ его шалфейнымъ взваромъ. Можно употреблять такимъ же образомъ бѣлый курдюкъ, распуская по нѣсколько грановъ онаго въ теплой водѣ. Я могу увѣрить, что молочница чрезъ нѣсколько дней пройдетъ, еслии все сие съ точностию, и такъ какъ выше предписано, будетъ употребляемо. Когда при семъ младенецъ имѣетъ въ животѣ рѣзь, то въ такомъ случаѣ должно употребляти вышенпредписанныя для сего средства, а наипаче бѣлую магнезію съ ревенемъ, либо безъ онаго. Ибо еслии находишься въ желудкѣ, либо въ кишкахъ кислоша, то оную должно развесить и испражнишь.

Еслии же, по громкому и внезапному крику младенца заключается, что онъ отъ молочницы чувствуетъ сильную боль: то должно кормилицѣ дати одинъ либо два раза по нѣсколько, по Лондонской Фарм. приготовленнаго маковаго сиропа

(*figuris e mesonio platensis Londinens*). Если въ то время, когда должно его ей дать, грудь пуста; то младенецъ пощасъ успокоится, кола скоро оную сососетъ, однако она въ такомъ случаѣ должна его принять только двѣ драхмы. Если же шишки полны, то она можетъ принять оного отъ трехъ до четырехъ драхмъ. Можно также, если кто не хочетъ давать кормилицѣ сего сыру, безъ всякой опасности дать самому младенцу по различію его возраста однажды или два раза въ день по одной, либо по двѣ капли панацеи Доктора Юнеса. (*) Славный Риверъ далъ своему сыну съ желаемымъ усѣхомъ цѣлый гранъ лавдана (*laudanum*). Почтеннаго Агличапина Бойле лѣкарство отъ молочницы также, какъ изъ опытовъ извѣстно, полезно.

Оное

(*) По описанію Г. Традесса (*usus opii salubris & vixius lect I. p 327.*) которое чаятельно изъ сочиненія изобрѣтателя соннаго зелья (*Jahn. Jones Mystery of opium revealed, Lond. 1700. 8*) взято, только я оное себѣ опробовать не могъ. Ся панацея (*rapacea liquida*) есть не что иное, какъ растворъ въ водѣ опія. А именно, должно распустить восемь унцовъ опія въ двухъ фунтахъ персидской дождевой воды и процѣдить. Отъ сей панацеи его (*rapacea filda*) опытная пѣнь, что для оной вытягивается изъ осипки (*faeces*) посредствомъ воды шинкюра, которая потомъ на подобіе вытяжки (*extractum*) сгущается. Мнѣнїе, что худыя дѣйствія опія зависятъ отъ находящейся въ немъ смолы, заставило изобрѣтателя дѣлать сіе приутожденіе. М.

Оное составляется изъ нѣсколькихъ унцовъ вылапного соку изъ травы подсебѣника (*Impatiens*) съ равнымъ количествомъ меду смѣшенныхъ. Сваривши сіе вмѣстѣ, должно прибавить сюда сполѣко квасцовъ, чтобъ сей сокъ имѣлъ нѣсколько вязкій вкусъ, и послѣ онымъ каждый часъ помазывать пунырышки. Куриный клѣвъ распущенный въ бѣломъ французскомъ винѣ, также приносилъ пользу, еслии онымъ почаще оны помазывать.

Когда по отпаденіи струпа у младенца во рту подѣлаются ранки, то должно почаще позывать оныя армудовою слизью (*mucilago celandon. n.*) одною, либо смѣшенною съ равнымъ количествомъ подсебѣниковаго сиропа (*syrupus Impatiens matris*).

Еслии молочница находится внутри, и простирается въ желудкъ и въ кишкѣхъ; то должно выжать сокъ изъ печеной рпы, и смѣшавъ оный съ небольшимъ количествомъ розоваго меду, давать младенцу почаще по чайной ложечкѣ. Либо смѣшать взваръ желтой моркови съ малымъ количествомъ розоваго меду и употреблять такимъ же образомъ. Можно также варить полуца толченаго льнянаго сѣмя въ одномъ фунтѣ воды до тѣхъ поръ, пока она станетъ густа на подобіе сиропа, потомъ оную процедивши смѣшать съ двумя унцами розоваго меду и употреблять вышесказаннымъ образомъ. При всемъ томъ кормилица должна принимать вышесказанный моршенокъ, и для разжиженія своего молока довольно пить.

Когда сиропъ начиняетъ выходить вмѣстѣ съ каломъ, то въ то время должно дать младенцу легкое слабительное, однако такое, которое бы при томъ и укрѣпляло кишки. Для сего полезнѣе всего ревенный сиропъ либо одинъ, либо смѣшенный съ нѣсколькими гранами ревенного порошка. (Смотри 10 видъ поносу)

Благоразуміе требуетъ, чтобъ давали онаго за однимъ разомъ весьма по немногу, и повторять чрезъ три часа, пока ремень не окажетъ своего дѣйствія. Ибо по опаденіи сирупа кишки, какъ я уже выше упоминалъ, бываютъ такъ чувствительны, что самый небольшой пріемъ ирритивъ обыкновеннаго весьма сильное оказываетъ дѣйствіе. Когда въ такомъ случаѣ хотя малые призываки у младенца примѣняются кровавого поносу; то должно ему часно давать лишь молоко (сталью) изъ бѣлой камеди, (*) либо супъ изъ пшена, съ водою и молокомъ вареный.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 10.

О судорогахъ и о родимцѣ.

Младенцы имѣютъ весьма раздражительныя, или удобно приводимыя въ движеніе чувствительныя жилы. Сии припомъ бываютъ въ разсужденіи величины ихъ тѣла гораздо больше, пече-

(*) Оное описано въ ошдѣленіи объ оснѣ въ первой ся степени. М.

нежели у взрослыхъ. А какъ младенческое тѣло приизобилуетъ мокроками; то въ ономъ снѣ жилы бывають мягче. Кромѣ того онѣ покрываются у нихъ тонкою оболочкою, и слѣдственно имѣютъ большую чувствительность. Для сей самой причины младенцы бывають подвержены судорогамъ.

Когда корча находится въ одномъ, либо въ нѣсколькихъ членахъ, то се называется судорогою, или конвульсией. Если же она простирается по всему тѣлу, и при томъ лицо сдѣлается блѣдно, то се именуется родимцемъ. Слѣдовательно сія болѣзнь весьма сходна съ падучею немощью, такъ какъ она и называется отъ врачей падучею младенческою болѣзью (*& ab Hippocrate eclampsia.*)

По справедливости почитаютъ сію болѣзнь опасною. Оную не всегда бываетъ такъ легко вылечить, какъ прежде отырашивъ. Для того предосторожно должно представлять себѣ причины, отъ которыхъ она можетъ воспослѣдовать. Не безразлично опасаются сей болѣзни, когда младенецъ часто во снѣ, а напротивъ когда пробуждается, усмѣхается. Хотя сей признакъ самъ по себѣ не весьма важенъ; однако еслили приномъ младенца надоежающимъ образомъ не слабитъ, либо онъ имѣетъ горячку или рвзъ въ животѣ, либо затрудненіе въ испражненіи мочи, либо прорѣзывавшися у него зубы, либо кормилица его перепугана, либо ему были прикладываемы для заличевія сыни наружныхъ лекарствъ, либо онъ имѣетъ въ себѣ глисты: то конечно можетъ приключиться родимецъ.

Есть-

Еслили же послѣ того младенецъ начнетъ кричать глазами, и имѣть короташѣ по нѣ носу, по ко лбу, и лицо имѣетъ блѣдное; прѣ уже онъ точно болѣтъ. Кожи начинаются или во всемъ тѣлѣ вдруть, или занимаютъ одинъ часнѣ за другимъ. Младенецъ сдвливаетъ ообъ челюсти и ротъ наполняется слюною. Но прошедши больше или меньше времени все сіе перестаетъ, и онъ весьма крѣпко засыпаетъ, напоследѣ прѣбываетъ и к жтиса довольно здоровымъ. Впрочемъ еслили причина не истреблена, то обыкновенно возирающаеся оный припадокъ въ шолѣ сѣмѣе время на другой день и на третій; потомъ болѣзнь на въсколькѣ времени перестаетъ. Однако она оный модаетъ возрапанья, коль скорѣ такая же, либо другая подобная тому причина будетъ приводить въ раздраженіе чувствительныя жды. Варчемъ онъ не всегда такъ счастливо оканчивается, но болѣею частію причиняетъ смерть.

Какое ожесточение раздвается на двѣ снѣпени. Первая изъ нихъ есть продолженіе судорогъ, а другую составляють сѣдѣнія оного, то есть, глубокой сонъ съ хрипотою въ груди (*). Въ сѣе-шо время приключается смерть. И поже
мла-

(*) Хотя болѣею частію сѣ болѣзнь сопряжена бываеъ съ ожежностью; однако она въ нашихъ сѣ орогахъ не столько бываеъ жестока, какъ въ жарныхъ климатахъ, какъ на прѣ въ Барбадосѣ, и въ роимѣхъ, по причинѣ в дикой чувствительности тѣла, удобо перемѣняется у младенца еще въ снрѣшнѣйшую и у насъ рѣже
слу-

младенцы словно какъ бы поспирѣломъ пораженные лежатъ, но говорятъ, что они поспирѣломъ умираютъ. По сей причинѣ мы видимъ изъ нашихъ ежедневныхъ записокъ, что въ нихъ столь много младенцы означены поспирѣломъ умершими, хотя ихъ настоящею причиною смерти была родимца.

Причины родимца суть многоразличны: для того во время лѣченія должно точно узнавать настоящую. Ибо не спрашивается, какъ вообще должно лѣчить родимца; но какимъ образомъ одному, когда онъ у извѣстнаго младенца онъ определенной причины произошелъ, пособлять должно. Для того я намеренъ представить здѣсь различныя причины, показать способъ оныя изыскивать, и описать нѣкоторыя средства, которыми каждая изъ нихъ отирается.

Первой видъ родимца.

Новорожденный младенецъ ежедневно долженъ три, либо четыре раза имѣть испражненіе мочою. Въ противномъ же случаѣ не довольно употребляется первый дѣтскій калъ, но остается въ брюхѣ, дѣлается острымъ, раздражаетъ кишки, и чрезъ то причиняетъ родимца. Изъ сего удобно видѣть можно, когда сей видъ бываетъ, и что оный удобно промывательнымъ

из-

случающуюся болѣзнь, то есть, въ оспенныя, либо въ закрывающія шѣла назидъ (Tetanus & Orisrhotosus). Ся бываетъ нѣмъ опаснѣе, что почти никогда ее излѣчить не можно. Смолр. *Hyllaris observations on the changes of the air and the Diseases of Barbados*, p. 240. M.

излечить можно. Оное же сосилаеяся изъ шестнадцати столовыхъ ложекъ теплаго молока, чепырехъ столовыхъ ложекъ деревяннаго масла и небольшого количества мѣлкаго сахару. Но еще удобнѣе пособить можно самому припадку посредствомъ манной кашки, испущая по упомянутому на стр. 36 предписанію.

Иногда и возрѣсшіишя дѣти подвержены бывающъ запору. Причиной же сего бывающъ либо густота, либо острота калу, и въ такомъ случаѣ давленіе и раздраженіе оныхъ оного происходящаго производящъ спсѣ болѣзнь. Для того должно спрашивать у няньки, одинъ ли день или больше дитя не слабило, и снаружи ощущивашъ брюхо, не раздуто ли оно, либо не примѣчается ли въ немъ въкожорыхъ малыхъ зашверданій. Узнавъ сіе, тотчасъ должно велѣть насплавить промыванельницу, и давать ему либо манную кашку, либо взанъ нѣсколько равнаго сыроу, смѣшанъ оный съ равнымъ количествомъ холодно выжатаго миндалянаго, либо хорошаго деревяннаго масла, попомъ прибавить туда нѣсколько сахару, и давать младенцу сего составу по одной, либо по двѣ чайныя ложечки каждыя три часа, пока не прищавно сушитъ по вѣрзабѣ въ брюхѣ, что скоро ознаменъ слабитъ. Ревень укрѣпляетъ кишки и дѣлающъ ихъ способными для испражненія калу. Сахаръ его размнчающъ, а масло смазываетъ кишки. Поному многіе Врачи утверждающъ, что шѣмъ младенцамъ, которые имѣютъ склонность къ запору, шѣмъ пособить можно, когда имъ чрезъ нѣсколько времени давать внутрь по

утрамъ

утрамъ каждый день по немногу деревяннаго масла. Однако я обыкновенно оное употребляю только для скорости; долгое время же оного употребление можетъ испортить желудокъ (*), ослабить чревообразное движение кишекъ и еще хуже умножить запоръ.

Второй видъ.

У младенцевъ происходитъ также родимецъ отъ рѣзы въ животѣ, и сѣя причина чаще всего случается. Имъ приключается рѣзь въ животѣ отъ того, когда они питаются не хорошимъ молокомъ; когда они его слишкомъ много сосутъ (**) либо, когда ихъ желудокъ и кишки бываютъ слабы. Что слабое дитя безъ всякой кормилицыной вины можетъ полу-

(*) Что сказано о пригняемости расщепленія желудка чрезъ излишнее употребленіе деревяннаго масла; то самое можно сказать и въ разсужденіи миндалянаго, которое въ столь многихъ домахъ въ семъ случаѣ, какъ для отвращенія рѣзы, такъ и не примѣчая оного, только часто даютъ. Однако Г. Тиссонъ въ своей книгѣ, направленной къ народу (*Avis au peuple*, L. 2. p. 463) называемой, которая съ симъ сочиненіемъ должна быть нераздѣльна, съ злоупотребленіе такъ сильно опровергаетъ, что для пренебреженія оного стоитъ только вспомнить вообще его о семъ напомниманіе. М.

(**) Младенцы слишкомъ много сосутъ молока тогда, когда ихъ однимъ только имъ зашѣшаютъ. Въ такомъ случаѣ ихъ желудокъ приходитъ въ расстройство и молоко сѣдается и окисаетъ. Они могутъ также получить рѣзь въ животѣ и отъ того, когда ихъ накормивши тотчасъ

получилъ рѣзь въ животѣ, по я сіе одизжты при-
мѣшилъ на двухъ младенцахъ, сосавшихъ одну
грудь. Ни одинъ изъ нихъ не высасывалъ больше,
нежели для его питанія надобно было молока:
однако крѣпкаго сложенія былъ здоровъ, а сла-
бый всегда имѣлъ рѣзь въ животѣ, испражнялся
зеленымъ каломъ, и большею частію былъ нездо-
ровъ даже и тогда, когда не въ продолжительномъ
времени послѣ того приставили къ нему особли-
вую кормилицу. Для того она, равно какъ и ея
питомеръ, принуждена была часто принимать
лѣкарства, отъ которыхъ онъ напоследокъ и
выздоровѣлъ. Впрочемъ онъ не прежде здоровьемъ
поправился, какъ только тогда, когда уже спазмъ
больше ощущать въ себѣ силъ. Признаки рѣзи въ
животѣ у младенцевъ въ особливомъ ошдѣленіи о
сей болѣзни уже показаны.

Когда причиною родимца рѣзь въ животѣ,
то также должно въ ожесточеніи онаго настаи-
вать промывательное. Тщенно бы было при про-
долженіи онаго вливать что нибудь въ ротъ ма-
ленку по тому, что въ сіе время онъ глотать не
въ

качаютъ. Отъ сего у нихъ молоко сѣдается
въ желудкѣ такъ, какъ отъ болтанія въ бу-
тылкѣ. Для того никогда не должно дитя на-
кормивши поспѣшъ качать въ колыбелькѣ, но
прежде положить его на подушку, лежащую на
волѣняхъ у кормилицы, и вѣлѣть ей слегка
погладить спину и брюшко, пока у него не вы-
детъ нѣсколько вѣшровъ. Ибо послѣ сего слѣ-
дующій сомъ всегда бываетъ покоенъ.

въ состояннн. Но когда оное пройдетъ, то должна кормилица чрезъ чешыре или пять дней сряду принимать по спольку, сколько кончикомъ ножа захватить можно (по скрупулу) вышписаннаго порошка для кормилницъ. Младенца же должно такъ пользоваться, какъ я выше сказалъ въ ошдѣленнн о рѣзи въ животѣ.

Сн лѣкарства должно давать кзкъ кормилницѣ, такъ и младенцу до шѣхъ иорѣ, п ка его калъ не получишь свойственнаго ему цвѣту. Сверхъ того кормилица должна также наблюдать вышеписанную діету, дабы младенецъ снова не занемогъ.

Г Циммерманъ (*Abhandlungen der Zürcher gesellschaft der Wissenschaften 2 ter Band, f. 369*) упоминаетъ объ одномъ младенцѣ, который первые шесть мѣсяцовъ послѣ рожденя часто имѣлъ тяжелыя ожесточенія судорожныя и самый родимецъ; однако оныя потчасъ миновались, коль скоро запретили ему давать изъ муки размазню.

Третій видъ.

Естьли кормилица, весьма сильно испугавшись, потчасъ накормитъ грудью младенца; то удобно отъ того ему можетъ приключиться родимецъ. Никакая также страсть не имѣетъ надъ младенцемъ такъ худаго и печальнаго слѣдствія, какъ гнѣвъ кормилицы. При томъ она ес лучше, нежели другія умѣетъ скрыть. Впрочемъ сверкающіе глаза, попеременно то блѣднѣющее, то краснѣющее лицо, и скорая и переменно-ная рѣчь, подають сираведливое о семъ подозрѣніе.

нѣ. Оное тѣмъ бываетъ правильнѣе, когда младенецъ, бывшій не задолго передъ тѣмъ здоровъ, въ лицѣ блѣднѣетъ, либо, какъ только пососетъ грудь, вдругъ получаетъ рвоту, и скоро послѣ того начинаетъ плакать, беспокоиться, и часто со сна вдругъ пробуждается; а на послѣдокъ получитъ настоящій родимецъ. Ибо если бы онъ пересосалъ, то бы рвота могла прекратить его припадки. Однако надежнѣе всего выспрашивать о точной сего истинѣ отъ другихъ дворовыхъ людей. Гораздо бы еще больше дѣтей лишалось жизни отъ гниву ко, милицъ, если бы не приходила имъ пошчасъ совѣтъ противная сей страхъ, по еси, страхъ о томъ, чѣмъ сего не узнали, и ее попомъ не прогнали. Сія усмирятъ многія движения, произведенныя первою.

Въ описаніи о кормилицахъ уже сказано, какимъ образомъ должно поступать съ такою кормилицею, которая разсердилась, либо испугалась, дабы тѣмъ отврашить отъ младенца худыя слѣдствія. Если же отъ сей причины онъ уже получилъ болѣзнь; то пошчасъ ему должно наставить прочывательное. По прошествіи же ожесточенія стараться, чѣмъ его довольно слабило, а сіе можно ему доставить часто выше сего употребляемымъ образомъ. (*) Кормилица должна употреб-

(*) Въ одномъ домѣ, въ которомъ находились близнецы, имѣвшія каждый особую кормилицу, то было необыкновенно, что когда кормилица, воспитывавшая слабаго ребенка, пошчасъ разсер-

див-

нреблять то средешно, которое для такихъ случаевъ въ ономъ же опредѣленіи предписано. Если же не смотря на то младенецъ въ слѣдующую ночь будетъ беспокоиться и во снѣ въ разныя стороны кидается, то должно ему дать не большее количество Лондонскаго маковаго сиропа такъ, какъ упомянуто на спир. 49; а на другой день напавить промышательное за два часа передъ наступленіемъ иного времени, въ которое онъ прошедшаго дня спрдаалъ родимцемъ.

Равнымъ образомъ мать, или кормилица, не должна давать младенцу сосать грудь и тогда, когда она получитъ чрезвычайную и неожиданную радость. Ибо находясь примѣры, что и онъ сего младенцы получали родимецъ и лишались жизни.

Младенцы еще бывающъ подвержены сему припадку и тогда, когда сосутъ грудь во время кормилицына мѣсячнаго кровоочищенія. Таковыхъ наблюденій весьма много у Врачей имѣется. Причиною сего бываетъ либо то, что сіе испражненіе у женщинъ бываетъ сопряжено со многими припадками и рѣзомъ въ брюхѣ, либо, что онъ въ семъ случаѣ бывающъ чувствительнѣе, нежели

Д з

ли

дившись дааа ему свою грудь, то онъ въ такую онъ сего пришолъ слабость, что не могъ ни руками ни ногами шевелиться. Онъ весь поблѣднѣлъ, и не въ состоянн былъ вскрикнуть. Второпяхъ согрѣли рейнвейну, и обмоча въ оный полошеницы его обсервули. Онъ чего онъ скоро пришелъ въ прежнее состояніе и началъ сосать грудь другой кормилицы.

ли въ протія времена. Какъ бы то ни было, однако не долженъ младенецъ сосать грудь такой кормилицы, болѣзнь же отъ сего произшедшую должно отпращать наставляваніемъ промывашельнаго, и послѣ того, когда оно его послабишь, дать не большое количество вышеписаннаго маковаго сыропу

Четвертый видъ.

Когда у младенца тяжело прорѣзываются зубы и при томъ онъ спраженъ зноромъ, то отъ сего можетъ воспослѣдовать родимецъ, хотя то болѣею частію въ то время судорги бывающіе въ одномъ только лицѣ. Какимъ образомъ узнавать должно сію причину, се показано въ описаніи о тяжеломъ прорѣзѣ зубовъ. Тамъ можно также видѣть и приспосібныя предписанія какъ для излеченія сей болѣзни, такъ и для предохраненія младенца отъ оной. Въ время ожесточенія оной кромѣ наставляванія промывашельнаго, ничего предпринимать не должно. Но если младенецъ безпрестанно кричитъ, нечаянно пробуждается отъ сна, либо совсемъ спать не можетъ; при томъ болѣзнь еще въ своемъ началѣ, и нѣтъ большой горячки; то безъ опасности можно ему дать въ какой нибудь жидкости одну каплю Доктора Іонеса панареи, либо усыпительнаго Сиденгамола Лавдана. Можно съ тою же надѣянью, что отъ сего ребенокъ перестанетъ: а особливо, если пріемъ оного съ осторожностію и полъ присмотромъ Врача одинъ либо два раза въ случаѣ нужды, и когда преч-
ви-

видится, что опять ожесточеніе воспослѣдуетъ, повторить. Если же при томъ находится горячка, то должно выпустить кровь, либо приставить пиявицы. (Смолпр. опадѣніе о шяжеломъ прорѣзѣ зубовъ).

Пятый видъ.

Родимецъ, приключившійся отъ вогнанной внутрь чесотки, легко можно узнать. Если младенца во время сыни купали въ холодной водѣ, либо мазали, и слѣдовательно больше или меньше вогнали внутрь чесотки: то должно съспинать причиною болѣзни. Во время ожесточенія ничегъ больше дѣлать не должно, кромѣ наставлянія промывательнаго. По прошествіи же оного весьма полезно давать кормилицѣ каждой день по сигалку, сколько можно по больше кончикомъ ножа захватить, сѣрыхъ цвѣтовъ кѣ тепломъ молока по утру и ввечеру, либо каждые два или три часа по столовой ложкѣ, слѣдующей съ камфорою сдѣланной микстуры.

R. camphorae. ℥ss Возьми канфары полдрахмы.
fuchrij albi. Благо сахару.

Mucilagis G. arabic Клею, бѣлой камеди по одной драхмѣ.
aa ℥j.

Tinis in mortario vitreo adde. Сперши въстекляннойступкѣ, прибавь

Aqu. Flor. ulmar ℥vj. Воды цвѣтовъ медуницы шесть унцовъ.

Syrup. Baccar. Norlandic. (*). q. s. M. D. Сыропу Норландскихъ ягодъ довольно количество, смѣшай все вмѣсто.

Д 4

При

(*) Такъ называется Г. Линней (Materia medica ed. 2. n. 268) ягоды растѣнія сходнаго съ Кня-

При томъ въ случаѣ надобности, должно младенцу давать поодинажды или по два раза въ день по одному, либо по два грана уксусу, съ десятиью гринами сахару хорошо стерпшаго. Когда послѣ сего выделитъ оная чесотка, то уже младенецъ на сей разъ бываетъ здоровъ. (*) Какимъ же образомъ лѣчить должно самую чесотку, и какъ опъ оной себя предохранять, о томъ показано будетъ ниже въ особливомъ отдѣленіи объ оной.

Ше-

женицы, и полько въ сѣверныхъ странахъ растущаго (*Rubus arcticus*), котораго рисунокъ находится in Flora Danica, Fas. 9 Tab. 488). Оныя гораздо превосходятъ ягоды обыкновенной княженицы какъ вкусомъ, такъ и прохладительною своею силою. Для того ихъ привозятъ во внутреннѣйшія провинціи Швеции изъ Норланди приправленныхъ сахаромъ, и дѣлаютъ изъ нихъ пріятное вино. Г. Соч. въ сей книгѣ часто ихъ похваляетъ, какъ крѣпительное средство. Но какъ они ни въ Швеции ни въ Россіи не растутъ; то можно ихъ намъ замѣнить ягодами обыкновенной княженицы. По причинѣ великой пользы сего растенія Г. Линней (Kgl: vet. ac. Handl. 1762. S. 192. u. folgg.) сдѣлалъ пространное описаніе, какимъ образомъ съ успѣхомъ можно оное въ садахъ разводить. М.

(*) Въ случаѣ, когда сіе не помогаетъ, Врачи советуютъ надѣть на больного младенца носеную прежде чесотнымъ рубашку. Въ семъ случаѣ къ нему чесотка пристаетъ и своимъ раздраженіемъ выводитъ на руку прежнюю сыпь. Сичъ способомъ Г. Дендьеръ лѣчитъ водяную болѣзнь, опъ воткнутой внутрь чесотки произшедшую. (*Sauvages Nosologia* T. 1. p. 431.)

Шестой видъ.

Иногда младенцамъ въ оспѣ, въ кори и въ горячкѣ съ красными пятнами (febris scarlatina) предъ выступленіемъ сыпи приключается родимецъ: однако къ счастью въ такомъ случаѣ рѣдко онъ сего случается опасноснѣ, но болѣею частію онъ тогда бываетъ предзнаменованіемъ благополучной оспы, либо другой какой нибудь изъ вышеписанныхъ болѣзней. Почему нуно бываетъ въ такомъ случаѣ стараться только о излеченіи начальной болѣзни, о чемъ я упомяну ниже. Довольно того, еслии извѣстно, что младенецъ еще не имѣлъ оспы и прежде, чѣмъ онъ въ то время у другихъ находился, что зараза къмѣ никуда въ домъ принесена быти не могла, и что младенецъ уже три дни имѣлъ жаръ съ такими припадками, которые такъ очевидно сопровождаютъ сыпную горячку. Ноо то уже великое приноситъ ободреніе, что родимецъ предвѣщаетъ не худое. Впрочемъ мнѣ случилось слышать, что одинъ младенецъ умеръ родимцемъ уже въ то время, когда сыпь начала показываться.

Седьмой видъ.

Когда родимецъ происходитъ отъ глоссовъ, то по большей части онъ бываетъ жестокъ, и часто возвращается. Однако къ счастью недавно родившіяся младенцы, питающіеся однимъ молокомъ, сему виду родимца не бываютъ подвержены. Ибо я никогда не примѣнилъ знаковъ доказывающихъ бытіе глоссовъ въ младенцахъ

древле, нежели они начнутъ употреблять, кро-
мѣ молока, другую пищу. Сей видъ почти всехъ
труднѣе распознавать. Мнѣ часто случалось видѣть
младенцевъ совершенно здоровыхъ и крѣпкихъ,
хотя изъ нихъ и выходили глисты. Для того
по наружному виду трудно заключить. Впрочемъ
если примѣчено, что младенецъ часто чешет-
ся въ носу, и имѣетъ сонъ безпокойный; когда
спитъ, издаетъ изъ себя шокъ звукъ, какъ
будто бы онъ что глоталъ. Дыханіе его против-
но и кало; ротъ по утру послѣ сна наполненъ
бызаетъ мокротами, цвѣтъ въ лицѣ часто пере-
мѣняется; то имѣетъ онъ отверженіе отъ пищи,
то сильный аппетитъ, который иногда до ша-
кой степени увеличивается, что, еслили онъ
чего нибудь скоро поѣсть не достанетъ, то по-
чти въ обморокъ падаетъ, брюхо бываетъ твер-
до, и въ то время, когда младенецъ обыкновен-
но привыкъ ѣсть, какъ бы распухаетъ; сахаръ
и другія сладкія вещи обращаются ему во вредъ;
попеременно нѣсколько времени онъ бываетъ то
здоровъ, то вдругъ опять боленъ, и жалуется
животомъ, либо рѣзомъ около пупка; приклю-
чается ему горячка либо рвота, которая болѣею
частью тотчасъ проходитъ, однако опять вдругъ
безъ явственной причины возвращается: но нѣтъ
сумнѣнія, что онъ боленъ глистами, а особливо,
еслили она у него и прежде показывались. Я при-
мѣнилъ, что у младенцевъ, страдающихъ ро-
димцемъ отъ глистовъ, всегда во время оже-
сточенія выпучивался пупокъ.

Но сколько жестокъ бываетъ сей видъ родимца; столько легко можно прекращать самыя оного ожесточенія; споймишь только младенцу немедленно испивши промывашельное изъ парнаго молока, къ которому, естли у него припомъ находишь заноръ, должно прибавить не много соли; въ противномъ же случаѣ и сіе не нужно. Не должно сюда прибавлять ни масла, ни меду, ни сахара, потому что глисты, какъ примѣчено, не любятъ сихъ вещей, и потому выше въ класки поднимаются; но хотя онымъ на сей разъ и отвращенъ бываетъ родимецъ; однако не можно надѣяться, чтобъ младенецъ совершенно былъ здоровъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ точно умерщвлены и истреблены глисты. Ибо коль скоро они опять начнутъ шевелиться, кусать, или сосать, то отъ сего ихъ раздраженія опять слѣдуетъ новое ожесточеніе. По сей причинѣ не медля долго, должно употребить надежное противъ оныхъ средство, въ противномъ же случаѣ они безпрестанно больше будутъ умножаться и прирастать. Я буду описывать сіе просираніе въ особомъ опдѣленіи, а теперь только упомяну, что малолѣтныя младенцы ежедневно должны употреблять медъ и свѣжую морковь, естли только оную сыскать можно. Большіе же могутъ пить манералыя воды, а особливо торккія Пранда оныя имъ весьма пропитвы; однако можно ихъ заохочивать оныя пить, вбрасывая въ стаканъ что нибудь для нихъ лакомое, на пр иминной сахаръ, который тоненъ на дно; и сказывать имъ, что онъ имъ доспанется, коль скоро они воду

воду до дна нынютъ. Небольшіе бѣды глисты (ascarides), которые находятся въ самыхъ нижнихъ кишкахъ, истребляются промывательными, изъ теплой минеральной воды настоявшими, въ которой, еслии ихъ не слабитъ, можно распушить по не многу соли. Глистовъ не можно въ одинъ разъ истребить, но се лѣченіе должно часто повторять.

Осьмой видъ.

Я видѣлъ также младенцевъ, которыми при продолженіи лихорадочнаго ожесточенія прикалывался родимецъ. Но послѣку оный, хоща при всякомъ ожесточеніи лихорадки возвращаясь, однако совѣтъ миновался, коль скоро она была прекращена: то я считаю, что сей видъ родимца зависить отъ лихорадки. Промывательное вскорости ожесточеніе оповращало. Впрочемъ я въ такихъ случаяхъ безъ замедленія, какъ только младенцу дѣлалось послѣ того легче, давалъ съ крайнею осторожностію (такъ, какъ предписано при окончаніи сей книги въ опдѣленіи о судорожномъ кашлѣ) легкое рвотное; а послѣ онаго употреблялъ известную лихорадочную корку.

Десятый видъ.

Есть еще и такіе примѣры, что младенцы, одержимые каменною болѣзнію, во время ожесточенія оной, получали родимецъ. Въ нашей спорѣ, Богу благодареніе, рѣдко примѣчается у младенцевъ каменная болѣзнь. Узнаніе ее у нихъ трудно иначе для того, что они не могутъ изъ

изъяснить своихъ припадковъ. Однако о томъ можно заключать по нижеслѣдующимъ признакамъ: когда младенецъ при испусканіи мочи кричитъ, ни однажды безъ слезъ помочиться не можетъ, моча у него выходитъ въ великомъ количествѣ и часто вдругъ останавливается. Еслили при томъ извѣстно, что его родили больныю ломотою, подагрою, либо самою каменною болѣзнию: по шѣмъ еще съ большею вѣроятностію отгадывать можно. Еслили же, вложивъ перстъ въ задній проходъ и пожавши онымъ мочевой пузырь, можно ощущать вѣчно твердое и движимое: то еще вѣрнѣе. Но все сумѣнье рѣшится, еслили удастся камень ощущать мочевымъ выпускникомъ (catheter).

Во время ожесточенія должно пустить кровь и нѣсколько разъ наставивъ промывательное. Оно сначала составлятъ изъ нѣсколькихъ ложекъ теплаго молока, разнаго количества деревяннаго масла и не много сахару; а напоследокъ изъ одной только деревяннаго масла. Къ больному мѣсту нужно прикладывавъ два пузыря одинъ изъ другимъ, наполненные до половины полченнымъ льнянымъ сѣмемъ, смѣшаннымъ съ небольшимъ количествомъ шафрану и молока, все сіе прежде сваривъ. Ихъ должно всегда перемѣнять, какъ только они начнутъ простывавъ. Полезно также больного сажать въ ванну. Внутрь должно давать успокаивающее болѣе лѣкарство, составленное изъ теплой наливки просвирковыхъ листовъ, на подбѣе чаю сдѣланной, изъ миндальнаго масла, яичнаго жел-

шки и небольшого количества Лондонскаго макового сыроу. На полфунта вышенписанной калыки прибавляется одинъ унцъ холодножжатаго миндальнаго масла, половина личнаго желтка и двѣ драхмы маковаго сыроу. Все сіе хорошо въ бушалаѣ сболтавши, давань по немому до шѣхъ поръ, пока не сдѣлается большому легче.

Десятый видъ.

Я уже выше упомянулъ, сколь вредно, естьли кормилицамъ и подобнымъ имъ извѣстенъ Эрискъ, кашка конскаго чеснока (Dafco dist), Филовій и другія, опій въ себѣ содержащія лѣкарства: ибо оныя особливо для младенцевъ весьма удобно во вредъ обратиться могутъ. Они, естьли и весьма малое количество маковыхъ вещей примушъ, ввергаютъ въ опасность свою жизнь, либо по малой мѣрѣ получающъ судорги. Таковыхъ печальныхъ примѣровъ весьма много описано. Впрочемъ трудно бываетъ послѣ того, доискаться настоящей причины смерти. Тотъ, кто сіе лѣкарство далъ, конечно на себя не скажетъ. Для того мы принуждены бываемъ у другихъ людей, въ домѣ находящихся, выспрашивать точную истинну. Хотя дѣйствіе опія надъ нашимъ шѣломъ состоитъ въ томъ, что онъ разгорячается, биеіе жилъ дѣлаетъ скорымъ, а дыханіе частымъ и тяжелымъ, производитъ потъ, (который по той причинѣ послѣ и пахнетъ имъ), испражненіе калу и мочи прекращаетъ, раздуваетъ лицо и рдѣніе въ немъ производитъ, гонитъ къ головѣ кровь, обременяетъ оную, разши-

ширяетъ зрачокъ въ глазу, и либо особенное спокойствие духа безъ сна, либо великую къ оному склонность, или и дѣйствительный сонъ съ бредомъ причиняетъ: однако изъ сего ничего съ точностію заключать не можно. Но еслии о семъ получено точное свѣдѣніе: то должно потчать влить въ ротъ младенцу теплой воды съ коровинымъ либо деревяннымъ масломъ, и вложивши осторожно въ ротъ перстъ, въ ономъ шекелишь, чпообъ отъ того произошла рвота. Если же сего сдѣлать не удастся; то должно съ солью испавить промывательное, тереть щоткою ноги, приложивъ къ онымъ съ горчицею штепо, котораго не снимать до тѣхъ поръ, пока кожа не покраснѣетъ; припаривать голову теплымъ уксусомъ и держать передъ носомъ гредкую губку, обмоченную въ крѣпкій уксусъ. Еслили можно тогда и кровь пустить; то сіе не худо. Но лучше приставить къ шеѣ, либо къ вискамъ пиявцы. Я не употребляю внутрь кислыхъ лѣкарствъ, хотя они и весьма дѣйствительны для отвращенія худыхъ слѣдствій, отъ великаго прѣема оныя происходящихъ; ибо неразумнобы было давать оныя малолѣтнимъ дѣтямъ, еслии вышеписанныхъ средствъ для сего довольно. Равнымъ образомъ должно снѣзаться пособлять въ такомъ случаѣ и изрослымъ младенцамъ, когда они по незнанію, либо не нарочно съѣдятъ какой либо ядовитый корень, на прим. блекты, либо ядовитыя ягоды, какъ то. красавицы, или сонной олуріи и подобное тому, послѣ чего обыкновенно приключаются судорги. Для нихъ также

месь-

весьма полезенъ, и самымъ лучшимъ противъ ясу можетъ служить лѣкарствомъ хороший виноградный уксусъ, который имѣ должно давать пины, а послѣ того дать рвотное.

Другіе виды.

Я пропущу здѣсь тотъ видъ родимца, который происходитъ отъ остроты любострастной болѣзни потому, что лѣчение онаго предписано будетъ въ отдѣленіи объ оной. Не упомяну также и о томъ, который зависитъ отъ недостижка въ пищави, то есть, когда кормилица скрываетъ свою неспособность къ возденію. Сие удобно можно узнать и отъративъ болѣзнь досматриваніемъ другой кормилицы, имѣющей больше молока. Равнымъ образомъ умолчу и о нѣхъ видахъ судорги и родимца, которые приключаются младенцамъ послѣ весьма сильныхъ испражнений, рвоты или поносомъ бывающихъ; ибо сему также какъ причину сыскашь такъ и прекратить болѣзнь остановленіемъ оныхъ испражнений не трудно. (Смотри въ отдѣленіяхъ о рвотѣ и поносѣ) Но еще Врачи повѣствуютъ, что родимецъ младенцамъ приключается и отъ того, когда они при подрѣзываніи языка проглнутъ нѣсколько крови. Сей можно излѣчить либо легкимъ рвотнымъ, либо ревеннымъ сиропомъ и промывательнымъ. Сколь вредно младенцевъ щекотать, и что они отъ сего получаютъ судорги и иногда лишаются жизни, то сие можно видѣть въ сочиненіяхъ Фомы Смишна Comment. T. 3. p. 402 и Робинсона On the spleen p. 148.

Впрѣ-

Впрочемъ вообще можно примѣнить:

1) Что второй, третій, четвертый и седьмой видъ чаще всѣхъ случается.

2) Что кровь пускашь нужно только тогда, когда младенецъ крѣпкаго сложенія и уже старше года; при томъ ешлы онъ не изнуренъ какою либо болѣзнию, ибо въ семъ случаѣ полезнѣе приставить пиявицы.

3) Что въ ожесточенн должно держать что нибудь между зубами младенца, дабы онъ не покусалъ себя языка.

4) Что промывашельныя во время ожесточенія служатъ наилучшимъ и полезнѣйшимъ лѣкарствомъ; ибо все, что имъ тогда ни даютъ внутрь, обыкновенно вонъ изъ рта вышкелъ, потому что они въ весьма сильномъ ожесточенн не въ состоянн бывать глотать. Теплыя ванны вообще хорошее оказываютъ дѣйствіе; онъ прекращающъ судорги такъ, что между ихъ ожесточеніями можно давать лѣкарства.

5) Я часто видѣлъ весьма хорошую пользу отъ того, когда младенцевъ обвертывали нагрѣтыми полотенцами, теплымъ рейвейномъ смоченнымъ. Недоспавшіе же люди могутъ нагрѣтое полотенце смочить горячимъ виномъ и прикладывать къ брюшку.

6) Что не можешь младенецъ себя предостеречь отъ родимаго пошеніемъ при себѣ корня желѣзной травы (*rad. x varberae*). Ибо я многихъ знаю, которые не смотря на то, что онъ при
Е себѣ

себѣ носили, весьма часто подвержены были сей болѣзни.

Некоторые родители зная, что ихъ дѣти многократно были подвержены родимцу, опасаются, чтобы оный не перешелъ въ послѣдокъ въ настоящую падающую болѣзнь. Однако я имъ въ утѣшеніе могу сказать, что сія болѣзнь обыкновенно съ лбтами, какъ только ихъ дѣти нѣсколько войдутъ въ силы, исчезаетъ. Но какъ си съ лбтами умножаются, такъ равнымъ образомъ и раздражительность чувствительныхъ жилъ, которая, какъ выше сказано, бываетъ нѣкоторымъ образомъ причиною полной слабости младенцевъ въ родимцу, уменьшается (*).

Впро-

(*) Такъ на пр. примѣнно намъ, что пропитательность обонянія, вкуса, слуха и зрѣнія съ лбтами уменьшается; равнымъ образомъ чувствительность нервовъ мочевого пузыря и кишекъ мало по малу такъ убываетъ, что онѣ не въ примѣръ молодыхъ дѣтъ опривленіе испражнений своихъ забываютъ. Чувствительныя жилы при прибавленіи возраста въ сравненіи съ младенчествомъ становятся меньше, или не получаютъ такъ равнаго съ шѣломъ приращенія. Онѣ также съ лбтами лишаются нѣсколько своей мягкости. Слѣдовательно въ младенческомъ онѣ имѣютъ самую большую чувствительность. И такъ, какимъ образомъ можно ихъ тогда называть напряженными? Гилари повѣствуетъ, что на островѣ Барбадосѣ дѣти споль были юнѣ чувствительны, что и онѣ сама албйшаго шуму получаютъ судорги. (Hallen element. Phylolog. T. 4. p. 293 & 294).

Впрочемъ родившии должны все то, что случается съ младенцемъ прежде ожесточенія, въ самомъ ожесточеніи и послѣ оного, замѣчать и прилѣжно наблюдать, рвоною ли или поносомъ оное оканчивается, приемъ смолръвъ, нѣтъ ли чего либо въ ротѣ жизни, нищѣ, нищии и содержаніи младенца, или въ цугихъ обстоятельствахъ, отъ чего бы ожесточенія либо сильнѣе, либо легче дваялись; либо не находится ли другой какой нибудь причины, отъ которой бы онъ либо чаще одинъ за другимъ слѣдовали, либо долѣ не приходили. Ибо еслили что нибудь сему подобное старающемуся о излеченіи шаковаго младенца врачу будетъ сообщено, то отъ чрезъ сіе весьма много пущаго узнаетъ, и имѣтъ скорѣе достигнети своего конца. Равнымъ образомъ родители, еслили они не имѣютъ случая посоветоваться о семъ съ врачомъ, симъ способомъ могутъ изъ шакowychъ наблюдений научиться, отъ чего должно младенца предоберегать, и что съ нимъ дѣлать. На пр. еслили они примѣтятъ, что ожесточение чрезъ каждыя двѣ недѣли возвращается, и каждой разъ оканчивается поносомъ, либо рвоною: то легко могутъ заключить, что въ первомъ случаѣ въ десятиый либо въ одиннадцатый день послѣ ожесточенія должно дать младенцу легкое слабительное, и повторить оное два или три дни сряду; а въ послѣднемъ равнымъ образомъ должны давать рвоное до тѣхъ поръ, пока не выдетъ изъ него вся клейкость. Еслижъ примѣчено, что родимецъ прилѣпляется все-

гда на четвертой недѣлѣ, то сіе подаетъ причину къ развѣдыванію, не имѣетъ ли въ то время кормилица мѣсячнаго кровоочищенія. А когда она оно имѣетъ по томчасъ должно ее перемѣнить. Ибо такая кормилица обыкновенно бываетъ въ то время весьма чувствительна и за самую бездѣлицу во вредъ младенца сердится. Когда изъ наблюдений извѣстно, что у младенца предъ каждымъ ожесточеніемъ за два или за четыре дни выходитъ изъ рта непріятный духъ, то изъ сего можно заключить, что онъ имѣетъ либо гнисты, либо испорченный желудокъ, и потомъ употребить противу того полезное лѣченіе и діету. Справедливосшь приписываемой противъ настоящей падухой болѣзни силы ясенду, или дикому бадьяну (*fraxinella*) время покажетъ. Оный похваляетъ Баронъ Фонтъ Смеркъ, (*Libellus de Hamula Jouis, Viennae 1769. cap. 2*). Цвѣты же дикаго кресу (*saradmine prat nris*) до полудрамы за каждымъ разомъ принимать съвѣдуетъ. Г. Бакеръ (*Medical Transactions bis the College of Physicians in London vol. 1*).

ОТДѢЛЕНІЕ 11.

О поносѣ.

Поносомъ называютъ, когда младенецъ жидче и чаще обыкновеннаго марется. Обыкновенное испражненіе низомъ единственно производится посредствомъ пресмыкающагося движенія кишокъ. Естественная слизь, въ небольшихъ кишечныхъ же-

железкахъ отъ крови отдѣляющаяся, оныя смазываетъ. Испарина, изъ скважинъ пищеваго желудка, желудка и кишокъ исходящая, бываетъ причиною, что калъ не бываетъ ни сухъ, ни твердъ. Она опять поглощается пасочными или всасывающими сосудами (*vasa lymphatica f. bibula*) и относится въ кровь. Сему самому много способствуетъ также поглощаемая слюна, желчь и сокъ пригожеюся железы (*lucius pancreaticus*), который безпрестанно вливаясь въ двенадцатиперстную кишку, разводитъ и разжиживаетъ желчь.

Желчь наипаче помогаетъ пресмыкающемуся движению кишокъ. Для того худо слабитъ въ желчныхъ пузыряхъ, либо когда случится запоръ въ желчномъ пузырѣ, или когда желчь отъ злоупотребленія кислой пищи и питія потеряетъ свою силу, какъ сие случается на пр. въ коликѣ отъ кислотъ. (*Colique de poitou vegetale*).

Все то, что болѣе скопленіе въ кишкахъ, либо сильнѣйшее въ оныя примеченіе вышечисленныхъ жидкостей производитъ, либо пасочнымъ сосудамъ препятствуетъ оную всасывать, и ускоряетъ извивающееся движеніе кишокъ, можетъ быть причиною поносу.

Накопленіе же умножается отъ многой пищи и питія. Когда желудокъ и кишки не въ состояніи употребляемаго въ пищу сваривать, то отъ сего происходятъ сырости и острога; а сля раздражая кишки умножаетъ пресмыкающееся движеніе оныхъ, и производитъ болѣе примеченіе

яб оныя жидкостей. Такъ на пр. изъ глазъ текутъ слезы, когда въ оныя попадетъ песчинка. Сие самое бываетъ, когда желчь стѣбается острою, либо она, какъ на пр. въ гнѣвѣ, приливается въ большемъ количествѣ въ кишки. Подобное сему случается, когда самая кровь имѣетъ въ себѣ острую; ибо тогда и жидкости отъ оной въ желудкѣ и въ кишкахъ отдѣляются, равно бываютъ остры, и своимъ раздраженіемъ причиняютъ большее приращеніе соковъ, и ускоряютъ пресмыкающееся движеніе кишекъ. По сей причинѣ всегда предъ начинаніемъ поноса ворчатъ въ брюхѣ въшры; а сие значить, что пресмыкающееся движеніе кишекъ увеличивается. Сие самое можетъ воспослѣдовать отъ молодого пия; и для того-то нѣкоторые дѣлаютъ съ дрожжами слабительныя пилюли. Равнымъ образомъ и отъ перемѣнной воды тоже случиться можетъ, а особливо когда кто оную употребляетъ вмѣсто обыкновеннаго питія. Когда кто много ѣстъ дынь, арбузовъ, малины или другихъ плодовъ, либо соеноваго соку: то также сей припадокъ происходитъ. Прекратившаяся испарина часто оплосится въ кишки, и умножаетъ въ оныхъ мокроты. По сей причинѣ подверженныхъ запору слабѣтъ, когда они пораньше встанутъ; ибо у нихъ чрезъ то нѣкоторымъ образомъ уменьшается испарина. Сходственное съ симъ, но гораздо сильнѣйшее дѣйствіе производитъ крѣпкое проносное. Равнымъ образомъ производятъ поносъ нарывы въ кишкахъ и въ другихъ внутренностяхъ; либо и снаружи на тѣлѣ

слу-

случающіеся, когда гвой изъ оныхъ можетъ про-
ткаться въ кишки, либо войти въ кровь и съ
оною пута принесенъ быть. Иногда сіе больному
бываетъ въ пользу. но большею частію отъ того
поринится кровь, и такъ рѣдѣетъ, что не въ со-
стояніи бываетъ держаться въ нѣдѣ, но отъ
частіи чрезъ сильный ночный потъ, а отъ ча-
сти неизлѣчимымъ поносомъ истощивается. То-
гда больной при такомъ состояніи его соковъ,
напослѣдокъ на подобіе угасающей отъ недостап-
ку масла лампы умираетъ. Мокроты такъ-
же умножаются въ кишкахъ и отъ того, когда
испаривныя ихъ сѣваины и устья железокъ раз-
слабѣютъ и весьма раздуются, либо разорвутся.
Равно какъ и когда всасывающіе сосуды не въ со-
стояніи бываютъ надлежющимъ образомъ вбирать
въ себя мокроты. Сіе случается, когда они поше-
ряютъ свою упругость, либо ихъ устья закроютъ-
ся слизью, спрупомъ молочницы либо оспы, либо
чешуею послѣ кори, либо когда находишься запоръ
въ печени или въ брижечныхъ железахъ. Они
также заиворяются и отъ остроты въ кишкахъ
изходящейся; ибо она выводя своимъ раздражені-
емъ изъ испаривныхъ скважинъ большее количе-
ство жидкошей, въ то самое время сбукаетъ
отверстія всасывающихъ сосудовъ.

При продолженіи поносу моча выходитъ въ
весьма маломъ количествѣ, и бываетъ цвѣтомъ
красивѣ обыкновеннаго. По сей причинѣ хорошимъ
почитається знакомъ, когда она начинаетъ испра-
жняться въ большемъ количествѣ, и становится

сѣшлѣ: ибо се бываетъ доказательствомъ, что мокроты прилепаясь къ кишкамъ въ меньшемъ количествѣ, и равномернѣе раздѣляются, такъ что моча въ состояніи бываетъ разжиживаться. Изъ сего видѣна можно причину, для чего бываетъ запоръ при употребленіи цѣлительныхъ водъ, когда вода у больного съ мочою весьма скоро выходитъ. Для того также хорошая испарина и потъ предвѣщаютъ скорое окончаніе поносу. По сей самой причинѣ тѣ подвержены бывають запору, кои опираются сильное шлодвиженіе, много потвѣютъ, либо часто мочатся; и для того Риверій посредствомъ бани прекратилъ въ себѣ самомъ поносъ.

Рвота въ поносѣ предвѣщаетъ хорошую перемѣну; ибо она не только уменьшаетъ вещество составляющее поносъ, но и способствуетъ къ тому, что пресмыкающееся движеніе кишекъ обращается вверхъ; снерьхъ того она въ состояніи бываетъ отдѣлить отъ кишекъ все то, что въ некоторыхъ мѣстахъ иногда къ онымъ остается прильнувшимъ, и бываетъ причиною раздраженія оныхъ.

Поносъ въ чахоткѣ предвѣщаетъ скорую смерть. Равнымъ образомъ когда оный и въ другихъ внутреннихъ, либо наружныхъ нарывахъ не приноситъ скорого облегченія, то ускоряетъ конецъ жизни. Сие самое разумѣть должно объ немъ и въ водяной болѣзни. По сей-то причинѣ слабительныя лѣкарства въ той водяной болѣзни, которая происходитъ отъ порчи желудка и кишекъ,
либо

либо остановившейся испарины, не годятся; ибо онѣ еще больше разслабляютъ желудка и кишки, и препятствуютъ пищеваренію. Сверхъ того прекращаютъ испарину; а вмѣсто того даютъ способность всасывающимъ сосудамъ, на поверхности онаго находящимся, поглощать въ себя изъ воздуха влажность. Въ головныхъ ранахъ, также роженицамъ и беременнымъ женщинамъ поносъ вреденъ; равно какъ и въ началѣ воспалительныхъ горячекъ, еслии желудокъ и кишки не наполнены сыростями.

Еслии поносъ продолжается безъ горячки, не перемѣняется отъ онаго аппетита и не приходящъ въ ослабленіе силы, при томъ рвѣ бысть не великъ, и послѣ каждаго испражнения чувствуется облегченіе, то его не должно останавливать. Посредствомъ онаго часто исцеляется излишнее количество мокротъ, въ желудкѣ и въ кишкахъ накопившихся, либо и изъ другихъ частей чашей, когда онѣ, будучи единственнымъ путемъ не истреблены, въ оныя протоняются. Такимъ образомъ останавливаются многія болѣзни, воспослѣдоваши могущія. Наипаче не должно преждевременно прекращать поносу у такихъ людей, которые имѣютъ боль во всей головѣ, либо въ половинѣ оной (Migraine), опухъ на шеѣ, въ глазахъ либо ушахъ, либо водяную застойную болѣзнь, потому что онѣ имѣютъ часто бывающъ полезенъ. Не должно также прекращать поносу у дѣтей, при прорѣзѣ зубовъ случающагося.

Но естли онъй весьма усиливается, то должно его останавливать, потому что въ противномъ случаѣ кишки весьма размягчаются, ослабѣваютъ и лишаются потребныхъ для перемѣненія надлежащимъ образомъ пищи и пития силъ. Полезныя же для желудка и для вышесказанной перемѣны опредѣленные жидкости чрезъ то испаряются. Поэтому кровь посредствомъ новаго и здороваго питательнаго соку не разжиживается, но дѣлается острою и для питания желудка неспособною. Для того оно ослабѣваетъ и начинаетъ сохнуть, силы исчезаютъ, ноги и спины ихъ распухаютъ; напоследокъ всю шрагедию оканчиваетъ сухотка, либо водяная болѣзнь.

Поносъ начинается жестокимъ, естли соединена съ нимъ горячка, ошращеніе отъ лици, либо сильный рѣвъ въ животи; естли слабоснѣ послѣ каждаго испражнения умножается, въ испражняемомъ калу примѣчается не естественный цветъ либо запахъ, и въ тѣхъ припадкахъ, которыми болѣвой отеранъ, и въ которыхъ съ перваго виду поносъ казался быть полезнымъ, нѣтъ никакого облегченія. Естли при томъ извѣстно, что онъ имѣлъ здоровый желудокъ, его ничѣмъ не разстроитъ и не меньше другихъ младенцевъ пробовать къ надлежащему вѣлодвиженію: то должно заблаговременно его останавливать, дабы онъ не превратился въ привычку. (*Diagnosa habitualis*). Наипаче должно спарашься о излеченіи долговременныхъ мысовъ, въ Іюль и въ Августъ мѣсяцѣ случающихся, когда днемъ бываетъ жарко,

ко, а ночью холодно; потому что оныя удобны
присрадились къ кровавый поносъ.

Изъ въ упомянутого мною явствуетъ, что
поносу находящияся многіе виды: однако я на-
меренъ описать только тѣ, которыми иначе под-
вержены бывающіе младенцы.

Первый видъ.

Чѣмъ младенцы моложе, тѣмъ больше изъ
слабнѣтъ, и тѣмъ они склоняеы бывающіе ко сну:
напротивъ того чѣмъ они старѣе, тѣмъ больше
подвержены бывающіе запору и меньше спятъ. Для
того не должно считать за поносъ, когда ма-
ленца, который надлежащимъ образомъ сосетъ
грудь, три или четыре раза въ день слабнѣтъ.

Новорожденные младенцы рѣдко подвержены
бывающіе поносу. Ежели же оный имѣетъ и приклю-
чился, то причиною сего бываетъ мать, либо кор-
миллица, когда она либо худо кормитъ свое дитя,
либо имѣетъ въ себѣ худое и нездоровое молоко.
Худо кормитъ, когда она обыкновенно не наблю-
даетъ всѣхъ тѣхъ предписаній, о которыхъ я
упомянулъ въ Описаніи о кормиллицахъ. Наипаче
маленецъ можетъ заболѣть поносомъ, когда про-
снудится его желудокъ, либо ноги; когда мокрое
бѣлье сушатъ въ его горницѣ; когда кормиллица
потчасъ послѣ кушанья, либо по утру еще не ѣвши
ему дастъ свою грудь; когда она весьма часто,
либо каждый разъ, какъ только онъ заплачетъ,
дастъ сосать оную; когда прежде прорѣзу зубовъ
его кормитъ какою либо грубою пищею; когда
самъ

сама часто ѣстъ соленую пищу, либо много плодовъ, огурцовъ, ягодъ; пьетъ кислое пиво; либо когда она имѣетъ въ животѣ рѣзъ и о томъ не рассказываетъ; либо когда перемѣнивши кормилицу возмущетъ на мѣсто ея такую, которой молоко кисло. Какого свойства молоко имѣть должна кормилица, о томъ сказано въ ономъ же Описаніи.

Родивши въ такомъ случаѣ должны отмѣнить только то, что причиняетъ вредъ, послѣ чего обыкновенно поносъ самъ собою прекращается. Если же оный долго продолжится, то должна кормилица часто принимать порошковъ для кормилицъ (Смолр. Описание о рѣзѣ въ животѣ смолр. 51.), и помазывать брюшко младенцу мускуснымъ бальзамомъ. Можно также смѣшать вмѣстѣ двѣ драхмы есриаку, одну драхму мускуснато бальзаму и шесть капель шминнаго масла, и намазавъ на лѣвѣ прикладывавъ къ брюшку. Въ случаѣ надобности можно одинъ либо два раза наставить промывательное изъ теплаго молока и небольшого количества крухмалу. Поносъ, происходящій отъ рѣзу въ животѣ, вылѣчивается тѣми же средствами, кои предписаны для отвращенія оного.

Второй видъ.

Когда младенецъ много ѣстъ, либо пьетъ, то пища у него не можетъ хорошо свариваться, но только шаястїю своею причиняетъ раздраженіе, могущее произвестъ поносъ.

Если же она не только въ излишнемъ употребляется количествѣ, но и худое качество имѣетъ:

етъ: то претерпѣваетъ въ желудкѣ и въ кишкахъ такую же перемѣну, какой она подвержена бываетъ и въ другомъ какомъ либо сосудѣ, столько тепломъ и мокромъ, то есть, получаетъ такую остроту, которая побуждаетъ къ поносу. Смощр. Отдѣленіе о кашаѣ, а именно о желудочномъ, припомъ о рвоѣ четвертый видъ, гдѣ описаны знаки сырости въ желудкѣ находящейся, и различныя оной свойства.

Сей видъ поносу чаще всѣхъ случается; онъ не надобно преждевременно прекращать, потому что онъ истощаетъ причину, его производящую, которая, естли вѣжущими лѣкарствами будетъ ослаблена, можетъ произвести худыя слѣдствія. Естли же оный самъ собою не перестаетъ, рѣзъ въ животѣ умножается, вѣпры въ ономъ производящъ сильное ворчаніе, и больной весьма истощился, то должно пособлять ему лѣкарствами.

Естли безпрестанно бываетъ отвращеніе отъ пищи, и больного пошнѣтъ, то полезнѣе всего рвотное, которое по сей причинѣ и употребить должно.

Естли же больной не чувствуетъ никакой пошноты, но только имѣетъ въ животѣ рѣзъ и ворчаніе, то должно дать ему слабительное изъ ревеню. Для сего можно избрать либо реченый порошокъ, либо эликсиръ безъ сахару сдѣланный, либо изливку (infusum), на подобіе чаю сдѣланную (смощр. въ Отдѣленіи о рвоѣ), а именно: порошокъ можно дать, смощря по возрасту младенца,

денца, отъ 8 до 12 грановъ, эликсира по большей или меньшей дѣйской ложкѣ, а наливки до двухъ чайныхъ чашекъ. Иногда одного приема бываетъ довольно, а иногда должно оный два или три упра сряду повторять, а особливо что касается до шѣхъ, кои долговременно употребляли хулую пищу.

Естьли же изъ признаковъ, въ Ошдѣленіи о рвотѣ описанныхъ, примѣчаются сырости, то должно употреблять вмѣстѣ съ рвеномъ описанныя въ ономъ лѣкарствы, либо и безъ оного. На пр. естьли сырости кислаго свойства, то должно употреблять бѣлую магнезію, либо въ порошокъ спертыхъ чернаховыхъ скорлупы, либо раскусить въ рвеномъ эликсирѣ или наливкѣ нѣсколько щелочной соли виннаго камня. Естьли же оныя гнилы, то заставлятъ больного притомъ пить понемногу лимонаду, либо миндальнаго молока и проч. Вмѣсто же обыкновеннаго питья должно для его употреблять жидкій взваръ изъ проснато или сорочянского лшена, изъ копорого шакже можно сдѣлать, примѣшавъ къ нему не много сладкаго миндаля, Миндальное молоко. Естьли младенецъ уже слабъ, то должно мліть въ молоко нѣсколько винограднаго вина, чтобъ оно осѣлось, и давать изъ оного младенцу пить сыворотку. Либо, когда уже время остановить почосъ, должно для сего употребленія налить сыворотку на бѣлый прижженный хлѣбъ и на небольшой кусокъ Винтеранской корицы, и протрудивши продвигать. Когда находящіяся кислыя сырости, это весьма полезны бываютъ жидкія мясныя похлебки.

Есть-

Естьли же не смотря на то, поносъ продол-
жался, то должно стараться сыскывать другія
средства для прекращенія оного. На сей конецъ
полезно прикладывать къ желудку вышеписанную
смѣсь изъ вериаку, мускатнаго бальзаму и пмин-
наго масла, а сверхъ оной нагрѣтую салфешку и
деревянную шарѣлку; при томъ больному младен-
цу давать еще сухія ягоды черницы (Вассе
турилл). Достаточные люди могутъ приказать
выписать изъ Аптеки желудочный Лондонскій
пластырь (Emplastrum stomachale Lond.) и прикла-
дывать оный къ брюшку младенческому. Когда
все сіе не помогаетъ, то должно сдѣлать поро-
шокъ изъ 10 на пр. грановъ Армянской красной
глины (Bolus Armena) и 5 грановъ жалаго пра-
таканту, и давать оный послѣ каждаго испражне-
нія на нѣ въ слѣдующемъ пишь: возьми двѣ
драхмы бѣлой или простой камеди, распуститъ въ
двухъ фунтахъ жидкаго супу изъ обыкновеннаго
либо сорочинскаго овшена варенаго. Можно также
растопитъ на пр. двѣ драхмы воску, и при без-
престанномъ мѣшаніи прибавлять къ оному степль-
но порошка изъ раковинъ, сколько онъ въ себѣ
помѣститъ можетъ, и употреблять вышеписан-
нымъ образомъ. Вечеру не бесполезно давать
внушрь по одному грану вериаку въ молоко, либо
въ простой коричной водѣ. (Смотри Отдѣленіе о
кашлѣ). Многіе съ пользою давали пить больному
небольшое количество молока, съ одною или дву-
мя драхмами мѣлкоизрубленнаго воску вареное.
Другимъ пользовало пишь изъ воды съ лепеш-
кою, въ копорой не много находилось воску, ва-
ре-

ренное. Инымъ также изрядную принесли пользу два или три яблока, сиченныя на такомъ угольѣ, въ который прежде положенъ былъ воскъ на шотъ конецъ, чпобъ онъ распившись могъ вбираться въ оныя. Однако ко всѣмъ симъ лѣкарствамъ не прежде должно пристувать, какъ уже послѣ употребленія рвотнаго либо рвеню. Больше же сего рѣдко что либо бываетъ нужно.

Напослѣдокъ, когда уже поносъ совсѣмъ перестанетъ, должно спаранься воздержаніемъ отъ пищи и нпня и желудочными аликсирами возврашнть желудку и кишкамъ прежнюю силу.

Естьли ас скоро послѣ онаго сдѣлается въ головѣ боль, либо воспослѣдуетъ другой какой либо припадокъ: то сіе бываетъ знакомъ, что поносъ оспановленъ преждевременно, и что еще нѣчто осналось въ кишкахъ, чему бы должно было испражниться. Для того младенцу должно дать рвеню шакъ, какъ выше сего показано.

Сюда принадлежитъ также и шотъ сильный поносъ, который не рѣдко случается при употребленіи цѣлительныхъ водъ, когда кто свечері прѣте покушаетъ много земляники. Однако оный удобно прекращается употребленіемъ небольшого количества коричной водки.

Третій видъ.

Естьли усія испаринныхъ всасывающихъ сосудовъ, либо отъ рстн кишечныхъ железъ шакъ разслабѣютъ, что мокроны изъ нихъ въ кишки словно льются, но всасывающими сосудами опять не
по*

поглощаются: то приключается сильный поносъ который удобно больного истощить можеть.

Оный различается отъ другихъ тѣмъ, что во время продолженія его не бываетъ никакой боли въ животѣ, ни рѣзу. Въ испражненіяхъ не примѣчается никакого гною и ничего другаго не обыкновеннаго. Знаковъ сырости также бываетъ не видно. Стражающие онымъ бываютъ слабы, блѣды и безсильны.

Когда поносъ чрезвычайно великъ такъ, что отъ него все въ шлѣ находящіяся соки въ короткое время истребляются: то должно оный какъ можно скорѣ стараться прекратить. Для сего полезно 1) больному давать одну только сухую пищу, запретить всякіе жирные суны, жирныя кушанья и все то, что можеть способствовать къ большому расслабленію. Для питья онъ долженъ употреблять одну только воду, которую можно настоять корицею либо померанцового коркою, по томъ процѣдить и простудить. 2) Велѣть ему по два или по три раза въ день принимать въ небольшомъ количествѣ коричной воды по чайной ложечкѣ такъ называемаго марціального вина (*vinum chalybeatum*), или другой какой либо марціальной настойки, либо по нѣскольку грановъ марціального чернаго порошка, (*Aethiops martialis*) по Парижской фармакопей сдѣланнаго. Г. де Гаенъ похваляетъ порошокъ травы такъ называемой плакунь (*Lupinus vulgaris flore purpureo* (*)).

Сей

(*) *Lupinus Sansana L* въ различныхъ сочиненіяхъ похваляется прошивъ поносу то самая шрава, то
Ж ко-

Сей видъ часто бываетъ слѣдствіемъ другихъ поносовъ, когда оныя, какъ сіе обыкновенно случается у недостаточныхъ людей, закоснѣваютъ и чрезъ долгое время продолжаются.

Не рѣдко также онъ происходитъ отъ печали, отъ страху и отъ зависти. Однако младенческая печаль не долго продолжается, но скоро проходитъ, еслили только худая мать, либо шатковъ же учитель ежедневно ему оный не наноситъ. Отъ страху иногда случается таковой поносъ. Зависитъ часно господствуетъ между дѣтьми

корень, то цвѣтъ сего растенія. Еще Дрескорилу и Галену дѣйствіе его въ сей болѣзни было извѣстно. Однако Г. де Гаену честь приписать должно, что онъ въ новѣйшія времена ввелъ оное въ употребленіе. (Rat med. p. 3. p. 195 fqq. & p. 4 p. 250); но почти въ тоже самое время Барнъ Фнъ Стеркъ (Alph. med. I. p. 108) и Г. Милей (Naen p. 3 loc. cit.) нашли его полезнымъ. Впрочемъ Г. Гаверманномъ (Vermischte Bemerk. und Unters. der aufub Arznei B. I. S. 214) многократно надъ порошкомъ изъ цвѣтовъ учиненныя наблюденія совсѣмъ противное тому доказываютъ; но онъ примѣтилъ, что оный поносъ луше еще увеличиваетъ и причиняетъ многія припадки. Г. Блѣмъ вкратцѣ описалъ (Berättelser til Coll. med. forande Medicinal Verket tilstând i Riget, 1765 S. 248. также Coll. med. Berättelser om Medicinal. Verket. 1769. S. 12), удачныя опыты надъ взваромъ корня, въ долговременныхъ поносахъ простыхъ и кровавыхъ учиненныя; равно какъ и другой Шведскій врачъ Г. Гастъ (на последнемъ мѣстѣ стр. 282) съ пользою употреблялъ порошокъ травы и цвѣтовъ въ продолжительныхъ поносахъ. М.

ми въ то время, когда они примѣчаютъ, что кого нибудь изъ ихъ соповарицевъ больше ихъ хвалятъ. Сего ради поносъ не можно прекратить до тѣхъ поръ, пока не прекращена будетъ причина оного. По прекращеніи же оной рѣдко какое либо лѣкарство кромѣ вышеписанныхъ бываетъ потребно.

Четвертый видъ.

Если дѣти лѣтомъ, либо осенью, когда днемъ весьма жарко, а въ вечеру холодно бывають, поздно на дворѣ долго ходятъ и играютъ: то отъ того приключается имъ насморкъ, либо кашель, либо частое испражненіе мочи, либо поносъ, большею частію сопряженный съ рвотомъ. Жаръ днемъ весьма растворяетъ потовыя скважины, а холодъ оный въ вечеру опять затворяетъ. По сей причинѣ влажность, которая должна бы испарившись чрезъ испарину, останавливается и приливаясь къ кишкамъ, причиняетъ поносъ. Но еще скорѣе оный воспослѣдовать можеть, если они разгизчась прыгаючи и испотѣвши ложатся на земаю. Младенцы одарены тонкою и нѣжною кожею и по той причинѣ они, равно какъ и прочіе слабые люди, скоро чувствуютъ перемѣну теплоты и спужи. Наврошивъ того сѣ не такъ вредитъ крѣпкимъ людямъ, которыхъ кожа чрезъ многіе труды и толстыя рубашки сдѣлалась твердою на подобіе ремня.

По вышеписаннымъ обстоятельствамъ сей видъ поносу удобно можно отъ другихъ разли-

чить; причины онаго также явствуютъ; да и лечить его не трудно. Должно только во первых по предписаннымъ въ отдѣленіи о кашлѣ законамъ испытать, нѣтъ ли сыростей въ желудкѣ и въ кишкахъ младенца. И еслили сіе примѣчается; то должно оныя безъ замедленія прежде рвотнымъ, либо слабительнымъ испражнить; послѣ того положить младенца въ теплую постель и давать ему нишь теплую наливку изъ бузиновыхъ цвѣтѣвъ, а сверхъ желудка прикладывать пропускную бумагу въ горячее вино, либо (что еще лучше) въ канфорный спиртъ, который можно за скоростъ, наливъ въ глубокую шорѣлку, надъ конфоркою согрѣть, обмоченную, и въ тонкое полотенце завернутую. Какъ только младенецъ получитъ хорошую испарину, либо настоящий потъ; то большею частію поносъ вдругъ прекращается. Но еслили и послѣ того оный вмѣстѣ съ рвотомъ продолжается; то наилучше дать ему слѣдующаго утра ревеню, а въ вечеру не большое количество Черіаку въ оной же наливкѣ, съ однимъ граномъ канфоры смѣшенною.

Пятый видъ.

Младенцы, которымъ даютъ бѣсъ жирное кушенье, сало, жирные блины и здобное пирожное, подвержены бывають особливому роду поноса. Отъ сего у нихъ скопляются сырости, которыя оспроною своею причиняютъ рвѣзъ и жестокий поносъ. Оный опъ Врачей называется *желчными* (Diagnosia biliosa) потому, что его производитъ также и острая желчь, когда она въ излишнемъ количествѣ

ствѣ во время жестокаго гнѣву приливается въ кишки, либо въ жаркое и сухое лѣто сдѣлавшись острою, при наступленіи осени, когда испарина уменьшается, бываетъ причиною гнилой горячки, либо поносу. Сей поносъ часто опвращаетъ горячки, и безъ сего испражненія ихъ трудно бываетъ лѣчить.

Познается онъ изъ вышеписанныхъ обстоятельствъ и по цвѣту испражнений изжелтазеленому: но сколько бы онъ вреденъ ни былъ; однако часто опвращаетъ и излѣчивается боль въ животѣ, поносомъ, изгату, рвоту, колику, лихорадку и желчную горячку.

Для того се испражнение не должно преждевременно останавливать; но вмѣсто того гнилая нечистоты, либо острую желчь такъ разводить и поправлять, чтобы поносъ былъ не столь жестокъ. Для сего полезно младенцу давать пить по немногу, но весьма часто теплую воду, либо съ пивомъ (*), съ лимоннымъ или барбарисовымъ

Ж 3

со-

(*) Въ Швеціи имѣютъ обыкновеніе свѣжоразивать молоко посредствомъ пива, которое во время кипяченія къ оному приливаютъ, и такимъ образомъ сдѣланную сыворотку вмѣстѣ съ пивомъ вѣшаютъ такъ, какъ родъ особливаго кушанья, которое впрошчемъ едятъ приравнывая къ нему немного сахара и корицы, вкусомъ бываетъ не неприятно. Для скорѣйшаго свѣжоразиванія приливаютъ еще нѣсколько крѣпшей кислоты, а особливо лимоннаго соку, хотя для сего довольно бываетъ и содержащейся въ нѣ-

тъ.

сокомъ, уксусомъ, кислымъ хлѣбомъ, либо съ
взваромъ сербюринныхъ ягодъ сдѣланную сыво-
рошку, хорошо продолженное пахтанье, миндаль-
ное молоко, такъ называемое молоко изъ белой
камеди (*Euphorbia gummi Arabici*), напѣлку изъ цвѣ-
тцовъ просвиры, супъ изъ ишена, или подобное
тому. Между тѣмъ должно дать однажды либо
два раза нѣсколько чашекъ часо упоминаемой
ревенной наливки, либо слабительное изъ пишья,
состоящаго изъ одного унца Индѣйскаго тамару
(*Tamarindi*), варемаго въ полфунтѣ воды и послѣ
продолженнаго. Если же не смотря на то бодѣзнь
продолжается; то должно стараться оную пре-
грапить, давая внутрь по шести или по осьми
грановъ жонатаго ревеню, и повторая сей пріемъ
послѣ каждаго испражнения, либо пишемъ изъ
одной драхмы сухаго Японскаго соку (*teiga satashu*),
распущеннаго въ полфунтѣ воды, составленнымъ
либо взваромъ изъ листовъ подорожника (*plantago*),
а когда рвѣзъ не перестанетъ, то давать въ ночи
по нѣсколько грановъ Геріаку.

Однако никогда не должно забывать послѣ
того исправивъ желудокъ и кишки хорошею, но
умѣренно употребляемою пищею, желудочными
эликсирами, желѣзными шариками, миндальнымъ
виномъ, и привесть ихъ въ прежнюю крѣпость.

Ше

вѣ. Сію сыворошку въ Швеціи по большой ча-
сти употребляютъ въ горячихъ бодѣз-
няхъ. М.

Шестой видъ.

Крѣпкія проносныя, естли ихъ кто по неразумію дастъ младенцу, могутъ причинитъ жестокий рвѣтъ, боль въ животѣ, судорги и самую смерть. Однако имъ можно въ семъ случаѣ пособитъ, давая пить въ довольномъ количествѣ жирный супъ, теплѣе молоко и деревяннѣе масло, сливки, или ѣсть несоленѣе коровье масло. Крѣпительныхъ лѣкарствъ не должно прежде испражненія проносныхъ давать; ибо они могутъ ими задержаны быти, развѣдашь кишки и причинитъ въ оныхъ возженіе. Для того нужно наставляти изъ вышеписанныхъ лѣкарствъ промывать шельныя, наипаче въ томъ намѣреніи, чтобъ кишки словно умягчить и уладить; при томъ проносное разжидишь и сдѣлашь чрезъ то недѣйствительнымъ. Когда поносъ начнетъ уменьшаться, то можно, смотря по различію возраста, дать не много уполяющаго боль лѣкарства, на пр. одну либо двѣ капли усыпительнаго Сиденгамова Лавдана въ небольшомъ количествѣ молока. Но естли бы оное употреблено было преждевременно, то въ состояніи задержать ядовитость проноснаго и причинитъ смерть. Между прочимъ таковой находится примѣръ въ четвертомъ Томѣ Единбургскихъ сочиненій (Edinb. sch. Abhandl. Band. 4), а именно: иѣкто по незнанію принялъ шесть грановъ рвотнаго виннаго камня (tartarus emeticus), и послѣдовавшую отъ того съ поносомъ рвоту преждевременно остановилъ, принявъ двуперъ 20 капель усыпительнаго Сиденгамова

мова Лавдана, но отъ того лишился жизни. Напротивъ того благополучиѣ отъ сего избавился господинъ Профессоръ Целларій, когда ему нѣкто прописалъ отъ глухоты пилюли, которыя онъ, не смотря на то, что онъ были прописаны на нѣсколько дней, всѣ вдругъ принялъ. Узнавъ свою ошибку по совету другихъ пилъ онъ много суну съ такимъ успѣхомъ, что не только шѣмъ уничтожилъ ихъ дѣйствіе, но и слухъ возвратилъ по прежнему.

Седьмой видъ.

Плюсъ, приключившійся отъ вогнанной внутрь чесотки, либо другой какой либо сыпи, излечивается теми средствами, которыя предписаны на сей случай въ отдѣленіи о кашлѣ.

Осьмой видъ.

Какимъ образомъ должно поносъ лѣчить въ оспѣ, сіе можно видѣть въ описаніи объ оной.

Девятый видъ.

Равнымъ образомъ шотъ поносъ, который вызастъ въ кори, описанъ въ особливомъ отдѣленіи объ оной.

Десятый видъ.

О шотъ поносѣ, который происходитъ послѣ молочницы, когда опадаетъ струнъ, и который часто бываетъ смѣшенъ съ небольшимъ количествомъ крови, можно читать въ Отдѣленіи о молочницѣ. Впрочемъ въ ономъ можно употребить слѣдующее лѣкарство:

R Spermat. cer. Muc lag.	Возьми китова мозгу,
G. Arab. aa ʒij.	клею камеди по двѣ драх-
Mixtis adde	мы,
Aqu. cinnam. s. v. ʒss.	Смѣшавши прибавь
M. Agitando S.	Коричной воды безъ вина
	сдѣланной полфунта.
	Смѣшанной избалшывая:
	надпиши:

Принимашь каждой часъ по столовой ложкѣ. Ежели коричная вода крѣпка: то можно уш- шребить оной полька полуона, а прочее допод- нить жидкимъ супомъ изъ сорочинскаго пшена.

Л и б о.

R Butyr. cerac Bat. (*) ʒβ.	Возьми восковаго масла по-
Muc lag G Arab. ʒj.	Битовой фармакопей при-
M. terendo & adde Aqu.	готовленнаго полдрахмы.
Cinnamom s. v.	Клею овдой камеди одну
Syrup. discod. aa ʒj.	драхму.
Decoct hord. perlitar ʒj.	Смѣшай стирая, и прибавь
M. D. S.	коричной воды съ виномъ
	сдѣланной,
	Маковаго сыропу по одной
	драхмѣ,
	Взвару перловой крупы
	два фунта смѣшай и над-
	пиши:

Принимашь сначала по столовой ложкѣ каж- дой часъ, а по шомъ послѣ каждого испражненія.

Ж 5 . . .

Один-

(*) Butyrum cerac secundum pharmacopoeiam Bateanam 1734 p. 23 дѣлается изъ желтаго воску, кото- рый должно въ винномъ спиртѣ рѣсусшить и прождить такъ, чтобъ на бумагѣ осталось маслу подобное существо. Ватъ оное хорошо вы- моченное похваляетъ до одной драхмы въ по- носѣ. М.

Одиннадцатый видъ.

Если младенецъ испражняется неперевареною пищею, которая тотчасъ послѣ кушанья словно плыветъ изъ кишекъ; то онъ страдаетъ поносомъ особливаго рода; который называется происходящимъ отъ неваренія желудка (*lienteria*). Оный легко отъ другихъ различить можно отчасти по вышепомянутымъ признакамъ, а отчасти потому, что во время продолженія его въ брюхѣ не чувствуется никакой боли. Сверхъ того онъ обыкновенно бываетъ слѣдствиемъ предшешаго долговременнаго простуда, либо кроваваго поносу, молочницы протсигающейсѣ въ желудкъ, либо другой какой нибудь долговременной болѣзни, отъ которой желудокъ и кишки приходятъ въ расслабленіе и для пищеваренія опредѣленный сокъ теряетъ свою силу. Сія болѣзнь тѣмъ опаснѣе, что тѣло отъ нее лишается питанія и истощается,

Кислая опришки въ семъ случаѣ бывають хорошимъ предзнаменованіемъ; ибо онѣ значатъ, что пища начинаетъ въ желудкѣ задерживатьсѣ и варитьсѣ.

Если старыя люди впадутъ въ сію болѣзнь, то она скоро лишаетъ ихъ жизни.

Дѣти достаточныхъ людей могутъ отъ оной освободиться, если

1) Будутъ надлѣвать такую діету, которую я опишу въ отдѣленіи объ Англической немочи.

2)

2) Непрерывно сплунуть носить надъ желудкомъ Лондонскій желудочный пластырь.

3) Позволять себѣ по утру и въ вечеру вдоль спины вытирать рачительна непеналою рукою не большое количество мускатнаго бальзаму.

4) Ежедневно будутъ принимать за часъ передъ обѣдомъ по различію возраста по 20, 30, либо по 40 капель Лондонскаго марциальнаго вина въ небольшомъ количествѣ коричной воды, безъ вина сдѣланной, и

5) Употреблять каждое утро и въ вечеру по три слѣдующія пилюли:

R. Extr. cort. cascarill. Возьми каскарильной кор-
ски,

Astoriae martial. paris Чернаго марциальнаго по-
рошку по двѣ драхмы,

Syrup. cinnaom. q. s. Сырону коричнеаго пошреб-
ное киличество.

M. F. pilul. pond. gr. Смѣшавши сдѣлай пилюли
вѣсомъ по два грана и по-
серебри.

Полезна также въ сей болѣзни такъ называ-
емая цѣлительная вода Шнавассеръ изъ Пуганнер-
скаго источника.

Дѣши бѣдныхъ людей должны, какъ можно, рачительно наблюдать вышепомянутую діету, и принимаютъ по утру, въ полдень и въ вечеру марциальное вино. Оно же для нихъ можно для избѣжанія дороговизны, дѣлать съ бѣлымъ французскимъ виномъ. Имъ можно давать его въ водѣ, вареной съ небольшимъ количествомъ корицы. Форесшъ пособлѣ одному своему сосѣду толченымъ му-

мускатнымъ орѣхомъ, который смѣшавши въ нич-
нымъ желѣзкомъ на горячемъ кирпичѣ пекли.

Одна Госпожа, которая около половины своей
беременности почти восемь дней была больна сею
болѣзною, послѣ щещнаго употребленія различ-
ныхъ лѣкарствъ, выѣвилась поддрыхною лавро-
выхъ Персиковыхъ бобовъ (Faba persicifera) (*).

Дос-

(*) Зри о семъ при окованіи сего описанія.
Кавалеръ и Архитекторъ Беккъ обстоятельно опи-
сываетъ оныя бобы (K vet. Acad. Handl. 1759.
S. 74. folgg.) Онъ говоритъ, что они во пер-
выхъ изъ Португаліи въ Швецію привезены,
гдѣ подъ названіемъ Пекурисъ или Фава Пека-
иро въ колѣкъ и поносѣ употреблялись. Однако
собственно говоря они родятся въ Бразиліи, и
на островѣ Марингонѣ. Они кажутся плодъ лав-
роваго дерева (Linn. Dis. obiecti in mat. med. Ups.
1772), похожи бываютъ на большую миндаль,
по срединѣ расколотую: однако имѣютъ на
соединенной поверхности вѣоль простирающую-
ся брану, а на противной оной примѣтное воз-
вышеніе. Снаружи они бываютъ черноваты, а въ
при свѣтлорусы, и на подобіе мускатныхъ орѣховъ
испещрены ямочками. Запахъ ихъ есть такъ,
какъ нечто среднее между мускатнымъ и Сас-
сафраснымъ. Я имѣю полученный въ Швецію
другой плодъ, который однажды взяли въ Аме-
рикѣ за настоящий. Онъ почти въ половину на-
стоящаго больше, снаружи морщинистъ, въ-
шомъ блѣднѣе, разрыванный внутри, больше
похожъ на сѣрый, тяжель и тверже, больше
прочихъ, горекъ и меньше пахучъ. Г. Беккъ
испытывалъ настоящий по Ламмъ и предписы-
валъ изъ морымъ болнымъ. Его опыты равно
какъ

Двенадцатый видъ.

Есть еще одинъ родъ поносу, которому младенцы выпадаютъ по изержны. Врачи называющіе его утробнымъ поносомъ (*Fluxus coeliacus*). (*)

Спраздлуште сего болѣзнию имѣютъ въ животѣ рѣзъ и весьма сильный поносъ, который однако безпрерывно продолжается, но на нѣсколько времени перемѣляется. Калъ иногда чрезвычайно водянистъ, а иногда никакого опмѣннаго запаха не имѣетъ. Цвѣтъ оного бываетъ различенъ, иногда сѣрый, иногда желтый, иногда изъбракрасный, и смѣшанный съ кровью. По зывъ на пищу иногда бываетъ сильный, а иногда совсѣмъ пропадаетъ. Больные въ
лицѣ

какъ и многіе Г. Шенцеля (*S. 6 и folg.*) прежде того имѣ въ арми учившые, хотя не безъ ограниченія, однако подтверждаютъ присылаемые Португальцами имѣ похвалы. Г. Германнъ (*Вѣстк. илд. Unters S. 215 и folg.*) также предпочитаетъ ихъ многимъ лѣкарствамъ какъ въ кровавыхъ, такъ и въ простыхъ поносахъ. М.

(*) Г. Вогель въ изданной имѣ въ 1768 году диссертации (*Fluxus coeliacus gelinae poto aque tatio*, доказалъ, что новѣйшіе писатели въ разсужденія сей болѣзни ошибаются, и что питательный сокъ (*chilus*) съ каломъ не испражняется. (Пон. Лейомедикъ представляетъ свои причины еще и того короче in suis praelectionibus de cognoscendis & curandis corporis humani affectionibus p 255 199. М.). Уваженіе къ достопочтенному Беллонию всѣхъ насъ Меликовъ одного за другимъ привело въ заложденіе. Р.

лицѣ бывають блѣдны, чахнутъ и лишаются силъ. Руки и ноги у нихъ распухаютъ, брюхо раздувается. Брижечныя железы спржадушъ запоромъ и, естли весьма уже испорчены соки, по раздувается печень, а съ оною селезенка и пригожемясная железа (pancreas). Слѣдовательно причина сей болѣзни можетъ быть во всей крови, естли она испорчена, а особливо въ тѣхъ жидкостяхъ, которыя вливаются въ кишки и опредѣлены для пищеваренія, они будучи сами испорчены, ни къ чему больше не способствуютъ, какъ только къ худой перемѣнѣ всей употребляемой пищи. Желудокъ либо кишки, либо и обоѣ вмѣстѣ лишаются своихъ силъ.

Изъ сего довольно явствуетъ, что сѣя болѣзнь должна быть тяжела и долговременна, и что она либо уже есть худокровіе, (cachexia), либо по крайней мѣрѣ скоро оное причиняетъ. По сей причинѣ для излеченія оной иногда пошребно бываетъ съ осторожностью употребить либо рвотное, либо слабительное изъ севенто. Послѣ того должно чрезъ долгое время употреблять крѣпительныя лѣкарства, изъ желѣза и хорошихъ желудочныхъ Эликсировъ составленные. При томъ полезно наблюдать такую діету, которая описана въ ошдѣленіи объ Англинской немочи. Естли же уже прекращенъ поносъ, однако сумѣніе есть, чтобъ не было запору въ брижечныхъ железахъ, въ печени, въ селезенкѣ, либо въ пригожемясной железнѣ: то должно часто тереть брюхо теплою рукою, либо фланелью. Діища должно какъ

какъ можно почаще въ маленькомъ возкѣ возить, и зоохочивать вмѣстѣ съ другими мальчиками играть и бѣгать; а наипаче въ хорошую погоду, когда позволяешь время года. Для пищи полезно давать сазый медъ, либо сдѣланную съ яичнымъ бѣлкомъ сыворотку. Но для сего должно употреблять молоко новопкальной коровы, и оную велѣть пастъ, естли сѣ случится весною, на какомъ дугу, гдѣ изобильно течетъ воды и древесной пѣны. Таковое молоко есть не что иное, какъ цвѣтучій сокъ, и потому имѣетъ чрезвычайно разбѣшающую силу и обыкновенно такъ бываетъ жидко, что его можно пить даже и не сывороживая. Естли примѣчается при томъ кислотъ, то можно употреблять вилюли изъ спиртованаго сырного сгущенія, (Объ Helmonti) (*) (Смотри о семъ въ Ошдѣлени объ Аллинской немочи) которыя испределяютъ аспроту, также разводятъ густыя и клейкія мокроты, и потому въ семъ случаѣ весьма полезны. Для разрѣшенія же въ брижечныхъ железахъ запору, итъ ничего на-

(*) Сие мыльное лѣкарство, которое съ большею справедливостію называється должно по имени Раймунда Луллія, нежели по имени Гельмонція, подѣ скрытымъ именемъ Давлехъ упоминавшаго, не во всѣхъ употребительныхъ Фармакопеехъ описано. Для того я здѣсь напоминаю, что оно состоитъ изъ нашатырнаго и самаго крѣпкаго виннаго спирту, которые оба вмѣстѣ смѣшаны булучи, потчасъ соснавляютъ сгущеніе (vid Boerhaav. Elementa chemiae T. 2 P. 122 & Spielmanni idem, chem. Ed. 2 p. 110) М.

надѣжиѣ и дѣйствительнѣ, какъ введенныя въ употребленіе Г. фонъ Сперкомъ пилюли изъ англоу (составъ таковъ), оныхъ можно давать каждой часъ по одному, по два, по три, по четыре грана или и больше, и заивать либо медомъ, либо сывороткою. Обыкновенно должно начинать самымъ небольшимъ пріемомъ и всегда оный умножать, смотря по возрасту младенца.

Еслилиже ты случился сей видъ поносу опъ рубіонѣ, послѣ ранъ въ кишкахъ оставшихся, какъ нѣкоторые утверждали, судно они сіе примѣнили; но оный долженъ быть во все не излѣчимъ. Ибо не возможно, мнѣ кажется, чинить кпо могъ въ поносѣ при такомъ поврежденіи кишекъ избавиться отъ смерти.

Тринацатый видъ.

Иногда младенцы страдаютъ такого рода поносомъ, съ которымъ имѣетъ испражняется и гной. Сие бываетъ послѣ сильного кроваваго поносу, послѣ возженія въ кишкахъ, въ брижейкѣ, либо въ груди, когда оно не могло разойтись, но пришло въ нагноеніе. Чшо внутри находящіяся нагноеніе или нарывъ, то сіе можно узнавать по предшествовавшей которой нибудь изъ вышеписанныхъ болѣзней, и когда младенецъ съ самаго того времени безпрестанно былъ нездоровъ, при томъ всегда послѣ обѣденнаго и вечерняго стола чувствуетъ въ себѣ жаръ и лихорадку, жаръ въ рукахъ, красное пятно на щеклахъ, сухость на губахъ, сухой и клейкій языкъ, непорядочный

ан-

аппетишъ, бессонницу, ночный потъ, слабость и чахлость. Внутри то же самое бываетъ, что намъ примѣтно и снаружѣ, мы видимъ, что когда на какомъ либо членѣ, или наружной шѣла части, случается возженіе, то тутъ бываетъ весьма великій жаръ, рдѣніе, опухоль и боль. Еслили сѣ возженіе не разрѣшится, то оно должно превратиться въ нагноеніе; сей нарывъ либо самъ собою, либо искусствомъ отворяется и гной вонъ выпускаетъ. Еслили же оный либо по нерадѣнію, либо по вредной жалости родимелѣй не будетъ вскрытъ, то гной въ немъ дѣлается жидкимъ, острѣмъ, разрѣдаетъ окружающія его части, безпрестанно поглощается всасывающими сосудами и приносится въ кровяносныя жилы, мѣшается съ кровью и производитъ небольшой и непостоянный ознобъ и чахотную лихорадку. Между шѣмъ кровь портится, лишается клейкого и питательнаго свойства, подобно, какъ бѣлокъ въ яйцѣ, еслили оно гниетъ, шѣло и силы истощаются, соки умаляются, и теряются ночнымъ потомъ, а напоследокъ изъ кишекъ не излѣчимымъ поносомъ (*diarrhoea colicativa*), когда вся кровь какъ будио распоняется. Слѣдовательно оный бываетъ слѣдствіемъ того, который я здѣсь опиываю, и гнойнымъ (*Diarrhoea putulenta*) называемся. Однако иногда у одного можетъ быть изъ тысячи случается, что гной, изъ нарыва будучи поглощенъ всасывающими сосудами и принесенъ въ жилы, не мѣшается съ кровью, но при кругообращеніи оной опносятся либо въ почки,

либо въ кишки, и въ немъ слушай испражняется мочею, а въ послѣдствіи низомъ. Такъ на пр. находится примѣръ (Mise. nat. surg. Dec. 2. A. 2.), что нарывъ, бывшій на лѣтѣ, кончившій на слѣдующій день опарышъ было должно, ночью пропалъ, и гной испражнился за нѣсколько разъ низомъ. Равнымъ образомъ (Dec. 3 An 3 Obs. 2 p. 6) упоминается объ одномъ человѣкѣ, имѣвшемъ на рукѣ великую опухоль, которая разшилась посредствомъ гнойнаго поносу. (Смѣени тамъ же A. 5. & 6. Obs. 281. p. 635.)

Только весьма не многие бывающіе пакъ счастливы, при томъ не извѣстны намъ также и никакая средняя, которую бы можно было не допустить гною, смѣшиваясь съ кровью. Въ воспалительныхъ горячкахъ вода, употребляемая нами, съ кровью не мѣшается, но можно испражняется вонъ со всѣмъ свѣпая, есѣли мы ее не смѣшиваемъ съ какимъ либо мыльнымъ веществомъ, какъ-то съ сахаромъ, съ смородиновымъ киселемъ и тому подобнымъ.

Когда находишьяся нарывъ въ кишкахъ, либо въ брѣжѣ, открылся на внутренней поверхности кишекъ, то еще остается нѣкоторая надежда къ излѣченію; однако есѣли еще гной оного не разѣлъ кишекъ и ни мало оного не вошло въ кровь. Кишки по принципъ находящихся въ нихъ въ великомъ количествѣ железъ, часто заражаются ракомъ. Есѣли также примѣры, что нарывы въ желудкѣ заживали. Но есѣли оные случаются въ печени,

ченъ, либо въ дѣтнхъ, то кхъ трудно дѣлать, когда они не на потерянности снхъ внутрѣнности находящейся, и зараженная часть дѣтнго не при-
ростнхъ въ потерьной павъ, а печени кхъ брѣ-
шнхъ, кхъ ене случается по ядѣя лоздѣнн. Но
снхън въ такомъ случаѣ сдѣлать снхъ рѣше на-
ружу, то снхъ получаютъ выхоль и равны могутъ
отдѣлаться и мнѣшнхъ, кхъ шкѣе примѣн
и мнѣшнхъ. А иногда мы становимся равнымъ бо-
разомъ, и воднхъ наружу той одѣлнхъ павъ выхъ
дѣкарснхъ, и павъ снхънхъ равно, либо заво-
локою, дѣлѣ оныя снхънхъ на шѣхъ мнѣшнхъ,
нохъ кхънхъ павъ, снхънхъ наружнхъ. Однако снхъ
должно дѣлѣ зазавоременно, и прежде нежели
гной сдѣлается острымъ, и мнѣшнхъ и внутрѣ оло-
ло снхъ рѣшнхъ. Снхъ, лнхъ уже войдетъ въ
кхънхъ и ову павъ, лнхъ. Нѣсколько улатнхъ
такоыхъ дѣчнхъ должны насъ поощрнхъ, снхъ
испынхънхъ болнхъ.

Нѣхъ снхъ снхънхъ, что павъ, снхъ кото-
рымъ павъ, лнхъ снхъ, прѣдѣлѣ не должно.
Кхънхъ снхъ. Кхънхъ и мнѣшнхъ, лнхънхъ бѣнхъ
рѣшнхъ, то ене вспаеся нѣхъ рѣхъ лѣдѣнхъ.
Впрочемъ все, что мы въ снхънхъ можемъ сдѣ-
лать, снхънхъ въ шѣхъ, что въ прѣднхънхъ бо-
ному строгнхъ дѣшнхъ, запрешнхъ снхъ всѣхъ снхъ
року, солѣну, и снхъ, нѣхъ. Также всѣхъ
горячнхъ павъ, павъ, павъ, павъ, павъ, павъ,
одно весеннее молоко, такъ кхъ я прежде упо-
мянулъ, снхъ, снхъ, снхъ, снхъ, снхъ, снхъ,
нѣхъ павъ, кхънхъ, нѣхъ снхънхъ, снхъ
зѣхънхъ нѣхъ, лнхънхъ снхъ снхънхъ,

кверелемъ, андивіею, съ великимъ количествомъ шавлю и процѣженный, Зеллерскую воду съ молокомъ, супъ съ Швейцарскими травами (*), съ молокомъ и небольшимъ количествомъ чистаго меду. Если при этомъ случится рѣзъ въ животѣ; то необходимо должно дать къ ночи усыпительное лѣкарство, какъ на пр. Японскій составъ, по Единбургской Фармакопеи приготовленный (copi. sine laromisa Edinburgensis), или тому подобное. Въ жестокомъ и продолжительномъ поносе мы принуждены бываемъ употреблять вяжущія или кровоостанавливающія лѣкарства, какъ-то жожубный ревенъ, Японскій сухой сокъ, марциальный черныи порошокъ, саскарильный экстрактъ и другія такого же рода средства. Необходимость заставляюща насъ сіе дѣлать, не смотря на то, что мы сими лѣкарствами можемъ вогнать гной въ кровь. Отъ балзамическихъ лѣкарствъ, какъ на пр. отъ балзама Перу, смирны, спираксы и подобныхъ тому, я никогда въ семъ случаѣ не видѣлъ хорошаго дѣйствія. Они примѣннымъ образомъ разгорячаютъ и умножаютъ возженіе по краямъ ранъ, отъ чего больше происходитъ гною и раны увеличиваются. Отъ лихорадочной корки, съ розовымъ медомъ смѣшанной,

(*) Оныя суть такъ называемый Швейцарскій Фалспранкъ, который составляется изъ смѣшенія большаго или меньшаго количества травъ, отчасти и вѣдѣйствительныхъ, но какъ онѣ къ намъ привозятся весьма много изрубленные; то весьма трудно ихъ развознавать. По увѣренію славнаго Швейцарскаго врача Г. Совѣтника Суалтера, обыкновенно для сего употребляютъ слѣдующія травы:

твानीой, можно ожидать нѣкоторой помощи, если-
ли оную давать въ шѣ часы, въ которые не бы-
ваетъ лихорадки.

Одному младенцу послѣ долговременнаго ки-
шную приключилася жеспокій гнойный поносъ. ои-
нако я его выѣмалъ долговременнымъ употребле-
ніемъ сирня изъ розовыхъ цвѣтовъ, и сыворожанъ,
изъ кислаго молока и небольшого количества ме-
ду составленнаго.

Посредствомъ такогожъ содержанія продол-
жалась жизнь одного Офидера, въ печенѣ имѣв-
шаго варивъ, чрезъ семь лѣтъ въ такомъ со-

З з

стоя-

R Hb. fanicul. Archimill.
Hepat pob. veron. pulmon.
Betonis. aa Mij.

Возьми травы здорювки,
львиной лапы, печеночной,
вероники, медуницы чер-
ной по три горсти.

Florum Bugloss. Vinc.
peruinc. Cyan. Hispidul.
millefol. saly. aa Mз.

Цвѣтовъ волового языка,
барвенку, васильковыхъ,
мохнатикъ, дикой гречк
всѣхъ по полу горсти.

Concis. M.

Сруби и смѣшай.

А и б о

R Hb. Agrimon. Veronic.
Beton. fanicul. Saly. scolo-
pendr. Archimill aa.
Concis. M.

Возьми травы репику,
вероники, буквицы, здо-
ровки, шалфею, львиной
лапы, порвальной части,
сруби и смѣшай.

Жоффроа (explication. abregee tabularum Materiae
Medicae подъ названіемъ vulneralis de suisse) пред-
писываетъ слѣдующія травы: Flor. belid. мао-
ris, Fol. & flor. Beton. fol. & flor. Brunell. Fol. & flor.
Bugul. Flor. centaur. minoris. Flor. cynaphal. Fol. & flor
Iacob. Fol. peruinc. Fol. Pyrol. fanicul. Flor. Tuskla-
gin s, Fol. & flor. virg. aureae. Но Листодъ описы-
ваетъ еще особливую смѣсь шакowychъ травъ
(Synopsis pr. med. p. 633.) M.

споднѣи, что онъ мнѣ даже исправлять свою
должность Охотки гадѣ приключилось ему воля-
ная болѣзнь (Анакса), и хотя при раза вода
выпускаема была, однако она отъ насъ склалась и
на послѣдокъ лишила его жизни. По вскрытїи мер-
твого его тѣла, сыскала въ печени великая рана,
когда ая опиралась въ желчный пузырь, и чрезъ
оное опровергну изъ себя тной испраждая въ кланы.

Политовалъ я также одного знаменитаго Госпо-
дина среднихъ лѣтъ, у котораго послѣ излеченїя
въ печени (Неранис) была остое рта болѣзнь,
съ такимъ усиломъ, что помощи вышеписан-
ной дѣлны, восемь лѣтъ онъ былъ живъ, но на-
послѣдокъ склалась лихорадочною чахоткою. Онъ
долгода спомъ жестокой имѣлъ поносъ, что я при-
нужденъ былъ его останавливать, однако ни-
чемъ не могъ въ томъ уснѣвать, кромѣ жженныхъ
жолудей, которые сгнѣши въ порошокъ въ водѣ
ему давали.

Другому однако благородному человеку, ко-
торому было 27 лѣтъ онъ роду, не могъ я ни-
какимъ образомъ поспѣшь, хотя и всѣчески о
томъ старался, будучи къ нему призванъ уже
при наступленїи его смерти. У него былъ нарывъ
въ кишкахъ и давновременный съ болѣю сопря-
женный поносъ. Впрочемъ онъ свое здоровье раз-
личнымъ образомъ повредилъ, а особливо, какъ
однажды неоспоржно простудился, обнажа на хо-
лодѣ свое тѣло. Съ того времени приключился
ему поносъ, испражняемый имъ калъ имѣлъ
цѣль и краснелый и смѣшенъ съ кровью, хотя
при

при томъ и не было рѣзи. Для освобожденія себя отъ этого то съѣлъ нѣкоторыхъ иилъ онъ съ кысцами сдѣланную сыворолку; послѣ чего продолжалъ боать и рѣзы въ кишкахъ, затвердѣнныя праламъ боку и заноры, онъ десяти до двенадцати гупокъ продолжавшіеся. Напоследокъ взялся одинъ сапожникъ его вылѣпить. Для того вынулъ онъ изъ вѣды нѣсколько старыхъ записныхъ березовыхъ полѣнъ, которыя калъ въ затопленной печи наискось, и собиралъ выступающую изъ нихъ отъ огня походяую на молоко бѣлую жидкость. Оную больной употреблялъ сначала безъ всякаго дѣйствія чрезъ восемь дней. Но послѣ того начало у него ворчать въ брюхѣ, сдѣлались вѣтры, и приключился съ споль жестокимъ рѣзомъ поносъ, что онъ часто кусалъ свой языкъ, онъ чего еще мною видимо были на немъ рубцы. Низомъ иногда выходили одна только вода, иногда разномывшій глой, а иногда словно желсы и кровь. При оканчаніи его жизни приключилась ему легкая чахотная лихорадка, распухли бедра и ноги, а на прочихъ тѣла чашахъ оспывались, какъ говаряны, только кожа да кости. Всѣ вышепомянутыя дѣйствія не могли прекратить его боли кромѣ клики конскаго чеснока (Elaeagnus Daboardi), либо Я. овскаго состава, по Единбургской фармакопей приготовленнаго (conspectio J. ronica Edinburgensis), да и то только на 8 либо на 10 часовъ. Но какъ его иногда по 70 и 80 разъ въ ночь слабнло, то я принужденъ былъ велѣть ему жевать и глотать по стѣколку жженого на водое кофею гороху, который имѣлъ шакое дѣй-

спяше, что больной послѣ того около трехъ дней свободенъ былъ отъ рѣзы и поносу.

Четырнадцатый видъ.

Поносъ, при окончаніи чахотки, либо водяной болѣзни, либо когда гной изъ внутренняго нрыва войдетъ въ кровь и оную какъ бы разводитъ, приключающійся, уже описанъ выше сего и называется неизлѣчимымъ (*Diagnosa coliquatina*); ибо онаго никакимъ средствомъ вылѣчить не лзя. Вся наша помощь въ семъ случаѣ въ томъ состоитъ, что мы можемъ продлить на нѣсколько времени жизнь больного наставляяцемъ небольшимъ промывательныхъ, изъ трухмалу и молока составленныхъ, къ чему можно еще прибавлять по нѣскольку горячаго вина, либо по 10, 15 или 20 капель усыпительнаго Сиденгамова лавдану. Можно также ихъ составлять изъ полфунта молока и полдрахмы веріяку, либо изъ известковой воды, Японскаго состава и Локателлѣеваго балзаму, прежде въ яичномъ желткѣ распуценнаго. Полдрахмою лавровыхъ персиковыхъ бобовъ, (*Faba persici*) которые одинъ больной изрѣдка принималъ, на двѣ недѣли я сдѣлалъ было ему отъ поносу облегчение; однако послѣ того онъ умеръ чахоткою. Впрочемъ должно признаться, что они часто и безъ успѣха бываютъ употребляемы.

ОТДѢЛЕНІЕ 12.

Объ Оспѣ.

Не лзя съ точностію сказать, въ которое именно время оспа появилась въ Швеціи (*): только то извѣстно, что она въ 622 или 640 году впервые принесена изъ Аравіи въ Египетъ, а оттуда въ 1714 въ Испанію. Въ Англіи она уже въ 1270 году вездѣ была извѣстна. Изъ Европы она переселилась въ Америку, и изъ Дании въ Гренландію. Сначала своего появленія въ какой либо странѣ была она чрезвычайно смертоносна: но послѣ своего свирѣпствованія чрезъ нѣкоторое время нѣсколько лишилась своей ядовитости. Впрочемъ она и теперь большее число людей похищаетъ, нежели самая чума. Прибывши въ Европу, безпрестанно имѣетъ она то на одномъ, то на другомъ мѣстѣ свое пребываніе. Въ большихъ городахъ, въ которые многіе люди изъ различныхъ мѣстъ собираются, часто она бываетъ повальною, равно какъ и въ университетахъ. Рѣдко кто либо на томъ мѣстѣ, гдѣ свирѣпствуетъ оспа, отъ оной можетъ избавиться. Заразительный ея ядъ не только къ самому чело-

З §

вѣку,

(*) Въ Швеціи нѣтъ никакого объ оспѣ повѣствованія прежде 1578 года, въ которомъ оную Венедиктъ Олай, врачъ Короля Эрика XIV, и Юлианъ III въ своей книгѣ подъ названіемъ: *Nyugh Lakage - Book* и проч. описалъ. Хотя онъ ее называетъ корью (*Maffing*): однако его слова довольно объясняютъ сію болѣзнь; ибо онъ описалъ даже различныя ея виды. М.

вѣку, но и съ плазью его пристаесть. По сему
можно также означать причину, для чего она
въ дѣвичьихъ монастыряхъ столь рѣдко случает-
ся. Въ 1755 году въ февралѣ мѣсяцѣ въ Упсалѣ
никто не былъ болѣе основно по прибавившій ту-
да Студентъ изъ Эребро, въ которомъ она схи-
ршиствовалъ, привезъ съ собою оную. Тотчасъ
онъ него заразился другой Студентъ и умеръ.
Братъ сего, прибывшій изъ Спэнголма для го-
ребенія его, и послѣ того возвращившійся домой,
привезъ шуда съ собою оную.

Голландскій корабль въ 1748 году пришелъ
къ Мысу Доброй Надежды, изъ котораго высаже-
ны были три мальчика, но задолго предъ тѣмъ
имѣвшие оную. Тѣ, которые по приѣзжии кора-
бля мыли употребляемые оными во время ихъ
болѣзни и спящее въ сундукахъ бѣлье, пот-
часъ заразились оною. Симъ способомъ она далѣе
распространилась и прекратилась не прежде,
какъ когда Голландцы сдѣлали кругомъ себя
окопъ и поставили караулъ, дабы никто вонъ не
выходилъ въ деревни, ибо они чрезъ то нако-
нецъ помѣшали далѣе ей распространиться. И
такъ оспа есть заразительная болѣзнь: однако она
пристаесть только къ тѣмъ, кои се никогда еще
не имѣли, и имѣющъ въ своей крови расположе-
ние къ заразѣ оной. Изъ сего явствуетъ, что
ядъ оспы не зараждается въ воздухѣ, и что по-
средствомъ онаго распространяться не можетъ,
но естъли бы предохранять какой либо городъ
отъ оной такъ, какъ предохраняютъ отъ моро-
вой язвы; то бы она въ него войти не могла.

Далѣе

Даже рѣшыл государство навсегда бы отъ оной свободными быти могли, если бы въ оныхъ всѣмъ имѣл, кои ещѣ ее не имѣли, рѣшено время оную паче; илаше, иже въ солдѣи употреблемъ, въ самую зѣло чѣ, и послѣ того имѣ, какъ морской заразы, сообщенія осеннаго яту остерегаться.

Ошелода такъ же явствуетъ, что вовсе не необходимо, чѣмъ оша, вставшая въ оныхъ какой либо городъ и заразившая нѣсколько домовъ, даже распространялась. Если бы только приказано быти ходити за больными единачѣ имѣл, кои оную уже имѣли, потомъ зѣло чѣ въ самую ихъ паче и запрѣщать на нѣкоторое время сообщеніе зараженнаго дома съ провин- то конечно она прекратится, и не будетъ ее въ семъ городѣ до нѣхъ поръ, пока кто либо другой, привошши плуда изъ зараженнаго мѣста, не принесетъ ее опять съ собою.

Оша распространяется слѣдующимъ образомъ:

1) Если бы кто, никогда еще ее не имѣвшій, робываетъ у зараженнаго ошело, къ нему прикасается, заразу оной проглотитъ; лично всасывающіе его сосуды оную въ себя примутъ. И многократно причѣшилъ сыпь подобную ошѣ у нѣхъ, которые, имѣя сморьные за дѣтьми очою спра- ждующими, чрезъ нѣсколько дней возлѣ ихъ постели находились: однако они при томъ не имѣли никакой горячки, и послѣ оной не оставалось у нихъ нѣжкихъ рыбинъ. Подобную сему, достой-
вуд

ную примѣчанія, истѣрию можно видѣть въ сочиненіяхъ ученаго Лондонскаго собранія. Подъ N: 373, и другую подъ N: 390. Д- Кирикпаприкъ повѣствуетъ, что и у него самого въ такомъ случаѣ высыпала оспина на верхней губѣ. (Analysis of inoculation Ed. 2. p. 21.)

2) Еслили кто примется за плащѣ больного. Сколь долго оспенный ядъ въ плащѣ можетъ держаться, не потерявъ своего дѣйствія, о томъ я не знаю: только то извѣстно, что отъ онаго, хотя бы его чрезъ цѣлую зиму въ плотнозапертомъ сундукѣ держать, слѣдующею весною заразиться можно. Почему вѣроятно, что сверхъ чаянія можетъ припасть оспа и отъ бѣлья, прежде больнымъ употребляемаго и подъ другимъ лежавшаго, еслили кно, еще ее не имѣвшій, до онаго дотронется.

3) Еслили пустить кровь тѣмъ ланцетомъ, которымъ недавно передъ тѣмъ оную пуцали страдающему оспою. Такъ на прим. пуцана была шиковымъ ланцетомъ въ 1741 году кровь Г. Фриѣ. Г; отъ чего край раны началъ загноиваться, и послѣ высыпала настоящая оспа, такъ точно, какъ бы она ему была привита.

4) чрезъ покупаніе, которое въ Саксоніи въ восточной и западной Готландіи и въ Валлійскомъ герцогствѣ долгое время было въ обыкновеніи. Въ первой странѣ приводящъ одного мальчика къ другому, имѣющему хорошую оспу, съ намѣреніемъ у него купить 5 или 7 оспинъ. Можешь, за которыхъ оныя споргованы, кладутъ одну

одну сверхъ другой на зрѣлую прорвавшуюся оспину, такъ чтооъ присталъ къ нимъ гной, послѣ того привязываютъ оныя къ бедрамъ мальчика, котораго всасывающіе сосуды гной изъ оныхъ поглощаютъ, приносятъ въ кровь и производятъ оспу. Въ послѣдній же створонѣ прокалываютъ булавкою кожу, и послѣ того вкладываютъ не много шуда гною, отъ чего происходитъ такое же дѣйствіе. Оба сии способы сушь не что иное, какъ прививаніе оспы.

5.) Чрезъ прививаніе по обыкновенію Китайцовъ. Оныя вкладываютъ въ носъ свертокъ хлопчатой бумаги, обмакнутый прежде въ созрѣлую оспу, и штемъ производятъ сию бользнь.

6.) Чрезъ прививаніе по примѣру Черкесцовъ, который однако Англичане весьма исправили, и который теперь какъ они сами, такъ и другіе народы съ великою пользою употребляютъ. Можно о семъ читашъ въ прензрядномъ сочиненіи Г. Дела Кондамина о прививаніи оспы, которое и на Шведскій языкъ по повелѣнію Его Сіятельства Графа Карла Фридриха Шеффера въ 1754 году, переведено (*). Оспу въ больномъ въ самомъ ея началѣ трудно узнать, однако можно объ ней заключашъ по нижеслѣдующимъ обстоятельствомъ:

1.) Еслили она тогда въ томъ мѣстѣ свирѣпствуетъ.

2.)

(*) На Россійскій языкъ переведено оное такъ же подъ заглавіемъ: рѣчь Г. де ла Кондамина о прививаніи оспы. К.

2) Естли больной никогда еще ее не имѣлъ и не задолго предъ тѣмъ былъ въ такой госпиталь, въ которой кто нибудь находился, либо недавно предъ тѣмъ ичившій, либо еще имѣющій оску: либо когда онъ близко сошелся съ такимъ человѣкомъ, который недавно былъ у зараженнаго ею: либо бравъ въ руки, или и на себя надѣвалъ такое платье, по которому пристрада заразы.

3) Естли примѣчается у него такіе признаки, которые предисказуютъ въ тѣхъ горячкахъ съ сильною сопряженностью; а именно: слабость въ шлѣхъ безъ явственнейшей причины, ознобъ и посѣтъ его жаръ, боль въ поясницѣ, тяжесть въ груди и частые вздохи. Естли еще при томъ.

4) Лицо бываетъ раздутъ, глаза мутные и изъ оныхъ, а особливо изъ лѣваго текутъ слезы, (которые однако не бываютъ ни въ жару, ни въ кори), при томъ онъ жалуется, что ощущаетъ толь, или и'куюю чувствительность около сердца, въ рукахъ чувствуемъ небольшую боль, сверхъ того не во время каленія его ко сну, сонъ бываетъ безпокойный и частая рвота: по въ такомъ случаѣ безъ сомнѣнія утвердиль можно, что скоро начнешь высыпаніе оспа (*). Горячка про-

(*) Свинная, Варагофъ оную называетъ швердою оспальною (*variolae digne oiales Disquisitio de variolis & anthracibus* p. 11), каменистая и водяная оспа высыпаніе въ 24 часа и пропадетъ въ 5, а по крайней мѣрѣ въ 6 дней. Перная бываетъ шверда какъ камень и иногда осмалаетъ по себе

продолжается безпрерывно до самого выступления; однако не равномерно сывется жестоко. Во время выступления въ которые малотенцы получаютъ родимцы; близко сый, слыши только не оль прорѣзу зусъ происходить, обыкновенно означень хоршую ошу (*). Сидитъ Врѣи и зынають первы спененю (рѣи и Радия), которая протдолжался 72 часа, или до четвертого дня. Протъ наступилъ чинъ пазъ, чинъ въ сдаль чинъ тый дель торчаа текнсерымъ ошвомъ сиваюлься дель и судо сиваюль сывуналь оша. Оша пываюлья вадъ видоу ма-
дешъ

себѣ русы иа шѣи, а сдаль прѣи ош-
зрачна галъ водянье ошчидки послѣ своего
выступления у иѣкорѣхъ оша сиваюль шѣи
шроу; но кѣиз выстѣ, изъ боде не ошзаетъ
сидякоу прѣи ошчидки. Одна же шѣи на 48
тоу подучилъ ошу в дугѣ ошчидъ сивъ рѣи;
но при выступленіи ошѣ пѣи ошчидъ безъ ош-
ствіе и шѣи ошчидъ, чинъ прѣи ошчидъ
шѣи, чинъ настояща оша выстѣ. Естьли
бы я не былъ тамъ же емѣстѣ съ другими вра-
чами, и слышати и мѣтѣ пѣи не знакома бы-
ла сѣи ошчидъ; то бы и я шѣи ошчидъ
что сѣи въ другой разѣ ошчидъ занемогла. Сѣ
самое чинъ случается и съ шѣи, о которыхъ
ушѣи ошчидъ, будно они въ другой либо въ
шѣи разѣ получили ошу: но врачи ничего
не должны сказывать за истину того, чего они
сами не видѣли.

(*) Однако нѣкоторые послѣ того не въ состоя-
ни были говорить, и поракены были парали-
чемъ хотя впрочемъ сего или не скоро извѣдыва-
лись отъ сивъ прѣи ошѣ (Смолтр. Кириллещ-
рикъ на сказ. мѣстѣ стр. 84).

ленькихъ пятнушекъ, похожихъ на булавочныя головки. Вонервыхъ выступаетъ она на лицѣ на верхней губѣ и по сторонамъ носа; а по томъ и на прочихъ частяхъ лица, послѣ на груди, на послѣдокъ на поясницѣ, на бедрахъ и ногахъ. На брюхѣ рѣдко она примѣчается потому, что на сномъ кожа бываетъ плотна; равнымъ образомъ и на подошвахъ ножныхъ: ибо на нихъ кожа также у тѣхъ, которые много, а особливо босикомъ ходили, бываетъ толста. Сыпь мало по малу умножается, вздымается вверхъ и спланивается ширѣ. Верхушки оспки бываютъ бѣлы, и основанія ихъ красны. Кожа, между ими находящаяся, бываетъ красна, тѣло раздувается, лицо, а наиначе глазныя вѣки начинаютъ разпухать такъ, что на силу больной можетъ опворить глаза. Чѣмъ сильнѣе выступаетъ оспа, и чѣмъ она выше подымается, тѣмъ больше ослабѣваетъ горячка и умалывается рвота, по совершенномъ же выступленіи оной оба сіи припадки во все исчезаютъ. Продолженіе сего времени Врачи называютъ вторю степенью (*secundum*), которая продолжается три или четыре дни.

Третія степень счисляется съ того времени, когда выступилъ вся оспа на лицѣ, и продолжается до тѣхъ изрѣ, пока оная подсохнетъ. Въ сей степени, которая обыкновенно въ осьмой, или девятый день начинается, оспа созрѣваетъ и желтѣетъ. Она наполняется гноемъ, приподымается вверхъ и спланивается ширѣ, въ основаніи обыкновенно бываетъ красна и съ болью сопряжена;

кожа

кожа между оспинами также вся краснѣетъ. Опухоль на лицѣ шкѣ увеличивается, что больной въѣкъ распворить не можетъ, почему тогда говорятъ, что онъ ослѣпъ. Но когда опухоль опадетъ, что бываетъ въ одиннадцатый день, то овѣ опять могутъ распвориться, и больной начинаетъ глядѣть попржнему. Опухоль сошедши съ лица, переходитъ на руки, персты, и напоследокъ на ноги. Въ сіе время, еслии оспа не умалается, опять приключается горячка, *второю* называемая.

Четвертая оспень слѣдуетъ въ одиннадцатый день, или считается съ того времени, когда оспа начинаетъ соизнать, и продолжается до шкѣ порѣ, пока она со всемъ опадетъ. Въ сіе время она высыхаетъ такимъ же порядкомъ, какимъ и выступала. Тогда часто случается, что нѣкоторая часть тѣла не испражняется испариною, но поглощается въ кровь всасывающими сосудами и производитъ новую горячку, которую Врачи называютъ второю оспенною горячкою (*Febris secunda variolalis*), хотя она въ самомъ дѣлѣ есть третья. Но понеже она иногда приключается въ то самое время, когда чуть еще первая окончилась; то и не удивительно, что оную за вторую принимаютъ. Иногда же оспа такъ бываетъ легка, что не принимается ни первой ни второй горячки. — Настоящая оспа никогда въ восемь дней не оканчивается.

Такимъ образомъ продолжается хорошая и порочная оспа. Но еслии она злая, то высыпаніе прежде 72 часовъ, и не исподоволь, и вдругъ;

при томъ въ великомъ количествѣ такъ, что она бываетъ въ самыхъ ноздряхъ, и закупериваетъ носъ, также занимаетъ горло и глотание дѣлаетъ тяжелымъ. Она не выходитъ вышепоянутаго порядкомъ, но иногда начинаетъ высывать сначала на другомъ мѣстѣ, а не на лицѣ. Хотя оспины на ономъ бываютъ не велики, но часто сливаясь вмѣсто опчаски для того, что бываетъ ихъ много, а опчаски по тому, что на многихъ мѣстахъ весьма близко одна возлѣ другой находящаяся, и какъ бы кистями выходятъ. Онѣ не желтеютъ, не сохрываютъ, и следовательно не наполняются гноемъ; по той причинѣ не приподымаются вверхъ и не завосприваются; но соспавляютъ ямки. Если вскрыть одну, либо нѣсколько изъ нихъ въ двенадцатый день; то и тогда еще какъ бы вода вытекаетъ. Онѣ принимаютъ на себя необычайный цвѣтъ, какъ то: зеленый, фиолетовый и черный. Когда въ оспой или девятомъ день бываетъ похожа на пергаментъ. Она также нехорошою починается и тогда, когда она сопряжена бываетъ съ сильнымъ кровотеченіемъ, либо съ такими пятнами, которыя бываютъ въ гнилой горячкѣ, либо съ коловымъ въ боку. Горячка, которая послѣ выступленія оной должна бы прекратиться, еще продолжается. У больныхъ уже второй степени дѣлается слинопеченіе. Слина часъ отъ часу становится гуще, и на послѣдокъ не въ состояніи бываетъ выслываться, но можетъ задушить больного. Какимъ образомъ наилучше раздѣлять оспу, о семъ можно читать въ Шредеровой диссертаціи (*Dissertatio circa variolam distibu-*
но-

monet, in primis ratione februm cum his conspiciantur, quaedam analesta.)

Когда только оспа начинается гдѣ либо свирѣпствовать, то весьма трудно предсказать, опасна ли она будетъ, или нѣтъ. Обыкновенно она легче бываетъ въ своемъ началѣ, либо при окончаніи: однако не всегда сѣ случается. Ибо та, которая въ Сибирѣ въ 1751 году осенью началась, и до самаго лѣта продолжалась, сначала была легка, а послѣ жестока (*). Еслили съ оною вмѣстѣ случится еще другая какая либо повальная болѣзнь, то она бываетъ опасна. Когда она долго на одномъ мѣстѣ пребываніи, то обыкновенно становится легче. Чѣмъ она долѣе на островѣ Мипоркѣ въ 1746 году продолжалась, тѣмъ становилась меньше опасною: ибо меньше людей умерло въ северной ея части, куда она послѣ перешла, нежели въ Полуостровѣ, гдѣ началась. Еслили же она долго на какомъ либо мѣстѣ не бывъ, туда принесена будетъ: то бываетъ жестока. Ибо когда она, не бывъ на вышеупомянутомъ островѣ съ 1715 года, въ 1742 туда принесена, то была весьма смертоюсною. Прежде думали, что естьли много въ одномъ домѣ оспою бывающіе больны: то тѣ самую жестокою имѣть должны, кои оную получаютъ навослѣдокъ: однако я часто примѣшилъ,

И 2

что

(*) А напротивъ того въ Востервикѣ въ Смерен (тѣ она, какъ примѣшилъ Факсъ, сначала была весьма смертоюсна а при окончаніи легка. (Смотри Fortification of provincial. medicorum benevolentia стр. 278.) М.

что шѣ, кои сначала оную получали, весьма опасно ею болѣны были. За нѣсколько лѣтъ предѣ еимъ виѣла я шестерыхъ дѣтей въ одномъ домѣ болѣныхъ оспой. У перваго, который впрочемъ былъ здороваго сложенія, оная была весьма жестока и сливная; а прочія, къ которымъ она уже пристала онѣ нѣто, имѣли весьма легкую. Какова свойства оспы всякъ ожидать для себя долженъ, о томъ можно заключать опчасни изъ вышесказаннаго, а опчасни изъ нижеслѣдующихъ обстоятельствъ:

Кто не слишкомъ жиренъ, не имѣетъ никакой оспины въ крови, имѣетъ мягкую и бѣлую кожу, живой цвѣтъ въ лицѣ, ясный и веселый взоръ, свѣтлые, однако не сверлящие глаза, тошъ не безъ причины можетъ надѣяться для себя хорошей оспы: напротивъ того суходавья, имѣющая оспину, либо клейкость въ крови, либо толстую и смуглую кожу, черные волосы, темные либо опавше глаза, звонкій и негладый голосъ, должны опасаться злой оспы.

Еслили оспа представитъ въ то время, когда тѣло хорошо аь оной приготовлено, и кишки недавно предѣ шѣмъ порядочно слабительнымъ очищены; то она бываеиъ легка, и напротивъ пошъ. Еслили оспа недавно появилась въ какомъ либо мѣстѣ, и бываетъ легка, то заразившійся ошоо вроятно будешъ имѣть хорошую. Еслили же она продолжалась уже шестъ либо семь недѣль; то опасаться должно худой. Еслили она сначала жестоко свирѣпствовала, и заразился ею кто либо уже спустя нѣсколько времени; то можно ожидать посредственной оспы.

Тѣ,

Тѣ, которые привыкли ѣсть много мяса, употребляли много питательной пищи, либо не довольно оной кушали, либо худою довольствовались, не умеренно постунали вѣ кушанья и питія, либо много не спали, или изнуряли себя прежде того какою либо болѣзнию, опасаясь deadly злой оспы.

Ежели оспа заразитъ беременную женщину, то она можетъ лишиться жизни либо зачатка, либо мать, либо и обоихъ вмѣстѣ. Также самое случившееся часто, еслибы она и при родахъ приставленъ (*). Сильная чесотка не только не отвращаетъ сильной оспы, но еще нагрозивъ того боляше кѣ о ней сего снужетъ, равнымъ образомъ оная бываетъ сильна прежде и послѣ красной сыпи.

Ежели младенцы занемогутъ оспою во время перемены груды лихорадки; то обыкновенно сего опасаться. (**) У тѣхъ, кои одарены мягкой кожей,

ИЗ

оспа

(*) Описывая Анкизотрикомъ (на вышеказанномъ стр. 316) исторія. кажется, подаетъ женщинамъ на то же кѣ удобнѣйшему перенесению оспы, еслибы оная выступала во время месячнаго кровотеченія.

(**) Однако оная послѣ оспы опять возвращается Г. Професс. Барти два такіе примѣры изъ известной лихорадки въ Шведскихъ сочиненіяхъ (V. 1. Acad. Handl 1756. p. 132. 133.), а Г. Професс. Аддингъ дѣлаетъ примѣръ, кѣ своей программѣ (Adversaria de contagio varioloso p. 14), описываютъ. Но еще особенное примѣчаніе сдѣлалъ Кавалеръ Беккъ на тѣхъ однимъ младенцемъ, составившимъ гуль, у котораго, послѣ выслушанія оспы, не было двухъ лихорадочныхъ ожесточеній;

оспа бываетъ легче, нежели у тѣхъ, у которыхъ она бываетъ шварда. По сей причинѣ у Англичанъ, которые много кунаются въ холодной водѣ, она бываетъ столь жестока; а у Негровъ еще и того хуже потому, что они сверхъ сего еще мажутся бальзамомъ, смолою и другими подобными тому вещами.

У молодыхъ людей обыкновенно она всегда бываетъ легче, нежели у старыхъ и такъ чѣмъ тѣло моложе, тѣмъ обыкновенно оспа бываетъ лучше. Однако есть примѣры, что даже и такіе младенцы, коиные сосали грудь, имѣли весьма худую оспу. Но въ сѣмъ случаѣ можетъ быть причиною сего либо кормилица, либо воспитаніе. Еслили кормилица много употребляетъ мяса, весьма склонна къ гнѣву, либо влюблена, имѣетъ мѣсячное кровоотеченіе, дышитъ на сызномъ воздухѣ, не всегда когда оно мокро, и не нагрѣтыми пеленками пеленаетъ, либо лежа на землѣ кладетъ возлѣ себя, то его тѣмъ можетъ выргнуть въ оспу. Еслили младенецъ при сѣмъ спраждаетъ шруднымъ прорѣзомъ зубовъ, то ему ни чѣмъ по-

со-

ний; но вмѣстѣ того оныя претерпѣла ея кормилица. Впрочемъ часто оспенная горячка какъ въ первой, такъ и во второй степени имѣетъ свойство лихорадки, какъ сие въ сочиненіяхъ Бреславскихъ Врачей (Hist. morb. Wraus. ann. 1702. p. 6), Г. Гукстама (Oper. ed. Reichel. III. p. 29). Фонтъ Шульценгейма (Om corporis umbrader. 23), де Гаена (Rat. med. p. 11. p. gl.) и Димедала (Present. methode of inoculating for the Small-Pox. p. 11.) пространно описано. М.

собишь не лезя. Когда выступишь оспа на губахъ, во рту, либо нѣ горлѣ; то онѣ сосать бывають не въ состояннн. Самый наилучшй возрастъ для перенесення оспы есть онѣ 4 до 14 года, а потомъ онѣ 16 до 25.

Я часто примѣшалъ, что какъ жирные младенцы, такъ равно и сухожазвые имѣли легкую оспу.

Обыкновенно говорятъ, что дитя умретъ, естли оспа, когда ее лизнутъ, имѣетъ соленый вкусъ: въ противномъ же случаѣ нѣтъ.

Естли въ первой степени руки и ноги, когда къ нимъ дотронутся, дрожатъ; то обыкновенно оспа бываетъ опасна.

Тѣ, которые порядочную жизнь вели, и не задолго передъ оспою изъ ранъ, либо другимъ какимъ нибудь образомъ много поперяли крови, могутъ ожидать хорошей оспы (*).

Напротивъ того худымъ признакомъ почитается, естли больнои либо въ то время, когда

И 4

оспа

(*) Д. Фуллеръ упоминаетъ объ одномъ Оксфордскомъ Студентѣ, который въ то время, когда въ ономъ городѣ свирѣпствовала оспа, заболѣлъ оною съ превеликою болью въ головѣ и въ поясницѣ, соединенною съ бредомъ: однако все сие прекратилось, коль скоро у него сдѣлалось кровоотечение изъ носа. У одного мальчишки много вышло крови поносомъ прежде, нежели высыпалась оспа, отъ чего она у него была легка, не смотря на то, что на нѣ другими въ то же самое время жестоко свирѣпствовала (Vid Haller. Opuscul. Min. Т. 3. р. 352. et Klink - patrick c. p. 78.)

оспа должна высыпаться, либо чрезъ нѣсколько времени при выступленіи оной имѣеть поносъ (*).

Естьли оспа чешется потчасъ послѣ своего выступленія; то она не легка бываетъ.

Естьли боль въ поясницѣ и рвота бываютъ не жестоки, духъ изъ рта выходитъ не противный, въ носу и въ горлѣ воспыны не находятся. то можно хорошую имѣть надежду, и вопрошивъ того. Лудымъ знакомъ почитается, когда приключившееся кровотечение изъ легкихъ (*Haemoptus*), либо кровавый поносъ. Естьли же съ мочею кровь выходитъ, то нѣсколько изъ тысячи выльчивающихся.

Естьли соединится съ оспою горячка съ язвами, то три изъ четырехъ умирають.

Отъ сальной оспы выльчивается одинъ изъ четырехъ, или изъ пяти.

Должно также стараться о благополучномъ окончаніи оспы и тогда, когда оспины на лицѣ бываютъ малы, плоски, ямку и черное пятнышко съ темнымъ и блѣднымъ дномъ имѣють; естьли онѣ въ претей степени не сопряжены бываютъ съ болью, не круглы, не тверды; но мягки и какъ бы морщиниваты, или пухлы.

Рав-

(*) Г. Сочинитель ограничиваетъ нѣсколько въ присовокупленныхъ прибавленіяхъ упоминаемую зѣбу и на другихъ мѣстахъ оспосень, которую поносъ въ сей степени причинилъ можетъ; ибо Баронъ Димедаль и другіе новѣйшіе опытами доказали, что оный большую часть ядовитости оспы истребляетъ. М.

Равнымъ образомъ не хороша бываетъ оспа, естли младенецъ часто, но по не многу за каждымъ разомъ мочится; а естли при томъ моча бываетъ блѣдна; то скоро слѣдуетъ бредъ и судорги, когда въ скорости не приложимъ больному нарывнаго пластыря.

Поносъ также въ третьей степени бываетъ безъ всякаго облегченія: то часто приноситъ пользу въ четвертой. Естли же испражняемый калъ бываетъ похожъ на гной, смѣшенъ съ кровью, либо имѣетъ черный цвѣтъ. брюхо раздуто, и съ нѣкоторою болью распухаетъ; то уже въ кишкахъ находишь Аншоновъ огонь.

Естли гнойная горячка не исподволь приходитъ, но приключается вдругъ съ твердымъ бѣшенемъ жидъ, съ головою болью, съ рдвѣнемъ глазъ, безсонницею и великимъ безпокойствомъ: то се бываетъ не безъ опасности. Естли при томъ примѣчается, что боевыя жилы крѣпко и твердо на шеѣ и на вискахъ выются, то скоро послѣ того слѣдуетъ бредъ. Естли же бѣненіе жидъ на оныхъ мѣстахъ бываетъ таково, каково на рукахъ слабымъ почипается; то обыкновенно слѣдуетъ смръть. Худымъ признакомъ снѣнаши, когда не все лицо, но только одинъ глазъ и вѣки и зубы распухаютъ.

Но больной скоро умираетъ, естли опухоль на лицѣ вдругъ исчезаетъ и не появляется поочасъ на рукахъ; сливомеченіе перестаетъ, кола между оснивами, и въ нихъ оснивание становится блѣдною, приключается смѣшеніе въ груди, рѣчь

перемѣняется, припомъ голосъ становится слышнѣе и тихимъ и большой лежипъ въ забвеніи.

Есѣли пише выходипъ носомъ назадъ, то въ гордѣ много находится оспинъ. По сей самой причинѣ младенцы въ оспѣ неохотно пьютъ. Тѣмъ нѣче опаснымъ се бываетъ признакомъ, что они ничего принимать не могутъ; въ оспѣ же либо довольно довольно пить, либо умереть.

Есѣли въ прѣшей степени приключится великая оспа; то легко можетъ оспановиться санинотеченіе.

Многіе въ злой оспѣ иногда избавляются отъ смерти чрезъ воснотсѣдовавшіе нарывы, есѣли только заблаговременно они бываютъ вскрыты.



Признаки хорошей оспы.

Есѣли кто получитъ оспу при началѣ, лицо подѣ конецъ ея свирѣпнотвотетъ.

Когда на другихъ бываетъ легкая оспа.

Когда оспа на шомъ мѣстѣ не давно предѣ шѣмъ была.

Когда она бываетъ весною, либо осенью.

Тѣло больного хорошо приготовлено и желу-

Признаки злой оспы.

Когда уже весьма многіе оспою заражены.

Когда многіе люди имѣютъ нежелую оспу.

Когда она давно уже тамъ не бывала.

Когда свирѣпнотуетъ въ самыя жары лѣтомъ, либо въ самыи холодъ зимою.

Когда не приготовлено хорошо шѣло, и не очи-

лудокъ и кишки надле-
жащимъ образомъ очи-
щены.

При томъ оный здо-
роваго сложенія, имѣетъ
свободныя мысли и тѣло
его ни чѣмъ не приведе-
но въ разспройку.

Нѣмъ въ томъ мѣ-
стѣ ни на комъ другой
какой либо повальной бо-
лѣзни.

Еслили больной не
слишкомъ жиренъ, имѣ-
етъ на шѣлѣ бѣлую и
мягкую кожу, живой
дѣтскъ въ лицѣ, пріят-
ный и веселый взоръ и
свѣтлые, однако не свер-
кающие глаза.

Младенецъ не слиш-
комъ молодъ, но уже
старѣе чотырехъ лѣтъ.

Родился въ такой
фамиліи, въ которой

обы-

очищенъ желудокъ и
кишки.

Еслили тѣло имѣ-
етъ въ себѣ испорченныя
соки, больной имѣетъ
красную сыпь, чесотку,
нарывны, гѣиспы, либо
прежде того изнуренъ
какою нибудь болѣзнію,
печалью, излишнимъ одѣ-
нїемъ, головною болью;
либо разстроилъ себя го-
рячими напитки, ли-
бо худую пищу.

Въ то самое время
свирѣпствуетъ другая
какая либо повальная бо-
лѣзнь, какъ на прим. го-
рячка съ пиянами, крас-
ная сыпь, колючее въ
боку и простудныя го-
рячки.

Еслили больной су-
хощавъ, имѣетъ на шѣ-
лѣ жесткую, толстую,
твердую, или смуглую
кожу, невеселый видъ,
пшавше и темныя глаза,
бѣлокъ въ глазахъ крас-
ный, волосы черные,
звонкій и негладый го-
лосъ.

Младенцу еще вѣтъ
чотырехъ лѣтъ.

Изъ такой произо-
шелъ онъ фамиліи, въ

ко-

обыкновенно оспа бываетъ легкая.

Женска полу еще не замужняя.

Чрезъ три дни больной находится въ хорошемъ состояніи.

Естьли онъ въ возрастѣ отъ 4 до 14 лѣтъ.

Немногокровенъ, либо излишняя кровь у него вышла кровотеченіемъ изъ носа, либо другимъ какимъ нибудь образомъ иссохшилась.

Не слишкомъ много употреблялъ мяса.

Съ самаго начала принималъ надлежащія лѣкарствя, имѣлъ хороший присмотръ, и довольно пьетъ.

Лежитъ въ простанной, умеренно теплой и чистой горницѣ.

Естьли въ первой степени находится жаръ, боль и жажда сносныя.

которой большая часть имѣла злую оспу.

Когда женщина беременная, либо въ родахъ находилась.

Въ извѣстное время больному тяжело бываетъ.

Естьли ему уже идетъ 14, 15, либо 16 годъ

Многокровенъ, либо весьма много, либо слишкомъ мало въ себѣ имѣетъ крови.

Много кушалъ мяса.

Не хочетъ для себя употребить приспосовѣнныхъ средствъ и лѣченія, и мало пьетъ: ибо въ оспѣ либо много пить, либо умереть больному должно

Лежитъ въ тѣсной горницѣ, въ такой, въ которой находится сквозной вѣтръ, либо слишкомъ жарко, либо слишкомъ холодно.

Естьли въ первой степени приключилась весьма великій жаръ, и жажда, сильный потъ и

Есть-

же-

Естьли больной въ сіе время либо совсѣмъ не имѣетъ, либо имѣетъ весьма малую рвоту; не чувствуешь въ брюхѣ никакой боли, и, при выслушеніи слы, не имѣетъ поносу.

Больной мало, либо вовсе не бредитъ, умѣренно спитъ, и не весьма беспокоится.

Не имѣетъ никакихъ судорогъ, ни родимца, незадолго предъ самымъ выступленіемъ осы.

Имѣетъ умѣренное кровоотеченіе изъ носа.

Естьли оспа начина-
етъ показываться чрезъ
72 часа или чрезъ три
дня и исподоволь. Спер-
ва на лицѣ, потомъ на
груди, на плечахъ, на
рукахъ, на бедрахъ и
но-

жесткая вѣтлость и вѣ-
снийъ боль, притомъ въ
рукахъ и ногахъ, естели
кънимъ допронуться,
примѣчается дрожаніе.

Естьли и въ то
время, когда высыпаетъ
оспа, больной имѣетъ
жесткую рвоту, боль въ
брюхѣ и поносъ.

Естьли больной имѣ-
етъ сильной и долго-
продолжающийся бредъ,
крѣпкій сонъ, либо
бессонницу и великое без-
покойство даже до того,
что принужденъ бываетъ
кидаться въ разные сто-
роны.

Худой запахъ изъ
его рта выходитъ.

Много выходитъ
крови изъ груди, либо
поносомъ, а особливо мо-
чею.

Естьли оспа еще
прежде 72 часовъ, не
порядочно и въ великомъ
количествѣ, а напаче
на лицѣ, выступаетъ
пикъ, что послѣ вы-
сно сливается, и въ не-
про-

ногахъ; есѣли она не вѣсѣма сильна, а особливо на лицѣ, и оспины одна отъ другой довольно имѣютъ разстояние.

Въ носу и въ горлѣ не бываетъ никакой оспы, а на носу только мало оной находится.

Тотчасъ послѣ выспупавшѣхъ оспы горячка проходитъ.

Есѣли оспины приподымаются вверхъ и завосприкаются, бывающѣ круглы и крупны, имѣютъ двѣ оспыночки, т. е. верхушку бѣлую, а корень красный и между оными кожа красна.

Въ прѣшей степени не примѣчается никакой, либо вѣсѣма слабая горячка, больной хорошо спитъ и легко дышитъ.

продолжительномъ времени послѣ своего выпупленія начинающѣ чешаться.

Больной множество оспинъ какъ на носу такъ и внутри носа имѣетъ; и потому принужденъ бываетъ ртомъ дышать и претерпѣваетъ затрудненіе въ глотаніи.

Горячка еще и послѣ выпупленія оспы продолжается.

Есѣли оспины мѣлкія, продолговаты, либо имѣютъ въ себѣ углы, или одна на другой накладываются, не возвышающся и не завосприкаются, въ срединѣ имѣютъ ямку съ дномъ изчерна краснымъ, кожа между оными блѣдна; и онѣ сами принимаютъ на себя необычайной видъ, бывшѣ зеленый, фіолетовый, либо черный.

Есѣли воспослѣдуетъ двойная горячка, и она не исподоволь, но вдругъ съ головою болью, безсонницею, рѣдѣніемъ глазъ, безпрестаннымъ въ разныхъ сторонахъ метаніемъ, бредомъ и спѣшеніемъ въ груди прихлѣюща.

Въ

Въ

Въ оной же степени оспа желтвенѣ и созрѣваетъ, наполняется гноемъ, твердою спановится, и такъ бываетъ больна, что все тѣло отъ того спановища чувствуя пельнымъ.

Никакого тогда не бываетъ слинопеченія, либо есшлы оное и случившя, но слина бываетъ жидкая, легко отходитъ и не останавливается.

Опухоль на лицѣ бываетъ почти не приметна, лицо по оному равномерно расхлывается такъ, что большой ябкѣ глазныхъ растворять не можетъ.

Есшлы опухоль на лицѣ начнешъ показываться въ одиннадцатый день, и послѣ того переходитъ на плеча, на руки и персты ручные, а на послѣдокъ на ладони и ноги.

Умѣренной жаръ въ третей и четвершой степени.

Есшлы оспа удобно и такимъ же порядкомъ, какъ высыпала, подсыхаетъ.

Есш-

Въ третей степени оспа не скоро становившя желта и не созрѣваетъ, бываетъ мягка и несопряжена съ болью.

Слинопеченіе при самомъ выпущеніи оспы начинаешя, слина бываетъ густа, не удобно выливается и вдругъ останавливается.

Оспа бываетъ многочисленна, но на лицѣ не находится никакой опухоли, либо она примѣчается только на губахъ, или на ябкахъ.

Либо есшлы и великая опухоль покажется, но она вдругъ исчезаетъ, не появляясь послѣ на плечахъ, на рукахъ и перстахъ, либо на послѣдокъ на бедрахъ и ногахъ.

Весьма великій ознобъ въ третей и четвершой степени, оспанаваивающій слинопеченіе.

Есшлы она совсемъ не сохнетъ, либо сохнетъ весьма медленно, и въ другой либо въ третій разъ новый на-

ра-

Естьли больного нѣ-
сколько слабѣтъ и въ
сливвой либо не въ слив-
ной злой оспѣ. Въ че-
твертой степени сдѣ-
лается поносъ, и послѣ
каждаго испражненія сла-
буетъ облегченіе.

Никакихъ не при-
ключается нарывовъ.

растаетъ струѣ по оп-
паденіи пераго.

Естьли въ четвер-
той степени ни мало не
слабѣтъ, либо приклю-
чится сильный или съ
болью сопряженный и
безъ облегченія поносъ;
калъ бываетъ похожъ
на гной, либо смѣшенъ
съ кровью, брюхо разду-
вается, распухаетъ и
болитъ: ибо се пред-
вѣщаетъ Антоновъ огонь
въ кишкахъ. Естьли
больной рѣдко и поне-
мному въ одинъ разъ
мочится; а естьли еще
при томъ онъ бываетъ
охлажденъ; то слѣдуетъ
бредъ и судороги, хотя бы
и въ непродолжитель-
номъ времени предъ тѣмъ
приложенъ былъ нарыв-
ный пластырь. Естьли
бленіе жилъ на вискахъ
и на щеѣ бываетъ скорое,
то тотчасъ наступастъ
бредъ. Естьли же при
всемъ тѣмъ на рукахъ
бленіе жилъ слабое, то
рѣдко больной избавляе-
тся отъ смерти.

Естьли въ четвер-
той степени подблаютъ
ся нарывы, оные не при-
ведены будутъ въ созрѣ-
ніе и ихъ не откроютъ.

Гло-

Гло-

Глошаніе и въ чет-
вертой степени бываетъ
свободное.

Языкъ чистъ.

Въ брюхѣ не чув-
ствуется никакой боли.

Если природа спо-
собствуетъ дѣйствию лѣ-
карствъ.

Глошаніе въ оной
степени бываетъ труд-
ное, и примѣчается особ-
ливая сыпавиость, и какъ
бы пустой голосъ.

Языкъ черенъ, при-
ключается молочница,
больной съ жаждою
сосетъ полошенье, обмо-
ченное въ вино, либо въ
какую нибудь благовож-
ную воду.

Въ брюхѣ ощущает-
ся боль.

Если природа при
употребленіи лѣкарствъ
остаётся непремѣнною, и
онѣ бываютъ не дѣй-
ствительны, моча и
калъ безъ воли больного
испражняются, приклю-
чается икота, поносъ вы-
ходитъ капаями, и при
томъ густой и холод-
ный, больной страдаетъ
судоргами: въ такомъ
случаѣ непременно слѣ-
дуетъ смерть.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ.

Для больного оспой въ самомъ еще началѣ ея болѣзни пошребно искать надлежащей помощи. Ибо то, что мы можемъ употребить въ первые дни, составляетъ главную часть нашего лѣченія. Для того, упустивши сіе время, никакой врачъ не въ состояніи бываетъ, подать почной надежды о выздоровленіи больного ошъ худой оспы. Нѣтъ никакой болѣзни, которая бы требовала столь исправнаго лѣченія, какъ сія. Сквозной вѣтеръ, холодная салфешка, либо холодное полотенце, извнѣ приложенное, можетъ оную внутрь вогнать; несогрѣвшее пище, либо окисшая сыворошка, въ состояніи бывающъ остановить слиноотеченіе. Если ли дать больному волю чесаться; то онъ можетъ себя чезъ то обезобразить на всю жизнь.

Еслили во время подсыханія не имѣть хорошаго смошрѣнія за глазами; то больной можетъ лишиться зрѣнія.

Оспу легко бы можно было лѣчить, еслили бы мы имѣли прошивъ яду оной такое вѣрное лѣкарство, которое бы ее въ самомъ ея началѣ употребить могло. И такъ между тѣмъ, пока либо всѣми не будетъ принято прививаніе оспы, либо же сущестъ вышеписанное лѣкарство, должны мы сію болѣзнь преслѣдовать во всѣхъ ея степеняхъ, и въ каждой изъ нихъ по возможности нашей подавать помощь.

Прежде нежели я приступаю къ описанію самаго лѣченія, за долгъ мой считаю, упомянуть

и тѣхъ многихъ обстоятельствевахъ, которыхъ весьма способствуютъ а́къ благополучному окончанію болѣзни.

Что касается до горницы больного, то она должна быть чисто убрана, довольно свѣтла, безъ сквознаго вѣтру, и не слишкомъ тепла, ни слишкомъ холодна. Когда больной имѣетъ сильную горячку; то она должна быть нѣсколько холоднѣе: елики же горячка не такъ жестока, то горница его должна быть поменѣе. Обыкновенно бываетъ теплоша расподѣлая, когда ршуть въ Шведскомъ Термометрѣ спомнѣ на 13 или 14 градусъ выше замерзанія, либо, когда скоро махая рукою, почти никакой въ перспяхъ не можно почувствовать стужи. Полезно также занавѣшивать дверь, отчасти для того, чинобъ не могъ войти сквозной вѣтеръ, а отчасти чинобъ можно было (*) не ду-ская онаго возобновлять воздухъ. Въ горницѣ полезно посыпать свѣжія едевые вѣтви, попрыскавши еныя не крѣпкимъ пивомъ, либо винограднымъ укусомъ, либо, елики больной весьма слабъ, рейнвейномъ. Когда въ горницѣ дымно, то не-свѣсно для его глазъ. Впрочемъ сему скоро можно пособить винограднымъ укусомъ, вавая поне-много онаго въ жаровню на горячее уголье. Естляи можно, то наилучше класъть только по одному, или по крайней мѣрѣ по два больныхъ въ одной горницѣ; ибо извѣстно, что и отъ одного изъ нихъ уже весьма дурной производишь запахъ; а

І а

осо-

(*) Что составитъ по Фарейгейшову Термометру ошѣ 55 до 57 градусовъ.

особливо въ осьмый или девяшый день. Естли же много ихъ въ одной горницѣ лежатъ, то такъ въ оной воздухъ порипнися, что не шокмо больнымъ, но и здоровымъ бывае тѣ вреденъ. Въ такомъ случаѣ уже болѣе не помогающъ вышеписаннымъ (*) образомъ посыпаясь на полъ елевья въшвыи; но должно почаще укусомъ курить, поливая оный на раскаленное уголье. Постѣлю такимъ образомъ спавить должно, чтобъ можно было съ обѣихъ сторонъ подойти къ больному. Нипаче должно беречься, чтобъ не спавить оной у каменной стѣны; ибо опа со стороны оной гораздо позже, нежели со стороны горницы созрѣваетъ и сохнетъ: при томъ она не должна сползать и такъ, чтобъ свѣтъ больному приходилъ въ глаза. Больной можетъ лежать на обыкновенной своей постѣли; однако наилучше всегда его класть на матрацъ. Одежда его зимою должно быть шолше, а лѣтомъ шовъ; ноги должно держать нѣсколько теплѣе, нежели прочее тѣло. Можетъ также больной съ надлежащего осторожности переменить свои рубашку, а особливо въ четвертой степени сей болѣзни. Не нужно, чтобъ ее прежде того кто лно повесилъ: но довольно, естли она только сула и ушномъ выгля-

гла-

(*) Сии въшвыи обыкновенно, по причинѣ пргашаго ихъ запаху, для возобновленія воздуха въ горницахъ, посылающъ и у здоровыхъ людей у значныхъ Господъ въ Швеціи. Рѣко употребляютъ какъ тамъ, такъ и въ Голштенбургѣ можжевельникъ; хотя онъ въ разумахъ своего запаху оныя и превосходитъ. М.

глазена. Естли она пристаеѣтъ къ оспинамъ : то наилучше еѣ опинимать посредствомъ обмоченной въ тепное молоко грецкой губки. Къ больному никакого безѣ дѣла впуснать не должно. Чемъ меньше съ нимъ говорить ; шѣмъ для него лучше.

Въ разсуденнн пици вообще должно наблюдать, чтооѣ больноѣ яѣ по немногу за однимъ разомъ, и не упошребляѣтъ бы грубыѣ вѣсти въ тѣ часы, когда бываетъ самое сильное ожесточеннѣ горячки. Естли уже и напередъ можно узнать, что больноѣ будетъ имѣть легкую оспу ; то объ немъ много беспокоинься не надобно. Естли же онъ не можетъ ляжеломъ оспомъ ; то, по причинѣ долговременнаго продолженнѣ его болѣзни, больше объ немъ спараннѣ упошребить должно. Всякнѣ супы изъ сорочинскаго пшена и изъ перловой крупы для нихъ полезны ; равно какъ и вишне-вый взваръ. Тѣ, которые имѣютъ нездоровую кровь и жесильную горячу, могутъ кушать супъ изъ сорочинскаго пшена съ теляшиною, либо цыплятами вареный и процѣженный, либо хлѣбный супъ, который можно сдѣлать слѣдующимъ образомъ : взять два унца сухарей, и варить въ одномъ фунтѣ съ половиною воды до тѣхъ поръ, пока они хорошо не разварятся ; потомъ прибавить двѣ, либо три столовыя ложки винограднаѣо укусу и полунца сахару, стертаѣо въ яичномъ желткѣ. Естли оспа не приподымается ; то можно въ супъ прибавить не много вина, либо лавать тѣмъ поджаренный хлѣбъ, въ водѣ напо-

ченный, посыпанный не большимъ количествомъ сахара и полишой рейнвейномъ. Еслили при этомъ приключится сильный поносъ, то можно хлѣбъ посыпать нѣсколько порошкомъ желѣзности помес-Рандовой корки, мускатнымъ орѣхомъ, либо корицею. Въ сильной горячкѣ можно вливать въ супъ по немногу винограднаго уксусу, либо лимоннаго соку либо, еслили при томъ случится поносъ, нѣсколько ку барбарисоваго соку. Понеже онъ въ большей чашѣ у насъ бываетъ жестока; то не должно больному давать въ сіе время мясныхъ суповъ, яицъ и вина.

Въ оспѣ не обходимо нужно изобильное пище, а особливо въ первой ея степени: только больной долженъ пища по немногу за однимъ разомъ, не пощаще. Приставленный къ оному не долженъ дожидаться до тѣхъ поръ, пока онъ попроситъ пища; ибо еслили больной лежитъ въ забвеніи; то онъ не чувствуетъ никакой жажды: а еслили у него оспа находится въ горѣ, то онъ не проситъ пища потому, что ему тяжело глотать. Не должно такъ же больного спрашивать, хочетъ ли онъ пища; но, какъ только онъ не спитъ, подноситъ ему стаканъ или чашку споль часто, сколько того надобность пребуенѣ. Лучшая вода, смѣшанная съ четверною долею молока, самыхъ хорошимъ можетъ быть пищемъ въ оспѣ. Съ нивомъ сдѣланная и разведенная разнымъ количествомъ воды сыворопка такъ же бываетъ пріятна вкусу, и укрощаетъ жажду. Не меньше сего полезно бываетъ продолженное свѣжее пахизалье; рав-

но какъ и чай съ молокомъ, либо съ лимоннымъ сокомъ. Можно такъ же сдѣлать пріятное и укро-щающее жажду питье изъ зрѣлой красной сморо-дины, наставивъ оную кипяткомъ, и нѣсколько оный прослудивши, прибавить шуда не много рейнвейну. Изъ зрѣлыхъ ягодъ княженицы (*Vaccas rubi atensis*) разнымъ образомъ приготовленное питье прохлаждаетъ, и наипаче полезно бываетъ въ 4. 5. и 6 день. Ячная вода, въ которой распушено не много желе, такъ же укрождаетъ жажду. По-добное сему имѣетъ дѣйствіе хлѣбная вода, смѣ-шенная съ лимоннымъ сокомъ и небольшимъ коли-чествомъ рейнвейну; но ни что такъ не прекращаетъ жажды и не прохлаждаетъ больного, какъ хорошо сдѣланная брусничная вода (*), которая по той

И 4

при-

(*) Г. Линней расшнѣе, изъ котораго ягодъ дѣ-лается сія вода, называетъ *Vaccas om vitis idaea*; а точный онаго рисунокъ представляетъ г. Едеръ (*Flor. Dal. Fasc. 1. Tab. 40*). Оно расшѣтъ въ хо-лодныхъ странахъ Европы и въ такихъ, ко-торыхъ равную съ климатомъ выше упомяну-тыхъ описателей теплоту имѣютъ, а наипаче изобилуетъ въ скрытыхъ и тѣнистыхъ мѣ-стахъ. На немъ родятся красныя ягоды, а бѣлыя ни гдѣ, кромѣ около Торно и Христиансандшиф-та. Въ Норвегій сѣе не примѣчены оныя, равно какъ и другія сего рода ягоды, какъ то: черника (*myrtillus*), клюква (*coxus coxus*) и проч. по причинѣ кисловатаго своего вкуса весьма бы-ваютъ пріятны. Однако онѣ предъ другими имѣютъ преимущество. Удивительно, что онѣ въ Швейцаріи, какъ говоритъ г. Фрѣ Галлеръ (*Nat. Supr. Helvet. n. 1022*) и въ Австріи, по

причинѣ и во всѣхъ Аптекахъ имѣется. Пять изъ числа первыхъ сихъ напипковъ въ оспѣ починаящя ошѣ всѣхъ наилучшими, и особливо когда горячка сильна, и должно оную умѣрять. Пслабѣнїе же весьма полезны бывающѣ въ такомъ случаѣ, когда оную должно поддерживать, либо уве-

описанїю г. Крауцїа (Mat. Med. Ed 2. T. 1. p. 59. еще и теперь совсѣмъ не въ употребленїи. Напротивъ того въ Швеции (такъ, какъ и у насъ) приправляютъ весьма много ихъ сахаромъ; либо сиропомъ и весьма хорошее изъ нихъ пекутъ пирожное, и дѣлающѣ мармеладъ. Воду изъ оныхъ чрезъ весьма короткое время можно сдѣлать слѣдующимъ образомъ: взять боченокъ, либо другой какой нибудь сосудъ большій или меньшій, насыпать оный до половины брусничною и дополнить толченымъ же количествомъ чистой рѣчной воды, насыпать чрезъ три мѣсяца; потомъ сколько надобно подсладишь. Правда вкуснѣе, одизко въ горячкахъ не столько полезно бывающѣ, еслили варить до известной степени сахаръ съ водою, послѣ того налить оную на бруснику въ боченокъ, и опустивши въ оный не большое количество завязанной въ узелъ корицы и кардамону, закупорить; а самую воду спустя нѣсколько недѣль разлить въ бутылки. Я сей рецептъ взялъ изъ поваренной Шведской книги (Hushållningens (or unge Fruentimber spr. 100), которая и на Нѣмечкой языкѣ уже переведена. Въ оной хотя многіе виды сей воды описываются; однако сія изъ всѣхъ наилучше потому, что она безъ поврежденїа вкуса ошѣ дорогихъ и многосложныхъ вещей сокращена; притомъ научающъ самаго Врача, не только какъ должно судить о нѣ-

увеличить. Въ разсужденіи сего должно такъ же располагать и количествомъ вина, которое къ онымъ прибавляется. Еслили оспа высыпаетъ въ горлѣ; то большой не въ состояніи ничего употреблять хлѣбнаго ни въ пиццѣ ни въ питіи, а съ всѣмъ кислаго и того больше; ибо горло отъ того пуще разбалтывается и увеличивается хрипопа.

Главное лѣченіе въ первой степени состоятъ въ томъ, чтобъ 1) горячку умирить, 2) стараться, чтобъ оспа начала высыпать единственно на канунъ четвертаго, либо въ самый четвертый день 3) сколько можно отвращать, чтобъ меньше было оспы на лицѣ, на носу, либо въ горлѣ, и ни одной бы не было оспины на глазахъ, 4) подавать помощь въ трудныхъ припадкахъ.

Жестокость горячки можно умирить, 1) кровопусканіемъ, которое бываетъ полезно, 2) естли

1 5

болѣ-

нѣкоторыхъ, въ великолѣпныхъ городахъ приготавливаемыхъ, кушаньяхъ; но и что касается до принадлежащихъ къ его должности составовъ. Изъ барбарисовыхъ и другихъ подобныхъ тому ягодъ можно такимъ же образомъ пріятную воду сдѣлать. Самая правда брусники пригодна кожевникамъ. Однако не задолго предъ симъ съ пользою она употребляема была и въ каменной болѣзни; можешь спастись, что ею замѣнили шолокнянку (*Uva ursi*) такъ какъ и мы извѣстно, что ее подъ симъ названіемъ изъ Гарда (гдѣ никогда неспоющая шолокнянка не растетъ), въ Галлу была привезена, и помощію сей погрѣшности найдена весьма хорошимъ средствомъ въ каменной болѣзни. Дай Богъ, чтобъ всѣ погрѣшности при замѣнѣ лѣкарствъ столько были удачны! М.

больной многокровенъ. Многокровнымъ же онъй почищается, естли всегда прежде того имѣлъ хороший аппетитъ, довольно спалъ, не имѣлъ довольногo шлодвиженія, естли онъ много употреблялъ внимательной пищи и пилъ крѣпкое пиво, либо вино, естли онъ не имѣлъ никакихъ примѣтныхъ испражнений; естли бѣненіе его жилъ полное и крѣдкое; жилы напрягаются, лицо, а наипаче губы, десны, внутрь носа, внутренняя поперхность глазныхъ вѣкъ, глазныя уды и бѣлокъ краснѣютъ b) Естли онъ молодъ, крѣдкаго сложенія и имѣетъ наклонность къ воспалительной горячкѣ; c) Естли въ то самое время имѣющіяся повальныя воспалительныя, либо другія такого рода горячки, въ которыхъ кровопусканіе почищается полезнымъ; d) Естли жестокая спуща, либо зной, либо сѣверный вѣтеръ не давно предъ тѣмъ предвѣстивали; e) Естли горячка весьма жестока и соединена съ чувствительною болью въ головѣ, въ поясницѣ, или во всемъ шѣлѣ, съ спѣшеніемъ въ груди, предвѣщающая жестокій бредъ, соединенная съ опухолью, либо возженіемъ въ горлѣ. Горячка же жестокою называется, когда бѣненіе жилъ бываетъ скорое, твердое и крѣпкое, въ вискахъ сильно спучишъ: естли больной имѣетъ сильной жаръ, не можешъ лежать, часто и тяжело дышетъ; моча у него выходишъ красная, языкъ сухъ и примѣчается великая жажда (*). Сильное бѣненіе жилъ въ вискахъ, же-

(*, Впрочемъ должно и кровопусканіи быть умеру, дабы не случилось того, что воспослѣдо-
вало

жестокая головная боль, бессоница и рѣдкіе галч-
ныхъ бѣлковъ представляющъ скоро наступающій
бредъ. Въ такомъ случаѣ не обходимо нужно пу-
стить кровь, и сіе повторять нѣскольکو разъ до
тѣхъ поръ, пока горячка не сдѣлается легче.
Если больной боится кровопусканія, либо тѣхъ
жиренъ, что не можно у него сыскать жилъ; то
нужно ему наставить на зашылку и на икрахъ
банки. Посредствомъ оныхъ равно какъ и чрезъ
кровопусканіе можно сдѣлать то, что на лигъ и
на шеѣ меньше будетъ оспинъ.

Если же больной почти со всѣмъ въ пр-
тивныхъ тому находится обстоятельствомъ; то
кровопусканіе должно оспавить. Не должно шикъ же
крови пускать и тогда, когда онъ слабъ, лицо
имѣетъ блѣдное, бѣненіе жилъ не полное и слабое,
и моча у него свѣтлая; если онъ не чувствуетъ
никакой жажды, ни боли, весьма склоненъ ко сну,
имѣетъ боль въ желудкѣ, впадаетъ въ обморокъ

и

видѣ съ Италіанскими Врачами, которые, при-
нявъ одному одиннадцатилѣтнему мальчику
оспу, какъ во время приготовленія его, такъ
и въ самой оспенивой горячкѣ, шикъ много пу-
скали крови, что бѣненіе жилъ сдѣлалось весьма
слабымъ; онъ чего у мальчика высчитала шоль-
ко одна оспина на лицѣ. Но какъ онъ чрезъ
нѣсколько времени послѣ толкаго кровопусканія
собрался съ силами; то оный получилъ оспе-
ную горячку, и высчитало уже великое коли-
чество оспы, которую впрочемъ онъ перенесъ
благополучно. Смори сочиненія Цирхерскаго
сооранія Испытателей Естесства т. 3 стр 176.
на Нѣмецкомъ языкѣ.

и бываетъ печаленъ. Въ такомъ случаѣ оспа не приподымается вверхъ и не созрѣваетъ. По сей причинѣ больше для него тогда нужно бываетъ, употребить на ія средотва, которыя бы сдѣлали бѣненіе жиѣ подрымъ и увеличили горячу, нежели которыя бы оную могли ослабить и уменьшить.

Понеже младенцы бываютъ слабы, удобно лишавшися силъ, и въ сравненіи съ большими скоро растушъ, а потому и большая часть ихъ питанія попребляется на приращеніе тѣла: то не должно торговаться, пускать имъ кровь, буде видѣтъ таковыхъ признаковъ, которые бы доказывали, что то сдѣлать не обходимо нужно; и еслии видѣтъ опасности имѣющаго воспосѣдовать родимца. Сверхъ того кровопусканіемъ не должно спѣшить и для того, что у нихъ обыкновенно случается само собою кровотеченіе изъ носа.

а) Посредствомъ очищающихъ желудокъ и кишки лѣкарствъ (*). Послѣ кровопусканія топчасъ должно наставить промывательное изъ теплой воды, въкотораю количества деревяннаго масла, меду и слишри составленное. Равнымъ образомъ оное должно повторять каждыи день до шѣхъ поръ, пока не наступитъ время высыпанія оспы, еслии только когда либо не бываетъ надобности больному дать слабительное. Промывательное также нужно бываетъ по большей части и тогда, когда больной прежде того имѣлъ хорошій аппетитъ, употреблялъ питательную пищу,

(*) Vid. Halleri Elem. physiol. T. 2. p. 179.

пишу, и мало имѣлъ испржженій, а особливо
еслии у него брюхо раздуло, въ немѣ ворчипѣ
отѣ вѣтровѣ и чувствуется сильная боль въ поя-
сницѣ (*). Я въ первомѣ изданіи сей книжки пред-
писалъ для сего спиритовевенную настѣй.у (Tin-
ctura thei Edinb.), либо Эдинбургской Эликсирѣ
Слауисѣ, также съ спиртомѣ слѣдѣнный, кото-
рыхѣ приемѣ для шрехлѣпняго младенца означалъ
по одной столовой ложкѣ: однако можно также,
положа въ чайникѣ полдрахмы мѣлко изрубленнаго
ревеню, нѣсколько грановѣ канцелярскаго сѣмени и
четыре разрѣзанныя вишныя ягоды, налить на
овыя шри чашки кипячей воды, и давѣ оной
чрезѣ ночь поспояти въ горячемѣ пепелѣ, процѣ-
дитѣ и смѣшать съ чайною чашкою коричной во-
ды. Сего отвару можно младенцу дать потчасѣ
выпить двѣ чашки, а проче спустя часѣ.

Однако сіи слабительныя не скоро оказыва-
ютѣ свое дѣйствіе, хотя то они и довольно сла-
бятѣ. Весьма великой стоипѣ важности, чтобѣ
умѣритѣ горячку въ первой степени; ибо рѣдко
умираетѣ больной оспою, когда у него въ сіе вре-
мя горячка была умѣренна. Впрочемѣ вышепомя-
ну-

(*) Что воспослѣдовавшии поносѣ можетѣ превратѣ-
стѣ въ выпукленіе осы, то сіе видѣти
можно изѣ описаннаго въ оныхѣ же Цирасскихѣ
сочиненіяхѣ (ч. 3. стран. 174) примѣра; ибо,
когда оный прекратился и дитя справилось, то
воспослѣдовала оная осеченія горячка, высыпала
оспа и все окончилось благополучно. Хотя сіе
случилось еѣ приливной оспѣ: однако то же самое
можетѣ воспослѣдовать и въ сѣмъ случаѣ.

нушья мною аѣкарства бываютьъ безполезны, когда оспа соединена съ гнилою горячкою. Ничто такъ не усмиряетъ жесѣтосности горячки, какъ сѣбѣшельныя; еѣшли только они скоро и довольно дѣйствуютъ и принимаемы бываютьъ прежде выѣтупленія оспы. Англичане сѣ намъ показали, а мы сами собственнымъ опыѣтомъ увѣрились о дѣйствительности ихъ. Еѣст ли слаѣбительное скоро и сѣ успѣхомъ дѣйствуетъ; то проходящѣ головная боль, бредъ, олуѣхъ и рѣвѣе лица, бѣзсѣда, необычайный сонъ и всѣ прочѣе припадки, какъ въ прививной, такъ и въ еѣстественной оспѣ случающѣся. Въ слѣдующую ночь либо на заѣспрее пѣсѣ шѣто легко высыпаетъ оспа. Еѣшли же горячка онѣ одного приѣма слаѣбительнаго не довольно уменьѣшилась; то можно дать другой, когда время позволяетъ. Нѣкоторые Сѣнокѣолмѣе Врачи изъ монахъ приѣхѣей писѣменно мѣ сѣ сообщили. Онѣ въ сѣмъ намѣренѣи употребляютъ порошокъ, составленнѣй изъ трехъ драхмъ перечиѣденнаго виннаго камня (Sѣstog tartari), полдрахмы яланнаго корня (Radix jalappaе) и изъ полѣпора грана, либо изъ двухъ грановъ рѣотной соли (Tartarus еѣstensis), смѣнря по возрасту и обстояѣтельствамъ больного. Сѣй порошокъ онѣ раздѣляютъ на 6 частей, и даѣвали по одной изъ нихъ каждыѣ часъ, пока не начинало слаѣбѣть. Г. Проф. Бергѣй сѣ равною пользою такимъ же образомъ прописывалъ порошокъ изъ трехъ грановъ рѣотной соли, и трехъ драхмъ перечиѣденнаго виннаго камня, который всѣмъ хорошо вмѣѣсто смѣшаннѣи раздѣ-

лишь

литъ на восемь частей. Французскіе Врачи имѣ доказали, что рвотная соль не производитъ рвоты, если ее смѣшать съ другою солью и весьма мѣлко спереть, но только слабитъ.

Рвотныя лѣкарства въ семъ случаѣ почти во все ненужны бывающъ поному, что въ оспѣ и безъ оныхъ довольно рветъ. А дабы сіе дѣйствіе, природою возбуждаемое, можно сдѣлать сноснѣйшимъ и больше полезнымъ; то потребно велѣть больному давать послѣ каждаго раза, когда онъ вырветъ, пить понѣскольку теплой воды, и сіе продолжать до тѣхъ поръ, пока начнетъ его рвать уже безъ всякой злеги. Въ сіе-то время по справедливости можно заключать, что желудокъ совершенно очищенъ.

3) Прохладишельнымъ питьемъ и пищею, мною выше сего описанными.

4) Прохлаждающими лѣкарствами. Можно на пр. сдѣлать не большіе порошки каждаго изъ шести грановъ селитры, и тридцати грановъ лимонныхъ лепешекъ (*Trochisci citri*), и давать по одному изъ нихъ каждый часъ, или чрезъ два часа; либо смѣшать десять грановъ селитры съ равнымъ количествомъ сахара. Еслили случится притомъ поносъ; то вмѣсто селитры можно употребить чистый нашатырь (*sal ammoniacus*); однако въ такомъ случаѣ порошокъ должно давать въ облаткѣ, дабы скрыть противный онаго вкусъ. Впрочемъ съ селитренными лѣкарствами должно обходиться осторожно, и не давать оной въ большомъ количествѣ, а наипаче слабымъ и слабымъ

дѣлать. Ибо оныя часто отъ нее получаютъ боль въ желудкѣ. Еслили же кто хочетъ сдѣлать питье, то можно оное составить изъ четырехъ фунтовъ отварной и процеженной воды, полтора унца хорошаго винограднаго уксусу, полтора унца сиропу изъ ягодъ княженицы и толкаго же количества жидкаго суну, изъ овсяной, либо перловой крупы, свареннаго. Оного должно принимать по чайной чашкѣ въ надлежащее время и почаще.

5) Уменьшеніемъ теплоты въ горнищѣ.

6) Одываніемъ тонкимъ одвяломъ.

7) Переизмененіемъ постѣли такимъ образомъ, чтобъ больной переходилъ съ одной на другую, и не прежде возвращался на первую, какъ когда она нѣсколько просынешь.

Еслили горячка слаба, что рѣдко въ первой степени бываетъ; то не должно пускать крови, но только должно такъ, какъ выше упомянуто, стараться доставлять больному свободное испражненіе низомъ. Горячку можно увеличить, еслили 1) горнищу держать нѣсколько шепале; 2) больного одывать не много толстымъ и теплѣйшимъ одвяломъ, 3) въ его кушанье и питье вливать по нѣскольку вина. Для сего хорошо употреблять съ виномъ сдѣланную сыворотку; 4) еслили прикладывавъ къ подошвамъ, либо къ икрамъ тѣсно съ черною горчицею и уксусомъ: однако оное, какъ только покраснѣетъ кожа, и подѣлаются на ней небольшіе пузырышки, должно опиять прочь.

Никакимъ другимъ средствомъ лучше не можно опсрочить выступленія оспы до ченикернаго дня, какъ удаленіемъ больного въ первые три дни отъ всѣхъ выгоняющихъ изружу лѣкарствъ, какъ то: мускусу, канфары, ебруныхъ дѣвцовъ и проч. и наблюденіемъ при этомъ, чинобъ горница была нѣсколько прохладна; сверхъ того больвой бы прохаживался, либо не лежалъ въ постѣли.

Должно шакъ же стараться, чинобъ меньше было оспы на лицѣ, на глазахъ, на носу и на шеѣ; сего же достигнушь можно 1) посредствомъ кровопусканія, либо насавливанія банокъ, еспли ш. е. вышепомянутымъ обстоятельствомъ того потребуютъ; 2) разцарапываніемъ булавкою, либо кончикомъ ланцета на рукахъ и на ногахъ кожи, не прокалывая оную насавозъ. (Смотри о семъ въ слѣдующемъ отдѣленіи о прививаніи оспы) Пособіемъ сего раздраженія, въ отдаленныхъ шѣла частяхъ дѣлаемаго, притеревать больше къ онымъ крови. А чѣмъ больше мы производимъ оспы на рукахъ и на ногахъ, и чѣмъ больше на оныхъ дѣлаемъ ранокъ; шѣмъ больше отвлекаемъ оную отъ лица, отъ глазъ, носа и шеи; для сего полезно такъ же 3) прикладывавать къ подошвамъ, либо къ икрамъ и къ рукамъ шѣвно съ горчицею, допорого пользы явивенно изъ вышеписаннаго видѣнь можно. На шомъ же концѣ 4) можно смягивать кожу на вышеупомянутыхъ мѣстахъ приприваніемъ ногъ и рукъ на прим. фланелью, либо полотенцами въ теплую кашку, изъ медной жорьовы съ молокомъ вареную, обмочушими и

выжатыми, которыя всегда какъ только проспи-
нутъ, потчасъ должно перемѣнять. Изъ опы-
товъ извѣстно, что оспа весьма рѣдко бываетъ
на подошвахъ и на брюхѣ потому, что на первомъ
мѣстѣ кожа обыкновенно бываетъ тверда, а на
последнемъ весьма плошна. По той же причинѣ 5)
должно держать нижнія чашки теплѣе, нежели
верхнія. 6) Еслили обрить на головѣ волосы; то
она обыкновенно бываетъ холоднѣе, и лучше на
ней выходитъ испарина. Въ прописномъ же слу-
чаѣ оныя пушаются и приспаяютъ къ оспинамъ,
и потому рано или поздно принуждены бываемъ
ихъ обривать.

Глазѣ между тѣмъ должно защищать отъ
оспы прикладываніемъ къ онымъ небольшого поло-
щенца, въсколько канфарю напертого. Оное мож-
но къ шапочкѣ шакъ привязать, чтобы напередъ
вышло.

Извѣстно, что всякъ, сколькобы ни имѣлъ
на себѣ освещенныхъ рябинъ, еще не безобразнымъ
кажется, когда носъ его оными не бываетъ по-
крытъ. По той причинѣ, для сбереженія его онъ
оныхъ, полезно покрывать не большою ветошкою,
намоченною канфарнымъ спиртомъ, либо дѣш-
скимъ балзамомъ (*Balsamum embryonum*): однако
прежде того должно въсколько ее въ рукавъ по-
держивать, чтобы ярблоснъ изъ нее вышелъ. На
сей конецъ полезны такъ же бываютъ шакъ назы-
ваемый рпушный пластырь (*Emplastrum de gavis cum
Mercurio*), которой должно намазать на холщину
и приладывать къ носу. Еслили въ носу высы-
пало

вазо много оспы, и по той причинѣ болѣзней при-
нужденъ бываетъ дышати, открывши ротъ; по-
должно обмочить въ теплое молоко свернутую
вешешку и вкладывать въ ноздри: однако нужно
притомъ наблюдать, чтобъ широкій ея конецъ
всегда былъ сухъ.

У насъ имѣютъ обычай, пришивать къ длин-
ной ленточкѣ черную шерсть, и помазавши оную
Ѳериаконъ, вѣшающъ на шею съ тѣмъ намѣреніемъ,
чтобъ оспа не высыпала въ горло. Однако сіе ка-
жется никакого дѣйствія оказать не можетъ. Го-
раздо лучше нашивать на затылокъ банки, и ве-
дѣть почаще полосканья въ горло. Полосканья же
для сего можно составить слѣдующимъ образомъ:
взять одну драхму канфiры, помолоть не большимъ
количествомъ Гофмановъ капсель (*Liquor aloduy-
nis tinctoris Hoffmanni*) и смолочъ въ каменной
спункѣ; прибавивъ сюда полунца сахару и опять
перемѣшавъ, полуду все хорошо не смѣшивается, по-
томъ приливать туда постепенно два фунта
теплой воды, послѣ процѣдить и бросить въ хоро-
шо залуперенной сдлинѣ. Сего полосканья можно
употреблять за каждымъ разомъ по чайной чаш-
кѣ, и всегда вливать туда по нѣскольку выше упо-
мянутыхъ Гофмановскихъ капель. Еслили оспа въ
горло уже высыпала, то должно стараться, чтобъ
она скорѣе прошла и отпала. Сіе же можно сдѣ-
лать лучше всего чистымъ полосканьемъ въ горло
теплымъ молокомъ, либо жидкимъ яичнымъ су-
помъ.

Припадки, обыкновенно въ первой степени болѣзни бывающіе, суть: рвота, бредъ, поносъ, кровошеченіе изъ носа и родимецъ.

Рвота очищаетъ желудокъ; для того оную поддерживать и облегчать должно питіемъ теплой воды. Если же она жестока, то должно припаривать брюхо мѣшечкомъ, сухою мясною, смѣшанною съ небольшимъ количествомъ шафрану, наполненнымъ, либо сваривъ оную въ рейнвейнѣ и хорошо выжавъ, тепловатую къ оному прикладывать. Можно такъ же сварить густую размазну изъ клѣбной корки, мясы и винограднаго уксусу, либо рейнвейну и, завернувъ въ полотенце, прикладывать къ желудку. Но какъ только она совершенно выскочитъ; то рвота сама собою прекращается.

Бредъ въ первой степени не имѣетъ съ собою никакой опасности. Онъ обратившись шѣми же средствами, которыми умѣряютъ горячку; ибо онъ единственно происходитъ отъ скорото печенія крови чрезъ мозгъ. Промывательное и банки, приспавленные къ затылку, часто онъ прекращаютъ. У младенцевъ обыкновенно бредъ проходитъ послѣ кровошеченія изъ носа. Сие же предугадывается по свербѣжу въ носу, либо по колотью въ боу, которое вдругъ прекращается, и онъ пропадаетъ.

Поносъ прекращается ревенемъ, который должно давать въ самомъ началѣ болѣзни такъ, какъ выше сказано. Въ первые дни онъ не причиняетъ никакого вреда; но если приводитъ боль-

бодягаго въ слабость и до самаго выступленія
осны продолжается: но должно его остановить
пристойною пищею и молокомъ изъ бѣлой камеди.
Сей же дѣлается изъ шрехъ драхмъ бѣлой камеди,
которую, сваривши въ двухъ фунтахъ воды,
должно смѣшать съ однимъ унцомъ высушеннаго
и исполченнаго славякаго мидалю. (*) Очтый прекра-
щается такъ же промывательнымъ изъ молока,
не большаго количества Оериаку и крухмалу, ли-
бо изъ известковой воды, не большаго количества
квашни изъ копскаго чеснока и Локателлеваго ба-
заму (Valentin Locatelli), съ яичнымъ желткомъ
сѣкенымъ. У малолѣтнихъ дѣтей въ злой оснѣ
чрезъ всю болѣзнь продолжается поносъ и большею
частью къ ихъ пользѣ.

Тоже самое разумѣть должно и въ разсужде-
нии кровопеченія изъ носа, еслии оно умѣренно (**).
Оное прекращаетъ головную боль и бредъ, и самая
горячка послѣ оного спавшиися легче. Телудую изъ
носа кровь болѣзной не долженъ опираться полотенцемъ,
но долженъ собирать ее въ чашку, либо тарѣлку, дабы
можно было видѣть, сколько оной вышло. Еслии
кровопечение сильно, какъ сіе явственно примѣтати
можно изъ того, что бѣлье жидъ епановиется все-
ма

К 3

ма

(*) Сие приготовленіе сходно съ молокомъ белой
камеди (Elixir gummi arabici Phlegm. Essent. p. 58. старѣйшаго изданія) толь-
ко но различіе между ими, что по Эдинбург-
ской Фармакопей берется одною драхмою боль-
ше бѣлой камеди, и прибавляется еще сахаръ и
коричная вода, безъ вина сѣдланнаго, М.

(**) Vid. Haller, Elem. physiol. Tom. 5. p. 150.

ма слабо: то должно сиваранься оноо прекрашитъ березовымъ труномъ (*Agaricus chningotum*), копто-рый, обрѣзавъ на подобіе кегля, вкладывать въ носъ, либо сперши аласцы съ яичнымъ бѣлкомъ, намазаны на сверлокъ корпи, или нащипанной пряжи, и оспа-вить въ носу до тѣхъ поръ, пока онъ самъ собою не выйдетъ.

Родимецъ обыкновенно предвѣщаетъ хорошую оспу. Если онъ вылазитъ, то приключается либо въ первую ночь послѣ начатія горячки, либо предъ высынаніемъ оспы. Его предупредить можно кровопусканіемъ, а излѣчить прощывающимъ изъ молока, масла и сахару, и събѣли майденъ въ состояніи глотать порошкомъ изъ одного, либо двухъ грановъ мускуса, съ десятию гранами мѣкаго сахару смѣшеннаго, либо (что еще лучше) легкимъ рвотнымъ. Одному осмысленному младенцу въ 1770 году весною послѣ прививанія оспы приключился родимецъ, въ груди сдѣлаалась хрипота, лицо пожелѣло, тѣло похолодѣло; однако бѣненіе жилъ было скорое, не можно было его никакимъ образомъ ни согрѣть, ни возвращиши въ лицѣ прежней краски до тѣхъ поръ, пока не произвели въ немъ рвоты посредствомъ порошка Бразильскаго корня (*Radix Ipecacuanhae*), смѣшеннаго съ кислымъ медомъ морскаго луку (*Oxymel scillaceum*). Сперва его вырвало великимъ количествомъ мокроты, а послѣ того нѣсколько послабило. Однако лучше въ семъ случаѣ употребляти рвотную соль (*Tartarus emeticus*), нежели Бразильскій корень (*Ipecacuanha*) потому, что она больше дѣйствуетъ на кожу.

ИТО-

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ.

Въ сіи дни спарашся должно, чинобъ оспа хорошо высыпала, приподнялась и получила осприя верхушки. Еслили мы видимъ, что она высыпаетъ исподоволь, спановится выше и ширѣ; при томъ біеніе жилъ бываетъ полное и довольно крѣпкое, но не весьма скорое, на пр. ударяетъ въ минуту у младенца около 120, а у взрослого около 96 разъ, или нѣсколько больше; то для больного не нужно бываетъ выгоняющее наружу лекарство. Одно частое питье довольно можетъ доставить крови такой жидкости, которая бы въ состояніи была наполнить и приподнять оспину.

Еслили же оспа не порядочно высыпаетъ, не приподымается надлежащимъ образомъ и не имѣетъ на себѣ острыхъ верхушекъ, рвота продолжается, біеніе жилъ бываетъ неполное и слабое, но при томъ скорое; то должно больному дать выпить одну или двѣ столовыя ложки липа, либо не много меду, либо съ виномъ сдѣланной сыворопки. Можно такъ же ему и въ семъ случаѣ дать небольшой порошокъ, изъ нѣсколькихъ грановъ кайфары, одного грана шафраннаго экстракта, и 30 грановъ лимонныхъ лепешекъ сосисливный; либо давать чрезъ нѣсколько времени за каждыи разомъ по чайной чашкѣ миндальнаго молока, изъ полдрахмы кайфары, шести очищенныхъ сладкихъ миндалей, полфунта воды цвѣтовъ медуницы (Urtica) и полунца сахару сдѣланнаго, либо дать вышеписанный порошокъ изъ мускусу и сахару,

и вѣдьмъ овий записъ водою цвѣтѣмъ медунцы. Впрочемъ рѣдко сіе бываетъ нужно. Ежели я когда либо моѣ положишься, что младенецъ хорошо сытъ по лавату, но жалуе къ лицу припускать пары изъ теплаго молока, онъ того оспа пощасъ на ономъ приподымается. Иногда съ великою пользою прикладываетъ къ нѣрамъ шѣсто съ горчицею.

Все сіе весьма полезно потому, что онъ сего оспа высыпаетъ и возвышается: однако часто случается, что она вдругъ опадаетъ и либо блѣднѣетъ и наполняется тонкимъ гноемъ, который не желтѣетъ и не созрѣваетъ, либо чернѣетъ и воняетъ, и возлѣ оспинъ выходитъ пупы, свойственныя гнилой горячкой. Для того я пощасъ въ такомъ случаѣ, какъ только оспа во второй степени не скоро выходитъ и не приподымается, приступаю къ употребленію лихорадочной корки, а особливо когда свирѣпствуетъ злая оспа и больной имѣетъ слабое тѣлосложение. Сію я продолжаю во все теченіе болѣзни, и даю оной почаще и побольше на каждый прѣмъ, елики бѣненіе жнать бываетъ слабое, и рѣнне около оспинъ не столько примѣтное. Напротивъ же того даю меньшіе прѣмы, когда оное бываетъ полнѣе и вышеписанное рѣнне примѣтнѣе. Сей способъ въ нашей сторонѣ съ невѣроятною пользою употребляли многие Врачи такъ, какъ и прежде насъ славные Англичане Мортонъ, Медль, Монро, Валль, Гуксгамъ и прочіе. Но всего труднѣе для младенцевъ лихорадочную корку по вкусу приравнить. Удѣлѣннѣй для сего способъ я покажу въ отдѣленіи

дейи о лихорадкахъ. Найдутъ ли бы одну прежде
размочивши давати въ облашкахъ; однако мла-
денцы такихъ кусковъ глотать не въ состояни.
Естьли ее сполочь съ горькою миндалю; то она
не сподъ отвращительный вкусъ имѣетъ. Въ
обыкновенномъ миндальномъ молокѣ равнымъ обра-
зомъ удобно лихорадочную корку младенцы прини-
маютъ. Можно такъ же для ихъ сдѣлать родъ
кисею изъ лихорадочной корки, зрѣлыхъ ягодъ
ежевельны и сыропу изъ оныхъ же, который не
полая, вкусомъ бываетъ приятенъ, но по причи-
нѣ приавленія сихъ ягодъ лучше дѣйствуетъ.
Равнымъ образомъ можно толочь въ мраморной
стукѣ зрѣлую лимонную корку съ равнымъ коли-
чествомъ померанцовой корки, и приавать туда
поспешно пофунна воды цѣльнѣ медунны и
четверть фунна оранжевой, послѣ того сіе про-
дѣлать и выжавъ, смѣшать съ тремя драхмами
порошка лихорадочной корки и съ двенадцатью
драхмами, либо двумя унцами померанцоваго сы-
ропу, либо сыропу княженицы. Естьли кто хо-
четъ употреблять экстрактъ лихорадочной кор-
ки; то можно сдѣлать приятный составъ, раслу-
стивши двѣ драхмы онаго въ десяти унцахъ виш-
невой воды, послѣ прибавить шуда полтора унца
лимоннаго сыропу (*Syrupus citri e toto*) и давати на
каждой приемъ по столовой ложкѣ.

Понеже лихорадочная корка есть сподъ поде-
льное и дѣйствительное лѣкарство; то должно пре-
жде употребленія оной узнать, настоящая ли она,
или фальшивая. Сіе же можно сдѣлать слѣдую-
щимъ образомъ: сварить не много порошка оной

въ вѣтъ, и влить потасъ въ спекальный сосудъ. Еслили горячій изваръ красенъ, а простывшій потасъ блѣднѣетъ, то лихорадочная корка хорошая. Еслили же не такъ, то она не годится.

Часто также случается, что оспа не хорошо высыпается поному, что горячка весьма сильна. Сему подвержены бывають люди крѣпкаго сложенья, имѣющіе швердую кожу и густую кровь, содержащую въ себѣ много красныхъ шариковъ. Въ такомъ случаѣ прилѣжно должно употреблять тѣ лекарства, которыя мною для уменьшенія горячки (ш. е. подъ N. 1. 2. 3. 4. и проч.) предписаны; и при томъ смѣсцать выше объявленнымъ способомъ кожу на плечахъ, на рукахъ, на бедрахъ и ногахъ. Полезно такъ же иногда давать съ камфарою порошки, изъ 7 грановъ селитры, шрехъ грановъ камфары и шридцати грановъ лимонныхъ лещешекъ составленные. Боль въ поясницѣ весьма сильная и безпрестанно продолжающаяся также можеть помѣшати выпутленію оспы: для отвращенія сего должно прикладывати къ поясницѣ въ подолбенно завернутую тѣсную овсяную крупу, и больному давать либо Единбургскій сыропъ княженицы, либо Лондонскую опійную настойку съ камфарою (*Elixir paeoniscum*) и при томъ которое нибудь изъ вышеписанныхъ лекарствъ, для выгнанія наружу оспы. Эликсира можно давать младенцу отъ 5 до 20 капель въ какомъ либо сыропѣ, съ которымъ оный хорошо должно прежде смѣшивать.

Еслили больной бредитъ даже и тогда, когда уже довольно оспы высыпало; то дол-

жно потыкать приложивъ къ ногамъ съ горчицею пѣсто, а къ запястью пришивити банн.

Когда больной жалуется, что онъ чувству-
етъ стѣсненіе въ груди, илѣетъ кровью, при-
помъ горячка у него продолжается, дыханіе бы-
ваетъ тяжелое и словно жжотъ, еслили прило-
жить руку къ воздрямъ, либо ко рну: то уже
находится въ легкихъ воспаленіе. Въ такомъ слу-
чаѣ безъ отлагательства должно пускити кровь.
Смотря о семъ проспраннѣ въ отдѣленіи о кори.

Еслили больной имѣетъ колѣны въ боку, то
должно употребити то же самое средство, и при-
паривати больной боѣ каффарнымъ масломъ (oleum
camphoratum E. 1717) Тотъ родъ колѣты въ боку,
которой нечаянно то и случается, то онаѣ
проходити, обыкновенно предвѣщая кровотоече-
ніе изъ носу.

Еслили въ сіе время приключится простой
либо кровавый поносъ; то должно шотчасъ упо-
требити вышеписанныя противъ онаго средства;
припомъ давати каефарный порошокъ безъ сали-
при, но съ осамю либо четверною долею грана-
отіа, смотря по различію возраста, смѣшенный.

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ.

Въ третей степени оспа начинаетъ испускати
отъ себя прошивный запахъ, смерельн, жел-
тѣть и созрѣвать: однако здѣсь можно по не са-
моу сказати, что я упомянулъ и въ началѣ вто-
рой

рой степени. Ежели природа сама собою хорошо дѣйствуетъ ; то не нужно бываетъ никакихъ лекарствъ, кромѣ извѣднаго питія. Ежели же бѣнне жидъ весьма слабо, либо слишкомъ много: то должно употребить вышеупомянутыя средства, что въ оное, смотря по обстоятельствамъ, либо сдѣлать полнѣе, либо слабѣе. Въ легкой оспѣ не бываетъ второй горячки. Но ежели она зла, то большой ночью безпокоится, не спитъ и мечется въ разные споры. Въ такомъ случаѣ обыкновенно даютъ младенцу по немногу маковаго сыроу: однако гораздо лучше оный оспавить, и вмѣсто оного вѣдьшь давать описанныя подъ N. 4. холодительныя питія, либо по предписанію слезного Д. Тиссопа (смотри его ученое письмо къ Г. Галлеру) такъ часто, какъ того жужда пребудетъ въ чашкѣ взвару перловой крупы по 10 капель (*) слѣдующаго состава :

R. spirit. violar. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Возми купоросной разведенной кислоты полунца, фіяковаго сыроу три унца смѣшай.
 Symp. violar. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 M.

Надписи: прохладительный составъ въ горячкѣ.

Въ

(*) Иначе г. Р. здѣсь говоритъ о малолѣтныхъ дѣтяхъ; но не удивительно, что онъ такъ мало количество предписываетъ ку о юного сироту, и чистенько советъ его не употребляетъ для тѣхъ, которые еще сосутъ грудь: ибо онъ такъ, какъ и всѣ кислыя вещи вообще, съ молокомъ не соединяется, хотя бы оно и въ человеческомъ питѣи равнымъ образомъ, какъ и въ ономъ

Въ сѣ время должно связать больному руки и посадить кого нибудь возле его постели, чтобы онъ не давалъ ему себя заранить; но вѣтено шло стѣ бы поглаживалъ по спинѣ на лицѣ перушкомъ.

Есть

отого онъ смѣшенія съ купоросною кислотою не сѣвораживалось, какъ сѣ утверждаетъ Г. П. фонъ Бергъ (Vetensk Acad. Handl. 1772. T. 46). Изъ письма Г. Тиссома (de variolis, apoplexia et typho-ре Ериѣ. medico - ргаѣ. 1770 р 232. можно заключать, что Сочинитель больше употребляетъ салип-ренной, нежели разведенной купоросной кисло-ты, хотя онъ вообще говоритъ о минеральныхъ кислотахъ. Но въ своемъ изъясненіи къ наро-ду (Avis au peuple) подмываетъ онъ сѣрную ки-слошу, которую безъ всякихъ размышлений мо-жно замѣнить хорошо перегнанною разведенною купоросною кислотою (швы въ чаше, что сѣрый духъ, изъ оной исходящій, утверждаетъ сход-ственность между обими видами кислотами), а сей такъ не по причинѣ пріятнѣшаго вкуса и, можетъ быть, по причинѣ лучшаго дѣйствія, должно предпочесть салипренную кислоту. Г. Тис-сомъ даетъ своего вышеписаннаго количе-ствомъ приотомленнаго составу не только въ тнойной горячкѣ, но еще и прежде того, если-ли больной чувствуетъ сильный жаръ, по спо-довой долѣ каждый часъ, или чрезъ два часа. Сколь дѣйствительнѣе сѣ кислоты онъ распи-пельныхъ, и сколь сильны для уменьшения го-рячки и сопровождающихъ оную припадковъ, какъ по: жару, жажде, стѣсненія груди, бре-ду и проч. для произведенія салипшенія, ис-пражнения мочи и опирающія гнилости; сѣ можно чинить у него самого. Только его не

хван

Естьли больной имевшъ оспу злую и жестокую; но въ скорое время начинаетъ появляться такъ называемая гнилая горячка (*Febris suppurativa variolosa*). Въ оной ставовишся бѣненіе жилъ скорое, прикаючаешся жаръ, алкае, безпокойство и безсонница (*). Иногда оная воспаляется вдругъ и съ такою жестокостію, что больной въ скоромъ времени получаетъ бредъ, оухоль въ гортань, либо воспаление въ груди, либо колотье въ боку. Причины сей горячки суть слѣдующія:

1) Раздраженіе чувствительныхъ жилъ, въ коихъ раздѣляющихся: ибо въ оной не только лицевъ и все тѣло несколько распухаетъ, но и самыя осипы нагноиваясь причиняють боль.

2) Уменьшенная многочисленною оспою, на кождѣ находящаяся, естественная испарина: но хотя бы и двѣ части кожи не покрылись оспою, то все еще по малой мѣрѣ девять унцѣ ежеднев-но оной оспанаваливается. Слѣдовательно естли она другимъ путемъ не будетъ испаряема, то по-

звываятъ за больные прѣемы его друзья, а (составъ Люисъ издалъ въ напечатанной его книгѣ (р. 271) Г. Тиссеръ опять слышавъ за свои опыты, съ коими, въ шкѣ же и здѣсь описанныя случаи, ибо взрослые по полѣ унца и по ѣдому унцу курорсной, разведенной каломы выливали въ 24 часа. Для тѣхъ, которые не могутъ нести каломы, можно въ восемь разъ больше сырую предписывать. М.

(*) Тѣ, кои имють проницательное обнятіе, могутъ примѣнить за день наступленіе сей горячки.

по причинѣ своей оспрошы всегда въ состояніи произвестись горячку.

Иногда также уже въ сіе время падаетъ оспа, и нѣкоторая часть тѣла изъ оной вбрызгается въ кровь, отъ чего горячка нарочито ожесточается. Сія горячка обыкновенно принадлежитъ къ четвертой степени оспы, и потому при описаніи оной пространнѣе объ ней будемъ упомянуто.

Чѣмъ чувствительнѣе больной, тѣмъ больше на немъ бываетъ оспы, и тѣмъ оная бываетъ злѣе, и чѣмъ меньше кровь въ общихъ первыхъ сшесеняхъ довольномъ и приспѣлымъ питьемъ разжижена, тѣмъ тяжелѣе и опаснѣе бываетъ сія горячка, и тѣмъ нужнѣе въ самой скорости оную прекращать, и надлежащій образомъ больного пользоваться.

Первая причина уменьшается, либо и испаряется довольномъ и частымъ питьемъ, но съ осторожностію употребляемымъ; припариваніемъ плечъ, рукъ, бедръ и ногъ соломенными, либо фланелью въ теплое молоко, и изъ моргови вареный супъ обмокнутыми и хорошо выжатыми. Ежели оспа причиняетъ сильную боль, то можно дать младенцу нѣсколько макового сырону (*Syrupus diacodion*).

Вторая причина отирается отчасти избыткомъ питьемъ (ибо всяка оспроша чрезъ разжижаніе ослабѣваетъ), а отчасти доведеніемъ выше объявленной влажности свободнаго чрезъ другіе пути испарения. Слѣдъ она себя сыскиваетъ чрезъ нѣ мѣста кожи, которыя не покрываются оспою.

осною, съспавъ озабому и чаще давати канфарный порошокъ. И часто примѣняла у больныхъ пошъ изъ снѣ мѣнахъ (*), и они по принятии каждаго порошка были спокойны и стали, во время же сего сна ося приподымалась и вылезала, и пономъ нѣкоторая часть манеры входила въ пухы-рышны. По сей притиѣ полезно оулавкою, ланце-помъ, либо махенькими пѣдницами пузырьки вскрывать, а особливо въ сливной оспѣ: ибо чрезъ то большая часть находящейся въ ней оспроты вытекаетъ. Сие должно каждый день многократно повторять поному, что оспины эаъ скоро заростаюмъ. Сдѣлаши же отвѣрстѣ, каждый разъ заключающій гной должно оширать мягкой трескою тукою, въ теплой водѣ намоченною. Вышенисанная влажность такъ же испражняется и избыльнымъ слюнотеченіемъ, о которомъ пространнѣе будешъ упомянуто ниже; равно какъ и испражненіемъ мочи. Сему же способствуетъ частое пише, а особливо смѣшенное съ нѣсколькими каплями уксъ-пашатырнаго Миндерероваго росолу (*spiritus Mindereri*), либо употребленіе въ не больномъ количествѣ уксъ-меду морскаго луку (*Ox-mel scillitici*), котораго можно давати на каждый прѣмъ по водрамы, либо по двѣлой драхмѣ; либо принимати вышениданнаго порошка изъ перечисленнаго вышего камия. Она такъ же иногда съ пользою болъ-

(*) Г. Галлеръ первый канфару въ оспѣ началъ употреблять; а сколько великую онъ ошъ нее въ себѣ пользу въ тяжелой оспѣ, сие можно видѣти въ его сочиненіи (*Opusc. med. T. 3. P. 350*)

больнато истребляется сама собою чрезъ частое испражненіе низомъ. Сіе самое заслужило искуснаго Доктора Фрейнда, давать въ такомъ случаѣ слабительное. Къ сему приступать должно, коль скоро большая часть осны начнетъ подсыхать на лицѣ. Еслии прекратится сливочеченіе, и опухоль на лицѣ оладетъ, и приномъ она не явившися въ скорости на рукахъ и ногахъ, мѣла испражняется неизобильно и вышесказанныя средства не помогутъ: то больше нѣчего дѣлать. Однако лучше всего въ такомъ случаѣ, вовервыхъ насмачивать промывательное (которое должно повторять каждый день во все продолженіе болѣзни, ссылая само собою не слабѣть), а когда оно оладетъ свое дѣйствіе; то должно часто осведомляться, возвышается ли и выполняется слабое, скрое и дрожащее бѣеніе жилъ, прекращается ли беспокоешіе и жаръ, и дѣлается ли свободнѣйшимъ частое и тяжелое дыханіе? Еслии сіе примѣчается; то послѣ безъ опасности можно дать слабительное изъ Единбургской кассіи (*Dissaltia Edinburg*), въ сыкороткѣ раснущенной, либо сдѣлавъ питье изъ манны и Индійскаго тамару, которыя оба въ водѣ вскипяшить, и процѣдивши прибавить для пріятнѣйшаго вкуса сыропу княженнды. Во время же дѣйствія сего лѣкарства никогда не должно забывать, больному дать одну или двѣ столовыя ложки крѣпительнаго лѣкарства, сдѣланнаго на пр. изъ четырехъ унцовъ брусничной воды, двухъ унцовъ рейнвейну, пятнадцати Гофмановыхъ капель и двухъ, либо трехъ драхмъ сыропу княженнды.

Л

Есть-

Естьли горячка жестока, то и въ сей степени необходимость требуетъ, пустить кровь. однако рѣдко сіе бываетъ нужно, естьли употреблять въ довольномъ количествѣ выше предписанный противъ горячки холоднѣльный составъ.

Я здѣсь повторяю тѣ же самое, что сказалъ въ описаніи второй степени, то есть, что сіе хорошо и въ семъ случаѣ полезно. однако рѣдко въ совершенно злой оснѣ бываетъ довольно дѣйствительно. Для того я въ оной употребляю лихорадочную корку. Да и всякъ, кто оную по моему предписанію станетъ употреблять, самъ увидитъ, что она часто дѣлаетъ чудеса, и все прочія лѣкарства замѣнитъ можетъ.

Хорошимъ считается знакомъ, когда опухоль на лицѣ продолжается до одинадцатаго дня. Однако всегда приномъ распуханіи, и какбы срастающіяся глазныя вѣки, отъ чего больной на нѣсколько времени лишается зрѣнія. Весьма многіе Врачи о семъ припадкѣ совѣтъ умалчиваютъ; но я полезнымъ считалъ каждый день по одному разу опворять глаза, дабы узнать, не сдѣлалось ли имъ какого либо вреда. Ихъ весьма легко опворять кончикомъ языка; но естьли кто сего сдѣлать не умѣетъ, то должно помочить тонкую вешошку въ молоко, съ небольшимъ количествомъ воды смѣшенное, и выжавши умѣренно теплую прикладывавъ къ глазнымъ вѣкамъ. Сіе должно продолжать до тѣхъ поръ, пока можно будешь оныя съ осторожностію перстами раздвигать.

И общааъ выше упомянутъ нѣчто о слиношечени, которое въ злой оснѣ есть необходимо нужное испражнение, и весьма худымъ почи- ваеиця признакомъ, когда оно непорядочно про- должается, либо преждевременно перестаетъ. У младенцевъ слиношечение рѣдко бываетъ, а у взрослыхъ оное открываеиця уже въ пятый, либо шестый, а иногда и въ четвертый день. Чемъ ранѣе оно начинаеиця, тѣмъ злѣе бываетъ оспа. Нача- та слнна удобно выходитъ, бываетъ жидка и въ великомъ количествѣ; при наступленн же деся- тата, либо одиннадцатаго дня, начинаетъ огустѣ- вать и спановицця клейкою; трудно выливаетъ- ся и захватываетъ дыханіе: однако сему можно поспособиъ и сдѣлать больному облегченіе частымъ полосканьемъ во рту, и вливаніемъ онаго посред- ствомъ насоса въ горло. Для сего полезно упо- треблять грудной Лондонской взваръ, прибавя на фунтѣ онаго одинъ унцѣ уксусу морскаго луку (acetum scilicet), и столько же количество розо- вата меду; либо морковный супъ, смѣшенный съ не большимъ количествомъ фіалковаго сыропу; ли- бо велѣнь варить два унца корня большаго про- свиряку и чепыре винныя ягоды въ трехъ фун- тахъ воды до тѣхъ поръ, пока выкипитъ третья часиъ, и процѣдивши прибавать шуда не много чистаго меду. Сииъ можно какъ полоскать во рту, такъ и вливать оное посредствомъ насоса въ горло; отъ чего оспа скорѣе въ сихъ мѣстахъ созрѣваетъ и опадаетъ. Впрочемъ ничто такъ не полезно для слиношеченія, и не приноситъ гор- лу большаго облегченія, какъ частое пишье теп- лаго

ляго молока либо одного, либо смѣшеннаго съ небольшимъ количествомъ сахару, либо съ чаемъ, съ яичнымъ взваромъ, либо съ овсянымъ супомъ. Въ сей и слѣдующей степени оспы больной не долженъ лежать на спинѣ; но должно его съ боку на бокъ поворачивать, дабы слюна не текла въ горло. Для сего такъ же полезно подкладывать полщечку, на которой больной лежитъ, мягкое теплое льняное полотенце, и оное почаще въ случаѣ надобности перемѣнять.

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ.

Если все продолжается хорошо и печетъ своимъ порядкомъ, то въ четвертой степени ничего, кромѣ хорошаго смотрѣнія за больнымъ и частаго пищья, бываетъ не нужно, а особливо если оспа легка, слюнотечение продолжается порядочно, дыханіе свободно, оспины созрѣваютъ и высыхаютъ, опухоль, бывшая прежде на лицѣ, переходитъ на руки, а потомъ на ноги; больной спитъ порядочно и имѣетъ нѣкоторый аппетитъ.

Если же оспа тяжела; то въ сіе время снова приключается горячка. Она происходитъ какъ отъ осипнаго гною, который не можешь весь выйти сквозь струпъ, но нѣкоторая еяго часть поглощается всасывающими сосудами и приносится въ кровь, такъ и отъ многой нечистоты, которая во время болѣзни, если бываетъ

запоръ, въ желудкѣ и въ кишкахъ накопляется, въ засывающихъ сихъ внутренностей сосудахъ поглощается, относится въ кровь, и своимъ раздраженіемъ производитъ горячку, которая по той причинѣ бываетъ гнилая. Почему тѣло должно отъ оного гною очистить, а иначе горячка не переставшъ. Еслили онъ принесенъ будетъ въ мозгъ, и причинитъ жестокий бредъ и глухой сонъ, либо къ легкимъ, и произведетъ одышку: то наступитъ неминуемая смерть. Еслили же онъ приливается къ глазамъ, либо къ ушамъ, то больной лишается зрѣнія, либо слуха. слѣдовательно всячески должно спараться отбратить сию горячку. Лихорадочная корка и крѣпительная пища и питіе въ семъ случаѣ больше всего помогаютъ; но при томъ должно употреблять такіа средства, которыя выводятъ изъ шла гной, какъ то: прокалываніе оспинъ, произведеніе слюнотеченія и частаго испражненія мочи; такъ же легкія слабительныя съ осторожностію такъ, какъ я упомянулъ въ третьей степени, употребляемыя. Сверхъ сего полезно въ сіе время, и накрывать плечи, руки, бедра и ноги и, еслили бѣсныя жилы бываютъ неполныя и слабыя, прикладывать кислое тѣсто съ горчицею.

Не рѣдко гной приливается къ какой либо наружной части шла, и производитъ на оной опухоль иногда безъ боли, но чаще съ болью. Еслили изъ таковой опухоли оный испражнится, и не будетъ болѣе всосанъ въ кровь, то больной совершенно выздоравливаетъ. Для того неупу-

спешительно должно о семъ спараться; еслили же не примѣчается никакой опухоли, то должно приказашь больному кашлять и спросить у него, не чувствуетъ ли онъ гдѣ либо боли. А еслили хотя мало начнетъ показываться опухоль, то должно къ оной прикладывать густую приварку изъ молока, пшеничной муки, печенаго красного луку, и небольшого количества шафрану, и, какъ только примѣченъ будетъ гной, ланцетомъ оную прорѣзать.

Когда оспа на лицѣ подсыхаетъ; то должно оную начинать такимъ же порядкомъ, какимъ она подсыхаетъ (однако не прежде того какъ когда уже прекрѣпится струпомъ) помазывать. Для сего я всегда употребляю яичный взваръ, съ небольшимъ количествомъ сахару смѣшенный, и мазь изъ полуца миндальнаго либо деревяннаго масла, и одной драхмы щолоку пережженнаго виннаго камня (*oleum tartari deliquitum*) составленную. Все сие хорошо вмѣстѣ должно взболтать. Потомъ обоими сими лѣкарствами должно посредствомъ листочки попеременно чрезъ нѣсколько времени помазывать. Иногда я употреблялъ для сего супъ изъ целаянины, а иногда и теплое молоко, въ которое велѣлъ обмокнуть мягкую грецкую губку и часто оною по лицу водить. Нѣкоторые похваляютъ составъ изъ мѣлу и сливокъ, которымъ помазываютъ посредствомъ перушка струня.

Когда оспу такимъ образомъ использовашь до того, что она уже совсѣмъ подсохнетъ; то непременно должно дать щепъ либо семь разъ
чрезъ

чрезъ каждыя четыре дни слабительное. На сей конецъ младенцу можно давать слабительной каши (Eleuagium lenitivum) по дая, по три, либо и по четыре драхмы, смотря по различію его возраста. Если же сие олушено будешъ; то легко можетъ въ разслабленіе прийти грудь, приключиться теченіе мокротъ изъ глгзъ, сыпь, либо нарывы.

Не лзя повѣрить, чтобъ кто имѣвшій уже однажды оспу, вторично оною заболѣлъ. Правда, маѣ часто сіе случалось слышать: однако по сие время ни я самъ, ни никто другой изъ иску-
сныхъ Врачей въ нашей земли, сколько мнѣ извѣ-
стно, никогда такого вѣрнаго примѣра не видалъ. Водяная сыпь, и такъ называемая сливая оспа мо-
жетъ случиться; а настоящая никогда. Нѣко-
торыя, имѣвъ только одну оспину, либо весьма лег-
кую оспу, боялись, чтобъ не получить ее вторич-
но: однако они всегда свободными отъ оной оста-
лись, не смотря даже на то, что жили вмѣстѣ
съ больными злою оспою. Другіе для лучшаго
удостоверенія прививали себѣ оную: однако и къ
нимъ она не приспала, когда они уже прежде
того перенесли естественную, либо прививную
оспу. (*)

А 4

Не

(*) Можно такъ же иногда съ перкаго виду извѣ-
стной родъ кори почесать за оспу, если она
т. е. въ весьма великомъ количествѣ высту-
питъ, и по срединѣ пузырьковъ оной показы-
ваются плоскіе круглые пузырьки, весьма похо-
жіе на оспу. Хотя оныя обыкновенно не созрѣ-
вають; однако съ прочими вмѣстѣ подсыхаютъ.

Нѣ

Не всякъ человекъ необходимо долженъ перенести оспу. Ибо сколько народа жило въ Америкѣ, который весь свободенъ былъ отъ оной? Ся болѣзнь въ первой разѣ туда принесена изъ Европы въ 1492 году. Равнымъ образомъ никогда не была она и въ Гренланди до 1733 года, въ которомъ туда принесена изъ Даніи. Врачи примѣтили, что есѣли привить оспу 100 человекамъ, то 5 изъ нихъ зараза ся не приспичнетъ: для того объ нихъ увѣрительно сказать можно, что они неподвержены оспѣ. Слѣдовательно изъ 100 человекъ бываютъ 95 имѣющихъ расположеніе въ крови къ сему яду. Однако оное никогда не можетъ обнаружиться прежде дѣйствительной заразы. То же бываетъ и въ разсужденіи моровой язвы. Оная никогда у насъ не зараждается, но приносится къ намъ изъ зараженныхъ ею мѣстъ, и никогда къ тому пристать не можетъ, кпо заблаговременно отъ такового мѣста удалится.

Не лзя утвердительно сказать, чтобъ кто либо у насъ сыскался плакой, кто бы, никогда не имѣвъ оспы, не всегда свободнымъ отъ оной могъ опасаться. Есѣли то справедливо, что прививаніе оспы у пачи человекъ изъ ста бываетъ не дѣйствительнымъ; то уже довольно изъ того явствуешь, что сѣи ее опасаться не должны. Однако и тогда опасенся еще сумѣние, не перенесли

ли

Нѣсколько ихъ вдругъ могутъ нагнаться, но они не имѣютъ въ срединѣ ямки, ни въ окружности краснаго края. (Vid. de Hæen Rat. med. contin. T. 3. P. 352.)

ли они ее еще въ колыбели, и можетъ быть она такъ была легка, что и родители ее не примѣтили, но считали за пузырышки, отъ жару исходящія. Я знаю одну дѣвицу, которая такъ легкую имѣла оспу, что ее родители и не считали по за оспу; для того отправившись въ Септра къ дѣлишельнымъ водамъ въ дорогу съ собой ее взяли. По случаю я встрѣтился съ ними и уговорилъ ихъ прекратить съ й нуиъ; послѣ чего они оставались на мѣстѣ до пѣхъ иоръ, пока миновалась оспа. Сверхъ того известно намъ, что различные младенцы уже рождались на свѣтъ съ оспою (*). Изъ чего явствуетъ, что, можетъ быть, нѣкоторые изъ оныхъ еще въ чревѣ матернемъ оную перенесли. Между прочимъ я упомяну здѣсь одинъ примѣръ, который мнѣ за 15 лѣтъ предъ симъ случилось видѣть, а именно: у одного младенца при самомъ его рожденіи примѣны были на плѣхъ оспенныя рябины и сыпунья. Въ то время, когда мать была на снось, боленъ былъ оспою старшій ея сынъ. Спустя послѣ того шесть лѣтъ, получили оную и прочія дѣти,

Л 5

на-

(*) Врачи много такихъ случаевъ описываютъ. (V.d. Mead. de variolis p. 66. 67. Fuller Exanthem. p. 192.) Однако не всегда сіе случается, чтобъ мать имѣя оспу сообщила ее и своему зародышу (Смотр. Кириватрикъ на сказ. мѣст. стр. 21). Сюда принадлежитъ также исторія г. Бакера (Medical Transactions T. 2. p. 314.) о двухъ беременных женщинахъ, которыя благополучно перенесли прививную оспу, и родили въ свое время; но ихъ дѣти, хотя имѣ уже на третьемъ году оную привили, имѣли настоящую оспу. М.

напротивъ того послѣ всѣхъ родившійся младенецъ ею заразиться не могъ потому, что онъ уже перенесъ ее въ утробѣ матерней (*). Впрочемъ есть и такіе примѣры, что нѣкоторымъ людямъ оспа еще въ первой разѣ приключалась въ старости. Одинъ человекъ въ Упсалѣ получилъ оную уже на пятидесятомъ году отъ своего рожденія и благополучно ее перенесъ (**). Одна госпожа въ Англіи занемогла на оспу на семидесяти второмъ году, и отъ оной скончалась. Другая получила оную на семидесяти третьемъ году, и что весьма рѣдко случается, сначала имѣла легкую оспу, но она въ 15 день сдѣлалась жестокою и сливною. Въ большомъ Купфербергскаго занемогла на оспу одна старѣе осмидесяти лѣтъ женщина, однако, не смотря на то, что она была сильна, благополучно отъ оной выздоровѣла.

Страхъ

(*) Къ сему я прибавляю еще два примѣра, г. Фонъ Акредемъ (*Tal om Fostrets Sux domari moderisvet.* стр. 7.) въ Спокгольмѣ примѣченные. Припомъ я помню описанную г. Мигомъ объ одной матери исторію, которая не смотря на то, что будучи беременна, ходила за дышащемъ, имѣвшимъ прививную оспу, родила сына здороваго и не имѣющаго нисколько признаковъ оспы. Нельзя знать, перенесъ ли уже сей младенецъ въ утробѣ матерней дѣйствительную, но весьма легкую оспу; или прививаніе было тому причиною, что онъ не заразился, или не имѣлъ въ оной въ себѣ никакого расположенія? Только то извѣстно, что его сестра послѣ прививанія весьма мало имѣла на себѣ оспинъ. М.

(**) Таковожъ легко перенесъ оспу одинъ мужикъ на 84 году отъ своего рожденія.

Сстрахъ какъ моровой язвы не бываетъ причиною (ибо мы видимъ, что она и самыхъ новорожденныхъ младенцевъ не щадишь), такъ равно и оспы. Зародыши, новорожденные, либо паче малолѣтшныя младенцы, что не знаютъ ни страха, ни самой оспы, не исключены отъ оной. Однако естъли гдѣ оспа находится, то она скорѣе припадаетъ къ боязливымъ людямъ. Ибо отъ страху ослабляютъ чувствительныя жилы и самое сердце, а отъ того кругообращение крови бываетъ медленнѣе; всасывающихъ сосудовъ устья больше бываютъ опверсты, и потому оспенный ядъ удобнѣе поглощаютъ.

Оспа ежегодно умерщвляетъ десятую часть младенцевъ въ Шведѣи. Примѣчанія достойно, что хотя больше она заражаетъ младенцевъ мужскаго пола, однако больше женска лишаетъ жизни. Напротивъ того прочія младенческія болѣзни больше похищаютъ первыхъ; такъ что хотя больше рождаются мальчиковъ, однако на пятомъ году бываетъ обоюго пола младенцевъ число одинакое. А на пятнадцатомъ уже году число знатно превышаетъ женскаго полу. (Смолпр. о семъ сочиненія Королевской Академіи Наукъ 1755 года стр. 247. на Швед. языкѣ.)

Съ какою пользою Г. Баронъ Димсхаль употребляетъ свой новый способъ прививанія оспы, сіе можно видѣть изъ нѣкоторыхъ опытовъ въ его книгѣ, о новомъ способѣ прививанія оспы имъ описанныхъ.

Опытъ исправно написанной исторіи сей болѣзни, и употребленнаго съ искусствомъ и благо-
ря-

разуміемъ въ оной дѣченія сообщаетъ намъ Г. Циммерманнъ въ описаніи злой оспы, которую перенесли два младенца. (О чемъ можно читать въ *Zürcher Abhandl. B. 2. стр. 386. 414.*)

ОТДѢЛЕНІЕ 13.

О

Прививаніи оспы.

Нѣтъ рѣзспровѣ о умершихъ явствуетъ, что оспа есть самая смертоносѣйшая болѣзнь: для того по справедливости можно ее считать за главную причину плачевнаго оскудѣнія нашего рода. Сіе самое меня побудило предложить здѣсь, какимъ образомъ чрезъ предосторожность и надлежащія суетства можно достигнуть до того, чтобы не многие отъ оной умирали.

Оспа приспаетъ различнымъ образомъ. Для того нужно знать, какимъ способомъ съ наименьшею опасностію можно оной себя подвергнуть. Все-го бы лучше, если бы можно совѣтъ ее избѣ-гнуть и избавившись ея заразы. Но человекъ обя-занъ жить въ обществѣ. Мы ходимъ на торжи-ща, бываемъ въ церквахъ и другихъ многолюд-ныхъ собраніяхъ. Дѣти наши, не давно отъ оспы умершія, погребаются въ храмахъ; мы хотимъ, либо споемъ надъ ихъ гробами и дышемъ воз-духомъ, наполненнымъ оспеннымъ ядомъ. Собаки и скоты переносятъ оный изъ дому въ домъ. И такъ по справедливости можно сказать, что оспа есть неизбѣжная болѣзнь. Благословеннымъ бы
того

того почестъ должно, кто бы противъ яду оной
открылъ вѣрное лѣкарство!

Бургавъ думалъ, что можно составить изъ
сурьмы и ртуши такое средство, которое въ со-
стоянии разрушить оспенный ядъ (*). Можетъ
быть ему въ томъ нѣсколько разъ и повсчастливи-
лось. Однако напоследокъ повипореніе опытовъ за-
ставило его въ себѣ сомнѣваться. Ибо, еслили
бы не такъ, то бы онъ, какъ чистосердечный
мужъ, прежде своей смерти столь великое откры-
тіе всему свѣту сообщалъ.

Безъ сомнѣнія сіе самое побудило и Филадельф-
скихъ Врачей давать больнымъ прививши оспу,
чрезъ

(*) Г. Фревенъ въ особливомъ своемъ сочиненіи
(Reasons given against an opinion, that a person in-
fected with the smallpox may be cured by antidote wit-
hout incurring the distemper) сіе средство опро-
вергаетъ; а Г. Фонъ денъ Бошъ (Proeve oer de
voorbekoming der Kinderpokken 1770) оное напо-
минъ того весьма защищаетъ. Они наипаче въ
томъ между собою не согласны, что оспенная
сыпь не есть необходимый переломъ (списъ) бо-
лезни. Таковыя примѣры оспенной горячки безъ
сыпи легко можно сыскать у Сочинителей. А
что сіе иногда также случается и въ кори, то
сему неложный свидѣтель де Гаенъ (Theses de
febris ии йе р. 106). О горячкѣ также съ крас-
ными пятнами самъ Г. Фонъ Розенштейнъ ни-
же пишетъ, что въ ней не было сыпи; такъ
какъ и въ Даніи въ одно время много такихъ
горячекъ примѣчено; ипрочемъ оныя всегда со-
единены были съ жаждою, ибо сей припадокъ
отъ нихъ кажется быть нераздѣльнымъ. (act.
Societ. Науп. Vol. 2. p. 32. 199.) М.

чрезъ день попеременно въ вечеру нѣсколько сладкой ршупи и сурьмяной извесни (антимонит диатрогетичесм), а по утру не большое количество Корнахиловаго порошка (pulvis cornachini), и павослѣдокъ желтосурьяную сѣру (sulphur antimoni auranti), съ малымъ количествомъ сладкой ршупи смѣшенную. Сколь ни неосновательно было сіе предпріятіе; однако вышеупомянутые Врачи имѣли удовольствіе видѣть, что изъ 700 больныхъ, которымъ они привили оспу, только одинъ умеръ. (Vid. Kirkpatrick Analysis p. 329.)

Бурганъ еще думалъ, другимъ образомъ сію болѣзнь у каждаго больного въ самомъ ея началѣ, или пока еще не высыллетъ, истребить. Онъ считалъ ее воспалительною горячкою, а всякую оспину за нарывъ. По сей причинѣ воображалъ, что естьли ослабить въскорости воспалительную горячку посредствомъ избытка кровопусканія, наставливаніемъ промывательныхъ, довольнымъ питіемъ, ставленіемъ ногъ въ теплую воду, умѣренною теплою въ горнищѣ больного и прохладяющими лѣкарствами: то никакихъ не большихъ сихъ нарывовъ или оспинъ не воспослѣдуетъ. Ему часто сіе и удавалось. Съ равною же пользою употреблялъ сей родъ лѣченія и дела Мешри (еслили только можно вѣрить словамъ толь явнаго опиступника отъ вѣры и закона). Справедливый и вѣроятнѣ достойный Докторъ Клеггорнъ оному такъ же послѣдовалъ, когда оспа въ Миноркѣ въ 1746 году жестоко свирѣпствовала. Нѣкоторымъ онъ симъ способомъ пособилъ, и три или четыре изъ нихъ не имѣли сыпи. Но хотя
онъ

онъ со всевозможнымъ раченіемъ употреблялъ все
лю, что въ воспалительныхъ горячкахъ бываетъ
полезно: однако большею частью больные бѣд-
ственно прекращали свою жизнь. Сие самое ви-
дѣть можно и въ сочиненіи благоразумнаго Докто-
ра Траллеса (*Dissertatio epistolica de methodo medendi
variolis haecenus cognita, saepe insufficiente & c.*) Сверхъ
сего не извѣстно, можно ли послѣ сего быть безо-
пасну отъ оспы заразы. Тѣ, которые имѣли
въ боку колотье, многократно могутъ быть под-
вержены воспалительной сей горячкѣ.

Лучшій сего имѣлъ успѣхъ простой народъ
въ Герцогствѣ Валахскомъ въ Саксоніи, и у насъ
въ западной и южной Голландіи, гдѣ въ долго-
временномъ употребленіи была купля оспы. Но
понеже тамъ не умѣли хорошо прежде пригото-
вить шѣло; то иногда сумѣвались, чтобъ сей
родъ прививанія оспы всегда былъ удаченъ (*).

Старый и паживный Докторъ Лоббъ оба мнѣнія
Бургаковы соединилъ вмѣсто и думалъ въ шакъ
называемомъ порошокѣ ртуть съ строю, (*Aethiops
marialis*) (**) сыскавъ такое средство, которое бы
мо-

(*) Однако обыкновенный способъ прививанія оспы
безъ приготовления больного должно предпочесть
купля по тому, что при оной опасности сообще-
ніе яду не приспаетъ, и опасности опасаться долж-
но, чтобъ не заразился тотъ, кому прививаютъ,
отъ вдыханія въ себя зараженнаго воздуха. Рав-
нымъ образомъ дѣи причины кажется опро-
вергающъ новый способъ прививанія оспы, упо-
требляемый Англичанами, М.

(**) Сіе лѣкарство одинъ изъ новѣйшихъ, а имен-
но Г. Котуини (*de sedibus variolarum synagma Ni-*
enae

могло, либо перемѣнить свойство оспеннаго яду, либо уже смѣшавшійся оный съ кровью такъ сдѣлать тонкимъ, чтобъ онъ не оставался въ кожѣ и непронизовалъ осы, но удобнѣе испражнился посредствомъ испарины. По сей причинѣ, когда оспа гдѣ либо находилась, то онъ рѣдѣлъ принимая сей порошокъ, смѣшенный съ не большимъ количествомъ сѣрыхъ цвѣтовъ, и велѣлъ припомъ наблюдать порядочную діету. Онъ утверждаетъ, что многие, кои принуждены были находиться при большихъ оспою, симъ средствомъ избавлялись отъ ея заразы на томъ разѣ, а естли кошорые оную и получили, то имѣли легкую. Онъ такъ много воображаетъ, что думаетъ, будто можно чрезъ частыя прѣмы сего порошка, оспенную горячку въ первой степени прекратить и зараженную кровь такъ перемѣнить, что оспенный ядъ больше останется незаразительнымъ, но испражнился изъ пѣла отчасти посредствомъ испарины, а отчасти съ мочою. Однако онъ не утвердилъ сего никакими наблюденіями.

Хотя я считаю за полезное, давать больному по двѣжды въ день порошка ртуть съ сѣрою по 10, 20, или 30 грановъ, смотря по различію его сложенія: однако онъ сего происходящъ при недоумѣ: 1) младенцу не пріятно его принимать, естль-

епіе 1771. р. 73. 75. 199.) защищаетъ. Онъ его давалъ не только въ такомъ случаѣ, когда были признаки глестовъ, но и безъ оныхъ. Оспа послѣ того хорошо выполнялась, гной лѣзался способнымъ къ испражненію посредствомъ испарины, и симъ средствомъ лишался своей ѣдкости. М.

естьли онѣ не смѣшенъ съ медомъ; 2) естьли кто имѣетъ склонность къ поносу, то онѣ весь выхлупитъ вонъ съ испражненіями на низъ. Въ такомъ случаѣ ни мало онаго не входитъ въ кровь, и следовательно онѣ не можетъ отвратить оснениаго яду, либо воспрепятствовать ему, оказывать свое дѣйствіе. 3) Напротивъ того естьли кто подверженъ запору, то, какъ изъ опытовъ извѣстно, сей порошокъ удобно можетъ произвести слиноотеченіе. Впрочемъ сіе можно отвратить примѣшиваніемъ къ оному легкаго слабительныхъ и канфары. Въ разсужденіи сего можно заключить, что шакъ же и люди Г. Беллоса могутъ служить хорошимъ предохранительнымъ лѣкарствомъ.

Покойный Ирландскій Епископъ Берклея (*) между прочимъ смольной водѣ приписываетъ такую пользу, что она предохраняетъ отъ оспы, либо по малой мѣрѣ оную дѣлаетъ не столь жестокою. Какъ только начнетъ оспа появляться; то онѣ великъ оной пить по большей или меньшей мѣрѣ, смотря по возрасту по утру и въ вечеру, и сіе продолжать до шестъ поръ, пока она либо пристанетъ, либо совсѣмъ пройдетъ. Онѣ увѣряетъ шакъ же, что ее съ пользою можно употреблять и въ самой болѣзни.

Сія вода есть такое лѣкарство, которое всегда сыскать можно и ничего не стоитъ. Для того простой народъ могъ бы своимъ дѣтямъ давать ее пить вышеупомянутымъ образомъ онѣ начала почивившейся оспы, до самаго ея окончанія.

(*) Еще больше имѣетъ опытовъ, утверждающихъ дѣйствительность смольной воды въ оспѣ, Пронель (Narrative of the success, of Tar-water). М.

М Про-

Пространно бы было здѣсь описывать всѣ Агличанами надъ сею водою учиненные опыты, доказывающіе пользу оной. Я только упомяну объ одномъ, Докторомъ Кантвелсомъ описанномъ, а именно въ одномъ домѣ въ Шотландіи было четверо дѣтей. Одинъ изъ нихъ заболѣлъ на оспу, двумъ отецъ велѣлъ принять оную, а четвертому давалъ пить смольную воду. Всѣ сіи четверо дѣтей жили въ одной горницѣ. Первые трое перенесли оную благополучно, а четвертый, который пилъ смольную воду, оною не заразился. Отецъ велѣлъ ему ее принять, и опять давалъ пить сію воду, однако оспа не приспала. По той причинѣ вторично, по прошествіи двухъ мѣсяцовъ, велѣлъ онъ ему оную принять, но при томъ оставилъ употребленіе смольной воды. Тогда младенецъ напоследокъ оную получилъ; однако она шакъ была легка, что едва ее примѣнить было можно.

За нѣсколько лѣтъ предъ симъ свирѣпствовала въ селѣ Лонгшорѣ за три мили отъ Упсала столь жестокая оспа, что едва осталось въ живыхъ хоть одно дитя. Но коль скоро простой народъ, по моему совѣту, началъ давать своимъ дѣтямъ по нѣскольку смольной воды, какъ прежде заразы, такъ и въ самой болѣзни, то она шакъ сдѣлалась слаба, что едва кто либо отъ нее умеръ.

Смольная вода дѣлается изъ двенадцати фунтовъ нозы и трехъ фунтовъ хорошей смолы (*). что все хорошо должно ложкою, либо лопашкою чрезъ три или чепыре минуты мѣшать. Послѣ того

(*) Такою же пропорціею составляется сія вода и по *rhaglasorosa ruzregim p. p. M.*

нѣго дать сей смѣси постоянно сорокъ восемь часовъ, и когда смола осядетъ, воду слить въ бутылки. Она бываетъ такъ прозрачна, какъ бѣлое Испанское вино, и имѣетъ кисловатый вкусъ, который еще больше бываетъ примѣтенъ, еслии вода нѣсколько выпарится. Въ то время дѣлаетъ она краснымъ фиалковый сиропъ и кипитъ съ щелочною солью. Сія вода состоитъ изъ тонкаго мыла, которое, будучи растворено посредствомъ не большаго количества кислоты, въ водѣ содержи-ся. Слѣдовательно она есть не что иное, какъ тонкое мыло, имѣющее въ себѣ растворяющую и гнилости сопротивляющуюся силу.

Когда въ Усаль въ 1744 году свирѣпствовала злая оспа, то я началъ давать младенцамъ предохранительныя пилюли, и имѣлъ счастье видѣть, что всѣ тѣ, кои оныя принимали, либо не имѣли оспы, либо имѣли весьма легкую. Съ такою же пользою оныя послѣ того употребляемы были и во всей нашей землѣ. Я еще не примѣтилъ, чтобъ оныя были безусѣбны, елики только сами родители наблюдали, чтобъ оныя порядочно были принимаемы. Оныя состояющія слѣдующимъ образомъ:

R. Colomel. rit. ppt.	Возми сладкой ртутки хо-
gr. XII.	рошо сдѣланной 12. гр.
Camphor. gr. VIII.	Канфары 8. гр.
Extract. aloes gr. XII.	Сабуринаго экстракта 12. гр.
Gumm. Guaiac. gr. XVI.	Бакауипной камеди 16. гр.
M. F. l. a. pil. pond.	Смѣш. сдѣлай поправилъ мѣ
gr. II. foliis argenti ob-	искусства пилюли лѣсомъ
ducendae D.	въ 2 грани, позолоти и
	надпиши:

М а

Пре-

Предохранительныя пилюли отъ оспы.

Сколько кому ихъ на каждой прѣемъ давать, должн о, сіе легко можно опредѣлить; ибо самый лучший прѣемъ будетъ тотъ, отъ котораго можешь послабить два или четыре раза въ день. Двухлѣтній младенецъ можетъ принимать по двѣ пилюли трехлѣтній по четыре, а пятилѣтній по шести за однимъ разомъ. Но еслили бы онъ былъ и старѣе семи или осми лѣтъ, то однократно не долженъ болѣе семи принимать. Еслили же отъ сего прѣема не слабитъ, то я прибавляю на каждый изъ нихъ по одному, либо по два грана ялановой смолы (гелла jalarrae), которую прежде того должно хорошо смереть съ миндалемъ. Сіи пилюли должно принимать по два раза въ недѣлю на пр. по вечерамъ въ Воскресенье и въ Среду; въ такомъ случаѣ онъ оказывающъ свое дѣйствіе въ Понедѣльникъ и въ Четвергъ прежде обѣда. При употребленіи оныхъ не должно бсть соеной пищи, и мясо кушать только въ обѣдъ. Выходить на открытый воздухъ, еслили захочется, можно только въ нѣ дни, въ которые пилюли не оказывающъ своего дѣйствія. Еслили только извѣстно, что уже оспа въ сосѣдствѣ находится, либо кто нибудь оную въ томъ домѣ имѣетъ, либо сообщенія съ тѣми людьми, которые въ зараженные оспою дома ходящъ, избѣгавать не можно: то потщасъ должно приступать къ употребленію сихъ пилюль, и продолжатъ оныя до тѣхъ поръ, пока она не минетъ, либо можно будетъ удостовѣриться, что иъ младенцу болѣе пристать не можетъ. Еслили же оставить употребленіе ихъ преждевременно то онъ не будущъ заразиною, когда воспослѣдуетъ злая оспа.

Ни-

Никогда не должно выписывать изъ Аптеки за однимъ разомъ великаго количества сихъ пилюль. Но канфара удобно улаживаетъ, а она по болве всего и способствуетъ къ предохраненію оныхъ. По сей причинѣ не пристаешь оспа, когда ея гной смѣшать съ помадою, имѣющую яб сею вѣ фару. Если же не будетъ въ ней канфары, то мож о о уо править, влирая ее въ пѣлу, смѣшавши же хорошо съ оспеннымъ гноемъ. А что сладк я ршупъ разжиживаетъ кровь, а наимене прочіе сѣки, то сіе явственно можно видѣть изъ наблюденій, мною въ сочиненіяхъ Королевской Академіи наукъ 1751 года на стр. 32 (на Швед. языкѣ) описанныхъ. По тому пилюли дѣйствительнѣ должны бышь противъ оспы, нежели простое са блѣтельное. Но что онѣ имѣютъ свою пользу, то сіе также явствуетъ изъ повѣствованій, изъ различныхъ мѣстъ сюда присланныхъ, и въ наши Вѣдомости (Lankes - Tidningar) помѣщенныхъ.

Даже я почти ни мадо не сомнѣваюсь, что каждый младе ецѣ, который только впрочемъ здороваго сложенія, крѣпокъ и имѣетъ твер ую кожу (ибо слабаго и нѣжнаго младенца должно приготовить больше лихорадочною коркою), непременно будетъ имѣть хорошую оспу, еслии 1) чрезъ четыре недѣли будетъ употреблять сіи пилюли; 2) чрезъ все то время мало будетъ употреблять питательной пищи и не много мяса; 3) всячески будетъ убѣгать сообщенія съ больными оспою; 4) какъ скоро оспою занеможетъ, снова очистишь свой желудокъ и кишки теми пилюлями; 5) и при томъ не укоснительно дозволишь себѣ на различныхъ мѣстахъ кожу лан-

пестомъ, либо булавою на рукахъ и ногахъ слегка подгараивать.

Последнее средство бываетъ нужнѣе, что мы примѣчаемъ, что, когда кто предъ начинаніемъ выступленія оспы ненарочно себя одараиваетъ иглою, то она въ великомъ количествѣ пообѣимъ сторонамъ ранки высыпаетъ (*). Равнымъ образомъ она высыпаетъ и въ томъ мѣстѣ, гдѣ прививка была. Сверхъ того я знаю одного мальчика, котораго въ сердцахъ мать, за день предъ выступленіемъ оспы, весьма выскла прутомъ; онъ сего столь хорошее произошло слѣдствіе, что на лицѣ была одна только оспина, а напротивъ того изобильно высыпала около рубцовъ, прутомъ произведен-

ден-

(*) Одинъ мальчикъ, которому мною прививка была оспа, разрѣзалъ себѣ прежде, нежели восполѣдовала горячка, средний перстъ на рукѣ, послѣ чего кругомъ раны высыпало весьма много не большихъ оспинокъ. — Равнымъ образомъ у одного мальчика, который весьма крѣпко себѣ перетянулъ ногу подвязкою, высыпало во кругъ онаго мѣста надъ коленнымъ весьма великое количество сливкоу оспы. Туже самую пользу, которую въ Швеціи привнесъ ударъ прутомъ, въ Швейцаріи оказалъ неосторожно на то же мѣсто, когда мальчикъ, обнаживши свою спину, задомъ слезалъ съ постѣли, пролитый чайникъ. Сии и другіе примѣры, доказывающіе полезное дѣйствіе дарапанія, можно читать въ менше извѣстныхъ, нежели какъ онѣ достойны, Швейцарскихъ писемъ (Von dem Erfolg der Einpfropfung der pocken in unserer Schweiz S. 100.), которыя точно такъ патристически написаны, какъ явствуетъ изъ ихъ надписи. М.

дейныхъ. По сей причинѣ вышепомянутое царапанье на кожѣ служило наилучшимъ средствомъ для сбереженія лица отъ оспы.

Въ Норландіи имѣютъ обыкновеніе, прививавать младенцамъ нѣсколько мускусу для предохраненія отъ оспы, естли она въ состояствѣ ихъ находится. Однако я осемѣ никакого вѣрнаго опыта не имѣю. Естли бы причину оспы были настоямыя, то бы еще можно ему приписать нѣкоторую вѣроятность. Впрочемъ одинъ изъ употребляемыхъ Китайцами способъ прививанія оспы, (ибо они прививаютъ оную различнымъ образомъ) ему нѣсколько противорѣчитъ. Они обкладываютъ одинъ гранъ мускусу большими двумя, либо малыми четырьмя оспенными струпами, и завернувши все сіе въ хлопчатую бумагу, вкладываютъ въ носъ. (*)

Другіе напротивъ того всегда тѣ тѣмъ же намѣреніемъ носилъ при себѣ ртуть. Веладостъ упоминаетъ объ одной Госпожѣ, что она плещетъ лѣтъ оную при себѣ носила, и осьмдесятъ лѣтъ прожила, никогда не имѣвъ оспы. Онъ самъ такъ же носилъ при себѣ ртуть для самой сей причины, и на семидесятомъ году отъ рожденія еще не имѣлъ

М 4

оспы.

(*) Въ опытахъ, изданныхъ Стокгольмскимъ Хирургическимъ Собраніемъ 1769 года въ Стокгольмѣ, похваляется въ оспѣ плодѣнное сало. Выжавши изъ оного масло, даютъ, коль скоро кто заболитъ на оспу, два раза въ день по нѣскольку капель, и продолжаютъ сіе до тѣхъ поръ, пока она со всѣмъ выступитъ: отъ чего утверждается, чие она бываеши рѣдкая и легкая.

вспы. Онъ думалъ, что ртуть даетъ отъ себя на тѣлѣ такую испарину, которая прогоняетъ насѣкомыхъ. Ибо онъ считалъ, что отъ оныхъ за-виситъ ося моровая язва, и прочія сыпи. Что изъ ртути выходитъ испарина, то се весьма вѣроятно. Ибо естли оной нѣсколько вдѣлъ на блюдо, и подолжитъ возлѣ оной дождевого червя; то точасъ можно примѣнить, что она ему весьма пропитна, и онъ, сколько можно удаляясь отъ нее изъ край блюда. Впрочемъ естли сии сред-ства не слишкомъ полезны, то на крайней мѣ-рѣ и вредны (*). Оныя многимъ, которые безъ того должны бы всегда пребывать въ безреспан-номъ опражѣ, приносятъ душевное спокойствіе, при томъ же они и безбеспокойны.

За нѣсколько лѣтъ предъ симъ прибыла изъ Финландіи въ Стокгольмъ одна замужняя женщи-на, въ намѣреніи открыть Двору испытанное ею средство, имѣющее ту пользу, что ося отъ она-го должна быть въ меньшемъ количествѣ. Увѣдо-мили

(*) Обыкновенно таковыми лѣкарствами стара-лись избавиться отъ осы знатные люди такъ, какъ Арнолдовичъ кошелькомъ отъ поспрѣлу. Однако на послѣдокъ се предразсужденіе уничто-жилось, когда примѣчено, что нѣкоторые и изъ тѣхъ, кои оный при себѣ носили, умирали поспрѣломъ. Впрочемъ можно позволить жела-ющимъ се пробовать; только бы не предвидѣлось отъ подобныхъ сему лѣкарствъ худыхъ слѣд-ствій такъ, какъ се случилось съ пѣми, кои, для предохраненія себя отъ моровой язвы, поку-пали привѣски изъ мышьяку и носили оныя на трудѣ. (Vid. Dietrichbroeck de peste L. 4. p. 319.)

мили меня о семъ и сказали, что оно состоитъ въ томъ, чтобъ больной осною на себѣ носилъ вмѣсто бѣлья кармозинъ, и онымъ бы покрывалъ свое лицо. Я похвалилъ доброе ея намѣреніе, однако сіе средство счолъ за бесполезное. Послѣ я узналъ, что Г. Мигъ въ Базилѣ, для защищенія лица отъ оспы, велѣлъ одному мальчику, которому имѣя привита была оспа, съ самаго нячада торячки лежать въ кармозинныхъ чулкахъ, сдѣланныхъ безъ подошвъ. Онъ думалъ, что слабое преніе или чесаніе, которое они будутъ причинять кожѣ, и удерживая испарина принадлекутъ оспу къ ногамъ. Какъ только пришло время вышупленія оспы, то онъ велѣлъ сн чулки скинуть, въ надеждѣ увидѣть на ногахъ великое множество оспы: но сколь велико было его удивленіе, когда онъ увидѣлъ только двѣ оспинки. Но послѣку шло порядочно было приготовлено, и испускающіе изъ себя испарину скважины посредствомъ банъ и мытья хорошо были открыты: то онъ заключилъ, что оспенная матерія въ большемъ количествѣ сквозь оныя выпда. Для того вздумалъ еще совѣтовати, оныя чулки внутрь посыпать лѣкимъ нибудь раздражительнымъ порошкомъ, какъ на пр. горчишною мукою (смотри Zutschel's Abhandlungen B. 3. S. 103). Послѣ того когда самъ сіе попросовалъ, то велѣлъ сдѣлующаго же утра оныя чулки скинуть. Ноо младенцѣ не въ состоянн былъ оносить происходящаго отъ того жару (на выше упом. мѣст. стр. 121).

Разумный и усердный врачъ Г. Кас. Медикусъ долгое время прилагалъ стараніе, какъ бы излечить

бить оспу; нанослѣдокъ остался въ такомъ мнѣ-
ніи, будто онъ изобрѣлъ пристойное для сего
средство, (оное имъ описано во второй его книгѣ
наблюденій на стр. 822.). Онъ началъ, когда сви-
рѣствовала весьма злая оспа, давать своимъ боль-
нымъ одну шольку настойку изъ лихорадочной
корки (Tinctura chinæ mae); однако приступалъ къ
сему не прежде выступленія оспы; и примѣшилъ,
что оная онѣ шого была легче. Послѣ онъ давалъ
также оую одному полугодовому младенцѣ, и съ
самаго начала съ такимъ успѣхомъ, что примѣ-
чены были шолько двѣ оспинки (тамъ же стр.
726—732). Сіе побудило его поступить далѣе. Онъ
зналъ, что оспенная горячка есть воспалительная,
и думалъ вмѣстѣ съ Буртавомъ, что естли толь-
ко оную утишить, то не восплѣдуешь никакой
сыпи. По сей причинѣ онъ съ самаго начала пред-
писываетъ все то, что почитается полезнымъ
въ воспалительныхъ горячкахъ, а именно: кроо-
пусканіе, мягчительныя промывательныя, сѣмян-
ное молоко, съ охлаждающими лѣкарствами смѣ-
шенное, и избыльное питье ячяго взвару. Виро-
чемъ въ его изобрѣтеніи то ошмѣнно, что онъ
употребляетъ при этомъ и лихорадочную корку,
чего прежде его никто не дѣлалъ, или не осмѣ-
лился дѣлать. Не безъ причины онъ старается,
естли шото шребуетъ надобности, впервыхъ
очистить желудокъ посредствомъ рвотнаго; по-
тому что лихорадочная корка никакой пользы не
принимаетъ, когда оный бываетъ наполненъ клей-
костью, желчью и сыростями. Естли же подоб-
ныя нечистоты находящіяся въ кишкахъ; то онъ
пред-

предписываетъ слабительное изъ Манны, Индійскаго Тамару и не большаго количества порошка корня Ялаппы; либо дасть Магнезію и перечищенный винный камень въ сѣмянномъ молокѣ. Еслили же первая горячка не слишкомъ жестока, то только смѣшиваетъ съ слихорадочною коркою перечищенный винный камень. Но еслили паче чаянія выступитъ оспа, то совѣдуетъ приложить нарывный пластырь съ тѣмъ намѣреніемъ, чинооъ посредствомъ оного привлечь оспу къ такому мѣсту, гдѣ бы она не могла причинить вреда, и гдѣ бы гной свободно истекалъ могъ.

Все сіе по видимому не худо; однако время покажетъ, имѣетъ ли оно съ опытами сходство. (*) Сколько я вижу, то Г. сочинитель сего не пробовалъ въ 1765 году, но заключающъ обо всемъ по одному только умствованію, по полезности сего способа въ воспалительныхъ горячкахъ (Смолпр. тамъ же стран. 452 и 464.), и по сходству въ разсужденіи кори, красной сыпи и горячки съ пиянами. Онъ совѣтуетъ также сіе попробовать на шеспи младенцахъ сряду и примѣчать, будетъ ли хотя одинъ изъ нихъ имѣть на себѣ сыпь.

Покойный Профессоръ Монро повѣствуетъ (Journal des Sçavans 1776 Janv. p. 218), что одна женщина, когда въ околѣности ея свирѣпствовала

(*) Г. Шерръ (Ueber die Empfindung der pocken Zurich 1779) точно пробовалъ предписанный Г. Медикусомъ способъ; давалъ въ оспѣ лихорадочную корку, и изъ наблюдений узналъ, что онъ полезенъ М.

Злая злая оспа, велѣла своимъ дѣтей ежедневно
жунашь въ ваннѣ, съ можжевельными ягодами съ-
ланной, и курить можжевельникомъ въ ихъ гор-
нищахъ. Дѣйствіе сего было то, что ни одно изъ
осьми или девяти ея дѣтей оспою не заразилось,
и что даже и въ то время, когда уже они сами,
имѣя собственныхъ дѣтей больныхъ оспою, за-
ними ходили, она къ нимъ приставать не могла.
Я бы о семъ здѣсь умолчалъ, если бы не такъ
великій человекъ, каковъ Монро (*), совѣтовалъ,
повторить сей опытъ.

Впрочемъ самое надежнѣйшее средство для
ошвращения худыхъ слѣдствій, отъ оспы зави-
днѣлъ, состоитъ въ томъ, чтооу оную моло-
дымъ дѣтямъ прививать, (**) а именно тѣмъ
способомъ, который теперь въ Англіи употре-
бляется (**).

Въ сѣ-

(*) Собственное повѣствованіе сего славнаго мужа
можно читать въ его сочиненіи: *Account on the
Inoculation of small-pox Scotland* стр. 9 въ оп-
ыткахъ. М

(**) Тѣмъ, кои желаютъ обстоятельное о семъ
имѣть свидѣніе, я совѣтую читать простран-
ное и краснорѣчиво написанное письмо Г. Проф.
Давида фонъ Шулценгейма (*Vänsele am Karp* съ
утрачено); и сокращеніе, взятое изъ сочиненій г.
Ханса (*Ellis ar I getique* и проч.), которое г. Оверъ
Гюфредигеръ Роленъ выдалъ подъ слѣдующимъ
заглавіемъ: *Svar på de Iakst, som et om föda Chri-
stn odoms pligt är ob förliga utofning förgälligt imne-
te, plagar göra emot Koppvaxningen*. Оба сіи сочи-
ненія печатаны въ Стокгольмѣ въ 1756 году.

(***) Записки г-на Мэри Ворманъ Мундтгоу пер-
вогъ класса въ употребленіе въ Европѣ прививаніе
оспы.

Весьма скучно казлый разъ чрезъ все время продолженія ослы упоиреблять порошокъ, сосна-
ваенный изъ ртутки и свѣты (*Aethiops mineralis*), ли-

60-

осны. Она, будучи въ Константинополѣ, велѣла
оную привить своему шестилѣтнему сыну; а по
и, вышши въ Англію велѣла также въ 1722 году
и инды и дочерѣ. Впрочемъ еще и прежде то-
го по повелѣнію оиѣ Двора сіе пробовано было
на шестиплѣнныхъ осужденныхъ на смерть съ
благополучнымъ успѣхомъ, которые чрезъ то
и освобождены отъ смертной казни. Блажен-
ной памяти Король Карлъ XII. велѣлъ, во время
своего пребыванія въ Бендерахъ, о способъ и
благополучномъ успѣхѣ приизнанія ослы въ Туре-
дѣи сочинить обстоятельную Исторію и пере-
слалъ въ Стокгольмъ. Однако мнѣ не извѣстно,
пользовался ли кто оною. Не лзя какъ безъ
досады, такъ и безъ смѣху себѣ представитъ
тѣ многочисленные вымыслы, которыми въ
Англіи ненавидяще прививанте ослы спарались
отъ онаго чернѣ отвратились. Между прочими
одинъ неразумный человекъ, именемъ Юнесъ,
писалъ, что его дочерѣ хотя и благополучно
принята была ослы; однако она чрезъ три не-
дѣли шорично заразилась естественною оспою.
Впрочемъ на вопросъ Д. Журена въ своемъ къ
оному письмѣ при уличенъ былъ признаться,
что онъ даже и не знаетъ, что такое естѣ
прививанте, и что онъ никогда не прививалъ
ослы своей дочерѣ. Кириватрикъ все сіе писъ-
мо отъ слова до слова въ новомъ изданіи своей
книги (*Analys* р. 147.) помѣстивъ. Въ Швеции
никто явно не опровергалъ прививанія ослы. О-
днако ітай о уловательно оное невидѣли; но
воротиваемы были въ знатные дома письма,
подъ именемъ Г. де Ласи, сочиненныя нѣвѣдомо
кимъ.

го предохранительныя инакомъ, либо смольнымъ
маслу. И слишкомъ отважно бы было, подве-
ситься себя себѣ, не пригласивъ своего пѣла къ
столь опасной болѣзни. Еслили же предохранить
себя

къмъ. (Еще больше сіе утверждаетъ Шведскій
переводъ Оуасилюмъ сего ученаго мужа, кошо-
рый безъ имени напечатанъ въ 1764 году).
Въ 1761 году распускали слухъ, будто въ раз-
личныхъ домахъ у самыхъ пѣхъ дѣтей, кото-
рымъ уже привита была оспа, вторично откры-
валась злая. Но когда я, для изслѣдованія не-
птинны, посѣщалъ сихъ родителей и видѣлъ
ихъ дѣтей, шо узналъ, что шо была одна
только выдумка. Сіе самое и многія изобрѣ-
щенныя въ Англіи бредни заславили меня
думать, что и пѣ примѣры, о которыхъ изъ
другихъ мѣстъ писали, равнымъ образомъ бы-
ли неосновательны.

Желающіе знать начало, успѣхъ и продол-
женіе прививанія оспы въ Швецію, равно какъ
и имена пѣхъ, кои своимъ уваженіемъ и по-
собіемъ оное зашцидали и вводили, могутъ чи-
тать рѣчь Г. Проф. І. А. Муррея, въ 1763 году
напечатанную въ Геттингѣ. Кроме того еще
проспраніе и особливымъ порядкомъ написалъ
Исторію прививанія оспы въ ономъ Королевствѣ
сей же сочинитель, и прибавилъ къ оной многія
примѣчанія до самаго начала 1767 года (*Nilona
infectiois variolatum in Suecia 1767 p. 8*). Никто тамъ
не оказалъ чрезъ прививаніе оспы никакой поль-
зы, какъ Г. д. Гастъ, который въ одинъ годъ
привилъ оную 229 младенцамъ болышею частію
изъ прѣстныхъ людей въ Ёстербошнѣ. Не мож-
но шакъ же въ семъ случаѣ довольно выхвалити
приложеннаго опѣ верховной власти старанія,
которая какъ Врачей, шакъ и народъ столь
усер-

себя отъ оной до самой спарости, и напоследокъ
ею заразиться, по тѣмъ опаснѣе. Оною можно
заразиться, путешествуя въ чужихъ краяхъ, на
дорогѣ, либо въ кнарширѣ, либо и въ шакихъ
мѣ-

Усердно къ прививанію оспы поощрила. (Можно
о семъ читашъ въ здѣшнихъ вѣдомостяхъ (Ити-
кез Tidningarne N. 86). Равнымъ образомъ и Коро-
левская Медицинская Коллегія безпрерывное о
семъ имѣла попеченіе и Г. Провинціальнымъ Вра-
чамъ рекомендовала, усусыпно о томъ спа-
раться. Въ семъ наміреніи посылала она Г.
Докторовъ: Нордблада, Амана и Салбера въ
Норрландію, а Г. Д. Екмарка въ Южную Готт-
ландію, гдѣ оными весьма многимъ дѣтямъ
изъ черни привита была оспа. Г. Д. Велинъ
такъ же съ великою пользою прививалъ оную
всѣмъ, кого только способнымъ для сего сы-
скасть могъ въ Енкепингѣ, и при томъ всѣмъ лѣ-
пимъ, изъ разныхъ деревень ежедневно привози-
мымъ. Хотя всѣмъ тѣмъ, которымъ при-
вина была оспа, дозволено было выходить на
открытый воздухъ; однако отъ того зараза не
распространялась. Одинъ мужчина, къ кото-
рому не пристѣла оспа чрезъ прививаніе, здра-
вился оною отъ того, что жилъ почти въ од-
ной горницѣ съ своею сестрою, имѣвшею привив-
ную оспу. Я не считаю за нужное болѣе вы-
числять здѣсь имена Врачей: ибо каждый изъ
нихъ на своемъ мѣстѣ доказалъ, сколь они для
Государства полезны какъ прежде были, такъ
и теперь суть. — Все число тѣхъ, кѣмъ до
означеннаго времени привитъ была оспа, по пок-
занію Врачей въ ихъ вѣдомостяхъ, (которыхъ
однако Г. Муррай въ своемъ письмѣ толково до бзъ-
вычислялъ) состоитъ въ 100 душахъ хотя
то еще гораздо больше въ ихъ было, если бы
всѣ

мѣстахъ, гдѣ не можно сыскать ни Врача, ни лѣкарствъ, ни хорошаго присмотру. Можно ее получить сверхъ чаянїя въ самые жары лѣтомъ; изнуривши свое тѣло другими жестокими болѣзнями, либо долговременнымъ бдѣнїемъ, или трудами; въ то время, когда свирѣпствуютъ другія опасныя повальныя болѣзни, какъ на прим. красная сыпь, колотье въ боку, легочника, горячка съ язвами; когда приведено тѣло въ разстройку горячими напитками, излишнею либо вредною пищею; и когда оное наполнено нездоровыми соками. Наипаче женщины должны вѣлѣть себѣ привить оспу потому, что онѣ отъ естественной могутъ лишиться всей своей красоты, и могутъ ею заразиться въ самой беременности, либо въ родахъ, и въ такомъ случаѣ могутъ подвергнуться опасности какъ самимъ собою, такъ и

раз-

все Врачи дали о немъ свои описанїя. Съ сего времени прививанїе оспы въ Швеции съ толковою же, или еще и съ болѣею ревностію продолжается. Г. Гастъ больше всѣхъ оную прививалъ. Ибо онъ до Іюня мѣсяца 1769 года (*Collegii Medici Berât l'le rolande Med.inal-verkeis tilfând i Åket 1769 sidan 351.*) прививалъ 593 душамъ въ Эстерботъ. Но съ счастїемъ сего былъ Г. Аманъ (тамъ же sidan. 443), который въ случившемся ему пути въ Норландію 1768 и 1769 годовъ почти въ одинъ годъ прививалъ 280 душамъ. Г. Проф. Фонъ Шульценгеймъ (тамъ же in. С 4) считавшій имъ привитыхъ по оное время 333, между которыми были и знатныя люди дѣти. Можно такъ же считать между Прививавшими оспы и женщину Кнужскую Денкербергъ (*Med. V åket. S. 397.*), которая привила оспу 53 душамъ. М.

раждаемый ими плодъ. Примѣры тѣхъ, кои отъ оспы лишились зрѣнія, слуха или произвошенія словъ, должны насъ побуждать, съ благодареніемъ принять сѣ средство, отвращающее всѣ оныя бѣдствія. Начальствующимъ извѣстно, что въ Швеціи оспа похищаетъ десятую часть младенцевъ (*).

По

(*) Членъ Королевской Коммисіи разсматривалъ духовныхъ реестровъ сообщилъ мнѣ нижеслѣдующее число умершихъ отъ оспы и кори въ 16 лѣтъ, а именно :

годъ.	муж. пола.	жен. пола.	и всего.
1742 — —	3659	— — 3616	— — 7275.
1750 — —	3838	— — 4015	— — 7853.
1751 — —	3360	— — 3393	— — 6751.
1752 — —	3398	— — 5514	— — 10912.
1753 — —	4362	— — 4570	— — 8932.
1754 — —	5103	— — 5288	— — 10391.
1755 — —	3680	— — 3794	— — 7444.
1756 — —	5868	— — 5960	— — 11828.
1757 — —	5643	— — 5660	— — 11308.
1758 — —	3979	— — 3913	— — 7892.
1759 — —	2543	— — 2629	— — 5172.
1760 — —	2276	— — 1415	— — 4691.
1761 — —	3761	— — 3884	— — 7945.
1760 — —	6088	— — 6324	— — 12412.
1763 — —	3180	— — 3138	— — 6318.

Всего 71292. 72902. 144194.

НВ. Во все сѣ время родилось въ цѣломъ Королевствѣ дѣтей 1,391,233, т. е. мужеска полу 709090 и женска 682143. Слѣдовательно мальчиковъ отъ оспы и кори умерло по одному изъ каждаго десятика, а изъ дѣвочекъ по одной изъ девяти, или до 100 изъ 936, ибо объ сѣ болѣзни въ нашихъ

Н

ре-

Что сему сколь великъ сей убытокъ для Государства, причиняемый оскуднѣемъ народа! Слѣдовательно они должны собою подавать примѣръ нижшимъ. Ежегодно теряешь оспою и жорью около 9000 душъ для пространный Швеціи, есть не маловажная вещь. Мы должны возбуждать себя примѣромъ другихъ спасенныхъ народовъ, которые уже сіе средство приняли и нашли оное невиннымъ, полезнымъ и надежнымъ противъ оскуднѣнія народа. Совѣты такъ же Врачей, возможнымъ образомъ сіе разумѣющихъ, есть смѣло сказать, не должно почитать замаловажные. Словомъ: прививаніе оспы одобряетъ не только умствованіе, опытность, но и законъ и вѣра. Обыкновенною оспою умираетъ одинъ изъ семи (*). А въ Лондонскомъ гошпиталѣ, въ которомъ лежали больные естественною оспою, умирали два изъ десяти. И за нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ Ко-

респираторъ подъ одною стѣною означаются, хотя бы и должно раздѣльно писать. Но какъ отъ кори гораздо меньше умираетъ, нежели отъ оспы, то послѣдніе составляютъ большую часть въ данномъ числѣ.

(*) Г. де ла Кондаминъ (Lettre de M. Maty 1763) говоритъ, что во Франціи умираетъ отъ оспы ежегодно по 3000 душъ, и что каждый годъ чрезъ прививаніе можно избавить отъ смерти 2500. Мы ему такъ же должны жизнью тѣхъ, которые чрезъ прививаніе оспы отъ смерти избавились. Ибо посредствомъ его письма, его Снятемельствомъ, Королевскимъ Совѣтникомъ. Графъ Шефферомъ привезеннаго, сіе дѣло въ Королевскомъ совѣтѣ получило ободреніе и заступу.

Королевской Гвардіи здѣсь умерло оспою 270 изъ 300 младенцевъ. Прививною же оспою напротивъ того умираетъ одинъ изъ 250, 425, либо 500, а естли хорошо къ сему прежде приготовами тѣло, и доставишь больнымъ хорошее смощрніе; то, можешь быть, и изъ многихъ тысячей ни одинъ не умретъ. Въ обыкновенной оспѣ большее количество оспия бываешъ на лицѣ, а въ прививной больше на рукахъ, и нѣкоторая часть гною вытекаетъ вонъ (*) чрезъ здѣлаыныя во время прививанія оспы ранки. Впрочемъ сіе кажется не уменьшаетъ сыпи, естли онѣ прежде оной не слишкомъ много оного изъ себя источаютъ. Объ естественной оспѣ утверждаютъ, что она можешъ нѣсколько разъ одному и тому же человеку приесть, хотя не только я, но и искусные Врачи: Бургавъ, Меадъ, Хиранъ, Мелинъ и другіе Шотландскіе и наши никогда сего не примѣтили. А что касается до прививной, то изъ нѣсколько тысячей ни на одномъ такового точнаго примѣра не было (**). Ибо мы не извѣстно, чтобы

Н а

у

(*) Утверждаемое Г. Гандогеромъ де Фогани (Traité de l' inoculation p. 278) кажется не на опытахъ основано; однако стоишь того, чтобы оное по-пробовать.

(**) Что прививаніе оспы было не дѣйствительно надъ двумя сестрами, которыми прививалъ покойный Лейбмедикъ Редереръ, то сіе упоминаетъ Г. Профессоръ Врисбергъ въ своей Программѣ (de infectione variolatum momenta paulula 1765.) Г. Фогани такъ же повѣствуетъ, что Г. Рихардъ де Гаушдесиркъ одному человеку целый годъ

у кого либо изъ шѣхъ, кои имѣли прививную оспу 1) край ранки, гдѣ она была привита, не нагноилась, 2) въ 7. 8. либо въ девятый день не воспослѣдовало никакой горячки, и 3) послѣ въ меньшемъ или въ большемъ количествѣ не высы-

пала

годъ чрезъ 14 дней прививалъ оспу; однако только первый разъ она была привита съ успѣхомъ, а прочіе безъ всякаго дѣйствія. Оный молодой человекъ такъ же въ здоровьѣ чрезъ шо не потерялъ никакого вреда. Д. Матти велѣлъ самому себѣ привить, однако безъ успѣха, по тому что уже прежде того онъ перенесъ естественную. Г. Гаппи утверждаетъ, что еслили шотъ, кому привита была оспа, однажды оную получить; то у него оспенный гной можетъ произвестъ оную вторично, а сей ея гной можетъ въ третій разъ и такъ далѣе; однако таковой оспы никогда не бывало. Еслили спрашивается, можетъ ли безопаснѣе быть отъ оспы шотъ, кому она была привита; то Г. Гандоеръ де Фвагги совѣтуетъ посмотреть, каковъ рубецъ послѣ прививной ранки, круглъ ли онъ, продолговатъ ли, великъ, и лоснящійся ли? Еслили онъ таковъ, то сей человекъ имѣлъ дѣйствительно оспу, и не имѣетъ причины, болѣе оной опасаться. У одного Арана, которому прививалъ оспу Г. Проф. Фонъ Шульценгеймъ, сначала я нашолъ рубецъ бѣловатымъ, однако онъ вскорости почернѣлъ. Г. Губерденъ (*Medical-Transactions Vol. 1.*) коморый весьма хорошо описалъ дикую оспу (*Chicken-pox*), приводитъ еще одну причину бывающей послѣ прививанія другой мнимой оспы (р. 433.) думая, что, по великому сходству дикой оспы съ настоящею, обманывающа и прививаютъ первую. Ибо и сія

до-

нада оспа, нѣсколько оной не изгноилось, не желѣшало, не созрѣло и не покрылось струпомъ; а оный напослѣдокъ не оппалъ; либо 4) въ недоспалкѣ сыпи не испекалъ изъ оной ранки въ великомъ количествѣ и чрезъ долгое время гной (*).

А что испекajúщая мокрота есть настоящій
Н 3 оспен-

довольно заразительна, и пристаётъ такъ же однажды только въ жизни. Но какъ она не можетъ предоберечь отъ настоящей, то легко видѣшь можно, что прививаніе ложной оспы не избавляетъ отъ будущей естественной дѣйствительной. М.

(*) Посредствомъ новаго способа прививанія оспы свѣжимъ гноемъ, въ ранки вкладываніемъ и позволеніемъ больному пользоваться прохладнымъ и свободнымъ воздухомъ, можно избѣгнуть многихъ припадковъ; а при всемъ томъ съ почти полною заключать можно, что больной дѣйствительно оную перенесъ. Равнымъ образомъ нѣ самые вѣрнѣйшіе признаки совершенно прошедшей оспы, которые я примѣнилъ у имѣвшихъ послѣ прививанія оную, и въ самомъ легчайшемъ спсении, описываю я въ моихъ *Observat. et animadvert. sup. variol. infect. Saturni test. l. p. 10*. Самонужнѣйшіе изъ оныхъ повторяю я здѣсь въ моей рѣчи (*med. Bibl. 3 B. S. 473*), 473), и именно: „Сколько я опытомъ дозналъ, что горячка бываетъ самымъ вѣрнѣйшимъ признакомъ, которую однако трудно узнать по бшенію жилъ и по внутреннему жару. Ибо какъ то, такъ и другое, еспли холодно содержанъ больного, часто примѣнно бываетъ только въ вечеру, когда онъ уже лежипъ въ постѣлѣ, и потому часто объ оной заключать должно по однимъ только рѣчамъ няньки. Но сопровождающіе оную припадки лучшимъ доказательствомъ

оспенный гной, но сіе довольно яствуетъ изъ того, что оною съ наилучшимъ успѣхомъ оспу прививашь можно, какъ сіе испытали Г. Ваалъ и Гиббесъ (Смотр. Киркпатрикъ на вышеупом. мѣст, стр. 164. и 413.). За четыре года предъ симъ прививка была оспа одной знашной Госпожѣ, опъ чего у нее было только одиннадцать оспинъ. Но хотя она, спустя нѣсколько времени послѣ того, спада съ

своею

щельствомъ. Для того я многократно безошибочно, какъ исчисленіе дней послѣ показало, заключалъ, что уже наступила горячка, когда мнѣ кромѣ моего освидѣденія рассказывали, что больной, бывъ прежде того чрезъ многія ночи покоевъ, послѣ весьма худо спалъ; и сіе все пономъ подтверждалось слабостію, склонностью лежать яъ постлѣ, головною болью, рдѣніемъ щекъ, изгагою, либо рвою, болью въ спинѣ, либо въ поясницѣ, нечислымъ языкомъ и противнымъ запахомъ изо рта, каковъ происходилъ опъ многочисленной оспы. А еще больше о семъ удостовѣрену быть можно, когда оспа, сколь бы она въ маломъ количествѣ ни была, дѣйствительно нагноилась. Однако сего часно не примѣчается, когда не сильная оспа бываетъ, потому что многіе изъ продачныхъ пузырьковъ сами собою пропадаютъ, а другіе хорошо уже завосприившись и нагноившись, по нетерпѣливости больныхъ раздарапываются. Что же касается до ранъ, гдѣ прививка была оспа; то онѣ обыкновенно, естли произведены однимъ только прокалываніемъ посредствомъ инструмента, покрывающа круглымъ пузырькомъ, подъ которымъ послѣ того нагнаеишя нѣсколько гною, и оный потомъ высыхаетъ и прорывается.

своею двояродною сестрою, больною оспою, чрезъ нѣсколько недель сразу, подъ однимъ одѣяломъ, однако отъ того оною не заразилась. Г. Проф. Фонъ Шуценгеймъ привилъ оспу 37 младенцамъ въ больномъ дѣтскомъ домѣ въ Стокгольмѣ. Но когда другіе 17 младенцевъ, спуская послѣ того три года, получили естественную оспу, изъ числа коихъ 9 и умерло: то первые хотя въ одной сѣвими горнищѣ находились, однако ни, мало оною не заразились.

Естьли кто не имѣетъ расположенія въ оспѣ (*), то прививаніе оной надъ нимъ оспается безъ дѣйствія. Однако она избавляетъ его отъ всегдашняго страха и сумѣнія, въ которомъ онъ въ противномъ случаѣ находился бы (**). Мы на

Н ↓

иску-

(*) Сие расположеніе у тѣхъ, кои еще не имѣли оспы, не всегда бываетъ въ одинакой спешенн. А отъ сего и происходитъ, что люди, обращающіяся съ больными оспою, иногда не заражаются оною, а иногда заражаются. Сие самое такъ же бываетъ причиною, что при вторичномъ прививаніи, когда въ первой разѣ оное было не дѣйствительно, не можно довольно имѣть осторожности. Мошно читать о семъ примѣчанія достойный примѣръ Г. Кавалера Фонъ Акредя (Fonitaining of provincial Doctorgesam Veratteler 1765 S. 253), и другой Г. Проф. Фонъ Шуценгейма (in d. ang. schr. S. 10). Послѣдній сочинитель весьма резонно совѣдуетъ потомъ испытывать, не дѣйствительноли ли оспенный ядъ извѣстныхъ людей для шѣла однихъ, нежели другихъ? М.

(**) Г. Галлеръ въ 1757 году велѣлъ приготовить къ прививанію оспы свою дочь чрезъ 4 недели. Хотя ей еще не было 15 лѣтъ; однако
ода

искушаемъ Бога чрезъ прививаніе оспы; не противимся тѣмъ его воля; не отвѣживаемся чрезъ то просить у него чудесъ: но надѣясь на милосердную его помощь, прививаемъ оную со всякимъ раченіемъ такъ точно, какъ бы употребляли и другое какое либо предохранительное средство, или извѣстное лѣкарство для отвращенія жеснокой, опасной, вовсе не избѣжной и часто смертоносной бѣзвны. Мы не отрицаемъ симъ противъ Провидѣнія, но употребляемъ такое средство, которое Всевышній благоволилъ намъ открыть, и помощію котораго многія уже тысячи людей избавлены отъ смерти. Слѣдовательно, еслии кто умираетъ естественною оспою, то совѣсть насъ изобличаетъ должна, что мы такое средство пренебрегли и осмѣили, котораго бы могло его спасти отъ смерти. (Смолр. о семъ письмо Графа Тессина къ Ея Высочеству прежде бывшей Шведской наслѣдственной Принцессѣ, Часть 2. стр. 192).

Я не счишаю за нужное, описывать здѣсь болѣе причинъ для поощренія моихъ соотечичей къ прививанію оспы, потому что оное уже съ столь удачнымъ успѣхомъ въ Або и въ Упсалѣ, и въ

Мартѣ

она уже имѣла мѣсячное кровоочищеніе. Въ сіе время употребляла она одну только расшительную иицу, сивила въ воду ноги и принимала слабительныя лѣкарства. Три раза прививали ей оспу, однако безъ всякаго дѣйствія. Послѣ того вышла она замужъ, родила семерыхъ дѣтей, и хотя болѣею частію, когда они болѣли были оспою, сама за ними имѣла смотрѣніе, однако не заразилась. (Vid. ejus forise, шн Т. 3. р. 356)

Мартъ мѣсяцѣ 1757 года въ Стокгольмѣ въ знатномъ домѣ (*), котораго примѣру конечно они budú събдѣовашь, принято (**); но за долготу мой только поспѣваяю коротко сказать, какимъ образомъ она прививается.

Н 5

1)

(*) Я здѣсь разумѣю Г. Гофмаршала де Геръ, который, съ согласія своей супруги Баронессы Риббингъ, рѣшился, привить оспу четыремъ своимъ дѣтямъ. Сте Его Сіяшества, Королевскому Совѣшнику, Графу Тессину такъ понравилось, что онъ въ память велѣлъ сдѣлать медаль, и на одной сторонѣ оной написать: *sublato iure posendi*; а на другой: *ob infantis civium felici ausu servatos*, съ именемъ Баронессы.

(**) Что уже и воспослѣдовало, какъ явствуетъ изъ репортровъ отъ провинціальныхъ Докторовъ, въ Медицинскую Коллегію присланныхъ (*Provincial - Doctoratus til Konigl. Coll. medicum in lämnade berättelser, rörande dets ämbetes - Författningar, Stockholm, 1761. 8*).

Напоследокъ дождались мы и того желаннаго времени, въ которое прививаніе оспы принято и въ Королевскомъ Дворѣ, и всѣ 5 Ихъ Высочества, молодые Принцы, въ 1769 году, къ великой всего Королевства радости, посредствомъ онаго, легкую и благополучную перенесли оспу. Сначала четыремъ Принцамъ она была привита въ одно и тоже время, а пятому (ш. е. Принцу Карлу) по прошествіи нѣсколькихъ недѣль. Всѣ они вообще разбаливались въ пятый день. Четыремъ привита была посредствомъ небольшого и слабого нарывнаго пластыря, а одному (ш. е. Принцу Фридриху Адольфу) прорѣзали въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ самъ указывать позволялъ. Ранки оныя у всѣхъ были одинаковы, и струпъ на нихъ, за день прежде выступавшій оспы, (что было въ осьмый день)

по-

а) Оспу можно прививать во всякомъ возрастѣ молодымъ, взрослымъ, старымъ людямъ и новорожденнымъ младенцамъ (*). Однако послѣднимъ прививать я, хотя бы у нихъ и испражнений

получилъ темный свинцовый дѣвиль. Во время приготовления всѣ наблюдали порочную дѣлупу чрезъ двѣ недѣли, и принимали пилюли изъ сладкой ртутки, жедтосурмянной сѣры (*fulphur aurat. tert. praeparationis*), канфары и бакаушовой камеди (*G. Guaiaci*), по дважды вѣ недѣлю, а послѣ того день спустя легкое слабительное, по вкусу каждаго приготовленное.

(*) Поелику не оспоримо, что возрастъ много способствуетъ къ удобнѣйшему перенесению оспы, и что младенцы и прежде того времени, которое наиспособнѣйшимъ для прививанія починается, оную получить могутъ: но не безъ причины Врачи вѣ новѣйшія времена старались опредѣлять шотъ возрастъ, вѣ кошоромъ именно съ наименьшею опасностію можно оное употребить. Г. Мати еще вѣ 1761 году (*Verhandelinge door de Holl. Maatsch. d. Wetk. часть 6 стр. 327*) а послѣ того вѣ вышеупомянутыхъ *Med. Observationes circa inocul. variol. in neonatis et Cont. 1. 2.*) весьма былъ опваженъ, что осмѣливался на однопдневныхъ младенцахъ оную прививать. Хотя Шведскіе Врачи еще до сего не опважались, однако извѣстно мнѣ изъ новѣйшихъ уведомлений, что иѣкоторые ниже полугодовымъ

ленъ былъ уже первый дѣтскій каплъ, и безопасны они были отъ тяжелаго прорѣзу зубовъ, не совѣщевалъ бы. Ибо ихъ нервы весьма бывають чувствительны, и они весьма бывають склонны къ судоргамъ, на которыя во всякое время смотрѣть непріятно. Впрочемъ извѣстно мнѣ, что Г. фонъ Шульценгеймъ многократно былъ принужденъ се предпринимать, и имѣлъ въ томъ успѣхъ; знаю такъ же и то, что Г. Д. Мани (*Medical observations and inquiries vol. 3. p. 187.*) се правильными утверждаетъ причинами; равно какъ и Г. Д. Лохеръ (*observationes pract. circa inoculationem variolarum in neonatis institutam, Vin. doct. 1768*) въ Вѣнѣ въ 1768 году 34 новорожденнымъ младенцамъ прививалъ оспу, изъ которыхъ самому сиротшему было только семь дней. Удивленія достойно, что изъ нихъ одинъ только умеръ, да и то поному, что какъ горница, въ которой онъ лежалъ, такъ и смотрѣніе за нимъ были худыя. А мать умершаго, заболѣвъ поносомъ отъ того, что ходила босикомъ по каменному полу, не объявила о своей бодѣзни. Г. Димедаль никого не исключаетъ отъ прививанія оспы, кромѣ спрадущихъ воспалительною, либо съ пятнами соединенною горячкою; имѣющихъ явные знаки остроты въ крови; изхудавшихъ и часто подверженныхъ перемежающейся лихорадкѣ. Онъ не совѣщаетъ такъ же,

при-

вымъ младенцамъ до четырехъ мѣсяцовъ смѣла прививали. (*Vergleiche des Hrn; Hofmed. W. ch. manns Abhandl. von der Wahl d. Alters bey der Einpfropfung der Blattern ind, Hannov. Magazin. 1777* B. 31) М.

прививать оную беременнымъ женщинамъ. Впрочемъ утверждаетъ, что всѣ тѣ, кои подвержены были какимъ нибудь долговременнымъ болѣзнямъ, имѣли расположеніе къ окръплости железъ (Scrophulae), заражены были цынгою, либо подагрою, которые были весьма полновѣлы и жирны, и которые привыкли вести непорядочную и неводержимую жизнь, гораздо еще легче переносили оспу, нежели самые здоровые и воздержные. (Вышеупом. местъ стр. 8.) Угры на лицѣ по моему мнѣнію должно прежде прививанія оспы испребляти; сіе же можно сдѣлать пристойною дѣлою и вышеупомянутыми пилюлями изъ сладкой ртутки, желто-сурьмяной сѣры и проч. но при употребленіи оныхъ должно давать и слабительныя.

Дѣвицамъ 14 и 15 лѣтнимъ не хорошо прививать оспу; прочимъ же особамъ женскаго полу, естли онѣ при дни предъ тѣмъ будущъ нахотѣлись въ добромъ здоровьи, можно оную привить. Вслѣдствіе должно беречься, чинобъ не приишетъ оспы тому, кто уже оною зараженъ. Ибо въ такомъ случаѣ она преждевременно высыпаетъ, и естли бы паче чаянія она была тяжела, но сіе могутъ приписать прививанію. Для того, кто хочетъ себѣ привить оспу, тотъ долженъ 12 или 14 дней обождасть, дабы удостовериться, что онъ свободенъ отъ заразы. Для тѣхъ, которые имѣютъ просторныя дома, удобно сіе сдѣлать можно, естли дитя на перевести во внутренній покой, между жальемъ его родимелей находящимся, и запретишь въ оный входить всѣмъ, кромѣ имѣющихъ за нѣмъ

смот-

ствопрѣіе. Сіе наставленіе пѣмъ для меня ка-
жется важнѣе, что Г. Археръ сообщилъ Г. Кирк-
патрику, что изъ 33 душъ, которымъ онъ на-
мѣренъ былъ привить оспу, одиннадцать во время
пріуготовленія заболѣли естественною, и шрое изъ
нихъ умерло (Vid Analysis Kirkpatrick p. 412.)

Прививши оспу, никого къ больнымъ изъ числа
пѣхъ, между которыми свирѣпствуетъ другая кака-
либо заразительная болѣзнь, допускать не должно.
Ибо мнѣ самому однажды случилось видѣть, что
одному младенцу, больному оспою, принесенъ былъ
судорожный кашель. Лишь только она у него
начала подсыхать, то прикающился онъ кашель,
и весьма бы худыя отъ того были слѣдствія,
если бы не столь легкую онъ имѣлъ оспу, что
она нимало не привела его въ слабость. Онъ пере-
несъ также и послѣднюю болѣзнь, какъ первую,
хотя и не весьма легко. А что онъ младенецъ
имѣлъ дѣйствительно судорожный кашель, то я
о томъ увѣренъ не только изъ неложныхъ зна-
ковъ онаго, но и изъ того, что онъ послѣ имѣ
не заразился, хотя и чрезъ дѣлаы три недѣли
безпрестанно находился вмѣстѣ съ двумя младен-
цами, страдающими сего рода кашлемъ.

2) Никогда не должно никому прививать оспы
прежде, нежели онъ, еслии того нужда пребу-
етъ, будетъ къ сему пріуготовленъ. А сіе мож-
но сдѣлать употребленіемъ чрезъ нѣсколько не-
дѣль сряду вышенисаннымъ образомъ предохра-
нительныхъ пилюль (*). Удаленіемъ отъ изанше-

(*) Либо можно въ вечеру дать въ облаткѣ одинъ,
либо два грана сладкой ртуты съ однимъ гра-
номъ

ства въ пищу и питіи, отъ великихъ трудовъ, отъ пѣловидіенія и бѣзнія, и употребленія весьма пишашедныхъ, соленыхъ, копченыхъ, кислыхъ, твердыхъ, пряныхъ и горячительныхъ ѣстїи и мята, а особливо въ вечеру. Однако слабосильные люди больше должны имѣть питанія, нежели крѣпкіе и полнокровные. Ибо тѣло такъ должно приготовить, чтобъ оспенная горячка никакого не причинила вреда, однако не должно оную и опаривать поному, что въ такомъ случаѣ оспа не высыпаетъ, не возвышается, не созреваетъ и не можетъ подсыхать. Все наше намѣреніе во время приготовления должно состоять въ томъ:

- 1) чтобъ тѣло никакой другой болѣзни, кромѣ оспы въ себѣ не содержало;
- 2) чтобъ кровь не была ни въ излишнемъ количествѣ, ни не было въ ней недосытку; ибо въ первомъ случаѣ горячка можетъ быть весьма жестока, а въ последнемъ весьма слаба поному, что тогда, какъ говорятъ, оспенная мазерія спремится на чувствительныя жилы;
- 3) чтобъ твердыя части размягчить и сдѣлать

гиб-

номъ кинфары, а слѣдующаго ушра потребное количество слабительной каши (Eleduatium lenitivum.), упоминаемая Г. Де Гасномъ для сего осторожность какъ изъ моихъ, такъ и другихъ нѣкоторыхъ опытовъ извѣстно, совсемъ лишняя. Г. Ассессоръ и провинціальный Докторъ Гастъ въ 1770 году въ одномъ селѣ въ Естербошнѣ 55 младенцамъ деревенскимъ и бѣднымъ людямъ и безъ приутоговленія съ железеымъ услѣвомъ привилъ оспу, чаятельно поному, что оное для нихъ было не нужно. (Смолтр. Inrikes - tidningen, n. 62).

слабыми, естли онъ повидимому весьма сухи, тверды и напряжены: но противное тому должно дѣлать, когда оныя мягки и слабы; 4) чтобъ исправить желчь, потому что испорченная желчь обыкновенно бываетъ причиною тяжелой оспы. Такого рода оспою боленъ былъ Графъ ГисорсЪ, которому она на 24 году была привита; впрочемъ онъ легко избавился отъ сей болѣзни. Для того многокровнымъ людямъ въ шопѣ же самый день, когда копятъ привить оспу, должно пустишь кровь. А сухощавые и тонкіе люди нѣсколько разъ должны садиться въ ванну. Естли при томъ у нихъ слаба грудь, то можно имъ давать нѣтъ сырошку, либо свѣжее процвѣтшее пахшанье. Другія болѣзни, (*) какъ то; поносъ,

глн-

(*) Въ разсужденіи опасности отъ глистовъ многіе согласны съ Г. Фонъ Розенштейномъ. Г. Копуни (de sedibus varicolarum p. 64 66. lqq.) обстоятельно описанные опыты, учиненные надъ двумя младенцами, которые, не смотря на хорошие признаки благополучнаго окончанія оспы, уже послѣ начала подсыхания оной умерли судорогами, между новѣйшими особливое примѣчаніе заслуживающъ. Онъ ничего не могъ считатьъ причиною ихъ смерти, кромѣ глистовъ, коихъ онъ и сыскалъ въ кишкахъ. Сие заставило его, изыскивать особливые признаки ихъ бывшія во время оспы, и для безопасности давать больнымъ, хотя оныя и не примѣчаются, порошокъ ртутный съ сѣрою (Aethiops mineralis). — Равнымъ образомъ примѣченъ глисты какъ въ естественной, такъ и въ прививной оспѣ и безъ худыхъ слѣдствій. Такъ на пр. я привилъ оспу одной дѣвѣ въ двухъ годовъ съ деловною

веса-

глисты, чесотку, нарывы, горячку съ красными пиянами и подобныя тому шакъ же прежде должно избѣчивашь. (*) Тѣмъ младенцамъ, которые
рѣдко

весьма благополучно, хотя она и имѣла въ себѣ глисты; ибо одинъ изъ нихъ, послѣ бездѣйствительнаго употребленія во время приговора, убивающаго глисты, аскариды, на третій день послѣ выстуления осы мертвой, а другой при окончаніи уже болѣзни, когда дано было слабительное, живой вышелъ. Но что сего различія причиною, особенны ли сложеніе младенцевъ, которое Тиссонъ (*Ann. au peuple* p. 480) весьма пристойно *sensibilité* (склонность къ судорогамъ) называетъ, или чувствительныя жилы въ одно время больше раздражаются, нежели въ другое, или раздражаются тѣ чувствительныя жилы, которыя находятся въ тѣсномъ соединеніи съ сердцемъ и легкими? Ибо часто главной причины въ кишкахъ не сыскано. М.

(*) Таковыя болѣзни непременно прежде должно избѣживать. Однако во все ли не должно спрассудимъ сими болѣзнями прививать? Понеже прививаніе осы есть такое средство, чрезъ которое можно избавишься отъ оной; а какъ и си равно съ прочими людьми не исключены отъ осы: то изъ сего явствуетъ, что и для ихъ оное средство употреблять должно. Ибо еслили для нихъ трудно переносить прививную оспу, то конечно они могутъ лишиться жизни, еслили пристанетъ къ нимъ естественная; понеже весьма вѣроятно, что она для нихъ будетъ тяжела. Впрочемъ мы избираемъ для прививанія осы здоровыхъ людей, покамысь оное вездѣ будетъ принято, испануть его считатьъ за столькожъ невинное средство, какъ крово-

пу-

редко умѣютъ наблюдать умѣренность въ пищѣ, должно не много давать кушанъ и не допускашь ихъ рѣзвостямъ разгорячаться. А особливо не должно позволять имъ такой игры, которая бы имъ могла причинить вредъ. (Можно о семъ читать примѣръ в *Zürcher Abhandlungen Th. 3 S. 47*). Дѣвкамъ въ семъ случаѣ должно оставить свое шурованье. Люти, подверженные желчнымъ болѣзнямъ, должны употреблять изобильное питье и принять однажды либо два раза рвотное, примѣшивши въ свой супъ, или въ похлебку, изъ зелени кареную но не многу лимоннаго соку, или хорошаго винограднаго уксусу; и удаляться отъ употребленія молока и всякой жирной пищи. Тѣ, которые не въ состояніи принимать пилюль, могутъ чрезъ шри, либо чевыре недѣли себя при-

пускать и пользоваться минеральными водами. А когда оное получишь себѣ полную довѣренность, то мы можемъ поступить далѣе, и съ изобилнаго небомъ средство станемъ употреблять и прошивъ другихъ, инако большую частію неизлѣчимыхъ болѣзней, какъ на пр. змѣивающихъ разумъ, инфондрии, судоргъ, падучей болѣзни, паралича, бѣлья, упрямыхъ лихорадокъ и проч. Двенадцатилѣтній опрокъ, которому Д. Лэббъ прививалъ оспу, и о которомъ онъ въ своей книгѣ, объ оспѣ имъ написанной (*Th. 2. in der 94 Geschichte*) упоминаетъ; такъ же помѣтъ, о которомъ упоминается въ Гемптинскихъ запискахъ (*Sötungsehen Anzeigen für das Jahr 1757. S. 1300*); и Исторія о Г. Вилламсонѣ, котораго здоровье чрезъ прививаніе оспы такъ поправилось, что послѣ того его друзья не узнавали

приготовляешь смольною водою, и чрезъ каждые четыре дни принимаешь легкое слабительное, какъ на пр. слабительную кашку (*Elestuarium lenitivum*), либо подобное тому, смотря по возрасту и телосложению. Кому противна смольная вода, тотъ дол-

жали (*Kikratisk* на сказ. мѣсѣ стр. 276.), подаютъ намъ надежду, достигнуть чего нибудь большаго чрезъ прививаніе оной. Г. Проф. Фонъ Шульцентаймъ привилъ оспу одному младенцу, у котораго было слабое зрѣніе. Однако послѣ того у него оное весьма поправилось. Одна дѣвица, которой прививалъ оспу Г. Гаартманнъ на ногѣ, исцѣлилась отъ четырехлѣшняго теченія гною изъ глазъ. Сие самое испытали Гг. Профессоры (Фонъ Шульцентаймъ и Бергій прививаніемъ оспы на рукѣ. Наннче тотъ родъ лѣченія, который употребилъ Г. Д. Музелль въ Берлинѣ 1754 года примѣчанія достойнъ. Онъ принялъ къ себѣ въ больницу 28 лѣтняго чело-вѣка, который такъ былъ распревъженъ расцусшною жизнію своей сестры, что одно только подобіе имѣлъ чело-вѣка. Никакого онъ знаку не оказывалъ разума и понятія о себѣ, былъ сухъ, блѣденъ, и имѣлъ бленіе жилъ слабое и медленное. Въ Лазаретѣ его держали два года и употребляли всѣ средства, какія только вздумать было можно. Но когда примѣтили, что всѣ оныя были бесполезны, то привили ему чесотку, послѣ чего день спустя воспослѣдовала жестокая горячка, однако съ такимъ дѣйстви-емъ, что больной въ девятый день пришелъ въ совершенный разумъ, и по прошествіи трехъ недѣль безъ всякой болѣзни вышелъ изъ больницы. (*S. seine Med. und Chirurg. Wahrnehmungen 2. Samml. Cas. 12. Und Hrn. Toggenburger disertta. Casus stuporis scabiei inoculatione curati in Hrn. Prof. Sadisfort Thesaurus Diff. Vol. I. n. 6.*) М.

долженъ наблюдать строгую діету и нѣсколько разъ принимать слабительное. Впрочемъ я больше полагаюсь на ринушь, иначе для того, что она лучше всѣхъ лѣкарствъ уменьшаетъ въ нѣдѣ оспенный ядъ. Ибо какимъ бы другимъ образомъ Баронъ Димедаль такъ удачно могъ своимъ способомъ прививать оспу? Я принялъ сіе мнѣніе, и въ 1744 году, когда Г. Ф. Гу боленъ былъ сливною оспою, желая ошврапншь оную отъ его двухъ братьевъ, что мнѣ и удалось посредствомъ вышеупомянутыхъ пилюль. Одинъ изъ нихъ принималъ уже онаѣ еще и безъ моего вѣдома чрезъ нѣсколько дней, какъ началась у него горячка. На третій день высыпала у него рѣдкая оспа, и на четвертый вмѣстѣ съ горячкою исчезла. Однако онъ находился въ хорошемъ состояніи, и оспенная горячка опять пришла чрезъ четырнадцать дней, и высыпало только пять оспинокъ. Г. Д. Вашсонъ въ Лондонѣ, для извѣдыванія разнціа прививанія оспы, съ пригошовленіемъ и безъ онаго прививалъ оную новымъ способомъ осьми, отъ 6 до 14 лѣтъ младенцамъ, изъ которыхъ было поравну какъ мужеска, такъ и женска полу, давши прежде того два раза слабительное изъ 10 грановъ порошка Лавпы и 4 грановъ сладкой рпуши. Оспи-ны вмѣстѣ взятыя составляли, какъ среднее число 14 на всякомъ мальчикѣ, и 5 на каждой дѣвочкѣ. На чешырехъ мальчикахъ и чешырехъ дѣвочкахъ, которымъ, послѣ двукратнаго даванія слабительнаго изъ наливки Александрійскаго листу и розоваго сиропу, прививна была оспа, считалось какъ среднее число по осьми оспинъ на каждомъ.

На одиннадцати же, которыми привита была оспа безъ слабительнаго, среднимъ числомъ на каждомъ было 32 оспины. Всѣ они пользовались одинаковымъ приемотромъ. И такъ когда опасность зависитъ отъ числа оспинъ, то воякому заключаешь можно изъ сего наблюденія о пользѣ слабительнаго во время приемотренія, да и въ разсужденіи самыхъ малыхъ дѣшей. (Man lese des Hrn. Aichater Back s' Vorrede Zu Hrn. Dm fda's Buch von der Einpropfung der pocken S. 15.)

Вода одна, либо смѣшенная съ небольшимъ количествомъ молока, пахпанье, процеженное и смѣшенное съ водою, хорошее слабое полпиво, либо взваръ изъ чалупинскаго корня (*radix chinac*) во время приемотренія служатъ хорошимъ питьемъ. Сыворожку (*petit lait*) похваляетъ Г. Тиссонъ справедливо. Пристойною же пищею могутъ быть всякія молочныя кушанья, супы, изъ перловой крупы и сорагинскаго пшена, также хлѣбные супы, жареная рыба, каша изъ рыбы, вареная рыба съ крошенымъ хлѣбомъ, либо съ пштрушкою, какъ съ травою оной, такъ и съ корнемъ, однако съ весьма малымъ количествомъ масла; вареный шпинатъ съ мяснымъ супомъ въ обѣдъ и безъ мяснаго супу въ ужинъ, шпинатъ, либо другая зелень, съ свѣжею смѣшаною вареною, однако не часто употребляемая; пулдингъ изъ хлѣба либо изъ шпинату. Вафли и блины можно позволить дѣшамъ, однако не должно имъ давать здобныхъ, либо пирожнаго, которыя обыкновенно бывающъ жирны. Тѣ, которые съ виду кажутся слабы и не

довольно имѣютъ въ себѣ крѣпости, могутъ ку-
шанъ супъ изъ телятины, либо изъ цыпленковъ
и гаше изъ мяса. Еслии кто подверженъ запору,
то онъ долженъ часто употреблять въ пищу зе-
лень, равно какъ и компоты изъ яблокъ и сливъ
на шибъ конегъ, чтобъ каждый день его слаби-
ло. Недостаточные люди, которые не могутъ
имѣть такъ многихъ перемѣнъ, должны доволь-
ствоваться молокомъ, супомъ изъ зелени, каше-
ею, пивнымъ супомъ (Vier Suppe), пивною сыво-
ропкою и подобнымъ шому. Въ обѣдъ они могутъ
быть до насыщенья, а въ ужинъ по не многу;
ибо въ противномъ случаѣ пища не сваривается и
бываетъ причиною безпокойнаго сна.

Впрочемъ общихъ правилъ въ разсужденіи
приготовленія предписать не можно; ибо различ-
ное шѣдоложеніе требуетъ различнаго. Слабое,
блѣдное дитя, которое часто имѣетъ въ желуд-
кѣ кислоту, подвержено рвотѣ либо поносу, либо
въ которомъ находясь признаки Агланской не-
мочи, требуетъ особливаго и долговременнѣйшаго
приготовленія, нежели здоровое, имѣющее хороший
аппетитъ и живость въ лицѣ. Для сего ничего
больше не нужно, кромѣ воздержанія отъ излиш-
ней пищи и употребленія наипаче зелени, а для
питья сыворопки. Всякого можно считать гото-
вымъ въ прививанію оспы тогда, когда онъ въ
обыкновенное время чувствуетъ позывъ на пищу,
въ надлежащее время хочетъ спать, въ обыкно-
венные часы пробуждается, порядочное имѣетъ ис-
пражненіе изомъ, брюхо мягкое, дыханіе свобод-

ное, мысли веселыя, легкость и проворность въ плывѣ. Еслии къ тому присовокупится не весьма жаркая погода, либо хотя и жаркая, но мокрая, не свирѣствуетъ никакая другая какая либо повальная болѣзнь, отъ которой не исключены и самыя младенцы; при семъ потѣ, кому должно привить оспу, отъ того не робѣетъ: но сіе весьма великую подаетъ надежду къ хорошей оспѣ.

3) Гной для прививанія оспы должно брать изъ той раны, гдѣ привита была оспа, или изъ какихъ нибудь оспинъ кончикомъ lanceta (*), либо нишкою изъ хлопчатой бумаги. Опытъ Г. Гуптона, Димсдала, Ватсона и другихъ доказываетъ, что не нужно ожидать, пока оный пожелтѣетъ или сзрѣетъ. Они утверждаютъ при томъ, что еслии новыи ихъ способомъ привита будетъ оспа; то она высылетъ въ меньшемъ количествѣ, и что для заразы весьма малое только количество пребудетъ гномъ. Впрочемъ Д. Димсдаль рѣдко полагается на одинъ разрѣзъ, въ намѣреніи больше быть удостовѣрену о дѣйствительности прививанія. Онъ обыкновенно беретъ для прививанія гной при продолженіи сыпной горячки, для того что онъ въ сіе время бываетъ самый дѣйствительный. Еслии же онъ употребляетъ гной изъ прививной оспы, то беретъ его изъ

(*) Свѣжій жидкій гной весьма великое имѣетъ преимущество, потому что онъ гораздо вѣрнѣе пристаетъ, воспослѣдовавшая отъ него оспа гораздо бываетъ легче и въ ранѣ послѣ него чувствуется меньше раздраженія (Vid. Observati. et animadvers. super variol. infusque facula sect. I. p. 5) M.

изъ той ранки, гдѣ она привита была, будучи въ томъ мѣстѣ, что естли болѣзнь уже совершенно нашедшися, то оный довольно имѣетъ въ себѣ заражительной силы. Чѣмъ оный свѣжѣе, тѣмъ лучше; однако въ небольшихъ городахъ и въ деревняхъ часто бываетъ трудно сыскать гной для прививанія осы. Для того полезно беречь въ складкѣ сухія нитки, въ оспенный гной прежде обмоченныя, дабы онѣ въ случаѣ нужды пригодились; а послѣ того можно получить опъ сего и свѣжій гной. Сколь долго оный соблюдаетъ свою силу, о томъ не извѣстно. Однако Г. Тиссонъ привилъ оспу одною такою ниткою, которая за 26 мѣсяцовъ преѣтъ тѣмъ обмокнута была въ оспенной гнои; а Г. Кирипатриккъ такою, которая уже лежала нѣтъ лѣтъ и одиннадцать мѣсяцовъ. Можно также беречь на томъ концѣ и оспенный спрутъ, по примѣру Г. Гаспа (*).

О 4

4)

(*) Баронъ фонъ Штеркъ (Unterricht für die Feld- und Landjundärzte 1. Th. S. 276.) совѣтуетъ также, прививать оспу въ порошокъ стерпымъ оспеннымъ спрутомъ въ случаѣ недостатку свѣжагогною, и несравненно предпочипаетъ оный ниткамъ. Оный чрезъ долгое время въ стеклянномъ сосудѣ соблюдаетъ свою силу. Употребляется же оный слѣдующимъ образомъ: должно на рукѣ ниже плеча вдоль на двѣ или на три линіи прорѣзать кожу, потомъ раздвинувши края ранки, потереть слегка онымъ. Либо можно задвинуть оный кончикомъ ланцета подъ кожу, и прижавши оную къ ножѣ, вынуть ланцетъ. Пластырь въ семъ случаѣ также бываетъ не нуженъ. М.

4) Естлии шотъ, кому хощятъ привить оспу, имѣетъ къ оной расположеніе и находится въ вышеупомянутыхъ обстоятельствевахъ: но можно ему оную привить какъ лѣтомъ, такъ въ осени и зимою. Ибо теперь она во все время года съ благополучнымъ успѣхомъ прививается. Въ Конспаннионолѣ всегда прививаютъ ее зимою по тому, что въ теплыя времена года обыкновенно тамъ бываетъ либо моровое повѣтріе, либо заразительныя горячки. Естлии случится другая какая либо повальная болѣзнь, то прививаніе оспы должно оставить до ихъ поръ, пока она не пройдетъ. Баронъ Диксдаль такъ же небезопаснымъ считаетъ прививаніе оспы въ подобныхъ случаяхъ. Покойный Профессоръ Монро упоминаетъ объ одномъ Врачѣ, который во время свирѣпствованія повальной горячки съ красными пятнами, пользуя многихъ больныхъ оною, велѣлъ привить оспу своему сыну. Но на восьмой день шотчасъ сей заразился оною горячкою, которая однако скоро миновалась. Она высыпала и была легка. А когда у него брали тѣло для прививанія другимъ, то и у тѣхъ такъ же высыпала оспа и выѣшъ съ нею красная сыпь. Такимъ образомъ случалось и съ другими многими, которыми прививка была оспа имѣла же вредъ. Еще счастье было то, что она весьма благополучно окончилась. Впрочемъ все сіе сочли неосторожностью (V. *Journal des Sçavans* 1766. janv. p. 227.) (*)

5.

(*) Точныя слова Монро можно читать въ его сочиненіи (*Account of the Inoculation of Small-Pox in Scotland*, p. 45.) M.

5. Спустя одинъ день послѣ прививанія, должно дать больному слабительное. Послѣ него можно начать ставить ноги въ теплую воду и каждый вечеръ сіе повторять.

Прививать оспу можно либо на одной, либо, для лучшаго удостовѣренія о дѣйствіи твоемъ, на обеихъ рукахъ, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ дѣлають искусственную рану, фонтанеллю (Fontanella) называемую. Я всегда за лучшее считаю, прививать на рукахъ, нежели на ногахъ, дабы шовъ, кому привита оспа, свободно ходилъ могъ. Для сего должно разрѣзать покровы ланцетомъ вдоль напальцемъ наискось между кожей и кожей такъ мѣлко, чтобы либо нисколько, либо только небольшое количество показалось крови. Въ ранку вложить прививальную иголку и оставивъ ее безъ пластыря, если онъ въ первые дни считается неужнымъ. Должно также положить на ранку нѣсколько хлопчатой бумаги, между ниткою и ваткою, которую протчемъ приложить можно. А дабы нитка не выпала, то должно обернуть руку повязкою. Нагноившая мазь бываешь не нужна. Но повеже дѣти всегда боятся, если ихъ рѣзать, а особливо если еще и не въ одномъ мѣстѣ: то мнѣ кажется несравненно лучше для сего продолговатый и узкій парывной пластырь (*), который въ вечеру можно приложить,

О с .

а

(*) Сей способъ Г. Гастъ также считалъ лучшимъ и надевѣйшимъ. Онъ клалъ въ ранку струпу свободной либо сѣдлыхъ оспинъ, и нѣтъ не парается прикрывать нагнаивши кожу (Epidermis) (K. Colleg. med. beäuellet angående medic. Verkets-
plstaad, ingisna 1769. S. 543.)

а по утру вмѣстѣ съ кашицею отнять; потомъ мокрымъ полотенцемъ оное мѣсто обтереть. Послѣ сего положить въ ранку обмоченную въ оспенный гной нитку, накрыть оную небольшимъ количествомъ хлопчатой бумаги и завязать ранку повязкою. Еслили примѣчено, что край раны чрезъ два или три дни не рѣшетъ, то еще приложить одну нитку, и еслили того потребуетъ надобность, то опять одну на третій либо на четвертый день. Я никогда въ слѣдствіе доказательствъ Г. Де Флагги ни малѣйшаго въ семъ неутобства не примѣтила. Можно также въ семъ случаѣ послушать полезнаго совѣта Г. Проф. Фонъ Шульценгейма и приложить три разныя нитки, чѣмъ еще надежнѣе будетъ прививаніе оспы. Такимъ образомъ четверымъ изъ здѣшней Королевской фамиліи привита была оспа. Баронъ Димсдаль (*) велѣ-

(*) Неприятно, я думаю, будетъ Читателямъ, предложитъ здѣсь краткое описаніе Димсдалеваго способа прививанія оспы; я оное заимствовалъ изъ читанныхъ мною Англическихъ сочиненій. Сей способъ называютъ новымъ, хотя оный самою вещію есть весьма древній; но только нѣкоторыми поправленіями преобразованъ. Г. Даниель Сунптонъ возобновилъ еще оный въ 1764 году. Но понеже онъ за полезное почелъ какъ для своей собственности, такъ и для своей фамилии корысти, свое искусство скрыть: то не долженъ изговаривать за то, что въ нынѣшнія времена Баронъ Димсдаль своимъ благотворительнымъ и откровенностію заслужилъ себѣ честь Изобрѣтателя и Любителя общества. (Смѣтри его книгу подъ заглавіемъ: *Present method. of inoculating for*

лпшѣ того, кому онѣ хочешѣ привившѣ оспу, впу-
стишѣ въ такую горницу, гдѣ находится кто ни-
будь больной оною, и беретѣ кончикомѣ ланцета
твоей изѣ ранки, къ которой прививша была оспа,
либо

for the Small-Pox 1767. 8.) Впрочемѣ естѣли бы
Лѣварѣ Суттонѣ обонхѣ листочковѣ лѣтсви-
тельной былѣ Сочинитель (in 4 Inoculation made
safe 1767), чему однакожѣ едва можно повѣ-
рить: то бы должно о семѣ судить иначе.

Г. Динсдаль для приготовления даетѣ поро-
шокѣ изѣ осьми грановѣ сладкой рпуши, рав-
нато количества сложенного Лондонскаго изѣ
раковыхѣ скорлупѣ порошка (*pulvis eschelus sacro-
gum compositus*) смѣшенный съ $\frac{1}{8}$ грана рвотной
соли, либо съ двумя гранами низверасной
желтосурмяной сѣры, раздѣля оный на три прие-
ма, которые весь больной долженѣ принять
прежде операціи. Послѣ операціи онѣ даетѣ
тошѣ же порошокѣ, только съ тѣмѣ различі-
емѣ, что первыхѣ двухѣ вещей беретѣ только
по 3 грана, а рвотной соли $\frac{1}{8}$ грана, и велитѣ
онѣ начинать употреблять на другой день
послѣ операціи. А Г. Суттонѣ составляетѣ оный
по вышеупомянутому подложному его сочиненію
(которое Г. Вихманѣ, такѣ какѣ и Историю
новатаго изобрѣшенія по 1767 годѣ *Naapov. Magazin*
St. 52 и 53 1767 кратко описываетѣ) со рпушью,
т. е. беретѣ 10 грановѣ сладкой рпуши и одинѣ
гранѣ искусственной киновари и раздѣляетѣ
также на три приемы. Оба сѣи Привившеле
оспы даютѣ между тѣмѣ слабительныя. Сей
способѣ призванія есть самый простѣйшій,
какой только издумать можно Мази, пласты-
ри и перевязки шутѣ со всѣмѣ не употребляю-
ся. Естѣли случится весьма сильная сыпь; то
даютѣ

либо въ естественной оспѣ изъ оспины такъ, что оба бока ланцета оного обмариваются. Симъ онъ разрѣзываетъ на рукѣ такъ глубоко, что рана проходитъ сарозъ кожу и нѣсколько достигаетъ до

даютъ слабительное. Впрочемъ чрезъ все продолженіе болѣзни, холодное содержаніе какъ въ разсужденіи питія, такъ и что касается до воздуха, строжайше наблюдается.

Супшоновъ способъ прививанія оспы въ Англіи такой имѣлъ успѣхъ, что у него, какъ явствуетъ изъ письма Прингеловаго къ Г. Гоф-Медику Вихману (*Vid. Historia Infl. variol. in Sueattia Murray in praef. p. 12.*) еще прежде наступленія 1767 года изъ 17000 душъ только близи 7 умерло. И Г. Шандлеръ считаетъ уже въ началѣ вышеисчисленнаго года (*Inquit u towards an infligation 1767*) 2000 душъ, коимъ благополучно имѣ была привита оспа. Слава о его способѣ послѣ того такъ распространилась, что онъ съ помощію своего брата (Вильяма) и другихъ свойственниковъ не только завелъ собственные для прививанія оспы дома, въ кои желающихъ принималъ за положенную имъ цѣну; но еще посылалъ своихъ учениковъ съ симъ намѣреніемъ и въ чужіе края. При столь чрезвычайномъ однако своемъ успѣхѣ не могъ онъ избѣгнуть хулишелей даже изъ числа самыхъ своихъ соотечественниковъ. Между оными доспойны примѣчанія Лонгтона (*Longton's adreff, to the Publc on the present method of Inoculation*) и Бромфелдъ Тугмсъ (*Bromfeld's Thoughts arising from Experience concerning the present etc.*). Они въ своихъ сочиненіяхъ опровергаютъ употребляемый имъ для всѣхъ одинакій способъ приготовленія, винятъ его за причиняемое имъ разслабленіе силъ и злоупотребленіе ртути, которая въспомогаетъ, чтобъ испривить оспрому,

до самой кожи, но въ длину сколько можно поменьше и не больше осьмой доли дюйма. Послѣ онъ разширяетъ не большую сію ранку большимъ и указательнымъ перстами и обтираетъ о ѣ оную
 съ

въ крови находящуюся, какъ сіе утверждаютъ записники оной, ее разжижаетъ и перемѣняетъ въ острую сыворотку, не хвалятъ какъ за прививаніе острымъ и еще несозрѣлымъ гноемъ, такъ и за неосновательное предписаніе въ содержаніи себя больнымъ и проч. Сюда принадлежатъ также *Luwytlanis natural observations etc.* Напрошивъ того весьма старались доказать, будто дѣйствительные Его Королевскаго Величества Лейбмедики г. Дунаръ, Винпрингамъ, Варренъ и Кор. Лейбхирурги: Гг. Канби, Гавкинсъ, Машмелтонъ, по Королевскому указу, свое мнѣніе утвердили въ разсужденіи новаго способа прививанія оспы, котораго вся важность состоитъ въ томъ, чтобъ позволять свободно больнымъ пользоваться холоднымъ и открытымъ воздухомъ, а не въ особенномъ (*fresciscum*) лѣкарствѣ, и будто посредствомъ прочаго холоднаго содержанія, рѣдко больше двенадцати оспинъ выступаетъ, хотя и не могутъ опровергать, что у нѣкоторыхъ, коимъ они прививали оспу, болѣе 200 ихъ было. Несудачнымъ случаевъ было мало, за которые бы можно было поносить Г. Сумптона и сію учениковъ. Напрошивъ того во зло употребляютъ Выше объявленные Врачи и Лѣкари свою спротивость, съ которымъ они больныхъ естественною оспою высылаютъ на открытый воздухъ, даже зимою, и стараются съ большею точностію различныя тѣлосложенія распознавать. Но когда сіе ихъ мнѣніе съ присовокупленіемъ многихъ обстоятельствъ въ Лондонѣ напечатано (*Centl. Magazin for Febr. 1768, Chro-*

съ осторожностію плоскую сторону ланцета, и такимъ образомъ оную помазываетъ. По моему мнѣнію хотя и можеть шотъ, кому хотятьъ привить оспу, пришедъ въ шотъ домъ, гдѣ нахо-
ди-

Chronicle 1768 N. 1744 p. 175.); но кѣ удивле-
нно всѣхъ шотчасъ оное старались въ пѣхъ же
недѣльныхъ сочиненіяхъ опровергнуть. Ибо въ
одномъ мѣстѣ написано, что оно подкинуто (Genl.
Mag. 1768. Chron. N. 1746.) а въ другомъ (N.
1748), что оно родилось отъ одной шотъко за-
висти, но какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ
порицающъ Сочинителей за то, что они сами себя
пронизорѣчашъ. Впрочемъ Сунтсонъ имѣлъ также
въ Англіи и своихъ защитниковъ между Врачами,
къ которымъ наплаче принадлежатъ Д. Гилесъ
Вашинъ (Vindication of the new Method of Inoculating
Small-pox); Д. Шандлеръ; Д. Руссионъ (Essay on In-
oculation for the Small-pox), который Сунтсоновы
лѣкарства испытывалъ по Химти, и отчасни Д.
Гласъ (Lectures to Dr. Baker t. 2.). Ибо его письмо
(Trial of D. Sutton for the high Crime of Preserving
the Lives of his Majesty's Liege Subjects by Means of
Inoculation) есть нѣсколько двусмысленно. —
Должнаго почтенія къ Г. Димсдалю сираведли-
вымъ служилъ доказательствомъ честь, копо-
рую онъ имѣлъ привить оспу ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ЕКАТЕРИНѢ ВТОРОЙ, и
которую имѣлъ также его ученикъ Г. Инген-
гусъ при Императорскомъ Домѣ въ Вѣнѣ, равно
какъ и многіе переводы его сочиненія. Кромѣ
Голландіи и Швеции употреблялъ съ пользою
сей способъ Г. Шинке въ Гагѣ, Г. Децоме въ
Лопарингмъ, Г. Лохеръ въ Вѣнѣ и въ многихъ
другихъ мѣстахъ. — Съ совершеннымъ безпри-
страстіемъ судитъ о семъ способѣ Г. Баеръ
(Medical Transactions Tom. 2. N. 12); онъ въ немъ

ни-

дился кто нибудь больной оною, однако не въ ту самую горницу, для всякой осторожности. Г. Проф. фонъ Шульценгеймъ и Г. Д. Аманъ, которые многократно прививали оспу Димсдалевымъ способомъ, дѣлали сіе въ ближней оспѣ больного герандъ и съ благополучнымъ успѣхомъ. О прочемъ же, что еще въ семъ способѣ должно наблюдать, можно читать въ часто упоминаемой мною его книгѣ, равно какъ и описаніе оного въ примѣчанія достойномъ предисловіи Г. Бека на его Шведскій переводъ. Прошедшей весны привилъ я въ деревнѣ оспу троимъ дѣтямъ, двумъ вышеписаннымъ способомъ, а третьему Димсдалевымъ; только съ тѣмъ различіемъ, что употребилъ для сего не ландетъ, но нарывный пластырь и ишки, обмоченныя въ оспенной гнои. Къ одному ребенку не пристала оспа, хотя я и многократно прикладывалъ новыя ишки. Но послѣ мать вспомнила, что онъ уже прежде того оную имѣлъ. У другаго была легкая оспа, однако онъ такъ былъ чувствителенъ, что не только не выходилъ на открытый воздухъ, но едва и съ поспѣваніи его нѣсколько разъ согнать было можно. Третій весьма свободно ходилъ и имѣлъ не много оспинъ, при томъ былъ бодръ, и выходилъ на холодный воздухъ въ случаѣ, когда ему хуже становилось, опѣ чего онъ опять скоро живѣе становился. Г.

Гз-

ничего худого не находилъ, но хулилъ пѣхъ, лон, несмотря на возрастъ, тѣлосложение и время года, строгою діею и расслабляющимъ приотопленіемъ, при томъ крѣпкими прочными, когда онъ крошлся бодѣнъ, ошеснивающимъ природу. М.

Гастъ часто употреблялъ Димсдалевъ способъ, и весьма его хвалилъ. Онъ примѣнилъ также, что его соотечественники гораздо охотнѣе начали отдавать своихъ дѣтей для прививанія оспы, когда онъ симъ способомъ поступать началъ. Для младенцевъ меньше при ономъ требуется осторожности и лѣченія. Вѣрность, которую имъ позволяють, и къ которой они привыкли, еще шѣмъ больше заснавляетъ ихъ быть довольными. (Смотри, Coll. med. Berattelser на сказанномъ мѣстѣ стран. 457.) (*).

Когд

(*) Я за нужею починалъ для предосторожности надѣть больному закрытъ носъ и ротъ платкомъ, во время продолженія операций, дабы испарина, изъ оспеннаго тѣла исходящая, вкравшись симъ путемъ, не произвела естественной оспы; однако сего, какъ я вижу, Г. Фр. Кас. Медикусу (Betrachtungen В. 2. в. 771.) не показалось. Я думалъ также, что Врачъ, который многихъ больныхъ оспою пользуетъ, не иначе долженъ того, кому оная привита, посѣщать, какъ переболевшій; и чело имѣющій прививную оспу не прежде долженъ имѣть сообщеніе съ имѣвшими уже оную, какъ только тогда, когда уже изъ надежныхъ знаковъ, въ ранѣъ оказывающихся, можно удостовѣриться о дѣйствіи прививанія. Мнѣ неизвѣстно, какимъ другимъ способомъ отвращать естественную оспу. Я не позволялъ также тѣмъ, коимъ привита была оспа, получать писемъ изъ зараженныхъ мѣстъ; ибо мнѣ извѣстно, что оспа такимъ образомъ за 18 миль изъ Уисала въ Нериху въ домъ одного Священника принесена. Для того мнѣ кажется, что Г. Суштонъ и самый Г. Димс-

мс

Когда еще покрывали ежедневно ранку пластыремъ, то трудно было узнатье въ оной
гною,

медаль весьма счѣлы, хотя бы я и не долженъ былъ судить о сихъ мужахъ, которые въ семъ случаѣ больше другихъ имѣли опытовъ. Равнымъ образомъ не могу я съ симъ сравнить предосторожности Г. Димсдэя, которую онъ наблюдалъ въ разсужденіи одного чловѣка, ко-
то ому привита была оспа. Сему онъ съѣшпо-
валъ предри. ять путешествие, однако увѣще-
валъ его, чтооъ онъ не входилъ въ такія ком-
нати, въ которыхъ бы можно посредствомъ
дыханія больше заразиться, хотя онъ и самъ
тѣлькомъ заразительное дыханіе имѣлъ. (Снеси
сыран. 29 34) Спастся можетъ, что жидкая
маннеря, взятая изъ прививной ранки прежде
высипуленія оспы, не имѣетъ въ себѣ запаха;
однако зрѣлый гной точно отъ себя оный из-
даетъ, и потому кажется, что для того ско-
ро действуетъ и прививаніе, когда вдругъ
приспадетъ зараза. Но сей причинъ, кто не
привелъ въ ослабленіе табакомъ своего обонянія,
помѣ можетъ за день узнать, когда начнетъ
оспа созрѣвать, слѣдовательно таковой можетъ
по дыханію того, кому привита оспа, заклю-
чить, заразился ли онъ ею или нѣтъ. Для
того думаютъ, что естли кто, не имѣвшій
еще оспы, посѣтитъ больного оною въ то вре-
мя, когда оспа созрѣваетъ, то онъ можетъ
чрезъ то заразиться. Новѣствуютъ о Ея Коро-
левскомъ Высочествѣ, Принцессѣ Гедвигѣ Софій,
что она, прѣхавъ съ визитомъ въ одинъ домъ,
загналась оною проходя чрезъ сѣни, возлѣ ко-
торыхъ нѣкто лежалъ больной оною. Ея Выоче-
ство ничего о семъ не вѣдая, почувствовала за-
пахъ, и тотчасъ закрыла платкомъ носъ и
ротъ

гною, потому что оный своею клейкостью его скардывалъ. Въ первый день послѣ приприванія никакой не примѣчается въ больномъ перемѣны, но на другой начинаешъ кожа на краю ранки какъ бы что въ фалдочки сбираться, свѣрбѣть и рдѣться (*).

Въ четвертый либо въ пятый день примѣчается на оной возвышеніе, и больной жалуется, что онъ чувствуетъ боль подъ мышкою, тяжестъ и боль въ лопаткѣ, и въ ранкѣ показывающіеся блѣдныя рубцы. Также видимы бывающъ около оной небольшіе пузырьки въ великомъ количествѣ, и рдѣніе часъ отъ часу распространяется. Въ пятый, шестой, седьмой, либо осьмый день (ибо сіе бывашъ

рошъ; однако зараза немедленно пришла, и Бя Высочество въ скорости заболѣла оспою и скончалась въ 1708 году. Можно бы подумать, что та часъ оспеннаго гною, которая заразительна, не летуча, ибо спрутъ, либо сухія нитки, которыми прививающъ оспу, равнымъ образомъ съ успѣхомъ употребить можно: однако естли бы такъ было, то бы въ семъ случаѣ оспою заразиться тогда только было можно, когдабы кто прикоснулся къ самому больному, либо къ тѣмъ вещи, до которой онъ дострогивался, какъ сіе случается въ чесоткѣ и въ любовопрасной болѣзни.

(*) Изъ одного либо изъ двухъ признаковъ не должно поспѣшь заключать, что прививаніе оспы удалось. Ибо весьма изсторопился Г Проф. Гаммин, когда онъ, увидя одно только рдѣніе и нагноение въ ранкѣ, сказалъ, что Гердегния Фонъ Буфлерсъ не имѣла причины болѣе опасаться заразы. Ибо она на шестомъ году послѣ того заболѣла естественною оспою.

заетъ не у всѣхъ въ одинакое время) начинаютъ
больные разнемогаться , становятся невеселы , по-
лучаютъ ознобъ , краску въ лицѣ , тяжесть въ
челѣ , боль въ головѣ и хребтѣ , и тошноту или
слабость ко рвотѣ . Послѣ того испускаетъ
горячка . Сія продолжается три дни , и при оконча-
чии препятого дня пуще ожесточается . Тогда
рабка становится суха , и спрутъ на оной бы-
ваетъ темный свинцовато цвѣшу , рдѣніе также
въ орудности оной увеличивается . Впрочемъ го-
рячка большею частію такъ бываетъ слаба , что
больные выходить могутъ . Въ сіе время я всю
прививать къ шанкѣ , или къ колаку небольшіе
кусочки полотна , напертые канфарю для защи-
щенія глазъ , такъ чтобъ оныя висѣли внизъ на
вѣкахъ . Въ десятиый день , либо въ одиннадцатый ,
или чрезъ три дни послѣ начала горячки мало
по малу начинаетъ выступать оспа и съ оною
прекращается горячка , а съ нею и всѣ прочіе
принадки . Въ сіе время больной бываетъ въ ве-
ликой опасености (*). Изъ ранки , гдѣ привива
П а была

(*) Почти всѣ Прививатели утверждаютъ , что
тотъ , кому привита оспа , послѣ выпущенія
оной уже бываетъ въ опасености : однако я хочу
противъ сего утверждения сдѣлать возраженіе .
Правда , что въ многихъ случаяхъ еще изъ го-
рячки , и прежде выпущенія оспы продолжа-
ющейся , и изъ другихъ припадковъ можно
предвидѣть , жестока ли , или легка имѣетъ быти
болѣзнь ; справедливо также и то , что и са-
мая впрочемъ легкая оспа отъ худого лѣченія
либо присмотру можеть перемѣниться въ тя-
же-

была оспа, начинается больше выходить гною, а
наипаче, когда оспа начинается подсыхать. Ибо
она мало по малу возвышается, становится
желта, созрѣваетъ и опадаетъ такъ, что въ
осьмиа-

желую. Однако иногда какъ то, такъ и дру-
гое обманываешь. Одинъ полугодовой мальце-
нецъ, въ котораго здѣсь умершаго Врача сынъ,
умеръ безъ предшествовавшихъ худыхъ припа-
сковъ, но причинъ худого излечения оспы, вы-
сто котораго въ оспинкахъ была оспра и въ-
кая мокрота. — Въ 1771 году въ Юль мѣсяцъ
привилъ я оспу своему племяннику, которому
не было еще года, однако онъ оспученъ былъ
уже отъ груди. Хотя мнѣ весьма не хотѣлось,
къ сему приступить, по причинѣ его малолѣт-
ства; однако, понеже другимъ его братьямъ
привить было должно, и при томъ естествен-
ная оспа въ сосѣдствѣ находилась, то никакъ
безъ сего обойтись было не можно. И такъ я
далъ ему прежде легкое слабительное, вѣшалъ
нѣсколько вечеровъ ставилъ ноги въ теплую
воду, и носить его чрезъ все продолженіе болѣз-
ни либо въ горницѣ, либо на открытомъ воз-
духѣ, который тогда былъ не весьма холоденъ.
Болѣзнь у него началась такъ, какъ и у другихъ
его братьевъ, въ седьмую ночь безпокойнымъ
сномъ, и въ восьмой день рдѣтемъ лица и жаждою.
Другихъ знаковъ горячки я не могъ примѣтить.
На четвертый день послѣ начала оной поущру
уже высыпало нѣсколько оспинъ, изъ которыхъ
одна была въ ямочкѣ подъ носомъ, двѣ на спи-
нѣ и нѣсколько на чреслахъ. Въ то время ка-
залось, что больной былъ уже въ опасности,
и я только думалъ, что на слѣдующихъ дняхъ
еще не много выдесть оспинъ. Однако, зная при-
мѣчаніе Г. Димсдала и Шинца, что блѣдный
цвѣтъ

ошмнатцатый, либо въ двашцатый день все про-
ходитъ и рѣдко случается, чтобъ больной хоть
одинъ рубецъ имѣлъ. Гептали оспа несильна, то

II 3

боль-

дѣль рожокъ, когда примѣчаются признаки по-
дѣйствовавшю прививанія, означаетъ нехоро-
шую оспу, такълько безтолкова. Чшо думалъ,
по и сбылось съ симъ младенцемъ. Ибо обѣ
рожи еще въ шестой день послѣ прививанія
безъ спухан и явственнаго рѣвня закрылись,
хотя и находились какъ на самыхъ ихъ, такъ
и въ орудности оныхъ пузырьки. При томъ
подозрительна мать была необыкновенная ше-
роховатость лица. Но сего еще не довольно;
хотя младенецъ на другой день послѣ высту-
пленія оспы былъ веселъ; однако высыпало какъ
въ шотъ, такъ и другой день сбинова много
оспинъ на лицѣ, на краю нижней губы, на кон-
чикѣ языка и на головѣ между волосами, не
наблюдая обыкновеннаго порядка въ разсужде-
нии чѣмъ шѣла, и пошомъ она надлежащимъ
образомъ не приподнялась и не нагноилась, не
смотря на то, что оспины чрезъ все время
орудены были краснымъ кружкомъ. Больной
цѣлымъ трою сушки провѣлъ въ безпрестанномъ
плачѣ и сненаніи. Голосъ его былъ весьма сипо-
ващъ; одѣко онъ могъ глотать, и дыханіе
имѣлъ совершенно свободное. На третій день
послѣ выпущенія оспы появилась красная сыпь,
которая часто случается послѣ выпущенія,
но во время продолженія онаго рѣдко бываетъ.
Опухоль въ лицѣ, которая уже въ четвертый
день по утру была примѣтна, около седьмаго
дня съ великимъ рѣвнемъ и явственною горяч-
кою такъ увеличилась, что почти закрывала
глаза. Я велѣлъ прилѣжно употреблять какъ
пристойное питье, съ мысами соками, такъ

и

больной рѣдко получаетъ гнойную горячку. Если бы она приключилась, то ее можно было прекратить посредствомъ легкаго слабительнаго.

Больные должны продолжать прежнюю діету (*), и для нихъ не нужны бывающіе никакія ле-

и другія умѣряющія жаръ лекарства, и наставлявшія промывашельныя. Тщетно давали ему въ ночи усыпительный или маковый сыроръ (*Syrupus e pisonio*) для достигновенія сна. Но лихорадочная корка оказалась хороше дѣйствіе, ей свойственное, въ возвышеніи оспы и въ нагноеніи оной, также слабая кучеросная кислота (*frigitus vitrioli*) уменьшила жаръ, опухоль и воспаление лица. Симъ способомъ также она перешла съ лица на руки. При томъ природа сама поддала помощь, открывъ весьма сильное шипение гною изъ раны на правой руцѣ, которое даже и послѣ подсыханія оспы долго продолжалось. Сильное слинопеченіе отъ испускающагося прорѣзу зубовъ, или слѣдствіемъ перелома болѣзни было, сего я утвердительно сказать не могу. Изобильная моча цѣлительно происходила отъ кислоты. Рѣвнѣ кожи между оспами на лицѣ также еще продолжалось и послѣ подсыханія, и по крайней мѣрѣ въ семъ случаѣ долго бы было ожидать съ вскрываніемъ оспинъ, если бы по воцѣну Тиссона до прошествія рѣвнѣ оное оперочивать. Подсыханіе началось въ надлежащее время, однако послѣ оного оставались долгія красныя пятна и рубцы. Тутъ заблаговременное употребленіе легкаго слабительнаго изъ манны и вивокаменнощедочной Сейгнетовой соли (*sal polichrestus Seigneti*) нужнѣе было для его, нежели для другихъ его братьевъ. М.

(*) Что ненаблюденіе діеты можетъ быть худымъ слѣдствіемъ; то се можно видѣти изъ по-

аѣкарства, кромѣ легкаго слабительнаго, которое бываше необходимо, когда природа сама не слабитъ. Можно имѣ позволить, встать съ постели и прохаживаться въ горницѣ; только должны они остерегаться отъ сильнаго движенія тѣлою рукою, къ которой привита была оспа, либо крѣпкого сжиманія оной платьемъ. Въ противномъ же случаѣ она можетъ распухнуть, зардѣвшись и лѣрнѣясь пузырьками. Но еслили сѣ случится, то можно легко излѣчить оную посредствомъ даннаго внутрь слабительнаго, и прикладываніемъ смидовой мази, съ цинковыми цвѣтами смѣшанной.

Что же касается до самой раны, къ которой привита была оспа, то она не такъ скоро залѣчивается. Ибо когда оспа созрѣваетъ, то она мало по малу расширяется; однако никогда не

П 4

бы-

повѣствованія Г. Проф. Бергта о двухъ младенцахъ, которыми онъ вмѣстѣ съ служанкою въ одномъ знашномъ домѣ привилъ оспу. На младенцахъ она была хороша, а на служанкѣ весьма худа. Послѣ она призналась, что она какъ прежде прививанія, такъ и послѣ онаго была скрытно соленые небольшіе сельди, вѣшину и тому подобное. Сммотри *Verättelser i smittade til Konigl. Coll. med.* 1765 года стран. 14, гдѣ также (на стран. 255.) описывается, какого прирда стоило Г. Акселью, избавить отъ смерти молодую дѣвицу, которая кушала послѣ прививанія оспы шпинатъ, разогрѣваемый въ неподуженомъ сосудѣ. Еслили бы ея няня и служанка, которыя также были изъ онаго, не имѣли равныхъ ей припадковъ, то бы не дѣзъ было, узнать сему причину.

бываетъ длиннѣе прорѣза, а иногда еще и со-
хращается. Когда оспа начинаеть подсыхать и
опыдаться, то начинаеть большую частію много
истекать мокроу изъ раны, которыя бывають
совсѣмъ похожи на гной, истекающей изъ оспинъ. По
той причинѣ не закрываютъ оную до тѣхъ поръ, по-
ка продолжается теченіе, и перевязываютъ ее сухою
изъ ветошки наципанною пряжею, еслии много изъ
оной течеть мокроу, либо она распухнеть. У нѣ-
которыхъ она не закрывается чрезъ два не тѣли, а у
другихъ прежде сего времени залѣчивается.

Когда прививаніе оспы не производилъ ника-
кого дѣйствія, ранка совсѣмъ зажила и чрезъ
шесть дней оная не открывається; что сіе дока-
зательствомъ служитъ, что тотъ, кому при-
вила была оспа, либо прежде оную имѣлъ, либо
она къ нему никогда не пристаєтъ, либо приви-
вательныя нитки весьма давня, либо они оп-
брошены, либо оспенный гной смытъ кровью, изъ
раны текшею. Въ такомъ случаѣ вторично дол-
жно ее привить, дабы тотъ, кому оную привив-
вали, между тѣмъ опъ другихъ не заразился.
Можно еѣе и точасъ сдѣлать, не смотря на то,
что нѣкоторые дожидаются до двенадцатаго
дня (а).

Не

(а) у двухъ изъ моихъ племянниковъ нитки опъ
движенія рукъ, будучи прикрѣплены только
узенькими ремешками изъ Аглинскаго пласты-
ря, безъ явственнаго воспаления изъ ранъ вы-
пали. Но какъ я, по причинѣ въ сосѣдствѣ на-
ходящейся оспы, опасался, чтобъ они еѣ не за-
разились, притомъ думалъ, что хотя бы пер-

Не должно также беспокоиться, естли его иногда и преж е, нежели разсмолется на ослу тошъ, кому оная прививка, будещъ сдѣлана. Г. Прф. Швенке привилъ ослу одному припадати-лѣпному мальчику, который одинъ сынъ и былъ у родителей своихъ. На четвертый день начала дрожати у него лѣвая рука: но на одной оной толь-ко она была прививка. Въ шестой день примѣчено не болыной спрунъ на ранѣ. Болыной чувствовалъ ѣдко порую боль въ ранѣ и подъ мышкою. Въ ослмой день приступила горячка и усилалась въ девятой съ небольшою болью въ спичѣ и въ голо-вѣ, также со рвою и сильнымъ пономъ. Но сн причадки продолжались только чрезъ нѣ-сколько минути. Въ десятый день воспослѣдова-ло небольшое кровотечение изъ носа. Однако еще не выступала оспа; что оида его безпокоило. Г. Швенке осмотрѣлъ въ двенадцатый день рану; и когда онъ обшегъ на оной гной, то увидѣлъ на краю оной и въ самой ранѣ пять наслоящихъ осниъ. Не смѣря на то однако полагалъ онъ къ ночи оная оспенный гной въ рану. Слѣдую-щаго утра выступали у больнаго на лицѣ, на

вое прививаніе и подѣйствовало, то впоричное не можеть причинить вреда. Для того возо-новилъ опять меньшему, которому не было еще года, на третій день раны на обѣихъ рукахъ; а старшему, которому было чепыре гала, толь-ко на одной, потому что онъ на другой сего сдѣлать не допустилъ, и приложилъ новыхъ вышкн. Однако изчисленте двѣ послѣ пока-зало, что довольно бы было и первой опера-ции. М.

поясницѣ и на одномъ колѣнѣ еще четыре оспины, которыя въ одно время съ прежними взулись, созрѣли, подсохли и опали. Изъ раны, къ которой прививка была оспа, текло много гною чрезъ дванадцать четыре дни, и тѣмъ все кончилось. Изъ сего явственно видѣть можно, что вторично приложенный гной ничего не поучивовалъ; ибо въ семъ случаѣ больной долженъ бы получилъ въ седьмой день новую горячку и вторичную оспу, чего однако со всѣмъ не было. Сверхъ того должно примѣчать, что то время, въ которое приключается послѣ прививанія оспы горячка, бываетъ весьма непостоянно. Здѣсь въ Ст. Кюльмѣ прививка была оспа четверемъ младенцамъ въ одномъ часу и однимъ гноемъ: однако одинъ изъ нихъ разболѣлся, спустя два дни послѣ прочихъ. У дочери Милорда Далкейна высыпала оспа въ четырнадцатый день; а у одного подкидыша въ 26 день. Впрочемъ шаковыхъ примѣровъ не много имѣется. Послѣдній имѣлъ уже въ себѣ начало кори; однако онъ перенесъ оба эти болѣзни, сперва корь, а потомъ и оспу благополучно. У Мисъ де Граеъ открылась оспенная горячка чрезъ одинадцать недѣль послѣ прививки; однако она чрезъ все сіе время была нездорова. Нѣсколько шаковыхъ примѣровъ описываетъ Киркпатрикъ (на вышеупом. мѣст. стр. 102.). Но всего лучше, еслии все приходитъ въ надлежащее время.

Никому не должно поручать смотрѣнія за тѣмъ, кому прививка оспа, кромѣ совершенно уже оную перенесшихъ. Госпожа Криценей, желѣвъ привить оспу своимъ дѣтямъ, сама за ними при-
сма-

смагнриваа, но опѢ того заразилась оного и ди-
шилась жизни. Она была неоспорожна для того,
что думала, что уже у нее оспа была. Сіе самое
случилось и съ госпожею Фіервиль, которая по-
сѣщала Герцогиню въ то время, какъ молодая
Принцесса была больна прививною оспою (De Foigny
на дышеуном. мѣстѣ).

Для многокровныхъ нужно бываетъ крово-
пускание; ибо естли нѣтъ не пуспипть крови, то
можемъ въ глазахъ сдѣлаться воспаленіе и про-
изойти рола, либо красная сыпь. У нѣкоторыхъ
сначала показывается весьма великое количество
оспы, однако большая часть оной вдругъ подсо-
хаетъ, и только не много оной созрѣваетъ, и чрезъ
все свое время остается. У полнозвѣлыхъ младен-
цевъ не сильнѣе бываетъ оспа, какъ и у самыхъ
хулощавыхъ. Однако увѣряющъ, что смуглые
получаютъ оную въ большемъ количествѣ, неже-
ли блѣдые.

Въ разсужденіи горячки рѣдко что либо бы-
ваетъ нужно, кромѣ питья чаю, либо сыворотки.
Естли же она слишкомъ жестока, то можно
наставитъ промывательное, либо пуспипть кровь.
Но естли неотступно требуютъ, чинобъ даваемы
были лѣкарства, то можно предписать прохладн-
тельное сѣмянное молоко, съ небольшимъ колл-
чествомъ селитры смѣшенное, и давать оного по
чайной чашкѣ каждой часъ, либо чрезъ два часа.
Однако должно оного не много за однимъ разомъ
дѣлать, потому что естли оно долго постоитъ,
то получаетъ запахъ, похожій на крѣпкую водку.
Можно также съ пользою употреблять холоди-

теплыя пища, въ отдѣленіи о перемѣляющейсѣ лихорадкѣ мною предписанныя, либо давши холодную воду, и не ведѣвъ больному лежать въ постѣхъ.

Естьли горючка жестока, то должно на другой день послѣ наступленія оной, либо въ началѣ третяго, больному дать такое слабительное, которое бы скоро могло оказать свое дѣйствіе такъ, какъ я уже о семъ выше упомянулъ. Горючка тогда чаще умиаеши, коль скоро больного послабитъ, а послѣ того выспити и сна, однако она чѣсто такъ бываеши въ маломъ количествѣ, что больной сумиѣдеши, чю-то о ѣсть пощю оное содеши. Но се сумиѣдеши мало, выиши вырочнымъ приливомъ, ко поре не изведешъ никакого дѣйствія. Г. Бирхей привилъ ошу одному господскому сыну дѣвяти лѣтъ, который былъ весьма многорученъ, въ дѣлѣ драссѣ на подѣе розы и бисерой и къ вѣтяи. Онъ разболѣся въ обыкновенное время, полунаъ гесса жестокую горючку, адо его сдѣладо и бѣдѣ краснотыпо и поподѣлаа никаа содѣиши, чю отъ безростанно сзадъ, однако его насильно поднимали съ постѣи и водили по горючѣ. Ему давали приномъ холоднелыныя лѣкарства и наснаивали промывательныя; но счю прѣ на то однокъ, горючка прибывала нѣ одинакой степени жестокости. Но коль скоро онъ принялъ вышеупомянутый порошокъ изъ перечищенного виннаго камня и корня Яаины, и пощомъ его посадило; по онъ силѣ совершенно вочни здоровъ. Оспа послѣ того такъ была легка и непримѣтна, что

Докт-

Докторъ боялся, чтобъ она къ нему опять когда либо не пристала. Для того приналъ онъ ему се впорочно чрезъ двѣ недѣли Димедалевымъ способомъ: однако сіе не имѣло никакого дѣйствія.

Колотые въ груди, головная боль, рдѣніе щекъ и свербежъ въ носу предвѣщаютъ кровотечение изъ носа. Сего не должно останавливать, есѣли оно не слишкомъ сильно и не ввергаетъ больного въ слабость. А есѣли сіе примѣчается, то должно влачить въ носъ свертокъ изъ пряжи, изъ ветошки нащипанной, сдѣланный и намазанный квасцами, съ яичнымъ бѣлкомъ смѣшенными. Обыкновенно въ семъ случаѣ довольно бываетъ для прекращенія кровотечения изъ носа, наспавливаніе промывательнаго потому, что тѣ, коимъ оное прилагается, всегда имѣютъ запоръ.

Рвоту, есѣли она бываетъ сильна, можно остановить наспавливаніемъ одного, либо двухъ обыкновенныхъ промывательныхъ; либо припаркою изъ мяты и небольшого количества шафрану, которая зашивъ въ мѣшечекъ, должна варить въ виноградномъ винѣ, и выжавъ прикладывавъ къ желудку; либо выпьемъ теплой воды. По выпушленіи же оспы она сама собою прекращается.

Есѣли младенецъ въ торжкѣ сонливъ, то обыкновенно ему во снѣ что нисудъ грѣзится; онъ чего онъ пробуждается со страхомъ, пужливостью, а наипаче есѣли онъ проснувшись не видитъ предъ собой того, кто сидѣлъ у его постѣли въ то время, какъ онъ начиналъ засыпать.

пять. Но какъ только съ нимъ заговорятъ, то все сіе вдругъ проходитъ.

Бредъ также не имѣетъ никакого худаго предзнаменования, и удобно проходитъ послѣ кровопеченія изъ носа, послѣ приниманія съ канфарою сѣбланныхъ порошковъ, и послѣ настаиванія промывательнаго. Дрожаніе нижней туовы означаетъ наступающую рвоту, либо поношшу въ желудкѣ.

Естьли младенецъ прежде того былъ боленъ родимцемъ, либо во время оспы прорѣзываются у него зубы; то онъ оная можетъ быть подверженъ судоргамъ или родимцу, либо въ первую ночь по наступленіи горячки, либо, что чаще случается, не задолго предъ выступленіемъ оспы. Однако большее часнію сіе предвѣщаетъ хорошую оспу. Сему припаду можно пособить настаиваніемъ промывательнаго. Рѣдко бываетъ нуженъ порошокъ съ канфарою, либо изъ одного грана мускусу и то грановъ спертата сахару сѣбланный, который можно дать младенцу, когда онъ въ состояніи глотать. (*)

Естьли младенецъ беспокоенъ, не спитъ и мечется въ разныя стороны; то должно дать ему къ ночи не большое количество опійной настойки съ канфарою (*Elixir patergolicum*), которую полезно смѣ-

(*) Когда одному младенцу, которому Д. Ингенгусъ въ Вѣнѣ прививалъ оспу, приключился родимецъ; то онъ велѣлъ тотчасъ открыть окно, и поддержать за оныя младенца. отъ чего въ ту же самую минуцу родимецъ миновался. Мнѣ о семъ увѣдомилъ достойный въ-роющій человекъ изъ Вѣны.

смѣшивать съ какимъ нибудь сырономъ, а особливо съ сырономъ княженицы.

Еслили дитя слабо, оспа не желѣетъ и не созрѣваетъ; то должно ему давать по немногу порошка лихорадочной корки, чрезъ три или четиры часа такъ, какъ предписано въ ошдѣлѣніяхъ о оспѣ и перемежающейся лихорадкѣ.

Когда оспа уже подсохнетъ, то должно давать больному шесть или семь разъ чрезъ три или четиры дни легкое слабительное. Онъ не долженъ также еще употреблять крѣпительной и весьма питательной пищи; ибо въ противномъ случаѣ можетъ воспослѣдовать сыпь на рукахъ и на ногахъ, на груди и на спинѣ, которая производилъ зудъ; а еслили ее расчесать, то ошуды выйдутъ оспрая мокрота. Не бесполезно давать пить младенцамъ чрезъ 14 дней послѣ того взваръ изъ чапушинскаго корая, съ молокомъ смѣшенный; но взрослые должны такимъ же образомъ пить съ молокомъ смѣшенный взваръ изъ бакаушоваго дерева (*Lignum Guaiaci*) (*).

Оспа

(*) Прежде нежели я окончу сіе ошдѣленіе, за нужное почишаю, дать ошвѣтъ на важное возраженіе противъ прививанія оспы, а именно: лумаютъ, будио оспу могутъ изъ дому въ домъ переносить либо пѣ люди, которымъ она привива, либо сами Врачи, либо имѣющіе за больными смощрѣніе, и слѣдзательно опѣ сего происходивъ, что въ таковыхъ мѣстахъ оспа чаще обыкновеннаго свирѣпствуетъ. Но сіе шолчасъ показешя неосновательнымъ, еслили шолко принять въ уваженіе, что сіи рѣчи ложны. Ибо
был-

Оспа также притиветъ, естли и отинъ толъ-
ко ослепный твой, либо сухой струиъ приложитъ
сверьхъ кожи на какой либо части тѣла и при-
крыиъ пластыремъ, чинобъ матерія оспенная не
улы-

бывшая въ Боспонѣ въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ
въ 1722 году повальная оспа произошла не отъ
прививанія потому, что оное начало уже въ Ав-
густѣ. Сывершенствовавшая также въ Нарвѣ 1762
года равнымъ образомъ не отъ прививанія имѣ-
ла свое начало: понеже оное шамъ прежде 1763
года еще не было въ употребленіи. (См. стр. 46
фоліантн на пынувомъ чѣствѣ). Пришмъ въ Лондон-
ской и Столгольмской оспенныхъ больницахъ
не примѣчено, чинобъ оная посредствомъ приви-
ванія распространялась. Не видно доселѣ тако-
выхъ примѣровъ въ Швеціи, хотя въ оной и
весьма многими уже прививали оспу. Ни однаж-
ды также не примѣчено сего и въ Англіи, гдѣ
уже безчисленному множеству людей чрезъ нѣ-
сколько дѣиѣй прививали. Во время продолженія
болѣзни не позволявшъ никому свободнаго до-
ступу къ больнымъ изъ числа тѣхъ, кои еще
не имѣли оспы. Мы теперь стали осторожныѣ;
нежели какъ были въ Англіи, когда прѣдъко
старались еще ввести въ употребленіе привива-
нне оспы. Ноо однажды позволено было шестнѣ
дѣвушкамъ, ходишь къ одному дитяти Г. Вап-
та, и ре запрѣщали имъ во время продолженія
болѣзни его цѣловать. Онъ отъ того всѣ шестнѣ
заразились, и одна изъ нихъ умерла (Котхартск
выше. на пом. мѣсту стр. 119.) Но выздоровѣ-
ннн же больного протѣпривавшѣ плашѣе и вымы-
ваютьъ употребляемое имъ бѣлье. Окны и дѣ-
ри отворяють, горнищу выметаютъ и вычи-
щаютъ. Стружья въ огонь бросають. Никогда
не примѣчено, чинобъ кто заразился оспою на

улетѣла на воздухъ, но какъ бы принуждена была чрезъ всасывающіе сосуды войти въ шло. А еще лучше сего она въ оное войдетъ, еспли гной смѣшавъ съ помадою, либо какою нибудь мазью, въ которую его удобнѣе можно впереть. Однако для сего употребляемая мазь должна быть сдѣлана безъ канфары потому, что она лишаетъ гной заразительной его силы. Сей способъ прививанія съ пользою употребляли въ Англіи и въ Лейпцигѣ. Достойно примѣчанія здѣсь упомянушь объ одной Агаинской пригожей десятилѣтней дѣвицѣ, о которой отецъ весьма много думалъ; Онъ, смѣшавъ оспенный гной съ небольшимъ коли-

че-

открытомъ воздухѣ. Кромѣ того прививная оспа бываетъ не такъ сильна; слѣдовательно меньше она даетъ отъ себя испаринъ. Врачамъ же, которые прививаютъ оспу, больше должно приписать чести и совѣсти, нежели чшобъ они, вмѣсто своего рвенія и возложеннаго на нихъ спаранія о соблюденіи жизни человѣческой, пожелали распространять заразу. Еспли ихъ зовущъ къ больнымъ въ другой домъ въ то самое время, когда они посѣщаютъ больныхъ прививною оспою, то они никогда не пропускаютъ передаваться. А сего на сей случай и довольно. Для того по шолікую довѣренность имѣешь къ Врачамъ нашего Королевства Верховное Правительство, и по сей причинѣ Его Величество милостивѣйше своимъ указомъ Медицинской Коллегіи повелѣваетъ, чшобъ оспа всегда прививаема была подъ смотрѣніемъ и по предписанію Медицины Доктора. А тѣ, кои имѣютъ присмотръ за больными, не прежде бы выходили изъ онаго дому, гдѣ исправили сго

Р

долж-

чесивомъ помады, помазалъ онымъ на внутренней
поверхности перчатки своей дочери между боль-
шимъ и указательнымъ перстами. Въ осьмый
день она получила отъ того горячку, въ одинад-
цатый высыпала оспа, которая была весьма легка
и мало по себѣ оставила рубицъ. Сюда при-
надлежитъ также достойное примѣчанія наблю-
деніе Г. Проф. Бертія, которое онъ 1756 года со-
общилъ Королевской Академіи наукъ, а именно:
одинъ младенецъ, имѣя весьма злую оспу, во вре-
мя своей болѣзни сосалъ только лѣвую грудь
у матери. На послѣдокъ заразилась оспою и мать,

озна-

Должность, какъ по совершенномъ вывѣреніи
своего племени и вымысли бѣлая. Если же при-
нимаются такіе мѣры, то довольно можно
быть увѣрену, что зараза никогда не можетъ
посредствомъ прививанія перейти изъ одного
до у въ другой, либо перенесена бытъ изъ од-
ного мѣста въ иное. Но когда неосторожные
и ошзвжные юности, вслѣвъ себѣ прививъ оспу,
безразсудно бѣзали въ церкви, въ собранія,
въ комедіи и въ другія мѣста; то если они
никого не заразили, по крайней мѣрѣ могутъ,
навѣтъ великій страхъ наипаче тѣмъ, кои
оной еще не имѣли. Следовательно въ такомъ
только случаѣ прививаніе оспы было бы вредно,
если бы не прекратили сего злоупотребленія.
Каждый человекъ имѣетъ право употребить
такое средство, которымъ можно спасти свою
жизнь; однако не долженъ онъ при томъ вер-
татъ въ опасность и своего ближняго. Изъ па-
семъ, изъ Парижа присланныхъ можно видѣть,
что тамъ подобное сему случилось, и что Парла-
ментъ черезъ сіе поуждѣнъ былъ требовать
отъ Богословскаго и Медицинскаго факульте-
товъ мнѣнія, должно ли позволено прививаніе
оспы, или нѣтъ.

однако имѣла легкую оспу, но она была въ великомъ количествѣ изъ лѣвой груди такъ, что почти вся на оной и находилась, а особливо около соска. Ибо кромѣ сего не много только было оспинъ на лицѣ, а на тѣлѣ ни одной.

Сюда можно причислить также тѣхъ, кои заражаются чрезъ допрѣгиваніе къ больному одною только рукою, либо ногою.

Всѣми вычисленными здѣсь способами заразиться оспою можно. Но какъ она безъ заразы никогда не пристаетъ, то каждый изъ сего заключить можетъ, что тотъ долженъ быть счастливъ, кто ею заражается уже тогда, когда его имѣло къ оной хорошо пригошовано.

ОТДѢЛЕНІЕ 14.

О

Корь.

Корь обыкновенно есть споль легкая болѣзнь, что не много дѣшей ошъ оной умираетъ; естли только ихъ хорошо пользовашъ, и естли они прежде не имѣли никакого порока въ груди.

Однако есть примѣры, что она такъ была жестока, что всё сплошь, кнобы только ею не занемогъ, лишались жизни. По сей причинѣ древніе ее назвали Лашискимъ именемъ morbilli (какъ бы малое моровое повзырѣ). Такого рода корь была въ 1713 году, коюая тесма многихъ

Р 2

въ

О всемъ семъ пространно иметъ Г. де ла Кондаминъ въ пяти письмахъ (Lettres de Mr. de la C-à Mr. le D. Maty sur l'état présent de l' inoculation en France 1764. 8.) М.

и Споблюльмъ лишила жизни. Подобная оной, естли только еще не злѣйшая, свирѣпствовала въ Вѣнѣ 1732 года; ибо у большей части больныхъ въ горахъ дѣлался Аншоновъ огонь, и они въ третій либо въ четвертый день умирали. Не меньше смертоносна была и та корь, копорая находилась осенью въ Лондонѣ въ 1762 (*) году, ибо каждую недѣлю по 300 душъ отъ оной умирали. Бывшую корь въ Единбургѣ въ 1758 году, еще считали за хорошую, когда отъ оной каждый двенадцатый больной умиралъ (**).

Корь

(*) Конечно должно было быть написано въ 1672 году, о которомъ Моршонъ (*Pugetologia et arreptis eius*) говоритъ, что въ ономъ корь была весьма смертоносна. Однако Г. Дикксонъ (*observ. med. and. inquit. Vol. 4. p. 256.*) по гораздо вѣрнѣйшему исчисленію (*Collection of the yearly bills of mortality from 1657 to 1758*) находитъ, что сіе число слишкомъ увеличено; ибо по оному умершихъ было только 118 душъ въ цѣлой годъ; а по счету. Г. Мортона должно быть въ три мѣсяца 3600 душъ. Изъ вышеписанныхъ же Англическихъ рееспрозъ яствуетъ, что въ 1670 году умерло 295 душъ, а въ 1674 795 душъ, въ которыхъ годахъ равнымъ образомъ была злая корь. Съ того времени оныя рееспры гласящъ за самый губительнѣйшій 1742 годъ, въ которомъ умерло 981 душа, хотя между ними сочтены еще нѣкоторые умершіе дикою оспою, красною сыпью и проч. М.

(**) Въ Лондонскомъ воспитательномъ домѣ, по объявленію. Г. Вансона (*Med. Observ. and inquit. Vol. 4. p. 132. seq.*) въ 1763 году умерло 19 душъ изъ 139, слѣдовательно 1 изъ 23. Корь была гнилая. — Въ Ямайкѣ корь, естли ее не лечишь, гораздо бываетъ опасна, нежели въ Европѣ, и нимало не уступаетъ оспѣ. За нѣсколь-

ко-

Корь большею частію бываетъ повальная, при-
сипаетъ и распространяется такимъ же образомъ,
какъ и оспа. По той причинѣ заключаешь должно,
что она имѣетъ въ себѣ особый ядъ, который
не въ воздухѣ содержишься, и не посредствомъ она-
го переходить съ мѣста на мѣсто, но перено-
сится самыми людьми и употребляемыми ими
вещами. Слѣдовательно отъ сей болѣзни равнымъ
образомъ можно бы избавишься, какъ и отъ оспы,
еслибы только не допускать къ себѣ заразы.
Въ нашей крови нѣтъ никакой корьной матеріи,
но находится только расположеніе къ сей сыпввой
горячкѣ, которая безъ заразы никогда, и ни у
кого сама собою не бываетъ.

Не можно также повѣрить, чтобъ кто ни-
будь имѣлъ корь больше одного разу, еслили
только дѣйствительно онъ ее перенесъ, и не оспа-
лось послѣ того затвердѣніе въ железахъ. Ибо быва-
етъ въ семъ случаѣ иногда задерживающъ въ себѣ нѣ-
сколько матеріи, могущей по прошествіи нѣко-
торого времени произвести новую сыпь. Таковой
примѣръ приводитъ Г. Д. Гуме (Medical Facts and

Р 3

Икре-

ко дней прежде выступленія оной показывающія
бѣлая, на малочницу похожая машна на деснахъ,
которыя во время выступленія распространяютъ-
ся во всемъ рту и нидепремномъ горлѣ съ вож-
женіемъ, похожимъ на розовый румянецъ. А ког-
да больше умножились сыпь, то слѣдуетъ рвѣзъ
въ животи съ поносомъ, которымъ испраж-
няется кровь и слизь, и часто бываетъ без-
престанная рвота. О другихъ тяжелыхъ при-
падкахъ я не упоминаю (снеси сюда *Lectures and
Essays du different practitioners of the West-Indies p.
113. sqq.*). М.

Experimente p. 280). Правда известно мнѣ, что многие Врачи, въ числѣ которыхъ находился и Г. Гааршманнъ (*) (Berättelser til K. Colleg. med. 1765 S. 59.) утверждающъ, что корь многократно можетъ приключиться: однако мнѣ въ 44 лѣтней моей Практикѣ никогда сего видѣть не случилось.

Никто, сколько по сіе время извѣстно, не исключенъ отъ сей болѣзни, какого бы онъ возраста и пола ни былъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыя заразительный ядъ кори рѣдко приносится, многіе не имѣяъ кори въкъ свой провели, и скончались отъ другихъ болѣзней. Однако можешь спастись, что и отъ кори равнымъ образомъ какъ отъ оспы чешыре или язва изъ спа душъ свободны быть могутъ. Но о семъ не можно еще съ точною вѣроятностію сказать до тѣхъ поръ, пока не войдетъ въ шакре же употребленіе и прививаніе кори, въ какое вошло прививаніе оспы.

Тогда

(*) Сей Эбойскій учитель у многихъ младенцевъ, коварые имѣли корь въ началѣ 1763 года, чрезъ годъ опять оную въ Августѣ мѣсяцѣ примѣтилъ; и сія также въ разсужденіи сыпи, кашлю, вожженія въ глазахъ, кровоотеченія изъ носа, поносу и вроду равно была десполоа, какъ и первая. Г. Гуме (на сказ. мѣстѣ стр. 225.) описываетъ примѣры, что корь была два и три раза. Равнымъ образомъ повѣствуетъ. Г. Де Гаенъ (Rat. med. soci. T. 3. p. 352), что въ одно время, когда была повальная корь, многіе младенцы заражались оною, которыхъ уже отчасти онъ самъ пользовалъ отъ оной, а отчасти родители ихъ его увѣряли, что они однажды уже ее имѣли. М.

Тогда журналы, естли въ оныхъ все будетъ исправно записываемо, рѣшатъ сей вопросъ.

Корь обыкновенно подвержены бывающъ младенцы. Однако есть примѣры, что она была и на взрослыхъ людяхъ. Врачи описываютъ также примѣры, что нѣкоторые младенцы съ оною на свѣтъ рождались. Слѣдовательно она никогда не приспаетъ отъ страху или боязни. Когда корь принесена будетъ въ какое либо мѣсто, то до толѣ въ ономъ пребываетъ, пока будетъ ей встрѣчаться шакіе люди, кои оной еще не имѣли, или пока здоровые для избѣжанія заразы не пресѣкутъ всякаго сообщенія съ больными. По справедливости о семъ всѣми мѣрами должно стараться, когда корь свирѣствуетъ злая. Обыкновенно думаютъ, что имѣвшій оспу, спустя шесть недѣль послѣ болѣзни, никого больше заразить не можетъ, естли только переѣмнитъ свое платье. Но и тѣ, которые были больны корью, не обязаны держать такъ долговременнаго карантина потому, что прививныя нишки, въ корьной гной обмоченныя, не такъ долго сохраняющъ свою силу, какъ употребляемая для прививанія оспы.

Естли примѣчено, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ кто либо живетъ, либо откуда прибылъ. находитъ корь, и онъ, никогда прежде не имѣвъ оной, сдѣлается больнымъ, при томъ будетъ находиться въ такихъ обстоятельствахъ, что зараза ему либо чрезъ людей, либо посредствомъ платья сообщена быть могла: то весьма вѣроятно, что онъ ею заразился. А естли еще пришло у больного бу-

дешъ сильный сухой кашель, изъ глазъ и изъ носа будутъ течь мокроты, сдѣлается жаръ, и воспослѣдуетъ совокупно со всѣми сими признаками горячка: но легко можно заключать о сей болѣзни.

Жоръ всегда сопряжена бываетъ съ выпеченными припадками. однако часто такъ, какъ и прочія повзлыныя болѣзни, бываетъ сама на себя не похожа. Впрочемъ обыкновенно она нѣчнается больше или меньше ощущительнымъ ознобомъ, въ первый день въ жаръ перемѣняющимся, который на другой день еще увеличивается. Всѣ больные при томъ имѣютъ сухой кашель, изъ глазъ у нихъ текутъ слезы и бываетъ частое чиханье, только то различіе между ими находится, что когда кашель бываетъ весьма сильный, то изъ глазъ не много течетъ слезъ, и чиханье бываетъ рѣже и не столько примѣшное. Кроме того лицо нѣсколько раздувается, глазныя вѣки не много распухаютъ, и какбы съ трудомъ растворяются, глаза не могутъ терять свѣта и рдѣютъ. Больные жалуются на чувствуемую ими слабость, тяжесть въ головѣ и въ груди, и боль въ шеѣ и поясницѣ. Приключается имъ рвота и отвращеніе отъ пищи, жажда, языкъ бѣлѣетъ, слѣдуетъ колика, поносъ, бредъ и кровошеченіе изъ носа, а иногда (хотя то рѣдко) и родимецъ. Сии припадки у нѣкоторыхъ соединены бываютъ съ великою склонностію ко сну и жестокою горячкою.

Около четвертаго, либо въ самый четвертый день выступаютъ язвами не большія красныя

ныя на лицѣ пятнушки (*), которыя въ первый день нѣсколько торчатъ на кожѣ. На другой же ровныываются съ кожей; расширяются и краснѣютъ; онѣ не бываютъ круглы, но различное имѣютъ очертаніе, какъ то: продолговатое, треугольное, четырехугольное и многоугольное. Въ часѣ онѣ часу прибываютъ числомъ и увеличиваются; а равнымъ образомъ исподоволь показываятся и на шеѣ, на груди, на рукахъ, на спинѣ, на брюхѣ, на поясницѣ и на ногахъ. Однако здѣсь они представляють вѣтскія красныя пятна.

Вышенисанные припадки не умаляются отъ выступленія кори такъ, какъ сіе бываетъ въ оспѣ (**). Одна только рвота у нѣкоторыхъ чрезъ сіе перестаетъ. Напротивъ того оныя еще пуще увеличиваются, а особливо горячка, тяжестъ въ груди, тяжелое дыханіе, кашель, слабостъ и печеніе изъ глазъ слезъ, также склонность ко сну и отвращеніе отъ пищи. Въ шестой или седьмой день кожа на лбу и на лицѣ нѣсколько бываетъ щереховата, пятнушки уменьшаются и весьма подсыхаютъ; но вмѣстѣ того они иногда бываютъ на прочихъ частяхъ тѣла весьма широки и красны.

Р 5

Вѣ

(*) По сему различается корь отъ красной сыпи. Р. Впрочемъ нѣкоторые переносятъ корь одною только корною горячкою, не имѣя сыни. Г. де Гаенъ (*Rat. med. conch. T. 3. p. 353.*) упоминаетъ, что онъ въ одно время много видѣлъ такихъ примѣровъ. М.

(**) Г. Тиссонъ (на сказ. м. спра. 253.) примѣтилъ, что желчная рвота, чрезъ два или три дни послѣ сыни послѣдовавшая, гораздо большее приносила облегченіе, нежели самая сыпь. М.

Въ осьмый день едва можно примѣнить на всемъ тѣлѣ нѣсколько пиянущекъ, а въ девятый уже по все ихъ не бываетъ. Но вмѣсто этого кожа наподобіе скорлупы ошдѣляется, и тѣло какъ бы мѣлкою мукою бываетъ осыпано.

Тогда заключаютъ, что уже вся опасность миновалась: однако иногда случается, что горячка ожесточается, тяжеснѣ въ дыханіи увеличивается и приключается такой сильной кашель, что больной ни днемъ ни ночью не имѣетъ покоя. Но большею частію вдругъ слѣдуетъ облегчительный поносъ, который, если бываетъ умѣренный, вскорости все зло прекращаетъ. Если же онъ бываетъ сильный, то приводитъ въ слабость больного. Когда долго продолжается и не перестаетъ чрезъ нѣсколько недель; то производитъ медленную лихорадку, чахотку и опухоль брюха. Впрочемъ иногда все благополучно оканчивается и безъ облегчительнаго поносу; когда больной получаетъ небольшой и ровный потъ; ибо онъ также прекращаетъ горячку. Изобильное кровотечение изъ носа прекращаетъ боль головы, шеи и глазъ. Если только стараться, доставивъ больному свободное испражненіе ничомъ: то тѣмъ можно избѣгнуть вышесказанныхъ слѣдствій.

Но если горячка и кашель продолжаются, дыханіе бываетъ частое, тяжелое и горячее, при томъ щеки краснѣютъ: то сіе худымъ бываетъ предзнаменованіемъ. Ибо въ такомъ случаѣ въ легкихъ находится возженіе. Если при продолженіи горячки воспослѣдуетъ колошье въ боку, то

по больной также находилась въ опасности. Равнымъ образомъ и естли слабѣется въ горлѣ такое воспаление, что онѣ того бываетъ тяжело дышати и глотати. Естли же хощя и умалѣется горячка, но каждый день опять ожесточается; приномѣ бывающѣ спѣсненіе въ груди, тѣло чихаетъ и больной, много выплевываетъ мокротъ, похожихъ на гной; то сіе доказываетъ прорвавшійся въ легкомѣ нарывъ.

Естли корь преждевременно опять скроется въ тѣло, и потомъ воспослѣдуетъ бредъ: то больной находится въ великой опасности. Не безъ причины опасаются высокихъ красныхъ пятенъ, иди шѣхъ, которыя заранѣе становятся блѣдны, равно какъ и такой кори, которая либо ранѣе, либо позже выше означеннаго времени выходитъ. Впрочемъ корь иногда у младенцевъ такъ бываетъ легка, что часто прежде высиваетъ, нежели они почувствуютъ въ себѣ болѣзнь. Напротивъ того иные изъ нихъ гораздо тяжелѣе бываютъ оною болѣзны. Во время случившейся въ Уссалѣ въ 1752 году кори, которая впрочемъ незлая была, на силу я могъ избавить онѣ смерти одного лѣтнѣшняго младенца. Онѣ находился съ другимъ мальчикомъ, болыымъ корью, въ одной горницѣ. Его братъ также былъ оною зараженъ. Въ немъ самомъ примѣчены были обыкновенные знаки кори съ горячкою, ознобомъ и пачемъ небольшого количества изъ глазъ слезъ; но кашель у него столь былъ жестокъ, что походилъ на судорожный, и каждый разъ до шѣхъ поръ продолжался; пока не слѣдовала рвота. При всемъ томъ онѣ чрезъ двѣ ночи не пришелъ въ худшее состояніе.

По

По продолженіи сего такимъ образомъ чрезъ 21 день, напоследокъ высыпала корь, и посадовыя припадкы сдѣлались гнотѣ. Беременнымъ же женщинамъ и родильницамъ корь весьма опасна. Равной участи ожидать должны имѣющіе слабую грудь, или склонность къ кровоплеванию и спраждующіе грыжею. Ибо въ такомъ случаѣ кашель многія причиняетъ бѣдствия. Родимца опасаться должно въ то время, когда больной въ первой степенѣ болѣзни весьма сильно потѣшетъ, и мало, либо совсемъ не мочится. Еслили разсудится мать или кормилица, когда ея питомецъ боленъ корью, то отъ этого бывающъ великая опасность.

Корь часто вмѣстѣ съ оспою въ одно и то же время на одномъ какомъ либо мѣстѣ свирѣпствуетъ. Однако, сколько мнѣ извѣстно, никто ихъ обѣихъ за однимъ разомъ не имѣлъ, но всегда одну за другою. Г. Проф. Бергъ приводитъ такіе же примѣры (*Verateller til Kongl. Coll. med. 1765. p. 260. (*)*).

Причиною кори и происходящихъ отъ оной припадковъ бываетъ не что иное, какъ собственнѣйшій ея ядъ, мѣшающійся съ кровію и производящій раздраженіе и воспладеніе въ шлѣхъ. Жестокій кашель происходитъ отчасти отъ того, что мы нѣкоторую часть оного втягиваемъ въ легкія посредствомъ дыханія, а отчасти отъ того, что на внутренней поверхности оныхъ бываетъ па-
кая

(*) Примѣчено, что корь была соединена съ приливною оспою. Новѣйшее описаніе о соединеніи сихъ болѣзней находится въ Шведскихъ запискахъ 1766 году стр. 71 и слѣд. 199 и слѣд. (на Шв. языкѣ.) М.

кая же сыпь, какъ и снаружи на кожѣ, которая удерживаетъ ципарину. Однако отъ кожи она скоро отдѣляется на подобіе чешуи, и какъ мула отпадеши: а напрошивъ того въ легкихъ, которыя всегда находятся мокры, сіе дѣлается медлительнѣе. Въ оныхъ всегда еще нѣсколько ее остается, безпрестанно побуждаетъ къ кашлю, и никакимъ другимъ образомъ испражниться не можетъ. Еслили харкотина онѣ чего либо загустѣетъ, то имѣтъ удобнѣе испражняетъ еѣ собою вышенисанную чешую, или муку.

Что сіе такимъ образомъ бываетъ, то явно видѣти можно изъ описанія продолженія болѣзни ихъ, которымъ Г. Д. Гуме прививалъ корь. Большая часть изъ нихъ не имѣли кашлю, а находился онъ только у нѣкоторыхъ, и былъ такъ легокъ, что не заслуживалъ никакого вниманія.

Изъ вышенисаннаго заключить можно, что какъ оспа имѣетъ четыре степени, такъ и корь оныхъ имѣетъ три. Первая изъ нихъ (*radium contagii*) продолжается отъ начала болѣзни до vystупленія кори. Вторая (*radium erupitionis*) до того времени, когда корь начинаетъ слущиваться; а третья (*radium atarescentiae*) начинается въ шестой или седьмой день, и оканчивается въ осьмый или девятый, когда т. е. всѣ пупырышки отпадутъ.



ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ.

Когда корь легкая и болѣзнь не имѣетъ никакого поврежденія въ трудѣ; то въ первой степени рѣдко что либо, кромѣ хорошаго содержанія, бываетъ полезно. Что же касается до содержанія, то оное здѣсь должно быть такое, какое и въ оспѣ, какъ въ разсужденіи горницы, постибли, одѣянія, такъ и въ разсужденіи пиши и питія. По сей причинѣ я ссылаюсь здѣсь на то предписаніе, которое мною упомянуто въ оспѣ оспѣ. Только въ кори не должно ничего употреблять ни въ пищу ни въ питіе кислаго, потому что въ оной кашель бываетъ сильнѣе. Корная маперія быть естѣ жижѣ, нежели оспенная, и потому можетъ убо быть вогнана быть внутрь: для того при лѣченіи должно смотрѣть за больнымъ корью. Весьма также полезно наблюдать, чтобъ ни како ненужный приборъ не находился. Равнымъ образомъ не должно въ его горницѣ ночью много зажигать свѣчъ. Ибо какъ присутствіе многихъ людей, такъ и зажиганіе многихъ свѣчъ больному причиняетъ безпокойство, и, какъ яствуюсь изъ опытовъ Г. Галеса, портитъ въ горницѣ воздухъ.

Когда корь свирѣпствуетъ злая и опасная; то 1) болѣзнь частію больному нужно бываетъ пустить кровь. Ибо въ таковой кори рѣдко горячка бываетъ слишкомъ слаба, но чаще слишкомъ жестока. Причины, для которыхъ кровопусканіе бываетъ либо нужно, либо не нужно, описаны мною въ оспѣ оспѣ (стр. 121 и слѣд.), которымъ и въ семъ случаѣ сообразоваться

ся

ѣя должно. (.) Почтенный Д. Меадъ, будучи однажды спрошенъ отъ нѣкотораго Врача, какимъ образомъ онъ поступаетъ, что у него никакъ не умираетъ онъ кори, чистосердечно признался, что онъ всегда вслѣдъ пускаетъ кровь, потому что онъ безъ того опасается возженія въ легкихъ. Чрезъ нѣсколько времени, сей опять увидѣвшись съ Г. Меадомъ, благодарилъ его за данный ему имъ совѣтъ; ибо онъ ему столько пособилъ, что послѣ того и у него ни одинъ больной не умеръ. Когда по моему приказанію пущена была въ сей болѣзни кровь, то она была покрыта толстою желтою пѣною. Однако всегда ли сіе случается, время покажетъ.

2.

(*) Въ одно время, когда свирѣствовала корь (о которой Г. Де Гаенъ *Rat. med. contin* Т. 3. р. 348) упоминаетъ, кровопусканіе также опіаси въ самой болѣзни, а опіаси въ случающейся послѣ опіаженія кори горячкѣ было необходимо нужнымъ и спасительнымъ средствомъ. — Сію досюпную примѣчанія часть леченія Г. Ватсонъ (*Med. observations and inqu.* Vol. 4. р. 146) не все оставляетъ. Впрочемъ сколь полезно кровопусканіе въ кори, соединенной съ воспаленіемъ въ извѣстныхъ случаяхъ, столь мало подобія отъ него бываетъ не только прежде выступленія, но и послѣ подсыханія оной при продолженіи и умноженіи грудныхъ припадковъ въ гинлой кори. Въ такомъ случаѣ оно такъ, какъ и въ другихъ гинлыхъ болѣзняхъ, увеличиваетъ слабость, самое зло увеличиваетъ. По сей причинѣ совѣтъ Меадовъ должно ограничивать. А что онъ несправедливо порицалъ Сиденгма за опущеніе кровопусканія въ началѣ болѣзни, то сіе доказалъ Г. Диксонъ мѣси. (на вышеупомянутомъ стр. 247.) М.

2) Потомъ должно ему, смотря по обстоя-
тельствамъ, дать либо рвотное, либо слаби-
тельное.

Еслили примѣчено, что больной имѣетъ
склонность ко рвотѣ, языкъ у него нечистъ,
горько во рту, бываетъ тошнота, боль въ голо-
вѣ, либо и самая рвота: то должно стараться,
чтобъ его вырвало. На сей конецъ должно ему
давать или теплую воду съ деревяннымъ, либо
коровьимъ несоленнымъ масломъ, или воду, Римскою
раманскою на подобіе чаю настоянную (*). Можно
также вмѣсто сего выписати изъ Аптеки слѣдую-
щіе три порошка:

К.

(*) *Anthemis nobilis* L. сіе свойство раманковыхъ
цвѣтковъ, что они производятъ рвоту, въ Гер-
маніи не довольно извѣстно: ибо въ печатае-
мыхъ въ оной книгахъ, содержащихъ въ себѣ
описание лѣкарствъ, въ которыхъ наипаче долж-
но бы сіе быть написано, объ ономъ ничего не
упоминается. Напротивъ того въ Англіи сіе
гораздо извѣстнѣе. Я нашелъ въ разныхъ Ан-
глинскихъ сочиненіяхъ (а именно: *Pringle's Obser-*
vat on the Dis. of the army Ed. 5. p. 226. 309. *Mor-*
ris's Account of the Dis. in Britischmil. Hospitals p. 175;
и *Lind's Ess. on Dis. in hot. Climates* p. 250.), что
романковые цвѣты предписываются какъ для
продолженія начавшейся рвоты, такъ и для
произведенія оной. Но что наипаче Римская
раманка въ Англіи для сего употребляется, то
сіе видѣть можно въ предисловіи Нѣмецкаго
перевода Прингеловыхъ сочиненій, Г. Бриндомъ
переведенныхъ. Конечно и Шведскіе Врачи объ
Англинскихъ Практиковъ получили знаніе о семъ
дѣйстви вышесписаннаго растѣнія. М.

B. Cortic. rad. Ipecacuan. Возми корки Ипекакуанаго корня три грана.
gr. III.
Sachar. alb. gr. XVII. Чистаго сахару 18. гр
M. F. pulv. in III. p. Сопри въ порошокъ и раз-
aerq. d. дѣли на три части.

Ихъ можно употреблять для двухлѣтнихъ, или прехлѣвшихъ младенцевъ, и дать сначала одинъ, а потомъ, еслили четверть часа не сдѣлается рвоты, другой; послѣ, еслили въ случаѣ еще не произойдетъ никакого дѣйствія, спустя четверть часа и третій, который уже конечно произведетъ легкую рвоту. Ничего такъ легко не переноситъ рвоты, какъ младенцы. Ихъ волокны бываютъ мягки и въ ихъ шлѣ, сравнительно съ взрослыми, больше находится жидкостей. Я всегда съ большою безопасностію даю рвотное младенцамъ, нежели взрослымъ. Еслили оно такимъ образомъ употреблять, то оно людямъ, не имѣющимъ въ шлѣ другихъ поврежденій, не можетъ причинить худаго слѣдствія.

Еслили же у больного не примѣчается выше объявленныхъ признаковъ, но вмѣсто того брюхо нѣсколько раздуто и въ немъ ворчитъ, либо ощущается побужденіе къ испражненію на низъ, но припомъ не слабитъ: то нужно дать легкое слабительное, которое можно выбрать изъ числа предписанныхъ въ Описаніи объ оспѣ (на стр. 157) такъ, какъ въ ономъ о семъ упомянуто. Еслили заблаговременно очистить хорошо желудокъ и кишки, и сіе сдѣлать прежде, нежели высылетъ корь; то симъ самымъ можно опровергнуть многіе припадки, въ болѣзни случающіеся;

а особливо можно сдѣлать, что поносъ, обыкновенно въ седьмой день слѣдующій, будетъ умѣренъ и полезенъ. Еслили больной въ началѣ болѣзни спрѣдешъ рѣзомъ въ животѣ и поносомъ; то должно также дать ему слабительное, а иначе изъ рвению, дабы тѣмъ прекратить причину рѣзу и вмѣстѣ съ нею поносъ.

1) Потомъ больной долженъ употреблять тѣ же самыя средства, которыя предписаны на стр. 159 и 160 подъ N. 3. 4. 5. 6. и 7.

Безъ замедленія должно спараться употребить для глазъ приспойныя средства, которыя по большей части состоятъ въ томъ, чтобъ не давать больному глядѣть на свѣтъ, и почаще вливать въ глаза чайною ложечкою по немногу розовой воды, чрезъ что горячая соленая мокрота, безъ сего пособія своимъ раздраженіемъ могущая произвести возжегіе, омывается.

Кровоотеченія изъ носа, еслили оно воспослѣдуетъ, преждевременно останавливать не должно, ибо посредствомъ оного отвращается головная боль и бредъ. Но еслили оно шакъ усилился, что отъ потерянія многой крови тубы и лицо поблѣднѣютъ, а руки и ноги похолонутъ, либо больной начнетъ жаловаться, что его весьма тошнитъ; то должно, не упуская времени, его прекратить. А какимъ образомъ сіе сдѣлать можно, о томъ уже сказано выше (на стр. 2. 166) Тамъ же можно видѣть, какимъ образомъ поступать и съ сильнымъ рвотомъ, бредимъ, жестокимъ поносомъ и судорогами.

Ка-

Кашель въ нри больше всего беспокоитъ. Но оному можно пособить пріятнымъ груднымъ составомъ, сдѣланнымъ изъ одного личнаго желтка и двухъ унцѣвъ свѣжаго холодновыжатого миндальнаго масла, которое, при безпрестанномъ бошпаніи постепенно, къ желтку должно приливать: потомъ хорошо смѣшавши, прилить два унца липкаго супу изъ перловыхъ крупъ и одинъ унцѣвъ сыроу большого просвирияка, либо ячменнаго (*).

Послѣ все сіе должно бошпанъ до тѣхъ поръ, пока сдѣлается подобно густому молоку, и давать младенцу такъ часто, какъ того будетъ пресовашъ надобность, по одной или по двѣ ложкѣ. Естли же у больного случится поносъ, то лучше давать такимъ же образомъ такъ называемый Парижскій бѣлый составъ отъ одышки, или лоохъ. Можно также, естли есть въ готовности, безпрестанно держать во рту по немногу пошпиль солодкаго корня (рафа liquidae)

Однако наилучшее облегченіе приноситъ чай изъ бузиновыхъ цвѣтовъ, съ пятою долею молока смѣшенный, естли его почаще пить. Для недоснаточныхъ же людей можно распушнить двѣ драхмы соку солодкаго корня въ одномъ фунтѣ процѣженного ячнато взвару, и давать каждый разъ по чайной чашкѣ, когда начнетъ беспокоить кашель. Хотя кашель весьма несносенъ, однако


С 2

онъ

(*) Сій сыропъ, котораго въ Нѣмецкихъ Аптекахъ не знаютъ, дѣлается по Парижской фармакопей (codex medicamentarius Parisis). М.

онъ рѣдко прежде окончанія кори бываетъ опасенъ.

Еслили примѣчено, что въ горлѣ начинается воспаленіе; то немедленно должно употребить мягчайшее полосканіе, котораго различные виды я описалъ на стр. 163 и 179. Еслили же оно внутри весьма распухло, то къ оному приложить снаружи съ горчицею мѣсто; однако оно поспѣе должно опиять прочь, какъ скоро оно чрезъ нѣсколько времени произведетъ рана.



ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ.

При наступленіи четвертаго дня не долженъ больной много ворочаться въ постелѣ, но повиненъ покойно въ оной лежать. Ибо въ то время нужно бываетъ, чтобъ энъ естли не пошла, по крайней мѣрѣ имѣла бы легкую испарину. Опытны доказываютъ, что въ такомъ случаѣ корь хорошо выступаетъ, и внутреннія части отъ оной освобождаются. Въ Сие время, естли того требуетъ надобность, непременно должно дать больному легкое рвотное, либо одинъ или два канфарные порошка, либо съ канфаромъ сѣмянное молоко; либо естли корь не скоро высыпаетъ, порошокъ, съ мускусомъ смѣшенный. (Смолр. стр. 167.) А особливо должно ему давать почаще пить. Питье для него также нужно бываетъ, хотя корь и сама собою высыпаетъ; только безъ вышеписанныхъ лѣкарствъ тогда обойтись можно.

Когда

Когда корь выпуститъ, то должно хорошо рассмотреть цвѣтъ пятенъ и примѣчать, будутъ ли они оставаться чрезъ три дни, и начнутъ ли послѣ того постепенно такимъ же порядкомъ, какимъ выходили, опадать. Еслили они имѣютъ весьма красный цвѣтъ, то должно употреблять внутрь вышеписанныя холодительныя лѣкарства, и давать почаще пять описанное въ первой степени питье.

Еслили же на нѣкоторыхъ изъ нихъ цвѣтъ бываетъ красный, а на другихъ блѣдный; то должно употреблять порошокъ съ канфаромъ, либо съмянное молоко съ ономъ же.

Когда корь опять скоро спрячется внутрь тѣла; то должно почаще давать вышеупомянутый порошокъ, либо съмянное молоко; либо дать одинъ или два порошка съ мускусомъ. Должно также давать почаще пить чай изъ бузиновыхъ цвѣтѣвъ, или изъ цвѣтѣвъ мелуницы; сверхъ того немедленно приложить нарывный пластырь, либо съ горчицею тѣсно къ икрамъ, или, еслили вскорости больнои начнетъ бредить, къ запятку. Когда послѣ сего опять покажутся пупырышки, то не о чемъ больше беспокоиться. Однако весьма нужно предоберегать больнаго отъ проспуды, гнѣва, страха и подобнаго тому, дабы корь опять не вошла внутрь.

Еслили больнои въ сіе время весьма беспокоится, то можно ему, а особливо въ вечеру, дать одну или двѣ чайныя ложки макового сыропу, (Fucus e mesoria) и сіе повторять всегда, когда только больнои будетъ беспокоиться.

ТРЕТЯЯ СТЕПЕНЬ.

Съ сего степенью наступаютъ самыя опаснѣйшіе дни, которые немедленно рѣшати, выздоровѣли ли или умереть, или въ другую опасную болѣзнь впася больной долженъ. Для того въ сіе время горѣздо больше нуженъ за больнымъ хорошій присмотръ и частое освѣтленіе, мягка ли кожа, и бѣеніе жилъ не слабѣли стачовишся. Ибо въ семъ случаѣ можно ожидать легкой испарины, либо и гасноящаго поноу, которымъ должна кончиться горячка. Еслили сіе случится, то довольно бываетъ для больного, когда онъ пьетъ избыточное количество воды. А еслили не воспослѣдуетъ сама собою испарина или потъ, при томъ у больного не примѣчается въ брюхѣ ворчанья и оное не раздуто, то должно стараться производить испарину теплымъ питьемъ и порошкомъ, съ канфарою смѣшаннымъ. Однако не должно сего употреблять больше, нежели какъ для произведенія оной. По томъ ее должно поддерживать до тѣхъ поръ, пока не пройденъ горячка; а послѣ оной нужно дать два или три раза слабительное.

Еслили же напротивъ того примѣчается, что брюхо раздуто, кожа суха, и у больного находящія въ животѣ рѣзъ и ворчанье, то должно ожидать поносу, который обыкновенно скоро слѣдуетъ, и въ ономъ такъ частыя бываютъ испражненія, что весьма не рѣдко сразу 10, 12 разъ, либо и больше слабятъ.

Когда

Когда оный произведетъ такое облетченіе, что кашель перестанетъ, глаза спанутъ свѣтлѣе, больному будетъ свободнѣе имѣть движеніе, и онъ будетъ въ силахъ спановиться на ногахъ, при томъ брюхо сдѣлается мягко: то сіе значитъ, что поносъ полезенъ, и что онаго прекращать не должно. Ибо онъ самъ собою уймется и больной будетъ здоровъ.

Если же оный соединенъ бываетъ съ столь жгучимъ рвотомъ, что его не можно прекратить припариваніемъ теплыми салфетками, либо деревянными шарѣлками: то должно давать больному вышеупомянутую на стр. 157 ревенную наливку и къ брюху приложить мазь, изъ двухъ драхмъ ееріаку, полдрахмы выжипаго масла изъ мушкетнаго двѣту (*oleum maceis*) и двухъ капель перегнаннаго лимоннаго масла соспавленную. Все сіе прежде хорошо между собою должно смѣшать, но потомъ намазать на лѣву и приложить къ пуку, нѣсколько его напередъ прикрывъ хлопчатую бумагою. Если же долго поносъ продолжается и не видно отъ него вышеобъявленныхъ хорошихъ слѣдствій, либо оный слишкомъ жестокъ, то должно его сшараться остановить предписанными на стр. 165 и 172 средствами.

Но если болѣзнь ни вышеписаннымъ образомъ, ни избыточною мочею не прекращается; горячка съ кашлемъ по прежнему продолжается, либо еще и увеличивается; при томъ дыханіе бываетъ частое, тяжелое, горячее и соединенное со рвотіемъ шекъ: то сіе означаетъ новую горячку, легочницею, или возженіемъ легкихъ

(*peripneumonia*) называемую, которая бываетъ весьма опасна. Въ такомъ случаѣ неуловительно должно пустить кровь съ той руки, надъ которою пуще щека краснѣетъ. Послѣ того приложить въ спинѣ между лопатками нарывной пластырь; а какъ только оный нарыветъ, то другой на груди съ той же стороны, гдѣ пущена кровь. Но сей пластырь должно посыпать не большимъ количествомъ сполченой въ порошокъ канфары, дабы тѣмъ отвратить могущій послѣдовать рвѣзъ въ мочеиспускательномъ стволѣ (*isthmus*). Еслили онъ сего дыханіе сдѣлается свободнѣе и не такъ скорое; то должно тогда давать больному порошокъ съ канфарою, дабы произвести не большой потъ. Приемъ нужно давать почаще лишь сыпорожку, съ равнымъ количествомъ отварной воды смѣшенную, каждый разъ распуская въ оной по немногу уксому, изъ двухъ частей чистаго меда и одной части хорошаго винограднаго уксусу на подобіе сыроа свареннаго. Сие питье всегда долженъ онъ употреблять нѣсколько теплое. Еслили у больного сдѣлается легкая рвота, съ желчью, либо съ кровью смѣшенною мащерією, то не должно больше ни повторять кровопусканія, ни давать порошка съ канфарою, но употреблять вышеупомянутое питье и сулъ изъ перловой крупы, когда по всему примѣнно, что больному легче спяновится. Еслили онъ не пьетъ вышеписаннаго взвару; то должно сдѣлать другое питье и въ равнаго количества воды и молока, на пр смѣшать, вмѣсто обоихъ, по 8 фунтовъ; во томъ вскипятивши прилишь потребное количество

тество хорошаго винограднаго укусу, чтобъ молоко сошло. Навослѣдокъ сѣю сыворотку должно сязать пропускающую бумагу процѣдиль, распустить въ оной одну дрихму чистой селитры, и приваивать потребное количество для доставленія приятнаго вкуса и для уменьшенія кислоты сахару. Деснапочные люди могутъ вѣсть положить вмѣсто селитры толкоежъ количество соли кислицы (*sal essentiale acetosellae*). Еслили сама природа не слабитъ; то должно ежедневно по утру и въ вечеру наставлянвать промывательное.

Еслили же у больного слѣзается козѣтъ лѣ боку съ торячкою; то должно лѣзъ руки пущить кровь на той сторонѣ, на которой приваивается козѣтъ, и послѣ потчасъ приложить на больное мѣсто нарывный пластырь. А когда оный нарыветъ, то давать порошокъ съ канфарою и вино почаще теплѣе питье, которое наилучше вырываетъ изъ вышеписанныхъ. Когда съ кашлемъ начнетъ выходить мокрота, то не должно ни крохи пускать, ни производить поту, ибо чрезъ то можно оную ко вреду больного остановить. Довольно еслили олъ находишь въ легкой испаринѣ, которой можно пособлять изобильнымъ питьемъ. Нарывный пластырь, какъ выше сказано, должно посыпать шеркою канфарою. Также и въ семъ случаѣ должно каждое утро и вечеръ наставлянвать промывательное, когда сама натура не довольно слабитъ. Еслили болью не соглашается, чтобъ ему приложили нарывный пластырь, то должно приложить ему къ больному мѣсту мѣсто съ горчицею, либо принавивать оное пузыремъ,

Наполненнымъ цѣвѣнами бузиновыми, ромашко-
выми и шафраномъ, которыя прежде должно въ
молокъ варить, и почаще перемѣнять; либо ма-
зать больное мѣсто льнянымъ канфарнымъ масломъ
(oleum lini camphoratum (*)), или мазью больного
просвирняка, съ не большимъ количествомъ кан-
фарнаго спирту смѣшенною; либо приставить къ
тому мѣсту, гдѣ чувствуется колотье, пять
или шесть пиявицъ, или наставить банки; либо,
еслии чего другаго въ готовности нѣтъ, при-
ложить разрѣзанный, не давно изъ печи вынутый,
ржаный хлѣбъ.

Еслии напротивъ того примѣчено, что хо-
тя горячка и умалается, но всегда послѣ обѣда
опять ожесточается; при томъ въ груди бываетъ
спѣсненіе и хрипота, съ кашлемъ много выхо-
дитъ гною и нѣко чахнети: то больной долженъ
пользоваться либо молокомъ, либо сывороткою.
Когда выпущенная кровь покрыва бываетъ тол-
стою пѣною; то молоко не годится; но лучше
въ такомъ случаѣ сдѣлать изъ пр. изъ козьего мо-
лока посредствомъ несолената бычачьяго желудка,
либо съ яичнымъ бѣлкомъ сыворотку, которую,
процѣдивши сквозь пропускную бумагу, давать
пить по два или по три фунта въ день до нѣхъ
поръ, пока совершенно больной не выздоровѣетъ.
Еслии же примѣчено, что кровь не только не
весьма густа, но еще нѣсколько и жидка; то луч-
ше

(*) Единбургскіе Врачи берутъ на два унца мин-
дальнаго, либо льнянаго масла одинъ унцъ кан-
фары и дѣлаютъ канфарное масло. М.

ше употреблять молоко. Весьма полезно, еслили больного вся пища будет состоять изъ одного оного. (Vid. Tissot p. 257, et Haller Elementa Physiolog. 7. p. 2. p. 42). Либо можно приказать для сего употребленія варить лихорадочную корку съ молокомъ (*). Женское молоко всякому другому предпочипается, послѣ него второе заслуживаетъ мѣсто ослицыно, потомъ кобылье, за нимъ козье,

(*) Сколь великую пользу приноситъ лихорадочная корка, такимъ образомъ съ молокомъ вареная, въ чахоткѣ, сіе доказываютъ Г Галлеръ (Opuscul. T. 3. p. 371) и де Гаенъ (Ratio med. T. 12. p. 236). Англичане хвалятъ купоросный эликсиръ, въ чемъ и де Гаенъ также съ ними согласенъ, и доказываетъ пользу оного многими примѣрами. — Однако о употребленіи его въ чахоткѣ должно читать примѣанія славнаго Практика Форшбергга (Medical observations and Inquiries Vol. 5. p. 351). Онъ всячески опровергаетъ соединеніе купороснаго снирпа съ пряными травами, съ которыми обыкновенно дѣлается купоросный эликсиръ. Оный въ воспалительныхъ болѣзняхъ явственный причиняетъ вредъ. Но въ послѣдніе дни сей болѣзни онъ бываетъ полезенъ потому, что тогда находится склонность къ гнилосии. Однако еслили гнилосии происходитъ онъ смѣшавшейся съ кровью матеріи, безпрестанно изъ разорванныхъ сосудовъ истекающей: то въ такомъ случаѣ все, что только можетъ причинять раздраженіе, какъ на пр. и пряныя травы, въ купоросномъ эликсирѣ содержащіяся, больше вреда, ничего не приносятъ. Для того тушъ наилучше употреблять слабую купоросную кислосу, подою разведенную.

а напоследокъ коровье (*). Онаго должно каждый день пить по столовку, сколько можетъ безъ тяжести снестъ желудокъ; однако при употребле-
нии

(*) Оселинаго и кобылье молоко кажетсѣ наиболѣе разбѣиваетъ, а женское и овечье болѣе прочихъ пицательно. (Vid Halleri Elementa Phyl. T. 7. p. 2. p. 28 29) Г. Медикусъ равнымъ образомъ и въ сей болѣзни, какъ въ оспѣ, великую имѣетъ довѣренность къ лихорадочной коркѣ, и думаетъ, что она можеть разогнать безъ вреда болѣзнь сыпѣ. Но спрашивается ли сіе, опытъ докажетъ. Наилучше разбѣивать коръ на разные виды въ разсужденіи соединенной съ нею горячки. Слѣдовательно можно ее называть либо воспалительною, либо гнилою, либо соединенною съ испорченною желчью, или съ осидливою слабостію чувственныхъ жнлъ. Впрочемъ часто въ сии виды бывають совокупно: въ такихъ случаяхъ лѣкарства должно употреблять притивныя тому, который болѣе другихъ превышаетъ. Въ упоминаемой Ватсономъ корѣ подъ именемъ гнилой, которую онъ весьма хорошо описалъ (Med. observ. et Inq. на вышесказанномъ мѣстѣ), не только не гнилая была горячка, но еще весьма похожая на воспалительную. Г. Ватсонъ раздѣлялъ оную на двѣ степени, изъ которыхъ первая окончивалась прошедшею сыпью. Въ сіе время кровопусканіе хотя и заблаговременно было употреблено, однако не приносило никакой пользы, для того что болѣзнь была сложная. Но послѣ того произведенная, рвотною солью, рвота весьма пользовала. Приспосаблимое пищье не было опускаемо. Когда кожа была суха, то больные садились въ теплую ванну. Во второй степени великую пользу приносилъ маривный пластырь. Но причинъ слабости

мѣнѣе оного больной долженъ воздерживаться отъ кислой и соленой пищи, пользоваться съѣжимъ деревеннымъ воздухомъ, и отправлять легкое шлодвиженіе.

Въ сіе время часто краснѣютъ глаза, и естѣли не стараться ихъ лѣчить, но они могутъ быть повреждены. Я уже выше упомянулъ, что должно въ оныя вливать по нѣскольку капель розовой воды. Но естѣли посредствомъ оной не можно отправитъ вожденія; то надобно, не теряя времени, приставитъ къ вискамъ и подъ глазами пѣявицы. Естѣли же очѣ не довольно высосунтъ крови, то приускаша къ симъ мѣстамъ пары изъ теплой воды чрезъ воронку. Ибо отъ сего выдешъ оной сколько, сколько нужно. Послѣ сего приложить къ обоемъ вискамъ не большіе варыные пластыри, и когда они нарвунтъ, дать больному

позволяемо было употребляти въ пишь вино. Съ болѣе сопряженныя испраженія на низъ прекращаемы были порошкомъ корня Виргинскаго змѣевику (*Serpentina Virginiana*), пряными травами и усыпительными снадобьями. Взваръ изъ лихорадочной корки весьма хорошо укрѣпляетъ послѣ опиражденія каналы и тяжесты въ дыханіи, а въ противномъ случаѣ оный вредитъ. Г. Вилсонъ также нѣкоторыхъ вскрывалъ умершихъ такою корью, и нѣмъ еще болѣе увѣрился объ Антоновомъ огнѣ. М.

Естѣли корь соединена съ гнилою горточкою, бугриемъ или съ слабымъ и мягкимъ, языкъ у больного ою бывать нечислъ и еѣ желчно рветъ: то конечно послѣ опираденія желудка и кишекъ лихорадочная корь приноситъ пользу.

ному хорошее слабительное, которое смотри по крѣпости его силъ можно и повѣрять. Приспавливание къ запылку сухихъ банокъ также обыкновенно приноситъ пользу. Сверхъ сего не худо прикладывать снаружи въ шонкой вѣшкѣ къ обоемъ глазамъ теплую припарку, изъ красныхъ яблокъ, такъ называемыхъ зимницъ, сдѣланную, а именно: спекши въ горящей золѣ сіи яблоки, должно ихъ очистишь, сѣмена вынуть, и сполыши смѣшать съ пяпью граами канфары и двашцатью граами сполченаго шафрану.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 15.

О прививаніи кори.

Изъ вышепомянушаго описанія кори явствуетъ, что хотя иногда она бываетъ весьма легка; однако часто и ввергаетъ больного въ великую опасность. Сіе самое заставило Врачей думать, не можно ли и ее съ такимъ же успѣхомъ прививать, какъ оспу.

Первый изъ нихъ, который имѣлъ случай сіе испытать, былъ г. Докторъ Францисъ Гуме, Единбургской Медицинской Коллегии членъ. (*)
Онъ

(*) Medical Facts and Experiments 1759 часть 3 отдѣл. 4. Весьма не понимая, почему въ Англіи не ввели въ употребленіе прививанія кори, не смотря на то, что по увѣренію г. І. Кюка (Gentlemen's Magazin. 1767 р. 163.) послѣ учиненнаго г. Гуме въ Единбургѣ опыта, многие Врачи въ Шотландіи сему примѣру последовали. М.

Онѣ прививалъ корь такимъ же образомъ, какъ мы прививаемъ ослу; только на обѣихъ рукахъ и безъ всякаго приготовленія больного. вмѣсто вѣшкѣ употребляя онѣ хлопчатую бумагу, которую обмачивалъ нѣсколько нѣ въ кровь. Оную же бралъ онѣ у больныхъ изъ прорѣзанной между весьма частыми пупырышками кожи. Онѣ примѣтилъ, что тѣ, коимъ прививка была корь, большею частію разболѣвались на шестой день ночью, что всѣ оную переносили легко и безъ худыхъ слѣдствій; что они имѣли также сильное теченіе изъ глазъ слезъ; и что также крѣпко чихали, какъ въ естественной кори; что они со всѣмъ почти не имѣли кашлю, что корь равнымъ образомъ оканчивалась поносомъ; что младенцы, имѣющие другую сыпь, вмѣстѣ съ оною переносили; и что напослѣдокъ тѣ ранки, къ которымъ прививка была корь, опять не отшарывались, не текъ изъ нихъ послѣ выступленія кори, какъ се обыкновенно въ прививной оспѣ случается, гной. Такимъ образомъ начала мало по малу открываться завѣса, покрывающая премногія полезныя истины.

ОТДѢЛЕНІЕ 16.

О горячкѣ съ красными пятнами.

(Febris Scarlatina.)

Есть еще одинъ родъ сыпной горячки, которая рѣдко взрослымъ людямъ, но большею частію младенцамъ приключается; и въ которой почти все тѣло на подобіе жармоzinу бываетъ красно

Одна-

Однако оная рѣдко случается; ибо въ послѣднѣе 38 лѣтъ въ уездѣ она была только однажды, и. с. въ 1741 году; а въ Спбгольмѣ, сколько мнѣ известно, чрезъ сколькожъ лѣтъ только въ 1763 году лѣтомъ, и чрезъ нѣсколько времени въ осени; но шомъ, не бывъ въ Ноябрь, Декабрь и Январь мѣсяцѣхъ, въ Февралѣ 1764 году онашъ открылась.

Еснѣли же оная сполькожъ рѣдко бываетъ и въ другихъ мѣстахъ; но не удивительно, что объ ней не многие Врачи писали. По видимому она имѣетъ нѣкоторое подобіе съ корью, съ кропивною горячкою, съ червельною сыпью и рожеою; и по шому отъ многихъ Врачей къ симъ болѣзнямъ причисляется. Г. Тиссонъ въ своемъ наставленіи къ народу (*Avis au peuple* §. 112 и слѣд. которое на русскій языкъ перевелъ Г. Озередковскій) описываетъ ее подъ именемъ жабы, или волженія въ горлѣ (*Esquinancie*). Однако все продолженіе сей болѣзни, свойства очой и пущая для предохраненія себя отъ нее осторожность доказываютъ, что она заслуживаетъ особое названіе (*).

Я

(*) Сиденгамъ называетъ ее *Febr's leishilla*, и видѣтъ оную только въ легкой степени. Вообще кажется Англич. имѣетъ по преимуществу, что горячка съ красными пятнами тамъ весьма рѣдко бываетъ злою. Однако не давно случилось Вальерингу видѣть весьма злою, и онъ объ ней сдѣлалъ весьма хорошее описаніе (*Account of the scarlet fever and sore throat as it appeared at Birmingham in the year 1778. Lond 1779. 8*). Г. де Гасъ (*Rapport med. continuat. T. 1. par. 7.*) также много-

Я здѣсь намѣренъ описатьъ такую такъ, какъ
 Я самъ ее въ Уполѣ въ 1741 году видѣлъ, гдѣ
 она тогда почти во всякомъ домѣ, въ которомъ
 только находились дѣти, свирѣпствовала, а иног-
 да даже и въ извѣстныхъ приютахъ. У нѣкоторыхъ
 она была легка, а у нѣкоторыхъ напротивъ
 того весьма опасна, такъ что въ нѣкоторыхъ домахъ,
 гдѣ много находилось дѣтей, нѣкоторые легко
 отъ оной освобождались, а другіе едва ее могли
 пережить.

Она всегда начиналась жабью, за которую
 слѣдовала сажистость и божь во всемъ шлѣ. Но про-
 ше.

многократно о немъ пишущій эту болѣзнь злую, онъ
 съ ней упоминаетъ много случаевъ въ общемъ
 описаніи болѣзни. Между первѣйшими описате-
 лями оной наиначе начинающаго Иоганнъ Шторхъ
 (Johann Storck's practischer und theoretischer Tractat
 vom Scharlachfieber, Gotha 1741.

М.

Мортонъ въ одно время и въ одномъ мѣстѣ
 съ нимъ жившій приписывалъ ея злую, од-
 нако считаетъ ее злѣе. Симонъ Шулцъ опи-
 сываетъ (Eph. N. Siglos. A. 6. c. 7.) разъ злую сей го-
 рячку, однако онъ ее называетъ *Pyrexia maligna*.
 Нави рѣ въ своемъ сочиненіи (*sur plusieurs maladies
 populaires*) именуетъ ее *fièvre rouge*. Докторъ Плен-
 цигъ называетъ ее Сандегамовымъ именемъ (*Vid.
 eius opera Medico-Physica Tract. III*). Оба сіи Со-
 чинители видѣли ее какъ легкую, такъ и
 злую. Последний упоминаетъ, что горячка съ
 красными панинами во времена Сиверина, ко-
 торый жилъ въ началѣ прошлаго вѣка, такъ
 была незнакома, что она, будучи впрочемъ оче-
 ный мужъ, никакого не далъ ей названія.

Т

шествѣи около полтора дня приключалась болы-
нымъ тошнота, сильная рвота желчью, ознобъ,
боль въ головѣ и великая сонливость въ первые
дни. Воспаленіе въ горлѣ при всѣхъ сихъ припад-
кахъ такъ скоро увеличивалось, что у нѣкото-
рыхъ оно уже въ одинъ день внутри весьма рдѣ-
ло и было распухшимъ. Больные проснувшись бы-
ли безпокойны, невеселы и имѣли скорое и тя-
желое дыханіе. Родимца, о кошоромъ, какъ мнѣ
извѣстно, Сидентамъ и другіе упоминали, я
никогда не примѣнилъ. Большею частію на дру-
гой день, а у нѣкоторыхъ и на третій высту-
пали красныя пятнышки. Оныя показывались
сирѣчь на лицѣ и на шеѣ, но шомъ на груди, на
брюхѣ, на поясницѣ, на бедрахъ и на ногахъ. Нѣ-
которые изъ нихъ были малы, а другіе нѣсколь-
ко больше. Но чрезъ нѣсколько дней такъ разни-
рились, что казалось, будто однимъ пятномъ
все лицо покрыто. Сие самое слѣдовало и на про-
чихъ частяхъ тѣла, а особливо въ локотномъ
сгибѣ; однако не вездѣ въ одно время, но такимъ
порядкомъ происходило, каковымъ начиналась
сыпь, на пр. когда краска начинала проходить на ли-
цѣ, то бѣтры и ноги весьма краснѣли. Сія сыпь на
въ первый ни въ слѣдующіе дни ни мало не возвы-
шались. Однако та часть тѣла, на которой при-
мѣнѣно было рдѣніе, становилась толще обыкно-
веннато; но оная тошчасъ по прошедшии рдѣти
опять опадала. Когда ж давила на тѣло идѣ ли-
бо перстнемъ, то отъ того шало, какъ въ рохѣ,
дѣлалось блѣлое пятно, а боль скоро оный опши-
малъ, то опять возвращался красный двѣтъ.

Боль-

Большая часть больных до окончанія четвертаго дня не могли свободно глотать. Примечено также, что и говорить имъ было трудно, и когда они говорили, то казалось, будто они слыли гортъ гоголять. Въ око чини же четвертаго дня находилъ хрипъ не въ гортъ, и начинало выходить много клейкой мокроты, которая начинала опадаялась въ великомъ количествѣ посредствомъ выфыкивания въ гортъ насосцемъ полосканья. Тогда глотаніе дѣлалось свободнѣе, глаза становились свѣжѣе, и у больныхъ на всякой вопросъ скоро можно было получать порядочные отвѣты.

Въ шестъ же самый день въкоторымъ вдругъ припадала температура, ахъ сажало 4. 5 или 6 градъ, по помъ оный сажъ собою переспавадъ съ великимъ для больного облегченіемъ.

Некоторые также въ окончаніи пятаго дня имѣли небольшое кровотечение изъ носа, которое рывымъ образомъ уменьшалось болѣзнь. А иногда оно останавливалось въ седьмой день, однако также было легкое.

Жаръ и горючка, которыя были по сіе время весьма сильны, а особливо послѣ обвденнаго купанья, и претъ вѣсромъ, начинали уже становиться меньше; однако никогда сажьмъ не проходили прежде седьмаго дня.

Бредъ обыкновенно находился подъ вѣсрѣ въ первые три или четыре дни; однако оный не весьма былъ великъ, когда во время ослабленія горячки прекращался.

Биеие жилъ всегда было, больше или меньше скорое; отчасти у некоторыхъ подлое, а у другихъ слабое, у посабднихъ изъ сихъ болѣзнь была жестокая.

Слабило рѣдко само себѣ, кромѣ выписаннаго дня. Я не примѣнилъ, чтобы кто пошелъ прежде насупасти на немъ на пьяный день.

Больные не имѣли также единошеченія, обыкновенно въ жестокой язве бывающаго.

Носъ въ ушнѣ обыкновенно былъ сухъ. Не было никакого чиханія, каково бываешь въ морѣ, и изъ глазъ не текли слезы.

Моча хотя и шла, однако съ рѣзкомъ; широчемъ не была пята крѣпа, какой бы по видимому ошъ жару ей быть надлежало. Я ни у кого не видѣлъ оной смѣшенной съ кровью, хотя съ другими и примѣчено.

Никому кашель не приключался до тѣхъ поръ, пока, какъ я выше упомянулъ, не начинала опухаяться гортань червоты, и потому рѣдко оный былъ сухой.

Больные всего больше жаловались, что у нихъ болѣло горло и жгло кожу.

Въ пятый день по утру краска съ лица, а въ слѣдующее дни и съ прочихъ частей тела начинала мало по малу сходиться, такъ что въ осмой день по утру она совсѣмъ инде не была примѣтна.

Въ шестой или седьмой день у некоторыхъ примѣчаны были на разныхъ мѣстахъ, и особливо около ушей, на шеѣ, въ членосоединеніяхъ

руч-

ручныхъ и на голахъ небольшие бѣдные пузырьки, похолоде на бѣлую сыпь (Weiß-Erith); однако оныя вѣдѣи не были наводнены. Они неподоволя разширялись, и послѣ начинала опрѣстывать кожа. Сие сдѣлывало нѣкомъ и по всему тѣлу, однако прикладывае всего бѣло из рукахъ и на ногахъ, потому что оныя пачѣ не наподобіе муки или чешуи опрѣстала, но дѣлами лусками опдѣляясь се было можно. Сие опдѣленіе кожицы у нѣкоторыхъ означивало скоро, а у другихъ продолжалось дѣла дѣи или при недѣли. Чѣмъ сильнѣе была сыпь, и чѣмъ больше была опухли палецы на рукахъ, когда къ ней допронуться, тѣмъ, тѣмъ скорѣе издѣлывалась кожа. Г. Докторъ Пленцичъ однако у нѣкоторыхъ сего опдѣленія не видалъ. При продолженіи и послѣ оного больные были весьма чувствительны къ теплотѣ и къ сухости; даже имъ было не сносно, естьли кто только отворялъ дверь, либо допроникался къ нимъ нѣжную салфеткою.

По прошествіи осьми или десяти дней казалось, что уже вся болѣзнь миновалась. Больные ни на что больше не жаловались; начинали прохаживаться, получали порядочный аппетитъ и хорошо спали. Однако на сие не лезъ было совѣтъ продолжать. Хотя нѣкоторые, слушая совѣта, и сѣбывали въ умѣренную теплоту горничъ, употребляли легкія слабительныя, и наблюдали умѣренность въ пищѣ и пиитѣ. Однако и у нихъ распухли железы ниже ушей и подъ нижней челюстью прежде на одной сторонѣ, а особливо на правой упомянутомъ мѣстѣ, а потомъ и на другой сторонѣ.

чемъ сіе не заключало дальней опасности. Ибо сія опухоль мало по малу уменьшалась сама собою. Напротивъ того шѣ, которые, презирая совѣтъ, не хотѣли чрезъ нѣсколько недѣль идти по предписанію Врача, между восемнадцатымъ и двѣццатью вторымъ днемъ спавшились неерессы, и жаловались на слабость шѣла. Въ то время начинало у нихъ сперва лицо, а потомъ и все шѣло, такъ какъ въ водяной болѣзни (anasarca), пухнуло. Послѣ сего слѣвовала горячка, тошнота, безпокойство, спѣшеніе въ груди и скорое дыханіе. Моча выходила только въ маломъ количествѣ, и у нѣкошорыхъ съ кровью, или похожая на такую воду, въ которой было много мяса. Въ сей спѣшеніи болѣзни много дѣтей въ Стокгольмѣ въ 1763 году умирало, ш. е. и въ числа шѣхъ, которыя не слушались полезнаго для нихъ совѣта, либо поздно уже оный принимали.

Но повину мнѣ рѣдко случалось видѣть шѣ моей Праксингъ шѣхъ болѣлыхъ, которые послѣ были подвержены онымъ опухольмъ; но я занимаю на сей случай слѣдующія г. Пленциномъ о семъ примѣчанія, а именно:

1) Что сія водяная болѣзнь иногда была и послѣ слабой горячки съ красными пятнами, а особливо когда она была злая, и много въ ней было сыпи.

2) Что распухали железы болѣею частью у шѣхъ, у кошорыхъ кожа опдѣлялась въ весьма великомъ количествѣ. Впрочемъ нѣкошорые сему были подвержены и изъ числа шѣхъ, кои не имѣли примѣтнаго опдѣленія очой.

3) Что у младенцевъ сия опухоль была чаще, нежели у взрослыхъ людей.

4) Что чаще она случалась зимою, нежели лѣтомъ, и преимущественно была у шѣхъ, которые ранѣ выходили, нежели у шѣхъ, которые сидѣли дома.

5) Что больные умирали большею частію въ сіе время, нежели въ горячѣ, сопровождаемой сыпью; и наносаюцѣ.

6) Что не неминуемымъ слѣдствіемъ горячки была сія опухоль; ибо ее можно было отвращать надлежащею предосторожностію. Однако припомъ онъ признается, что не всегда ему удавалось въ семъ имѣть успѣхъ, хитя онъ и всѣ надлежащія мѣры для того употреблялъ.

Такимъ образомъ продолжается настоящая горячка съ красными пятнами. При семъ еще примѣчено, что всегда сія болѣзнь, столько по сіе время извѣстна, бывашъ повальною.

Впрочемъ она не наблюдаешъ извѣстнаго времени года. Ибо въ Упсалѣ она была въ 1741 году зимою, а въ Стокгольмѣ 1763 года лѣтомъ и осенью, и въ 1764 году опять находилась въ Февралѣ мѣсяцѣ. Она, какъ видно, также бывашъ и не въ одинакую погоду; ибо во время ея быва въ сіи три времена были различныя въ воздухѣ перемѣны. Сверхъ сего сія болѣзнь очевидно бываетъ заразительна, и приключается иначе дѣтямъ ниже пятнадцати лѣтъ. Однако и старѣйшія сего возраста не во все онѣ оной исключены; а наипаче естѣли они еще ее не имѣли. Ибо

я ни однажды не принималъ; чтобъ она больше одного раза въ кому нибудь впадала.

Долженъ также я здѣсь упомянуть и о томъ, что когда много дѣтей въ одномъ домѣ ея страждутъ, то она у нихъ бываетъ весьма различна. Одинъ младенецъ часто казается совсемъ не имѣющимъ никакой болѣзни, въ это самое время, когда другой такъ тяжело бываетъ боленъ, что опчаяющаяся о его жизни; а притѣмъ напротивъ того безъ всякаго шума онъ оной избавляется.

Я примѣтилъ также, еслии не ошибаюсь, въ одномъ домѣ, въ которомъ шестъ было дѣтей, что одно изъ нихъ перенесло эту горячку безъ сыпи. Ибо двое имѣли весьма жестокою горячку съ красными пятнами одинъ за другимъ, а притѣмъ мальчикъ имѣлъ также какъ и они жабу, тошноту, рвоту, ознобъ, жаръ и, спустя по томъ одинъ день, сильный потъ, однако симъ все и кончилось.

Изъ предложеннаго выше описанія легко можно различить горячку съ красными пятнами отъ другихъ болѣзей, а особливо когда еще извѣстно, что больной либо живетъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ она находится; либо изъ онаго прибылъ, и притомъ былъ въ такихъ обстоятельствахъ, что оною могъ заразиться.

Хотя она въ своемъ началѣ имѣетъ общіе признаки, со всеми сыпными горячками (смотри выше стр. 298) однако, еслии больной еще уже имѣлъ, изъ лѣваго глаза не текутъ у него слезы и не имѣется въ глазахъ воспаления. Но вѣроятно, что не оспу предвѣщаетъ его болѣзнь.

Еслии

Естьли также не превъзается сухаго кашлю, частаго чиханія и не текутъ изъ глазъ горячія слезы: то изъ сего можно видѣть, что кожа описанная не должна. Но еслии уже сытъ похаживаетъ: то едва можно ошибиться въ распознаваніи сей болѣзни.

Сверхъ сего изъ самаго продолженія горячки съ красными пятнами и изъ ея припадковъ явственно видѣть можно, что она составляетъ особенный родъ сильной горячки и отъ другихъ во все отличной. Но:

1) Въ осьмь дней бывають выше кожи и напоследокъ приходять въ нагноеніе. Нагноеніе пазухъ сей горячки пузырчатки бывають плоски и не приподымаются выше кожи.

2) Въ кори пятнушки не столько, бывають красны. Въ первый день они кажутся на лицѣ нѣсколько возвышенными. Изъ глазъ въ оной текутъ горячія слезы, чиханіе безцѣленно продолжается, кожа на подборѣ мучи оцѣснѣетъ, а не кусками такъ, какъ въ горячкѣ съ красными пятнами, отѣбается. Сверхъ сего въ сей болѣзни горячка въ осьмой день проходитъ, напрошивъ того въ кори въ то самое время, аще въ девятый день она еще пуще ожесточается, тяжелое дыханіе умножается и кашель усиливается.

3) Въ крѣпкой горячкѣ пятнушки бывають высоки, тоже самое бываетъ и

4) Въ горячкѣ съ червчатыми пятнами. Правда я примѣтилъ, что и послѣ сей горячки ноги распухаютъ, однако опухоль не распространяется по всему тѣлу, такъ какъ въ горячкѣ съ красными

ми пиянами, въ которой, какъ выше сказано, опухоль, начинается съ лица и уже въ то время приключается, когда большой около четырнадцати дней былъ свободенъ отъ горячки.

5) Въ гнилой горячкѣ съ пиянами не такъ скоро выстунають пияны. При томъ оныя не сливаются вместе.

6) Въ рохѣ краснѣетъ одно только какое либо мѣсто, какъ на пр. лицо, бедра, либо ноги, а здѣсь все тѣло. Сверхъ того по прошествии рожи, кожа сбирается въ морщины и послѣ оной падаетъ кожа.

При томъ жабъ въ другихъ сыпныхъ горячкѣхъ не такъ бываетъ изъеда, какъ въ сей, и бѣлыхъ пузырьковъ, которыми начиняется опухоль кожицы, ни въ какой изъ нихъ не примѣчается.

Причина горячки съ красными пиянами столько неизвѣстна, какъ оспы и кори. Только то извѣстно, что оная распространяется заразою, и что единственно тѣ только отъ оной избавляются, кои утѣкаютъ заразы. Что кожа въ оной поражена бы вѣдѣнъ воспаленіемъ, то сего оспоривать нельзя. Но рвоте, жаръ, боль и опухоль оное довольно доказываютъ. Однако сіе воспаление есть такого рода, что оно не превращается въ нагноение, но только опухляетъ кожу отъ жолы такъ, что оная опадаетъ прочь. Возжигеніе тогда бываетъ таковымъ свойства, какъ и кожи; но и оное не приходитъ въ нагноеніе, но оканчивается опухленіемъ кожицы, либо превращеніемъ въ Ангионовъ огонь. Что въ оной опух-

дешеся божицъ великими дусами , по се доволъ-
го додѣлѣть въ бѣдѣ души Г. Д. Пасицын (сморг.
тамже стр- 135 и 136)

Горазда съ красѣми пиянами у ибѣшотѣхъ
пизкъ бѣжестъ дѣла , что для большаго кукапѣ
выластѣ отнѣтъ только хоронѣй причесмотрѣ. А
напротивѣ того иногда отнѣтъ пизкъ бѣжестъ ле-
стпостъ , что въ хоронѣе время умерщвляестѣ боль-
наго.

Младенцы обыкновенно удобнѣе оную перено-
сятъ , нежели взрослые люди.

Съ бѣдѣхотѣ хоронѣмъ починастѣ призна-
метовъ немъ , тогда съ нѣ выстунастѣ пснотвотѣ
и не пѣдѣе пѣдѣстѣ дѣла. Однако я не слѣдѣ ,
какъ въ дѣло , пизкъ и въ 1741 году , что отнѣ больнѣ
была неслѣдѣ , хоня уже сынѣ пѣдѣзѣвалась и
на другѣй дѣла.

Жестокое воспаленіе въ гортѣ и происходящее
отъ онаго великое затрудненіе въ глотаніи , силь-
ный жаръ въ кожѣ , скорое и сильное бѣженіе жиѣ ,
частое и тяжелое дыханіе , чрезвычѣйная слабость ,
безразсудная сонливостѣ , или безсонница , слаб-
ный бредъ послѣ воспалѣдовавшей головной боли ,
безмыслие , пошнотѣ и частое мѣнаніе на по-
спѣхѣ въ разныя стороны быжикѣ самыми опа-
снѣйшими пѣдѣлками въ сей болѣзни ; и вопреки.

Болѣли пѣдѣны по гѣ болѣшемъ , по въ мѣ-
шемъ количествѣ пѣдѣзѣваютъ , по больше , по
меньше окунастѣ крѣсы , по легко можстѣ вос-
послѣдоватѣ бредъ , и либо печально , либо послѣ
сдѣлѣдѣстѣ на отнѣй споронѣ паралича , смернѣ.

Но

Но еслили при томъ будетъ печь изъ уха съ кровью смѣшанный иной, то можно ожидать обесчещенія.

Во время сыни иногда сонна, а иногда моча бываетъ съ кровью смѣшана, и послѣ него распухаетъ belly. Однако г. Пленция въѣрдитъ, что сей припадокъ не предвѣщаетъ ничего ни добраго ни худого.

У малолѣтнихъ дѣтей, когда они болѣвы бывающъ горячкою съ красными пятнами, скелетъ долаю осматривая десны и принимая, имѣли ли такихъ признаковъ, кои бы представляли тяжелейшій прокъ зубовъ. (смотри о семъ особенное Ощипление стр. 45). Еслили у нихъ къ сей горячкѣ присоединился оный припадокъ, то они имѣли болѣе подвержены быти опасности.

Когда кто по перенесеніи горячки съ красными пятнами, въ которой была сильная сыпь, великій жаръ въ кожѣ и избыточное ощущеніе кожи, чрезъ четырнадцать дней находился въ хорошемъ состояніи, вдругъ изнеждетъ позывъ на пищу, почувствуетъ слабость въ тѣлѣ и моча у него будетъ извѣщаться не въ довольномъ количествѣ: то онъ долженъ опасаться водяной болѣзни. Въ такомъ случаѣ, еслили не подать скорой помощи, то моча безпрестанно будетъ осаживаться, приключится потомъ горячка, сильной будетъ имѣть сильную жажду, безсонницу и судорги, то не остаётся болѣе надежды къ выздоровленію.

Аликопъ должно сію болѣзнь въ первой степени также какъ и корь. Еслили она легка, то
кроме

кромѣ хорошаго содержанія большого, что касается до горюцы, тоскы, одѣянна, чирки (*) и нипта (смор. о семъ выше въ 12 Описаніи обѣ оспѣ въ описаніи первый ея степенн, въ 14 Описаніи о кори, и распространѣе о ниптѣ въ 1) Описаніи о лихорадкѣ), болѣе ничего събавить не нужно. Просныые люди съ великою пользою могутъ употреблять теплое питье, изъ четырехъ частей ошварной воды и одной части молока, събавное. Но сколько бы ни лежала была эта болѣзнь, однако никогда не должно выпускать дѣтей на дворъ послѣ горячки и сыни чрезъ три недѣли не только зимою но и лѣтомъ. Ибо, какъ я выше сказалъ, и послѣ слабой сей горячки можеть воспослѣдовать водяная болѣзнь.

Естьли же горючка съ красивыми пятнами желтого и опасна, (что можно узнавать, когда болѣмой безъ явной причины лишается силъ, потѣхъ весьма великое у него сдѣлается затрудненіе въ глотаніи, голосъ перемѣнившійся, кожа спазмѣтъ весьма горяча и будетъ частое или тяжелое дыханіе) то спрашивается, можно ли пускать кровь? Въ семъ случаѣ должно поспѣшь поспу-

(*) Зрѣлыхъ плодовъ, какъ на пр. вишенъ, земляники, грейпъ, шакриды, сочныхъ яблокъ, грушъ и апельсинъ, естьли есть, можно имѣть дѣланъ бѣсъ по немину. Но лѣтнюю плахъ не упущенъ жару, не прохладаетъ и не содрать силъ въ воспалительныхъ болѣзняхъ, какъ оныя. Но той причинъ си плоды уменьшаютъ и самую горячку, принимъ томятъ въ большемъ количествѣ мочу и нѣсколько славятъ.

немъ ворчитъ, либо больной чувствуетъ напрасное побужденіе къ испражненію нанизъ; то должно дать легкое слабительное, какъ на пр.

R. Eristaeae, Ictiv. Ed. m. b. Возьми слабительной к

3а.

шки полульца,

Cistemor. tartar. 3i.

Перечищеннаго виннаго
камня одну драхму.

Syrup rosar. solut. 3а.

Розовато слабительнаго
сырону полунца смѣшай,

M. D. S.

надпись: легкое слабительное; принимать каждыи часъ по чайной ложкѣ, пока начнешь слабѣть.

Либо выбрать для сего какое нибудь изъ тѣхъ слабительныхъ, которыя я предписалъ въ Описаніи оубъ оубъ въ первой еѣ степени. Еслили же примѣняется, что скоро начнешь выступать сыпь, то се должно осматривать, и вмѣсто того вѣлѣнь насматривать промывательное, составленное изъ 9 унцовъ сыворошки, двухъ споловыхъ ложекъ деревяннаго масла и невольнаго количества стелченнаго въ порошокъ сахару; въ первые дни можно къ оному прибавлять по драхмѣ селитры, а послѣ того ничего уже не должно примѣшивать. Но се промывательное чрезъ все продолженіе болѣзни насматривать должно каждыи день по потребности, а иногда, естли горячка сильна, и по два раза. Однако для сего должно изобрѣсти малыя часы, въ которые она больше прощадаетъ.

Намѣреніе при употребленіи вѣхъ сихъ средствъ состоятъ въ томъ, чтобъ она, имѣющая мочущія случиться, при продолженіи болѣзни, худы сдѣлались, и чтобъ возженіе горла и кожи, сколько можно, сдѣлать сноснѣе.

Жабу

Жабу однако должно лечить особливимъ образомъ, на сей конецъ должно приготовить

1) Припарку изъ четырехъ видовъ сполченыхъ листовъ травы просвиры, и двухъ видовъ сполченныхъ же укропныхъ семянъ. Все сие варить на подобе размазни, и завернувъ въ лепешку умѣренно теплую прикладыватьъ старушкѣ къ горлу. Всегда должно имѣть двѣ парки припарки, дабы, когда одна начинилъ протыкать, теплая можно имѣть другую въ готовности. Въ случаѣжъ нужды вмѣсто одной можно приложить къ горлу шкваръ съ горчицею, которое однако, какъ только оно произведетъ на кожу раны и пузырьки, должно снять.

2) Полосканье изъ нѣсколькихъ разбавленныхъ винныхъ ягодъ, которыя должно варить въ водѣ и по немъ такую проглотить. Если бы больной не въ состояннн полоскать себѣ гортанъ сими полоскательми, то по крайней мѣрѣ долженъ онъ его долго почаще держать во рту. Мало смѣшавъ три фунта воды, бузиновыми листьями на подобе чаю пасюанной, съ двумя столовыми ложками бузинова о уксусу и равнымъ количествомъ киселя черной смородины, выписывать посредствомъ насаса больному по немногу, не чаще въ ротъ, направляя всегда къ бокамъ снаго

3) Можно также иногда больному дать съѣсть нѣсколько ягодъ черной смородины.

4) Проглотъ, отмоча въ теплую воду, съ бузиновымъ уксусомъ смѣшанномъ, грядкую губку, прикладывать сверху полтора на грудь, дабы вѣдухъ, которымъ больной дышетъ, наполненъ былъ

былъ разрѣшающими сими парами. Если же больной имѣетъ кожу сухую, и носъ его такъ залегъ, что онъ разинувши ротъ дышитъ, и онъ того у него языкъ и въ горлѣ сохнетъ; то

5) Должно помачивать часто въ ноздряхъ свернушою и въ тепломъ молоке обмоченною ветошкою.

Но еслии все сѣ никакого не приноситъ горлу облегченія; то должно ниже ушей приставить пиявцы (*), и въ крайней необходимости сдѣлать въ горлѣ посредствомъ скрышаго ланцета (горпаносѣца) надрѣзыванія. (Vid. Heinek Chirurg. р. 2. сар. 94.)

Когда больной начнетъ кусками выплевывать мокроту; то можно сказать, что уже большая часть жестокой сѣ болѣзни миновалась. Въ сѣ
вре-

(*) Г. Прингель похвляеши въ жабѣ слѣдующее полосканье, котораго однако я еще не пробоваъ.

R. decocti restoral. Возьми грудного взвару 15 унцъ.
Lond. ℥xv.

Mell. composit. ℥i. Меду однаѣ унцѣ.

Spiritu. sal. ammo. Нашатырнаго спириту : Дра-
глас. ℥j. М. хму; Смѣшай вмѣсто.

Но можешъ ли еще равную сему принести пользу багульникъ (Rosmarinus officinalis), котораго Унгарскій Врачъ великими превозноситъ похвалами, время покажетъ.

Оный можно употреблять вмѣсто припарки къ горлу снаружи, и дѣлать изъ воды, вмѣсто чаю онымъ настоянной, полосканье.

время нужно только бываешъ хорошо повязывать лѣю, и иногда впрыскивать въ горло посредствомъ насоса полосканье.

Можно бы также внутрь давать и предписанные мною въ описаніи первой степени оспы подъ N. 4. холодительные порошки, но какъ въ сіе время болѣею частію больной бываетъ не въ состояніи глотать; то должно умѣривать горячку холодительною пищею и пипіемъ, а напитки тамъ же мною предписанными. Достаточные люди могутъ прибавлять къ пищею вмѣсто укусу лимонный сокъ.

Въ разсужденіи кровоточенія изъ носа должно поступать такъ, какъ о семъ предписано въ первой степени жорі.

Еслили воспослѣдуетъ родимецъ, то должно употреблять тѣ же самыя средства, о которыхъ при концѣ описанія первой степени оспы упомянуто.

Еслили хотя въ первый день въ вечеру, во время ожесточенія горячки, случится бредъ, однако при ослабленіи оной оный пройдетъ: то для отвращенія оного ничего бываетъ не нужно, кромѣ того, что способствуешъ къ умаленію горячки. Еслили же оный воспослѣдуетъ въ шестой, седьмой день, либо позже, то онъ бываетъ опасенъ; и въ такомъ случаѣ должно, какъ выше сказано, приставить пиявицы, либо пускить кровь; наставлявши промывашельныхъ и прикладывашъ къ икрамъ тѣсто съ горчицею; либо нарывный пластырь къ запястью. Описанныя г. Пленничомъ наблюденія доказываютъ, что ссй бредъ можно
отвраща-

отправить даннымъ въ началѣ болѣзни порядочнымъ слабительнымъ.

Въ четвертый и слѣдующіе дни должно давать пить чай изъ рамашиковыхъ цвѣтовъ. Ибо бесполезно прежде сего употреблять такіа лѣкарства, которыя бы могли произвести испарину, либо потъ. О азъ чрезъ кожу не можетъ выходить до шѣлъ поръ, пока въ ней будетъ находиться вожженіе. Для произведенія поту я не совѣтую употреблять никакихъ горячительныхъ лѣкарствъ. Но еслили онъ самъ собою воспослѣдуетъ, то должно его довольно поддерживая, въ противномъ же случаѣ онъ можетъ такъ несчастливо окончиться, какъ у того мальчика, о которомъ г. Тиссонъ (тамъ же стр. 103.) упоминаетъ.

Когда уменьшится болѣзнь до того, что больше не примѣтно будетъ никакого рдѣнія и горючки, и большой прежній получить позны на пищу; то нужно:

1) Велѣть ему, чтобъ онъ еще чрезъ три недѣли находился въ умѣренно теплой горницѣ.

2) Тереть его брюхо по утрамъ и вечерамъ флаanelю, окуреною можжевельными ягодами, масликою, либо обыкновеннымъ курительнымъ порошкомъ.

3) Смотрѣть за нимъ, чтобъ онъ наблюдалъ умѣренность въ пищѣ, и

4) Давать чрезъ день, либо чрезъ два дни какое нибудь изъ вышеписанныхъ легкое слабительное; и еслили онъ мало мочится, велѣть по утрамъ пить воду, на подобіе чаю нѣсколько прижонными можжевельными ягодами застоянную.

Естьли же отъ сего еще моча не въ довольномъ количествѣ выходитъ; то можно въ оной водѣ давати по одному или по два раза въ день по 15, 20 или 30 капель эссенціи морскаго луку (*Essencia scilae Ph. Wurtemb*). вмѣстѣ обыкновеннаго супу больной въ такомъ случаѣ долженъ есть супъ, съ чеснокомъ либо съ арпишоками вареный.

Такимъ образомъ обыкновенно отвращается водяная болѣзнь, коипорой безъ сихъ предосторожностей опасатся должно. Естьли же она не смотря на то воспослѣдуетъ, о чемъ можно судить изъ выше объявленныхъ признаковъ; то должно оную лѣчить крѣпительными средствами.

Что касается до дѣтей людей недостаточныхъ, то можно:

1) Продолжать пить воду, прижонными можжевеловыми ягодами настоянную.

2) При томъ давати имъ каждое утро по одному изъ слѣдующихъ порошковъ:

R. Nuc. pulvis. Cryfall.
gr. L.

Возьми самой чистой селитры, въ хрустали приведенной, 50 гран.
Корня морскаго луку
10 грановъ.

Radi. scill. leviss. siccat.
gr. X.

Zingiberis alb. gr. L.

Вълаго инбирю 50 гр.
Сотри все въ порошокъ и раздѣли аккуратно-шимъ образомъ на 10 равныхъ частей, надпиши.

M. F. pulvis David. exactissime in X partes aequ.
D. S.

Разрѣшающіе и мочегонительные порошки, которыхъ больной долженъ принимать каждый разъ по одному.

Естьли отъ нихъ не дѣлается пошнота, то можно чрезъ два часа давати еще по половинѣ порошка

рошка, либо, естли младенецъ крѣпкаго сложенія, и по цѣлому порошку, и такимъ образомъ ежедневно поступать до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ опухоль.

Что же принадлежитъ до дѣтей dospапочныхъ людей, то они могутъ употреблять

1) Вышписанные порошки, либо Парижское вино морскаго луку (*vinum scilliticum Paris*) по не большой чайной ложкѣ за каждымъ разомъ, и также ежедневно. Но понеже у нихъ желудокъ бываетъ чувствительнѣе, то имъ должно давать оное въ столовой ложкѣ простой коричневой воды. Естли оный у нихъ дѣлается тошнота, то всегда можно оную прекращать, давъ выпить ложку оной же коричневой воды, въ кошерую, дабы она не столько была крѣпка, можно прибавить нѣсколько коричневаго сироу. Естли послѣпринятія порошка чрезъ часъ не воспослѣдуетъ тошнота, то уже болѣе онъ не будетъ тошнить; но станеть гнать воду либо мочевыми пушиами, либо низомъ.

2) Когда они принимаютъ оныя порошки до обѣда; то послѣ обѣда можно имъ давать по три, либо четыре раза лишь по чайной ложкѣ слѣдующаго разбѣшающаго пишья:

R. Flaved. Cortic. Aurant. Возьми померанцовой корки два унца отъ полувинною.

Vin. Mosell. 3X. Мозельскаго вина до унции.

Conquassentur, atque, dum болтай до нѣтъ поръ, vinum saporem aurantiorum пока вино померанцовый вкусъ получитъ, adde прибавь

- Argan. Tartaris. **ЗІІВ.** Виноуксусной соли два унца съ половиною.
 Conquassando solne et adda Взабалшывая распусти и
 sachar. alb. **ЗVІ.** прибавь бѣлаго сахару
 шесть унцовъ.
 Conquassa donec et hoc so- Мѣшай пока и оный со-
 lutum sit. вѣсмѣ распустишся.

Естьли жѣ опухоли присоединишя горячка, жажда и проч. то обыкновенно уже тогда поздно бываетъ искать ередствъ для исцѣленія. Но понеже мы никого, покаѣснѣ еще его жизнь продолжається, безѣ помощи оставлять не должны: то можно тогда пробовать перечищенный винный камень (cremor tartari), котораго давать каждый день по двѣ, по три или по четыре драхмы.

Когда опухоль совѣсмѣ пройдетъ, то должно стараться шѣло привести въ прежнюю крѣпость посредствомъ сухой пищи, пренемѣ шѣла, лихорадочною коркою, Марциалловымъ виномъ, либо, естьли больного не слабитъ, давая внутрь горькую ревенную настойку (Tinctura rhei amara Edinburg). Какимъ же образомъ должно сѣи лѣкарства употреблять; о семъ я уже упомянулъ во многихъ мѣстахъ сей книги.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 17.

О р е о т ѣ.

Рвотка часто такъ бываетъ легка, что для прекращенія оной не надобны бываютъ никакія лѣкарства. Иногда она приноситъ еще и пользу. Пошому часто примѣчається, что она скоро прекращаетъ колику и боль въ желудкѣ. Но иногда

она такъ долго продолжается, либо такъ часто снова возвращается, либо столь сильна бываетъ, что составляетъ уже немаловажную болѣзнь, но такую, которая пребудетъ скорого вспомошествованія. И не намѣренъ здѣсь вычислять, какія должны произойти въ тѣлѣ слѣдствія отъ недоставки въ питаніи, когда въ ономъ не можетъ задерживаться пища; не спану говорить и о томъ, какая дѣлается въ крови оспроша, когда она не возобновляется безпрестанно новымъ питательнымъ сокомъ. Ибо сіи припадки не такъ скоро примѣчаются, какъ то безпокойство, въ которомъ младенцы находятся, когда ихъ на прѣспѣ и кори съ самаго начала день и ночь рветъ, и каждый разъ приномъ шечетъ изъ носа либо изъ горла кровь.

И такъ я опишу только ту рвоту, которой младенцы бывають подвержены. Но какъ она не всегда одно имѣетъ мѣсто пребыванія, и не отъ одной происходитъ причины, то и раздѣляется на разные виды.

Первый изъ оныхъ происходитъ отъ разслабленія желудка. Когда малолѣтній младенецъ слишкомъ много сосетъ груди; то въ такомъ случаѣ онъ лежа безпрестанно плачетъ, безпокоится и не можетъ уснуть. Но какъ только его нѣсколько молокомъ вырветъ; то онъ засыпаетъ и опять становится здоровымъ. Сюда принадлежатъ также и та соединенная съ болью желудка рвота, которая взрослымъ дѣтямъ приключается, когда они поспѣшно ѣдятъ, либо много пьютъ. Въ обоихъ сихъ случаяхъ рвота составляетъ и

болѣзнь и самое лѣкарство. Но естѣли она сама собою не воспослѣдуетъ; то должно стараться оную произвести перушкомъ, въ деревянное масло обмоченнымъ, которымъ въ горлѣ нѣсколько пощекотать.

Второй видъ зависитъ отъ простуды; когда, по ссѣ, расповивши младенца, простудятъ ему желудокъ и, для прекращенія сдѣлавшейся отъ того икоты, кормилица дастъ пососать грудь. Отъ сего тотчасъ слѣдуетъ рвота. Но она прекращается припариваніемъ желудка нагрѣтою салфеткою.

Третій видъ имѣетъ свое начало отъ угару, отъ уголья исходящаго. Когда изъ угольевъ, въ жаровни положенныхъ, исходитъ угарь; то отъ того часто, какъ я примѣтилъ, младенцамъ приключается рвота. Однако оная скоро проходитъ, когда уголья вынесшъ вонъ и горнищу не много накуришь уксусомъ. Естѣли въ семъ случаѣ не смотрѣвъ прилѣжно за кормилицею; то младенецъ легко можетъ лишиться жизни.

Четвертаго виду рвоты причиною бываютъ сырости въ желудкѣ, которыя въ ономъ, естѣли младенецъ имѣетъ привычку много ѣсть, либо употребляетъ твердую и грубую пищу, пищеварительнымъ его силамъ не соразмѣрную (*), мало по малу скопляются.

Оныя

(*) Г. Медикусъ (Beobachtungen B. 2. S. 421.) утверждаетъ, что сырости у младенцевъ бываютъ главнѣйшею причиною судорогъ. Никто, я думаю, оспаривать не сманетъ, что они при-

Оныя вредяшъ либо своимъ количествомъ, либо оспрошю, которую они въ желудкѣ получаютъ. Можно о семъ чишашъ въ Опдѣленіи о кашлѣ; ибо и сія рвоша и желудочный кашель узнаются по однимъ признакамъ и однимъ образомъ вылѣчиваются. — Въ ономъ же Опдѣленіи можно сыскашъ и пѣ знаки, по которымъ заключается, что точно сыросши въ желудкѣ исходяшъ. Только нужно знашъ, какого рода оныя суть.

У младенцевъ, которые сосутъ грудь, обыкновенно оныя бывають кислы потому, что вся ихъ пища состоитъ изъ одного только молока. Однако кислоша бываешъ и у возрастнѣйшихъ дѣтей, ешъли они въ пищу употребляютъ почти одно только молоко, пьюшъ молодое пиво, либо иногда и вино; скрываетъ являшъ швердые, незрѣлые плоды, либо слишкомъ много зрѣлыхъ, какъ на пр. вишенъ и шочу подобнаго; либо льютъ въ ку-

У 5

шашае

чиняють родимецъ. Но ешъли бы кто спросилъ, по чему младенцы склоняе къ судоргамъ, нежели взрослые люди; то на сіе можно отвѣчать слѣдующимъ образомъ: потому что у нихъ бывають нѣжнѣе чувствительныя жилы. Ибо когда кормилица, получивши какую либо досаду даетъ сосать грудь младенцу; то хотя она сама не имѣетъ судоргъ, однако младенцу оныя приключаются. Равнымъ образомъ кислоша, въ желудкѣ у младенца находящаяся, можетъ ему причинить судорги, которая однако у взрослыхъ причиняетъ одну только боль около сердца (*cardialgia*.) (*S. Zimmermann's Buch von der Erfahrung B. 2. S. 564.*)

шанье укусу или лимонный сокъ. Оную у младенцевъ можно узнавать по кислому ихъ дыханию, и по кислому запаху, отъ рвоты и калу происходящему; по блѣдности кожи и у самыхъ мало-возрастныхъ дѣтей по зеленому либо смѣшенному со спворожившимся молокомъ испражненію нанизъ. У нѣжныхъ дѣтей употребляется оная порошокъ изъ раковинъ, либо изобрѣтеннымъ мною дѣтскимъ порошокъ, который Г. (ф). Дарсали описалъ въ своей деревенской Аптекѣ (Soken Apotheke стр. 257. N. 90). Оный состоитъ изъ полунда бѣлой магнезии, трехъ драхмъ тмину, двухъ драхмъ фіялковаго корня и полдрахмы шафрану; все сіе хорошо должно столочь и въ порошокъ стереть. Сего порошка должно давать по столько, сколько можно взять кончикомъ ножа средней величины, въ укропной водѣ по пяти или по шести разъ въ день до тѣхъ поръ, пока не изпребится кислота и младенецъ не станетъ покойнѣе. Больнымъ дѣтямъ снѣ же способомъ можно пособлять. Однако они должны сверхъ того употреблять ревенную настойку, безъ сахара сдѣланную, либо взять для нихъ полдрахмы мѣлко столченого ревеню, два грана толченой корицы, положить въ чайникъ и налить на оныя три чашки кипятку, поставивъ на цѣлую ночь въ горячую золу, по томъ процѣдишь и смѣшать съ одною чайною ложкою коричневой воды. Сей настойки должно поспѣшъ дать больному двѣ чашки, а прочее спустя часъ. Однако ничего нѣтъ надежнее для изпребленія кислоты какъ у младенцевъ, такъ и у взрослыхъ, какъ сѣдующее лекарство:

Возьми

Возьми полутора щелочной соли вирикаменной (*sal tartari*) и распусти въ одномъ фунтѣ рѣчной воды. Сего распыору можно давать на пр. младенцу двухлѣтнему въ рюмкѣ воды по чайной ложкѣ два или три раза въ день, а взрослому столькожъ разъ въ день по столовой ложкѣ въ стаканѣ чистой воды.

Острота, которую пища и питье въ слабости желудка получаютъ, можетъ также быть и гнилаго свойства, и тогда означаетъ, что ребенокъ много употреблялъ въ пищу мясного. Узнается оная по исходящему изъ рта прогнивому запаху, подобному вонючимъ гнилымъ яйцамъ. Вылѣчивается же лишнемъ лимонаду, употребляя оный въ небольшомъ количествѣ; либо порошками изъ перечищенного виннаго камня (*stemon tartari*) и лимонныхъ лепешекъ, (*Trochisci citri*) составленными. Всякій таковой порошокъ можно составлять изъ шести грановъ перечищенного виннаго камня и 20 грановъ лимонныхъ лепешекъ.

Оныхъ должно давать младенцу по два, по три или по чепыре въ день въ небольшомъ количествѣ воды, и продолжать до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не пройдетъ прогнивое дыханіе.

Если же напрошивъ того вышеупомянутыя сырости бываютъ прогорклые (*acrimonia rancida*), которыя всегда происходятъ отъ излишняго употребленія жирной пищи, какъ на пр. яичницы, масленыхъ блиновъ, здобнаго пирожного, вешчанъ и проч. чрезъ что отъ другихъ и различающа: то можно ихъ испребить приниманіемъ двукратъ по нѣскольку сахару, либо вышеупомяну-

тыхъ

тѣхъ порошковъ изъ перечищенного виннаго камня и лимонныхъ лепешекъ. Однако послѣ нужно бываетъ употребить ревенный Эликсиръ, дабы не воспослѣдовалъ опасный желчный поносъ (*Diagnosa biliosa*).

Когда оныя состоятъ въ одной только густой мокротѣ, отъ употребленія младенцемъ въ великомъ количествѣ молочной либо изъ муки вареной кашицы, либо не хорошо выквашеннаго хлѣба и изъ оного приготавливаемого кушанья, а въ желудкѣ накопившейся, отъ которой брюхо раздувается, и бываетъ твердо; то должно дать рвотное, а по томъ употреблять ревенный Эликсиръ.

Но когда младенца рветъ несваренною и цѣлою пищею, то сѣ значить, что онъ не хорошо ее переваривалъ, либо она была весьма тверда, либо желудокъ его слабъ, и требуетъ послѣ окончившейся рвоты подкрѣпленія посредствомъ хорошаго желудочнаго Эликсира, каковъ на пр. мой (*). Оного должно давать по 15 или по 20 капель въ некрѣпкой коричневой водѣ.

Во всѣхъ сихъ сыросняхъ, или нечислотахъ, въ желудкѣ накопившихся, нужно бываетъ рвотное, и поному естли воспослѣдуетъ рвота, то не должно оной прекращать, но вмѣсто того дол-

(*) Я имѣю у себя сего Эликсира слѣдующій рецептъ:

R. Cort. Aurant. ab omni albed. mundat. ʒʒ.	Возьми помаранцовой кор- ки, отъ всего бѣлаго су- щества очищенной, по- лунца,
--	---

Rad.

жно ее питьемъ теплой воды, либо, естли по-
то требуетъ надобность, и рвотнымъ произво-
диль, дабы желудокъ отъ оныхъ отиспился:
въ противномъ же случаѣ оныя входятъ въ кровь
и производятъ горячку; либо, вышедъ въ киш-
ки, часто причиняють тяжелый поносъ, въ ко-
торомъ также не рѣдко рвотное приноситъ об-
легченіе.

Пятый видъ рвоты происходитъ отъ яри
(*), когда ш. е. для младенца пищу варящъ въ
неполуженыхъ кострюляхъ, и послѣ дающъ ей въ
оныхъ простывать; либо когда пиво или сыво-
рошка, для ночнаго пищи ребенку приготовленная,
чрезъ долгое время стоитъ въ мѣдной либо оло-
вянной посудѣ; ибо она окиснувши нѣсколько ее
растворяетъ. Когда дитя шакого питья нѣсколь-

-
- | | |
|---|--------------------------|
| Rad. Rhei opt. ЗХVI. | Самаго лучшаго ревеню 16 |
| | драхмъ, |
| Terr. fol. tartar. ЗI. | Виноуксусной соли одинъ |
| | унцъ, |
| Vini alb. Gall. ЗVII. | Французскаго бѣлаго вина |
| | 7 унцовъ, |
| Digere leni calore per IV. | Поставь въ легкой духъ |
| dies. | на четыре дни. |
| In colatura dissolve Extract. | Провѣдивши, распусти |
| Gent. subr. Зз. | горечавковаго Экстра- |
| | кту полунца, |
| Ol. destill. Flor. chamomill. | Перегнаннаго масла ра- |
| | машковыхъ цвѣтовъ, |
| Ol. destill. Millefol aa gut. | Перегнаннаго масла |
| X. | тысячелистника по 10 |
| | капель. |
| Misce. | Смѣшай. |
| | М. |
| (*) Vid. Halleri Elem. Physiolog. p. 216. | |

ко выйдетъ, то тотчасъ ощущаетъ въ себѣ великую боль. Не давно мнѣ случилось видѣть мальчика, котораго я съ перваго взгляду полюбилъ было за ширинату; однако (хотя то и съ великимъ трудомъ) его вытѣнулъ, произведя въ немъ посредствомъ вложеннаго вторго перста, и послѣ того вливая ему въ оное прѣсное молоко и деревянное масло, рвоту. Сюда принадлежитъ также и ма рвота, которая, какъ я самъ примѣтилъ, происходитъ отъ кушанья жаркаго, на серебряной тарѣлкѣ чрезъ нѣсколько часовъ лежавшаго. На пр. естляи посадивши на очагъ къ огню рѣбчика на тарѣлкѣ для разогрѣванія, то чрезъ нѣсколько часовъ примѣчается вокругъ оного зеленый кружокъ, который происходитъ отъ небольшого количества мѣди, въ серебрѣ содержащейся и растворенной солью въ маслѣ, съ которымъ его жарилъ, находящуюся. Слѣдовательно оный есть не что иное, какъ ярь. Можно еще сюда причислить ту рвоту, которая происходитъ отъ яичницы, естляи она чрезъ цѣлую ночь стоитъ на оловянной посудѣ. Что личный блискъ растворяетъ свинецъ, то сіе явственно можно видѣть изъ чернаго пиппа, на немъ осѣдающагося, когда личница долго на такомъ сосудѣ лежитъ. Счапливъ младенца, естляи его скоро вырвешь. Естляи же рвота сама собою не воспослѣдуетъ, то должно оную произвести перстомъ, либо перушкомъ, въ деревянное масло обмоченнымъ и далеко въ ротъ вложеннымъ. Время не позволяетъ въ такихъ обстоятельствахъ, выписывать изъ Ашсеки гусиного миндальнаго молока, съ великимъ

количествомъ деревяннаго масла и небольшимъ
личнаго желѣза смѣшеннаго, либо клею бѣлой ка-
меди (Muscado gummi Arabici.) И такъ должно упо-
треблять въ пользу тѣхъ, чью скорѣе всего до-
спѣять можно, на пр. давать лишь младенцу
теплую воду, съ коровьимъ масломъ смѣшенную,
прѣслыя сливки, некислое молоко и деревянное
масло, также жирные супы и подобное тому,
которыхъ вливать ему въ ротъ сколько можно
побольше. Оныя припугиваютъ ядъ и лишаютъ
его раздражительной и тѣдой силы. Впрочемъ
все, что только служитъ къ прекращенію рво-
ты, въ семъ случаѣ бываетъ вредно.

Шестой видъ случается въ оспѣ и кори въ
первые дни. Но какимъ образомъ сего рода рво-
та облегчается, о семъ уже упомянуто выше на
стр. 163 Какъ въ Спекгольмѣ свирѣпствовала въ
1740 году корь, то рвота была несноснѣйшимъ
изъ всѣхъ припадковъ. А особливо я знаю одного
мальчика знатной фамиліи, у котораго сто-
лѣжкокая была рвота, чѣмъ во время оной даже
кровь изломъ выходила. Однако онъ скоро отъ
оной получилъ облегченіе, когда начали припаривать
ему желудокъ теплою овсяною кашницею и
толченою мятою, которую употребляли слѣдую-
щимъ образомъ: взявъ вешошку, клали на оную
два слоя оной кашницы и одинъ столченой мяты про-
межъ оныхъ, и прикладывали теплую къ брюшку.

Седьмой видъ происходитъ отъ вогнанной
внутри чесотки, который прекращается выгнані-
емъ оной опять наружу. Смотря о семъ въ Ошдѣ-
леніи о родимцѣ и кашлѣ.

Осьмой

Осьмый видъ рвошъ бываетъ у младенцевъ, страдающихъ глистами, о чемъ также ниже сего будетъ упомянуто.

Девятый видъ происходитъ отъ судорожнаго желудочнаго и щекоцущаго (*Tussis titillatoria*) кашлю. Въ первыхъ обоихъ случаяхъ рвота бываетъ полезна. Смотри Отдѣленіе о простомъ и судорожномъ кашлѣ.

Теперь приступаю и къ описанію десятаго и самаго опаснѣйшаго вида рвошъ, ш. е. самаго тяжелейшаго, который приключается нѣмъ младенцамъ, которые имѣютъ завивную грыжу, либо у которыхъ кишки чѣмъ нибудь заперты, либо на какомъ нибудь мѣстѣ отъ нѣкоторой раздражающей причины такъ сузились, что не имѣютъ никакого проходу. По сей причинѣ червообразное оныхъ движеніе не можетъ простираться внизъ, но больше дѣйствуетъ вверхъ, и испражняетъ рвомъ все то, что въ желудкѣ и въ кишкахъ ни содержишя. Слѣдовательно больной не можетъ въ себѣ задержать ни пищи, ни лекарствъ. Но какъ съ сею рвошою сопряжена бываетъ нестерпимая боль въ страдающемъ мѣстѣ, то скоро къ оной присоединяется горячка и воспаление, въ непродолжительномъ времени перемѣняющееся въ Антоновъ огонь, за которымъ скоро слѣдуетъ и самая смерть. Для шого въ семъ случаѣ нужна бываетъ скорая помощь; а естли уже сдѣлается вожженіе, то ничемъ сему пособить не можно. Ибо сія болѣзнь и сама собою бываетъ неслгка; но еще болѣе опасность оной увеличиваетъ

ся отъ того, что больной не можеть въ себѣ задерживать лѣкарствѣ.

Еслили рвота происходитъ отъ грыжи, то должно ея какъ можно скорѣе излечить. Но хотя сей грыжи много бываетъ видовъ; однако во всѣхъ оныхъ должно вправлявать на свое мѣсто вышедшую часть, кишка бы то была, или салъникъ, либо и то и другое. Только не должно при вправленіи всего вдругъ вкладывать, но мало по малу прежде то, что послѣ, а по томъ и то, что прежде вышло. Въ лной во время сей операции долженъ лежать такъ, чтобы грыжа свою тяжестію спремилась въ отверстіе, изъ котораго она вышла. Однако прежде того часно бываетъ нужно пустить кровь, нѣсколько разъ настаивать промывательныя изъ овсянаго извару, не большого количества деревяннаго масла, прѣсшаго уксумену и селитры, либо уксумену морскаго луку; и какъ самую опухоль, шакъ и то мѣсто, куда вышла грыжа, стараться размячить умѣренно теплыми припарками. Оныя же можно варить изъ молока, головекъ бѣлаго мака, листовъ просвиры, столченыхъ анисныхъ сѣменъ, и послѣ прибавлять по нѣскольку хорошаго деревяннаго масла. Но еслили рвота прѣпятствуетъ дѣланію сего припарку; то должно оную прекратить $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ либо $\frac{1}{8}$ грана опійнаго экстракта (extractum Thebaicum (*)), который должно

Ф

спе-

(*) Изъ Лондонской фармакопеи (р. 23.) видно, что extractum Thebaicum есть вещество, какъ самый опій, въ водѣ разпущенный и послѣ продолженія оный студенный. М.

стерень съ небольшимъ количествомъ сахару, либо, смѣшавъ съ сиропомъ, сдѣлавъ изъ онаго пилули, и прикладываніемъ припомъ въ мѣшечки снаружки вмѣсто припарки шафрану. Выравнивши же грыжу должно оную хорошо персвязать, дабы младенецъ вторично не могъ поднестъ равной опасности.

Напрошивъ того когда извѣстно, что рвота происходитъ не отъ грыжи, но младенецъ жалуется несносною болью въ брюхѣ, въ кишкахъ ворчишь; однако ни вѣтры ни калъ не могутъ испражняться низомъ, хотя бы уже и многократно были наставляемы промывательныя и рвоты безпрестанно продолжается: что сіе значить, что въ какой нибудь части кишекъ находится заворотъ, либо отъ какой нибудь раздражающей причины суженіе. Въ такомъ случаѣ скоро наступаетъ та страшная болѣзнь, которую Врачи называютъ *Miserece mei*.

Въ семъ случаѣ должно:

1) Когда многокровіе либо нѣкопорые горячечные признаки пребудутъ кровопусканія, отворить больному кровь.

2) Сколько можно почаще наставлявать промывательныя либо такія, какъвы выше сего предписаны, либо изъ одного деревяннаго масла.

3) Дать младенцу нѣсколько вышеупомянутого опійнаго экстракта, дабы хотя на краткое время прекратить рвоту и имѣть случай

4) Давать пить чай изъ двухъ драхмъ, полунца, либо и большаго количества Александрійскихъ листовъ, горячею водою наспояннаго, прибавя къ оному нѣсколько выжатого изъ лимона соку.

бору. Оного должно дачать по немногу за однимъ разомъ, но паче, и велѣть каждый разъ послѣ того нѣсколько съварой лимонной корки, либо чего другаго, для него въусомъ приятнаго держать во рту.

5) Посадить больного младенца въ теплую ванну, которую должно хорошо покрыть, дабы ноги не могли въ верхъ въ головѣ восходить; утѣшавать его сидѣть въ оной подолъ и пить вышеписанный чай, либо, еслии опять начинаетъ рвать, дать одинъ, или два грана опійнаго экстракта. Еслии младенецъ не согласится болѣе сидѣть въ ваннѣ; то должно его положить опять въ постелю и прикладывать ко всему брюху вышеупомянутую припарку умѣренно теплую; либо, еслии она тяжела, вдвое или вчирое сложенную фланель, обмоченную въ отваръ изъ листовъ просвиры и молока и хорошо выжатую. А послѣ того, какъ только можно, опить посадивъ его въ ванну. И такимъ образомъ употреблять попеременно то то, то другое, пока за помощію Всевышняго возвращено будетъ прежне здорье.

Я помню еще то великое безпокойство, въ которомъ мы съ Г. Шуценгеймомъ находились, пользуя за нѣсколько дней преѣзъ симъ въ знаменитомъ домѣ болное сею бѣднѣйшею дитя, которое только одно и было у своихъ родителей; и видя великое ихъ сожалѣніе, наше сумѣніе скрывать были принуждены. Однако за Божіею помощію мы симъ способомъ спасли его отъ смерти;

но пока его однажды послабило, мы издержали для его полтора унцъ Александрийскихъ листовъ. Я упоминаю здѣсь о семъ случаѣ для того, что странно можетъ быть иному покажется, что мы вмѣстѣ и запирающія и славишельныя употребляли лѣкарства. Однако если бы мы не давали опійнаго эксиракта, то больной не въ состоянн былъ бы задерживать въ себѣ онаго чаю, и судороги его не прекратились бы; а безъ сего ванна и припарки ни мало бы не помогли слабить. И такъ все, что только въ какой либо болѣзни употребляется, должно имѣть предметомъ одинъ конецъ, то есть исцеленіе причины оной и уничтоженіе того, что въ семъ дѣлаетъ замѣшательство (*).

Оди-

(*) Мнѣ не пришло тогда на мысль употребить льняное масло, которое, какъ мы недавно видѣли, многие, въ числѣ которыхъ Баронъ Фрэнъ Свиненъ (*Commentar. T. 2. p. 147.*) и Докторъ Галески (*Abhandlung u. von der Darmsicht*) похваляютъ. Оной дѣвъ пособилъ я деревяннмъ масломъ, за не имѣніемъ льняного. Я велѣлъ ей каждый разъ принимать онаго по столовой ложкѣ въ овсяномъ супѣ. Отъ чего рвота и боль тотчасъ унялись и потомъ начало се слабить. Кровь еще прежде моего прибытія была пущена и многократно наставляемы были промывательныя, однако безъ успѣху. Г. Мат. Брукхеръ утверждаетъ, что прикладываніе нарынаго пластыря къ тому мѣсту, гдѣ чувствуется самая жестокая боль, бываетъ дѣйствительнымъ лѣкарствомъ, которое онъ самъ испыталъ. Но Г. де. Гаенъ, какъ видно, сіе не похваляетъ. (*Ratio medendi p. 9. p. 201.*)

Одннадцатаго вида рвоты причиною бываютъ душевныя возмущенія, а особливо страхъ и испуганіе.

Отъ страху сердце лишается своей силы и способности прогонять кровь къ поверхности тѣла, мышцы ослабѣваютъ и кожныя волокны теряютъ свою упругость. По этой причинѣ въ ономъ человекѣ блѣднѣетъ, поскучетъ и испарина у него останавливается. Всасывающіе сосуды поглощаютъ въ себя изъ воздуха влажноту, а съ оною и заразительный ядъ, члены дрожатъ и послѣ приключается либо рвота, либо поносъ. У испуганнаго человека все чувствительныя жилы приходятъ въ безпорядокъ и бываютъ причиною корчей, судорогъ и падучей болѣзни. Кровь у него стремится отъ поверхности тѣла внутрь, а отъ этого происходитъ прекращеніе сердца и поскли-всаніе; появляется на всемъ тѣлѣ блѣдность и по большей части перестаютъ все испражнения, а иногда еще и увеличиваются. Изъ сего ясно видѣть можеть, сколь опасно содержать дѣтей въ безпрерывномъ страхѣ.

Родители и Учиители всегда такъ съ ними обходиться должны, чтобъ они ихъ считали себѣ за вѣрнѣйшихъ друзей, и чтобъ желаніе имъ угодишь, отвлекало ихъ отъ всякихъ шалостей имъ неприличныхъ, отъ которыхъ послѣ они и сами отстанутъ. Изъ сего также явствуетъ, что еще опаснѣе нечаянно ихъ пугать крикомъ, странно одѣтыми людьми, разсказываніями о привидѣніяхъ: и что напрошивъ того весьма полезно

прѣчаютъ ихъ смотрѣть лошадей, коровъ, собакъ и слушаютъ стрѣльбу, барабанный бой и проч. А особливо когда мы видимъ у наблюдателей многие примѣры, что нѣкоторые младенцы отъ такихъ сценъ не только пугались, но даже получали падучую болѣзнь (V.d. Waerhaave Confil II 29; Abheer observ. 24; v. Swieten Comment III. 415. Andrie on the Epilepsy p. 55; Schenck Observ. p. m. 100 etc.)

Когда рвота происходитъ отъ страха; то должно младенца ободрять и дать ему выпить не много вина, либо росолу олене рожного янтарнаго (Liquor Corvi cetivi succinatius), либо нѣсколько капель Гоффмановаго жизненнаго бальзаму (Balsamus vitae Hoffmanni), либо сложенной Лавандовой маслицы (Spiritus Lavendulae Compofitus Edinb. Palsy drops), напавъ оныя на кусочекъ сахара, либо вливъ въ небольшое количество коричневой, или мясной воды, либо въ вино.

Еслили же оная воснослѣдуетъ отъ того, что младенецъ испугался; то должно употребить усыпительныя лѣкарства, не только для прекращенія рвоты, но и для обратенія другихъ худыхъ слѣдствій. Для сего весьма полезно замазать на лѣчку естелу, приложивъ къ желудку и покрывъ теплою салфеткою.

Внушрь дать смотря по различію возраста $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ либо $\frac{1}{8}$ грама опійнаго экстракта въ небольшомъ количествѣ хорошо перетнутой рушиной воды. Но еслили младенецъ нѣтъ ослабѣлъ, что ничего принять не можетъ; то дол-

жно

жно припаривать его тѣло положенцемъ, въ теплый рѣшветиѣ обмоченнымъ, покаместъ ему сѣдается лучше, потомъ можно ему дать въ винѣ и бѣлѣно олено-рожнаго янтарнаго росолу, (*) а въ вечеру спертаго съ сахарѣмъ опіятаго экстрекша. При томъ должно стараться, чтобъ томъ, кого онъ больше всѣхъ въ домѣ любитъ, его развеселялъ, и представлялъ, что ему уже больше нѣчего бояться. Но еслили младенецъ плакъ малъ, что никакими ободреніями ему пособишь не лзя; то должно его забавлять такими вещами, которыя ему пріятны, и показывать все то, что его зрѣніе и слухъ увеселяетъ и привлекаетъ его на себя вниманіе. Такимъ образомъ онъ можетъ забыть съ нимъ случившееся. (Сверхъ сего не должно давать ему смолръвъ либо слушать то, что можетъ привести ему на мысль съ нимъ воспослѣдовавшее.

Одинъ кучеръ нѣкотораго знатнаго Господина понесъ своего подпоротковаго сына на конюшню, въ наѣженіи показать ему пизмъ для увеселенія жеребенка. Но какъ оный сиюль за кобылою, то и онъ пудалъ съ нимъ пошолъ: Однако кобыла, которая кормила своего жеребенка, такъ лягнула, что оный мужикъ упалъ на землю, на ту самую руку, которою держалъ дитя. Отъ чего оное такъ испужалось, что мать его пуда пришедшая подняла его замертво; ибо оно непохоже было на живаго, но похолодѣло, ротъ и глаза закрыло, тѣло у него совсемъ опу-

Ф 4

сши-

(*) Лучше всего давать ему опій въ ячмѣ сн-ротѣ.

спилось, и биеіе жиѣ перестало. Привесши
домой положили его въ постелю и обвернули поло-
тенцами, въ теплый рейнвейнъ обмоченными и
посѣ выжаными. По прошествіи посѣ того нѣ-
сколько времени началъ младенецъ какъ бы жи-
вать и потомъ громко закричалъ. Тогда ему да-
ли нѣсколько капель одено-рожнаго яштарнаго ро-
сосу (Liquor s. s. succinatus) въ рейнвейнъ, посѣ
копсато онъ спалъ шесць часовъ и весьма много
попѣлъ. Чрезъ нѣсколько дней онъ совершенно
поправился. Однако скоро посѣ того опять за-
болѣлъ упрямымъ и долговременнымъ поносомъ,
котораго никакими средствами прекратить было
не можно; но когда я ему началъ давать ежедневно
въ коричневой водѣ марціальное вино (Vinum Chaly-
beatum Lond), то совсемъ поносъ пересталъ. Сколь-
ни малолѣшенъ былъ сей младенецъ, однако чрезъ
нѣсколько недѣль такъ боялся конюшенныхъ во-
рошъ, что даже дрожалъ, когда его туда поль-
же несли хотѣли. Ему весьма было примѣтно то
мѣсто, гдѣ кучера кобыла ушибла.

Когда младенцы почувствуютъ боль въ желуд-
кѣ, либо ему приключится рвота; то пошчасъ
наши женщины, не разсуждая о причинѣ оной,
насправдываютъ банки въ нѣбреши приподнявъ
мочесобразный, отростокъ (Cacilago Xurphaga), на
нижней части грудины находящійся, и по нхъ
мнѣнію внаупрь вогнувшійся. Однако оныя полез-
ны быть могутъ только взрослымъ, когда уже
онъ отростокъ совсемъ окоспѣетъ (*), и
есть-

(*) Conter Haller Elementa Physiol. T. 3. p. 15.

естьли паче чаянія будетъ погнушѣ: а младенцамъ никогда, потому что оный состоятъ у нихъ изъ упругаго хряща, который будучи влѣвѣнъ, въ одно мгновение приходитъ къ прѣзвѣе положенію.

ОТДѢЛЕНІЕ 18

О кашлѣ.

Причиною кашлю бываетъ все то, что приводитъ въ раздраженіе чувствительныя жилы дыхательнаго горла, дѣйствуя на оныя либо непосредственно, либо посредственно. Въ первомъ случаѣ онъ имѣетъ свое мѣстопробываніе либо въ дыхательномъ горлѣ и въ груди, либо въ другой какой нибудь части шѣла, имѣющей сообщеніе съ оною. Потому иногда то же самое средство, которое въ одномъ родѣ кашлю бываетъ полезно, въ другомъ не только не дѣйствительно, но еще и вредно (*).

Я намѣренъ упомянуть наипаче о томъ кашлѣ, который весьма часто приключается младенцамъ, и котораго раздражающая причина находится въ желудкѣ. Оный для того и называется желудочнымъ кашлемъ (*Tussis stomachalis*).

Дѣти рѣдко умѣютъ наблюдать умѣренность въ пищѣ, но всегда столько ѣдятъ, сколько имъ даютъ, или какъ говорятъ, отъ утра до вечера; при томъ большую частію употребляютъ такую

Ф 5

пищу,

(*) Vid. Halleri Elementa Physiolog. T. 3. p. 300. Кашель въ груди равнымъ образомъ происходитъ, какъ чиханіе въ носу.

нищу, которая скоро оскиснетъ, какъ на пр. ма-
ло, зю и чатуе, и въ вода и кдо состоящую,
а именно: жидкую либо густую изъ муки пшени-
цы, не хорошо выващенный хлѣбъ и проч. Такой
вищи ихъ желудокъ не въ состоянн бывать
переварить или надлащивимъ образомъ передѣ-
лать въ питательный сокъ.

Для того мало по малу скопляются въ ономъ
сырости (лабига стъ з), которая его растягиваетъ,
раздуваетъ, и алаишннъ рвоты и снѣтъ причиня-
ютъ сонливостъ, сильное бннне жидъ въ вискахъ,
боль въ головѣ, тошноту, опвращенне онъ пиди
и не рѣдко рвоту. Съ сырости приномъ не долго
ощущенн въ желудкѣ въ одинакомъ состоянн,
то скоро двлнются острыми, и своєю острою
раздражая чувствительныя желудочныя жилы, со-
общнмъ такъ же раздраженне и груди, и пивмъ
самымъ производятъ сего рода кашель. Въ семъ
случаѣ равнымъ образомъ рлдается кашель въ
груди, какъ онъ земельной колики въ желудкѣ
побужденне въ рвоту. Сей родъ кашля удобно
можно узнать по тронившему духу изъ рта,
по нечистому языку, по напнщенно брѹха и оп-
вращенно онъ пиди. Присемъ еще можно примѣ-
нить, что кашель напнще послѣ кушанья увели-
чивается, чувствется щекотанне или боль въ
желудочномъ верхнемъ отверстн предъ его на-
чинанемъ, и оный проглатывается рвотю,
послѣ которой длатъ кашлю не вынестъ. Можно
такъ же влѣсть младенцу задержанъ въ себѣ ды-
ханне и пидмннть, будншнмъ онъ и тогда ка-
шляеть, снѣшли онъ кашляетъ, то у него нахо-

длится кашель нежелудочный, но побуждающая
къ оному причина имется въ самой груди. Это
легко можно различить и опыту судорожному, что
по тому, что сей всегда чрезъ день пуще ожесточа-
ется, и въ своемъ ожесточеніи едина тачица кре-
ня въ себя вталкивать воздухъ, но безпрестанно
продолжающа до тихъ поръ, пока болящей осла-
нётся бездыханнѣ, либо пока его не вырветъ.
Судорожный кашель сверхъ того соснавляетъ по-
вальную и застывшую болячку: а желудочный
напротивъ того не всегда имаетъ ея съобщения.

Изъ сего явственно видѣть можно, что въ
семъ родѣ кашля обыкновенныя средства скорѣе
могутъ причинить вредъ, нежели принести пользу.
Ибо все то, что расслабляетъ желудокъ, умножаетъ
въ ономъ сырости, а съ оными вмѣстѣ увеличиваетъ и самъ кашель.
Напротивъ того удоро и скоро можно его излечи-
ти легкимъ рвотнымъ. Какимъ же образомъ
оное и самымъ малымъ дѣломъ безъ опасности
можно давать, то я о семъ уже упоминалъ въ
Опытѣхъ о кори. Еслили чрезъ нѣсколько ча-
совъ кашель рвоты больного не ослабитъ, то долж-
но ему насавить изъ небольшого количества мо-
лока, дежянаго масла и сахару промысатель-
ное. Се средство можно употреблять чрезъ нѣ-
сколько дней сряду, покашного можно будещъ
совершенно надѣяться, что кашель пройдетъ, а
особенно сашли младенцу не давать много есть, и
послѣдокъ желудка его поддерживать желудоч-
нымъ Эликсиромъ либо саждающимъ порошкомъ:
Возьми нѣсколько сухихъ листьевъ кудрявой мяты,
стол-

спольн въ мѣлкй порошокъ и просѣй, смѣшай съ равнымъ количествомъ сполченнаго сахару, и давай по дважды либо три раза въ день по одному скрупулу.

Младенцы еще бывающъ подвержены другого рода кашлю, который называется простуднымъ (Tubis catarrhalis). Оный происходитъ отъ простуды, когда на пр. возьмѣтъ съ собою дѣшей осенью либо зимою, не запрещаломъ имъ на холодъ раздѣваться, бросать сѣдомъ, по оному ваяться, бѣгать по лужамъ и проч. либо холодне ихъ держашъ, несли какъ они привыкли, а именно: когда ихъ постель на пр. либо кодыбелка прежде стояла всегда у печи, а пошомъ чрезъ нѣсколько времени оная постойтъ у окна, то отъ того они пошчасъ получаютъ насморкъ и кашель. Равнымъ образомъ когда младенецъ сосетъ грудь матери или кормилицы, недавно съ холоду пришедшей. Сие самое также можеть случиться, когда позволяютъ имъ въ вечеру лѣтомъ, когда днемъ бываетъ весьма жарко, а въ вечеру холодно, до пада на дворѣ играть.

Причина сего кашля есть слѣдующая. Дыхательное горло и легкия внутри имѣютъ безчисленныя потовыя сѣважны, изъ которыхъ безпрестанно выходитъ тонкая влага. Мы видимъ, сколь въ великомъ количествѣ остается оная изъ свѣшломъ зеркалѣ, естли мы на оное дохлемъ, оно ею совѣмъ бываетъ покрыто. Ся испарина у здоровыхъ людей такъ бываетъ сильна, что, естли на пр. выходитъ оной 11 унцовъ изъ кожи, покрывающей все тѣло, то 22 унцъ теряетъ
ся

ся дыхательнымъ горломъ. Изъ сего видѣть можно, сколь неразумно поступающѣ инѣ, кои, подвержены будучи груднымъ припадкамъ, выходятъ на холодный воздухъ думая, что они себя отъ оного довольно защититъ могутъ, когда только тепло одѣнувшись. Хотя они могутъ тѣмъ укрыть тѣло отъ холода; однако не въ состоянн бываютъ не допускать холоднаго воздуха въ легкія. Кромѣ вышеобъявленныхъ поимовыхъ скважинъ находящаяся еще по всей длинѣ дыхательнаго горла на внутренней его поверхности премногія маленькія железы, отдѣляющія изъ себя во внутренности оного тонкую влагу, которая его умащаеиъ и смазываетъ, защищаетъ чувствительнѣйшую его оболочку отъ раздраженія, пылью и иному подобнымъ причиняемаго. Когда устѣя сихъ испаринныхъ скважинъ и железъ отъ стужи, либо отъ жару закрываются; то самое ихъ суженіе причиняеиъ уже раздраженіе, вышеупомянутая кола лишается той защиты, которую, какъ сказано, имѣла; а влажность, прежде изъ нихъ выходящая и вливавшаяся въ дыхательное горло, дѣлается острою такъ, какъ въ насморкѣ, въ которомъ она въ носу производитъ раны и рдѣніе на кожѣ. И такъ раздраженіе, отъ вышеписанныхъ обстоятельствъ происходящее, составляеиъ сего рода кашель, который легко отъ другихъ можно различитъ по тому, что онъ имѣеиъ свое начало отъ простуды и соединеиъ бываетъ съ насморкомъ, чиханіемъ и нерѣдко съ тяжелою жабой, приномъ пуще всего въ вечеру ожесточаеиъ.

Въ началѣ сего канало харкошины бывають
жизни. А есѣли отъ выглашѣ однакъ, то
каналь не перестаетъ, хотя бы ихъ и весьма
мало выходило. Но каналь только сдѣлаются
густыи и глянны, притомъ свободно выходящѣ,
и скоро уменьшаются болѣзнь.

Сей рѣдъ канало самъ по себѣ естѣ неона-
сенъ. Одно есѣли его оставили безъ враче-
воты и зарушить; то оная мажорша спановинскя
осирѣе, приниматѣ въ горѣ ранки, и наплѣ-
докъ мажоръ произвѣсть чахотку (*). Есѣли
отъ всѣхъ есѣли, то комъ другихъ принад-
ковъ мажоръ причинитъ кровоизлѣзане (посторѣ-
нѣ), которое должно опирацннѣ кровопусканіемъ.
Но опосрѣдство для младенцевъ бытѣтъ нужно по
тому, что ихъ колокны бывають мягки, тѣки
и потому не удобно разрываются.

Когда каналь еще въ сумѣ началъ; то
можно его вѣтчить сѣрѣжнѣ въ шлошѣ
горницы, възвѣси или постели младенческой и
надуришиемъ ихъ сахаромъ, когда каналь не мож-
но давать пить чай съ укромными лио анисны-
ми семенами. А есѣли младенецъ уже ошлу-
ченъ отъ труда, то можно также и ему давать
лио отъ чай, лио отъ чайную сызорошкѣ до тѣхъ
поръ, пока отъ не получиши хорошей испаринѣ.

Есѣ-

(*) Сей самый отъ посторѣзаннѣй кан-
шаль, говоритъ славный Принцель, бызѣнѣтъ
первымъ степенемъ волжѣнѣ въ легкихъ, или
легочницы; а старѣй и запущеннѣ естѣ на-
чаломъ чахотки (Oncaes of the army Ed. 7. p.
163.) М.

Еслили же оный уже несколько дней продолжался, то сего недостаточно, но должно въ это время употреблять слѣдующія лекарства:

1) Давать младенцу каждое утро, либо чрезъ день ледкое слабительное, смотря по крепости его силъ и возрасту. Для сего можно взять двѣ, три, или четыре драхмы манеры, и разпустить оную въ небольшомъ сычужномъ сиропѣ. Либо выписать оной одну, два, три, либо четыре драхмы Эдинбургской слабительной каши (Edinburg Phlegm. Ed.mb), и то по Ландонской фармакопее оная сдѣланная съ сахаромъ, и дать также въ сычужномъ сиропѣ или въ сдѣланной. Когда отъ одного приема недостаточно послабитъ, то можно дать другой.

2) После обвѣда давать ему жидкое процеженное миндальное молоко, или слабую сычужную, или жидкую процеженную сиропъ изъ перловыхъ крупъ, сиропъ изъ рвы, либо чай съ молокомъ.

3) Употреблять каждый вечеръ, пока хрипотца не сдѣлается гусиной и жидкою, усыпительное лекарство не только к вечеру, чинюи онъ ночью можетъ покойно спать. Для сего можно взять одинъ гранъ опийнаго экстракта, два граны корки Индианскаго корня и смешивать грановъ сарлаху, смѣшавши выписно хорошо сгущенъ, послѣ раздѣлить на четыре части и давать по одному порошку каждый вечеръ. Еслили же таковой порошокъ не въ состоянии былъ ошваривить ночнаго кашля; то въ слѣдующий вечеръ должно оный сдѣ-

сдѣлать побольше. Но когда младенца кашель ночью не беспокоитъ, то можно и обойтись безъ сего лѣкарства; въ противномъ же случаѣ оно бываетъ необходимо нужно. Ибо отъ кашлю жидкая часть пасоки (Lympha) изъ малыхъ отверстій потовыхъ скважинъ и железокъ выливается и вонь выплевывается. Она же бываетъ нужна для смягченія выписанныхъ отверстій, для разжиживанія харкошины и для приведенія оной (какъ говорятъ) въ созрѣніе, чтобы она могла выходить въ дыхательное горло и отсюда удобно выплевываться.

Когда при томъ содержится младенецъ въ горницѣ, а особливо вѣдши ему лежати въ постели, впитать въ подошвы распущенное на огнѣ козье сало, часто давать нищи, опредѣлить ему легкую пищу и не давать ничего ни кислаго ни соленого, то сей кашель скоро проходитъ.

Хрипотѣ происходитъ отъ той же причины, т. е. когда внутренняя поверхность головы и дыхательнаго горла сдѣлается сухою. А сіе бываетъ также, когда вышеупомянутая жидкая влага и испарина не выходитъ, и слѣдовательно не можетъ смягчаться и смазываться дыхательное горло. Причины сему вѣроятствующія суть различны. Иногда вышеупомянутыя отверстия сжимаются; что часто случается, когда мы вдругъ выходимъ изъ теплоты на холодъ; либо они закрываются, какъ сіе бываетъ въ оснѣ, въ кори и молочницѣ, либо естественная влага въ кожномъ образомъ отъ горячихъ напитковъ, отъ кислыхъ вещей либо избыточныхъ болѣзней

сгу-

стущаеся. Для того мы видимъ, что шѣ, кои весьма пристрастны къ горячимъ напиткамъ, обыкновенно низко говорятъ. Равнымъ образомъ и кашель иногда шакъ бываетъ продолжительнѣ, что вышеупомянутая мокрота скорѣе испражняется, нежели возобновляется. Сѣ самое бываетъ приливомъ, что и чахотные обыкновенно хрипятъ.

Сюда принадлежишъ также и щекоцущій кашель (*Tussis irritativa*, *Toux gortorale*), которой имѣетъ свое мѣсто пребыванія въ верхней части дыхательнаго горла. Въ ономъ ощущается щекопаніе, побуждающее къ кашлю и рвотѣ. Прекращается оный либо вышенисаннымъ образомъ, либо инбирнымъ конфектомъ, который дѣлается изъ одной столовой ложки чистаго меда и одной чайной ложки сполченнаго въ порошокъ и пересѣяннаго инбирю; сего конфекта должно давать по чайной ложечкѣ. Я употреблялъ также въ семъ случаѣ по нѣскольку грановъ экстракта изъ белены (*exigastum Hyoscyami*), который еще скорѣе оказывалъ свое дѣйствіе.

Бываютъ еще младенцы подвержены одному роду кашлю, который происходитъ отъ загнанной внутрь чесотки. Оный шѣмъ бываетъ опасенъ, что чесотка равнымъ образомъ въ немъ разѣдаетъ грудь, какъ прежде того разѣдала кожу; слѣдовательно, еслили заблаговременно больному не подать надлежащей помощи, то отъ сего можетъ произойти чахотка, либо и самая смерть. Сего рода кашлю не можно излѣчитьъ обыкновенными трудными лѣкарствами, но въ ономъ всячески должно стараться онышъ произвестъ чесотку.

ку. Для того въ семъ случаѣ, когда того пре-
буетъ надобность, должно младенцу хорошо очи-
стить желудокъ и кишки которымъ нибудь изъ
вышесписанныхъ слабительныхъ лѣкарствъ; по
тѣмъ велѣнь ему лежать въ теплой постелѣ и
давать по скрупулу въ тепломъ молокѣ сѣрыхъ
цвѣтовъ, которыя принявши долженъ онъ пить
чай изъ цвѣтовъ меуницы (*Ulmia*) либо съ
молокомъ, либо безъ онаго до тѣхъ поръ, пока
не воспослѣдуетъ изобильный поитъ, сей же долж-
но вышеупомянутымъ чаемъ чрезъ нѣсколько ча-
совъ поддерживать.

Сие должно повторять чрезъ нѣсколько дней
сряду. Но какъ только ошъ сего вышупитъ че-
сотка, то кашель во все прекращается. Еслили же
сего не воспослѣдуетъ, то должно къ тому мѣсту,
гдѣ сильнѣе была чесотка, приложить пѣсто съ
горчицею, либо нарывный пластырь (который
лучше всего составлялъ по Лондонской Фарма-
копей); а какъ только оный начнетъ произво-
дить боль или нарывать; то должно давать мла-
денцу по чайной чашкѣ юдепа изъ мускусу, по
Лондонской Фармакопей сдѣланнаго (*Jalapum e mos-
cho, Lond*) пока не воспослѣдуетъ поитъ. Либо да-
вать ему пилюли, составленныя изъ пр. изъ трехъ
грановъ мускусу, одного грана канфары и неболь-
шаго количества сырону княженицы. Послѣ того
тотчасъ давать пить вышесписанный чай. Если-
ли же паче чаянїя сие недовольно дѣйствуетъ; то
должно давать младенцу по дважды, или по три
раза въ день по четыре или по пяти грановъ по-
рошка сурмы со ртутью (*Aethiops antimonialis*) въ
об-

облапкѣ, либо смѣшавъ съ сыропомъ и вслѣдѣ
потчасъ выпить оный же чай. Еслили кашель
слишкомъ беспокоитъ, то между тѣмъ должно
его послабляти предписаннымъ прописъ просуд-
наго кашлю лѣкарствомъ. Оное въ семъ случаѣ
тѣмъ съ меньшею опасностію можно употребить,
что сія болѣзненная матерія есть не такого
свойства, чтобы ее выдѣлывать, но она не-
прѣменно должна быть выгнана на поверхность
кожи (*).

При семъ случаѣ я за нужное считая упомя-
нуть, сколь легко можно дать дѣтямъ что ни-
будь принявъ въ облапкѣ. Должно только отъ
нихъ скрыти свое намѣреніе, и сидя держась у
себя мѣлкій сахаръ и облапку. Они увидѣвши сіе,
конечно подойдутъ и схватятъ проситъ сахару.
Тогда, для приведенія ихъ въ большую къ нему
явности, должно имъ не много его дать. А
между тѣмъ помоча облапку, вложивъ въ оную
при глазахъ ребенка сахаръ и послѣ свернуть.
Примѣтивши онъ сіе конечно ее возьметъ и прогло-
титъ зная, что въ ней находится сахаръ. Когда
такимъ образомъ сдѣлавъ по ушрамъ чрезъ нѣ-

Х 2

сколь-

(*) Снеси сюда то, что я сказалъ въ Отдѣленіи
о роуицѣ (сир. бѣ). Сюда также по моему
мнѣнію можно причислить и тотъ жестокий
кашель, который описалъ Г. Циммерманъ (*Zit-
scher Abhandlungen* В. 2 S 398) и который про-
изшелъ отъ отвердѣвшихъ на шеѣ у одного
мальчика железъ, которые послѣ разошлись и
болѣзнь перешла къ груди. Оный былъ вылѣ-
ченъ предъ симъ упомянутыми лѣкарствами.

сколько дней сряду; то младенецъ таковыя обла-
сти привыкнетъ глотать, а съ нимъ будетъ при-
нимать и все то, что для его болѣзни нужно.

О шѣхъ видахъ кашлю, которые приклю-
чаются въ другихъ болѣзняхъ, какъ на пр. въ
шрудномъ прорѣзѣ зубовъ, въ молочницѣ, въ
оспѣ, въ кори и въ ганскахъ, можно читать
особенныя описанія, о каждомъ изъ нихъ порознь
въ сей же Книгѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ 19

О судоржномъ кашлѣ.

Извѣстно, что оспа, корь и любострастная бо-
лѣзнь не въ Европѣ зачались, но съ товара-
ми, самыми людьми и прочими животными изъ
другихъ частей свѣта, гдѣ съ давнихъ временъ
имѣли свое мѣсто пребыванія, къ намъ прине-
сены: равнымъ образомъ и судоржный кашель
есть такая болѣзнь, которой наши Предки
прежде во все не знали, но вѣроятно получили
оную изъ Америки, либо изъ Остѣ-Индіи.

Въ которое именно время появился онъ въ
Швеціи, сего я точно сказать не могу. Но что
касается до Франціи, то онъ во первыхъ тамъ
примѣченъ въ 1414 году.

Изъ сего всякому глѣбѣ можно что судор-
жный кашель происходитъ не отъ природ-
наго порока, ни отъ истекающей изъ головы
оспроны, ни отъ клейкихъ мокротъ, въ груди
содержащихся, ни отъ великаго оныхъ количества
въ желудкѣ. Ибо еслибы онъ имѣлъ свое нача-

до опѣ вышеписанныхъ причинъ ; то бы и наши
 Природисла, равно какъ мы, не исключены были
 опѣ сей болѣзни. Для того я не считаю причи-
 нною болѣзни эту мокроту, которая въ великомъ
 количествѣ у младенцевъ въ судоржномъ кашлѣ
 рвотною выходитъ, но принимаю за слѣдствіе на-
 стоящей причины, опѣ дѣйствія оной на опѣдѣ-
 ляющія изъ себя оную мокроту железы зави-
 сяще. Эти железы въ такомъ случаѣ будучи
 раздражаемы болѣе обыкновеннаго, опѣдѣляютъ и
 издаютъ онѣ сею мокроту шакъ шочно, какъ
 подобныя имъ железы, въ мочевоомъ пузырьѣ нахо-
 дящіяся, которыя испускаютъ изъ себя великое
 количество клейкой мокроты, когда ихъ раздра-
 жаетъ находящійся въ ономъ камень. Слѣдова-
 тельно несправедливо бы заключалъ шопѣ, кто бы
 считалъ эту мокроту причиною боли, въ шейкѣ
 мочевого пузыря бывающей, ибо оная происходитъ
 опѣ раздраженія, находящимся тамъ камнемъ
 причиняемаго: равнымъ образомъ мнѣ кажется не-
 вѣроятнымъ, чшооъ подобная оной мокрота и въ
 судоржномъ кашлѣ, изъ желудка рвотною выхо-
 дящая, могла быть причиною онаго.

Примѣчанія достойно также, что судоржный
 кашель всегда бываетъ повальный. Мнѣ кажется,
 что я совершенно сіе знаю, ибо я многократно
 очевидно примѣтилъ, что онѣ бываетъ зарази-
 теленъ; толькооъ никогда не пристаеиъ къ шѣмъ
 младенцамъ, которые оный уже имѣли. Слѣдова-
 тельно зараза его распространяется шакимъ же
 образомъ, какъ кори и оспы. Сверхъ сего я ви-
 дѣлъ однажды, что онѣ чрезъ присланиаго изъ
 ? 2 3 иѣ-

нѣкотораго дому человека, въ которомъ находилась сія болѣзнь, въ другой домъ двумъ лѣтямъ принесенъ. Помню также, что я и самъ нѣкогда принявъ моей воли оный въ другой домъ перенесъ.

Какъ шотъ, кто уже однажды имѣлъ настоящую оспу и корь, не имѣетъ причины болѣе опасаться новой ихъ заразы: такъ равно и шотъ, кто имѣлъ уже судоржный кашель справедливо предъ оного бояться не долженъ. Ибо я въ тридцатисемилѣтней моей Практикѣ никогда не примѣнилъ, чтобъ кто больше одного раза оный имѣлъ. Д. Гилларн (*) (*on the Air and the Diseases of Barbados* p. 45.) и Киркпатрикъ (*Analisis* p. 64, *Editio secunda*) тоже самое утверждаютъ (**). Безспорно, что известный мальчикъ въ корь имѣлъ

а.с.

(*) Гилларн (въ оной своей книгѣ) пишетъ, что ни онъ самъ, ни другіе, у которыхъ онъ спрашивалъ, ни у кого два раза сей болѣзни не видѣли, и точно утверждаетъ, что, еслибы кто заражался въ старости судоржнымъ кашлемъ, то сіе было еще въ первой разъ его жизни. Сіе самое видѣть можно и изъ наблюдений Г. Бассета (*Med. Essays et observations* p. 147), который примѣтилъ, что всѣ жители Клевеландскіе, какъ старыя такъ и малыя, выключая только тѣхъ, кои уже прежде оный имѣли, сею болѣзнію страдали. Онъ изначе старался описать всѣ тѣ признаки, по которымъ бы можно различать судоржный кашель отъ кори и оспы, съ коими онъ имѣетъ нѣкоторое сходство. М.

(**) Судоржный кашель въ известныхъ обстоятельствахъ, какъ лихорадки можешь воз-
вра-

жестокій кашель прежде выступленія оной; онъ кашляя издавалъ отъ себя также тому подобный звукъ, каковъ бываетъ въ судоржномъ кашлѣ, и каждое одеспочение его оканчивалось рвотою: однако одеспочения оного не чрезъ день приходили; а сіе по саче и еснь почнымъ признакомъ суторжанаго кашля. Сверхъ того оный кашель, какъ только корь высыпала, миновался.

Х 4

Су-

врачались. Д. Моррисъ (Medical observ. and Inquiries Vol. 3. p. 281.) примѣтилъ, что нѣ малыдѣцы, которые онымъ болѣны были осенью, въ слѣдующую весну опять оный получали. Ибо причина болѣзни въ осени не совершенно была изстреждена. Въ 1762 году судоржный кашель во многихъ мѣстахъ въ Швеции свирѣпствовалъ, и былъ самый жестокий, сколько миѣ случилось примѣнить. Въ то время получилъ оный также одинъ четырехлѣтній мальчикъ; послѣ снустя нѣсколько времени заболѣлъ онъ ежедневною лихорадкою, въ которой былъ ознобъ жаръ и потъ, и которая чрезъ нѣсколько дней сряду въ вечеру его безпокоила. Но въ сіи дни кашлю у него во все не было. А какъ только миновалась сама собою лихорадка, то возвратился опять судоржный кашель съ прежнею жестокостию. У сего мальчика часто шла кровь изъ носа; напоследокъ нѣ обѣихъ ноздряхъ прорвались кровеносныя жилы, и онъ отъ этого много потерялъ крови. Въ началѣ болѣзни оная не была пущена. По продолженіи же чрезъ нѣсколько недѣль болѣзни, выступила весьма сильная сыпь около пахъ, изъ которой хотя много истекало острыхъ мокротъ, однако судоржный кашель отъ сего не уменьшился. Сыпь оная также продолжалась еще и по окончаніи оного,

Судоржный кашель иногда соединенъ бываетъ съ явственною горячкою а иногда безъ оной. Но, покаместъ не приведенъ будетъ превращеннымъ дѣченіемъ, либо другою какою нибудь постороннею причиною (*) иъ безпорядокъ, всегда чрезъ день имѣетъ свои ожесточенія. При томъ больные всегда чувствуютъ ознобъ въ тонкой части ногъ.

Онъ начинается мало по малу и съ начала бываетъ сухой; но чрезъ 10 или 12 дней начинаетъ больной откашливать мокроты, которыя бываютъ цѣпномъ желты, такъ какъ гной, выходящій изъ созрѣлаго нарыва. Не смотря на то однако кашель часъ отъ часу увеличивается, довольное время даетъ послабленіе, въ извѣстные часы опять возвращается, и продолжается съ такою жестокостію, и такъ долго, что младенецъ блѣднѣетъ иъ лицѣ, глаза у него выпучиваются, выпускаютъ изъ себя слезы, и иногда изъ носа течетъ кровь. Больше нѣчего тогда ожидать, какъ только что младенецъ долженъ остаться безъ

оного, и тогда уже прошла, когда сдѣлался на междупроходной промежуткѣ нарывъ, который пришедъ въ созрѣніе, открылся и залеченъ былъ обыкновеннымъ образомъ. Другаго младенца не могли удержать, чѣмъ онъ во время продолженія судоржнаго кашля не сверднулъ себя ногтемъ между вѣкою прѣвого глаза и корнемъ носа, почему онъ сіе продолжалъ до тѣхъ поръ, пока сдѣлалась рана: однако кашель его продолжался съ равною свирѣпостію.

(*) Смори примѣчанія Г. Доктора Блома и Факса (in den Berichten an das Königl. Coll. von I. 1769 S. II. 250).

безъ дыханія и задушишься. Ибо естѣли онѣ хотя не много втягиаетъ въ себя воздуху, то сіе происходитъ съ такимъ звономъ, что явственно примѣлишь можно, съ сколь великою трудностію входитъ онѣ въ легкія. Онѣ всегда продолжается съ одинакою жестокостию и каждый разъ оканчивается рвотою, съ котораго много выходитъ мокротъ. Естѣли же когда перестанетъ безъ рвоты, то опять скоро возвращается и мучитъ до тѣхъ поръ, пока больного не вырветъ. Естѣли его ожесточеніе придетъ послѣ того, когда младенецъ что нибудь покушаетъ; то онѣ становится сиъ, падетъ на землю, и естѣли ему вложа перстъ въ ротъ не произвестъ рвоты, то онѣ можетъ задушиться. По сей причинѣ не должно шокowychъ младенцевъ покидать однихъ, но лучше всегда оставаясь при нихъ разумнаго и опытнаго челоуѣка; сіе такъ же и для того нужно, чтобъ они, когда придетъ къ нимъ ожесточеніе, не упали и не ушиблись. Они сами жала сего избѣгнуть при наступленіи кашаю, хватаются за крѣпкое какое нибудь шѣло, какъ на пр. за столъ, либо за стулъ, и всѣми силами за оное держатся, ударяя обѣ полъ ногами въ Франціи называютъ сей кашель *Coqueluche* потому, что такъ прежде думали, будто онѣ происходитъ отъ мокротъ, изъ головы внизъ опускающихся, и будто его и вытѣчь можно, естѣли шолько держать голову тепло, накрывая оную шапкою. Древніе же Греки и Римляне не дали сей болѣзни никакого названія для того, что она имѣ была вовсе неизлѣпна.

И такъ настоящимъ причинною сей болѣзни есть особливое вещество или сѣмя, которое можетъ такъ, какъ и оспенный ядъ размножаться и къ шѣмъ младенцамъ, которые еще онаго не имѣли, приставать. Я не знаю, также въ насѣкомыхъ ли оно состоитъ, или нѣтъ. Только то известно примѣчается, что зараза распространяется чрезъ сообщеніе, и нѣкоторая часть оной входитъ посредствомъ вдыханія въ легкія, а большая часть входитъ въ желудокъ съ глотаемою нами едоною. Въ обоихъ сихъ мѣстахъ, а также въ послѣднемъ, дѣйствуетъ ядъ на чувствительныя жилы и раздражаетъ или разбѣдаетъ оныя въ извѣстныя времена; а въ другія, которыя иногда продолжаются около полтора дня, не бываютъ. Сие раздраженіе, отъ сообщенія чувствительныхъ жилъ желудочныхъ съ легочными въ груди возбуждаемое, производитъ сей судорожный кашель, котораго освобожденія до тѣхъ поръ продолжаются, пока посредствомъ рвоты не изсражится главная часть причины, оная раздражающей. Оное никогда вовсе не прекращается до тѣхъ поръ, пока не будетъ причина его совсѣмъ уничтожена, бездѣйствительна, либо вонъ изъ тѣла изгнана.

Изъ сего заключить можно, что для прекращенія судорожнаго кашля потребно такое средство, которое бы въ состояніи было, причину онаго либо обезсилить и сдѣлать недействительною, либо немедленно и кратчайшимъ путемъ изъ тѣла изгнать.

Не напрасно старались разительно оное изыскивать: ибо сія болѣзнь тяжела и долговременна.

на. Ежели ее оставить на одну природу; то она продолжится 11 и 12. недѣль, а иногда и цѣлые полгода. Припомѣ болѣзнь бываше не только оная, но и смертоносна (*). Иные въ оной задыхаются, иные истощаются крѣпеченемъ; иные получаютъ судорги и самыя поспѣва; иные вовсе высыхаютъ, а иные распухаютъ и умираются жизни. Я еще не упоминаю о тѣхъ, коимъ онъ приключастъ грыжу, либо горбъ.

Онъ сего кашлю удобно можно избавиться, ежели въ то время, когда оный свирѣпствуетъ, всачески стараться убивать его заразы. Ибо вѣроятно, что онъ всегда гдѣ нибудь въ Государствѣ находишь, пробѣгающими въ разныхъ мѣстахъ возникши, либо чрезъ извѣстное время въ плащѣ, или въ поваряхъ такъ, какъ ося, скрывается.

Ежели бы мы имѣли такое лѣкарство, которое могло болѣзненное сіе начало истребить, либо сдѣлать недействительнымъ; то бы удобно могли прекращать судоржный кашель. Можетъ быть справедливо приписываютъ сіе дѣйствіе лисамъ

(*) Изъ записокъ о умершихъ явствуетъ, что въ 16 лѣтъ, то есть онъ 1749 до 1764 года, (считая и сіи два года) въ Швеции судоржнымъ кашлемъ умерло 43393 младенцевъ, что составивъ на каждый годъ по 2712. Въ одномъ 1755 году умерло ихъ 5832, а прочие годы еще благополучными считаются, и въ которыхъ умерло онъ 1700 до 200. Но какъ изъ числа вышенисанныхъ умершихъ младенцевъ было мужеска пола, 21543, а женска 21850; то изъ сего явствуетъ, что сія болѣзнь умерщвляетъ больше женска пола, нежели мужеска.

спамъ багульника (*Rosmarinus sylvestris*), которые съвинутомъ имъ наподобіе чаю. Г. Линней въ Вестгогскомъ своемъ Путешествіи повѣст-
ствуетъ, что простой народъ съ пользою оный
для своихъ дѣтей употребляетъ въ судоржномъ
кашлѣ (*). Мускусъ также въ сей болѣзни мо-
жетъ принести пользу. Известно мнѣ, что оный
весь-

(*) Сие дѣйствіе подтверждаютъ г. Гаршманнъ
(in *Berg us Færløk om gongvita siukd* 1755. S. 25.) и
г. Величъ, который давалъ имъ больнымъ ли-
бо слабую, либо покрѣпче сдѣланную и сѣрнот-
вымъ алкаарствами смѣшенную наливку листовъ
сей травы, прибавя къ ней нѣсколько молока,
либо сыворотки. Онъ употреблялъ также сіе
дѣкарство и въ оснѣ, соединенной съ судор-
жымъ кашлемъ. У просиныхъ людей въ Каа-
марѣ г. Валбоомъ также весьма прославился реоп-
тнымъ и сими листьями (*Beræiseit til K. Sæll-
med. fæst en Fær fatning* S. 157. и 212.) Сіи са-
мый способъ съ пользою употреблялъ г. Боомъ
(*Medicinal Verke til Rands Riker* S. 12.) Сіи тра-
ва называется по Ботанически *Ledum palustre*, а по
Россійски, клоповникъ, багуиъ, багульниъ,
или дикой розмаринъ и растетъ на влажи-
стыхъ мѣстахъ. Въ рѣдкихъ еще Аптекахъ она
хранится, а въ нѣкоторыхъ подъ симъ име-
немъ содержится *Asplenium polyfolia*: вмѣсто
того, что настоящій багульникъ какъ ради
вышесутомъ оупата дѣйствія въ судоржномъ каш-
лѣ, для внутренняго употребленія въ проказѣ,
въ которой его нѣкоторые похваляютъ; такъ
и по причинѣ происходящей отъ него пользы въ
чесоткѣ и въ шолудяхъ, естли его въ водѣ
зварить и мыть больного, въ оныхъ содержаніи
должно бы. Въ Элономіи онъ также весьма по-
ле-

весьма хваляшъ противъ судоржнаго кашля Агличане, изъ числа которыхъ я упомяну только о д. Фуллерѣ (*Rhagmasorosa extemporeanea* p. m. 206.), кто намѣренъ въ семъ случаѣ испытать сѣ лѣкарство, потѣ можетъ выписать изъ Аптеки такъ называемой юлеи изъ мускуса (*Jularum e muscho*), по Лондонской фармакопеи приготовленный, котораго можно взять около шести унровъ и давать больному по столовой ложкѣ въ свободныя отъ болѣзни времена чрезъ часъ, либо рѣже или чаще, смотря по послабленію болѣзни, которое долѣ или короче продолжается. Я еще его никогда въ сей болѣзни не пробовалъ; но какъ мнѣ случилось видѣть хорошее онаго дѣйствіе въ другихъ болѣзняхъ, имѣющихъ съ сѣю великое сходство. шо думаю, что можно оно въ семъ случаѣ употребить не только безъ опасенія, но и съ пользою. Желательно бы, чтобъ Врачи больше старались испытывать такіа лѣкарства, которыхъ умерщвляющъ извѣстныхъ, и о которыхъ извѣстно, что они полезны въ сыпныхъ горячкахъ (*).

Въ прошедшемъ году начали употреблять пиюленее

леженъ: но не хорошо его класть въ пиво вмѣсто хмѣлю такъ, какъ прежде было въ употребленіи; ибо пиво отъ него бываетъ весьма пьяно и для головы весьма тяжело (*Vid. apparatus Medicam. Murray T. 2. p. 75. 199*) М.

(*) Г. Гаршманнъ (на вышеупом. мѣстѣ) предписываетъ съ рвотными лѣкарствами лихорадочную корку и мускусъ и примѣтилъ, что отъ сего скорѣйшее бываетъ дѣйствіе, нежели отъ багульника. М.

нее сало (*Phoca vitulina*). Взявши полумца онаго ва-
риани въ одномѣ фунтѣ молока чрезъ четверть
часа; и давали пить сие молоко отъ полулодо-
выхъ до одностодовыхъ по столовой ложкѣ по
утру и въ вечеру, з пѣмъ, которые постарѣе,
большее количество. Увѣряютъ, что отъ сего
ослабеваше дыханіе въ восемь дней прекращалось,
только кашель долѣ сего продолжался. Но напо-
слѣдокъ и оный прекратили, давая по нѣскольку
капель смолы, смѣшавши съ яичнымъ желткомъ.
Г. I. А. Брандшъ (*Inkestdning for år 1770 N. 24*
ind. Chirurgiska societeten Handelser 1769 S. 105.)
бышомъ сие утверждаетъ и увѣряетъ, что онъ
видѣлъ облегченіе съ симаго перваго дня, когда
оное даваніе начали. Д. Моррисъ предписываетъ
въ судоржномъ кашлѣ лобровую струю, (*salicem*)
съ лихорадочною коркою смѣшенную. Онъ такъ же
говоритъ, что онъ слышалъ, будто младенцы въ
9 или 10 дней выздоравливали отъ того, когда
соглашались вдыхать въ себя паръ противный
запахъ, который происходилъ отъ козла либо
лисицы (тѣмъ же стр. 231.). Справедливо можно
надѣясь, что въ скорости будетъ извѣстно,
которое изъ сихъ лѣкарствъ лучше дѣйствуетъ,
и потому въ непродолжительномъ времени су-
доржный кашель будетъ исключенъ изъ числа
опасныхъ болѣзней. Пилюли изъ шабачнаго экс-
тракта (*) часто въ судоржныхъ кашляхъ дру-
гаго рода приносятъ пользу: но могутъ ли онѣ и
въ

(*) Такъ на пр. Г. Фонъ Роз. примѣнилъ весьма
хорошее дѣйствіе шабачнаго сыроу въ жесто-
комъ

въ семъ кашлѣ равное слабашь облегченіе, я еще не имѣлъ случая сего испытать. Не испытывалъ также я селищреной нефши (*Naphtha nitri*) и эфирнаго Фробеніеваго спирта (*Spiritus aethereus Frobenii*) (*) коиорые оба опѣ иѣкопторыхъ весьма похваляются (**).

Дру-

комъ кашлѣ, соединенномъ съ спѣсненіемъ въ вѣ груди (*Observat. Clin. in Nosocom. Varsaviens. Fasc. I. p. 53*). М.

(*) Съ симъ спиртомъ имѣенъ сходство слѣдующій составъ (*Hanlöversch. Magazin 80 ff. 1768*), который Г. Верлеофъ давалъ съ весьма хорошимъ дѣйствіемъ въ судорожномъ кашлѣ такъ, что всѣ больные въ четыре недѣли онѣ онаго выздоравливали, а именно:

R. Symp. Corall. $\frac{3}{4}$ VIII. Возьми сыропу морскаго
моху 8 унцовъ,

Spir. falis dulc. $\frac{3}{4}$ I. Виносолнаго спирту 1
унцѣ,

M. D. S. Смѣшай вмѣсто и над-
пиши:

Давать по утру и въ вечеру по двѣ чайныя ложки за каждымъ разомъ. Я съ пользою оный употреблялъ, только прежде онаго давалъ и другія лѣкарства, которыя можетъ быть послѣ оказали свое дѣйствіе.

(**) Къ симъ двумъ лѣкарствамъ нехудо примѣшивать дурный духъ (*assa foetida*), котораго пользу не давно открылъ Г. Милларъ (*Observations on the Asthma and on the Hoopingcough p. 132*). Онѣ распускалъ онаго полторы или двѣ драхмы въ 6 либо 8 унцахъ полейной воды (*Aqua pulegii*) и количество оной послѣ либо увеличивалъ, либо уменьшалъ, смотря по обстоятельствамъ чрезъ день. Еслии только онѣ заблаговременно былъ призванъ, то однимъ симъ

Другой способъ лѣченія судоржнаго кашляю состоитъ въ томъ, чтобъ посредствомъ легкаго рвотнаго выгнать изъ пѣла то вещество, которое я счишаю причиною сей болѣзни. Сими способами лѣчилъ Г. Спрандбергъ и хорошо въ сочиненіяхъ Королевской Шведской Академіи наукъ (на Шведскомъ языкѣ стр. 251) описалъ (*). Сей родъ лѣченія похваляетъ также Г. Докторъ Бергспралъ въ ученыхъ Стокгольмскихъ вѣдомостяхъ (1752

симъ лѣкарствомъ вылѣчивалъ. Однако иногда жестокость болѣзни и извѣстные опъ оной происходящіе припадки либо во все не позволяли употреблять дурнаго духу, либо по крайней мѣрѣ требовали, чтобъ оный соединенъ былъ съ другими лѣкарствами. М.

(*) Г. Спрандберга способъ лѣченія состоитъ въ разбивающихъ мокроты лѣкарствахъ, изъ числа которыхъ дастъ онъ предъ прочими преимущественно виноукусной соли (Арсанитъ или азотъ), слабительнымъ, рвотнымъ (для произведенія рвоты онъ употребляетъ уксуседъ морскаго духу (*oximet scilicet*) и лихорадочной коркѣ, (о которомъ при окончаніи сего отдѣленія будетъ упомянуто). Клейкость рвотною испражняемой мокроты, сама по себѣ съ облегченіемъ болѣзнаго бывающая, рвота и судоржное и перемежающееся свойство болѣзни научили его употреблять сіи лѣкарства. Съ меньшею пользою употреблялъ оныя въ Геттингѣ Г. Брендель (*Vid. eius programma de Tussi convulsiva* 1747. р. 61. при совозвущеніи къ нимъ смотря по основательствамъ кровоупусканіе, утоляющія жаръ лѣкарства и прикладываніе нарывнаго пластыря. М.

(1752 года N. 40.). Равнымъ образомъ вылѣчивалъ сию золотъный старый Французскій Врѣчъ Вассевиллѣ (* однимъ только рвотнымъ, какъ сіе утверждаетъ его сынъ въ написанной имъ въ 1752 году диссертаціи въ Парижѣ.

Тѣмъ, кои недовольно еще имѣли опытовъ, спрѣшно показаніе, что малолѣтнимъ младенцамъ предписывается рвотное. Однако оное для нихъ способа вынаетъ, нежели для взрослыхъ людей. Правда, что ихъ чувствительныя жилы нѣжны; однако имъ по той причинѣ даются и меньшіе прѣмы. Твердыя же чревы у младенцевъ бывающъ мягки, гибки и удѣбно растягиваются, а мокроты у нихъ находятся въ изобиліи. Слѣдовательно рвота не можетъ имъ причинить никакой опасности. Самымъ для нихъ лучшимъ рвотнымъ лѣкарствомъ служишь корка Ипеакауаннаго корня, употребляемая такимъ образомъ, какъ предписано въ Ошдѣленіи о корнѣ, которую должно давать въ то время, когда болѣзнь наиболее поощрится. Если одинъ или два прѣмы оной не дѣйствуютъ; то я даю ирешій. Только для нѣкоторыхъ должно уменьшать прѣмы. Такимъ образомъ можемъ мы произвести симъ лѣкарствомъ желаемое дѣйствіе. Вѣсто Ипеакауаннаго корня можно также употребить для произ-
ле-

(*) Quæst. med. an suffi puerorum clangorae, vulgo Coquel che, emefis? Praes. Lud. Claudio Bourdelin proponbat Io. Varius Bassville. Paris. 1752. — Сколь великую имѣющъ надежду на рвотныя лѣкарства прочіе Врачи, то о семъ можно читать краткое описаніе способа лѣченія Г. Миллера (on the Asthma and Hooping-cough.) М.

веденія рвоты желтосурьмяную сѣру (*fulphur antimonii auratum tertiae praeparationis*), либо минеральный кермесъ (*Kermes minerale*), либо рвотную соль (*Tartarus emeticus*), либо сурьмяную Гуксгамову эссенцію (*essentia antimonii Huxhami*), либо рвотное вино (*vinum emeticum*). Только должно давать сих лѣкарствъ въ различномъ количествѣ, смотря по большему или меньшему количеству содержащагося въ нихъ сурьмянаго королика (*Regulus antimonii*). На пр. можно спереть одинъ гранъ рвотной соли съ 31 граномъ сахару въ мѣлкій порошокъ, и раздѣля на 8 частей, давать по одной каждый день въ небольшомъ количествѣ водою разведеннаго молока въ то время, когда больной не имѣетъ ожесточенія. Молоко отъ сего порошка цѣлству своего не теряетъ, и вкусъ также имѣетъ пріятный: для того младенецъ можетъ его пить ни мало не подозревая о лѣкарствѣ. Когда отъ одного прѣма не сдѣлается рвота, то спустя четверть часа должно дать другой такъ, какъ сіе сказано и о Ипекакуинномъ корнѣ. (*Sneca Fothergill Med. observations T. 3. p. 319*). Когда рвотное начинаетъ оказывать свое дѣйствіе, то я даю младенцу пить приспосойное питье. Сіе продолжаю до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ кашель, и естли вилау, что оныя прѣмы либо слишкомъ сильно, либо не довольно дѣйствуютъ; то я ихъ либо уменьшаю, либо увеличиваю.

Естли же судоржный кашель уже сдѣлался безпорядочнымъ, такъ что больной не чувствуетъ въ извѣстные дни прежняго облегченія; то я начинаю давать ему рвотное поспѣе послѣ
ожс-

ожесточенія, какъ только нѣсколько сдѣлается легче.

Естьли младенецъ весьма многокровенъ, либо во время ожесточенія у него бываетъ кровоотеченіе изъ носа; то прежде рвотнаго должно ему пустишь кровь. Естьли же у него бываетъ запоръ; то я ведю наставить ему промывавшесельное, либо дать не много ревеню. Но естьли онъ уже давно болелъ, весьма истощились силы его, и потому опасно ему дать рвотное: то должно слѣдуя совѣту Г. Спранберга употреблять лихорадочную корку (*), либо давать пить кобылье молоко и вмѣстѣ съ нимъ оную же корку.

Ц 2

Об-

(*) Равнымъ образомъ и въ Геттингѣ, во время бывшаго 1772 года лѣтомъ повальнаго судоржнаго кашля, одними только рвотными можно было избавитися отъ оного. Однако я многократно примѣнялъ, что и самыя крѣпкія присы въ разсужденіи младенческаго возраста сначала не дѣйствовали до техъ поръ, пока разрѣшающими лѣкарствами не разведены были клейкія мокроты и не обнажены чувствительныя жилы. Такъ на пр. данный одинъ приемъ нѣкоторому прехмѣстному младенцу въ такомъ количествѣ, котораго довольно было для чепырехлѣтняго его брата, не произвелъ у него рвоты. Мокрота же у него такъ была клейка, что можно было нитками тянуть ее изъ горла. Разрѣшающее лѣкарство большею частию я составляю изъ полевой воды (*Aqua pulcr.*), уксомеду морскаго луку, росолу винокаменной соли (*Liquor tartae foliatae tartari*) и груднаго сыропу. Для произведенія рвоты лучше всего мнѣ показался уксомедъ морскаго луку съ Инскакуанымъ

Облегченіе болѣзни узнается, когда 1) горячка уменьшается, 2) дыханіе спановиниса свободнѣе и 3) ожесточенія одно за другимъ бывають рѣже. Есть-

вымъ порошокъ, смѣшенный и разведенный перегнанною водою. Рвотное смотря по обстоятельствамъ я давалъ прежде обѣда либо ежедневно, либо чрезъ день не только въ началѣ болѣзни, но еспли поогрудилъ приболада и при употребленіи другихъ пропитъ сей болѣзни лѣкарствъ. Послѣ чего болѣлые ночью покойнѣе спали, ибо большею частію чрезъ ночь возвращались ожесточенія, при томъ были не ешоль сильны и короче продолжались. Однако обстоятельства сей болѣзни меня заставаши, приступать къ употребленію лихорадочной корки прежде, нежели разршаримъ, ршотными и слабительными лѣкарствами доведеть былъ кашель до того, чтооъ могъ окончиться безъ ршоты. Я давалъ имъ сперва взваръ оной, съ росоломъ виноукусной соли смѣшенный, а потомъ самую лихорадочную корку одну, либо смѣшиваеъ съ нѣсколькими гранами бобровой струи. При томъ я примышля, что не должно скоро ешть употребленія оной отставать, но лучше еще и тогда чрезъ нѣсколько времени продолжашъ, когда уже кашель и во все переставешъ. Ибо въ противномъ случаѣ оный снать молетъ возвратиться — Что ешоль кратко Г. Фолъ Р. здѣсь описываетъ употребленіе сихъ лѣкарствъ; по сему конечно причиною бытъ его недосудъ. (Смотри о семъ пространнѣе: *Magay Progr. de tempore corticis Peruviani in tui convulsa exhibendi.* Gott. 1776). М.

Г. Виншъ также (*Observ. on nervous Disorders, Works стр. 636.*) заблаговременное употребленіе лихорадочной корки, т. е. прежде воспослѣдова-

Естьли у младенца сдѣляется грыжа; то должно оную поспѣшь вравыишь и, приложивъ тому мѣсту, опікула она вышла, сложенные вѣшюшки (компрессы) хорошо перевязать. а мѣсту тѣмъ стараться досыпать нарочитые для грыжъ бандажки.

Ц 3

ОТ-

завшаго въ дѣткахъ запору считаетъ наилучшимъ лѣкарствомъ. А Г. Биссетъ (*Medical Essay et observations* p. 183.) употребляетъ ее чрезъ все продолженіе болѣзни, смѣшивая съ другими лѣкарствами. Однако онъ примѣнилъ также, что естьли се употребляетъ при продолженіи болѣзни для прекращенія оной въ великомъ количествѣ, то она студаетъ клейкую мокроту и кашель увеличиваетъ, и что ее только во времена послабленія, и наипаче когда они не коротко продолжаются, безъ вреда употребляетъ можно. Особливую она имѣетъ силу опарашать возвращеніе болѣзни и предохранять больного отъ могущихъ воспослѣдовать различныхъ худыхъ слѣдствій, а именно: отъ золотухи, отъ Аглинской немочи и чахотки. И потому онъ ее по крайней мѣрѣ уже при окончаніи болѣзни употребляетъ начинаетъ и продолжаетъ до совершеннаго выздоровленія больного. (Снеси сюда *Millar's observations on the Asthma and the Hooping-cough* p. 136.) М.

ОТДѢЛЕНІЕ 20

О желтяницѣ.

Хотя желтяница есть такая болѣзнь, которой всякаго возраста люди бывають подвержены: однако и къ младенческимъ ее причисляють по тому, что часто она младенцамъ въ самомъ еще началѣ ихъ жизни приключается. (*)

Впро-

(*) Хотя никогда мнѣ не случалось самому видѣть такихъ младенцевъ, которые бы на свѣтъ родились съ желтяницею: однако не безъызвѣстно, что другіе Врачи таковыя примѣры описываютъ (M. N. Cuius. Dec. I. A. VI. Observ. 241. Dec. III. A. 11. Obs. 40. Fr. de la Boe Sylvius, Prae, med. Lib. I. cap. 45. N. XI. p. 302. Theod. Kerkring opera omnia anat. Obs. 57. p. 118.) P.

Во всѣхъ упоминаемыхъ здѣсь сочиненіяхъ, исключая Сильвуса, описаны такіе младенцы, которые получили сию болѣзнь отъ своихъ матерей, во время беременности оною же страдавшихъ. Они обыкновенно либо преждевременно выходили на свѣтъ мертвые, либо только чрезъ короткое время живы были послѣ своего рожденія. Но такіе случаи, подобъ младенцы рождались на свѣтъ съ желтяницею отъ здоровыхъ матерей, кажется должны быть и много рѣже; хотя по Сильвій и утверждаетъ, что онъ много ихъ видѣлъ. Впрочемъ можеть быть она и тогда скрывается подъ рдѣніемъ кожи, которое у новорожденныхъ младенцевъ больше или меньше бываеть примѣтно, и есть не что иное, какъ настоящая рожа, ибо и кожа нанослѣдетъ сдущиваеши. М.

Впрочемъ она не такъ часто у насъ бываетъ въ Швеции, какъ въ другихъ Государствахъ. Можетъ статься, что сіе происходитъ отъ того, что здѣсь даже и упростиыхъ людей приняно въ обыкновеніе, новорожденнымъ младенцамъ порядочно очищать желудокъ и кишки посредствомъ манной кашки (*) отъ находящейся въ нихъ склизы и перваго дѣтскаго калу.

Помеже все то, что печеночные желчные протоки (*pori bilarii et ductus hepaticus*), большой желчный каналъ (*ductus choleduchus*) и онаго опверстие въ двенадцатидюймовую кишку затворяетъ, либо суживаетъ такъ, что желчь свободно въ оную не можетъ проходить (**), можетъ быть причиною желтяницы. то изъ сего явствуетъ,

Ц 4

что

(*) Я думаю, что онъ подъ симъ именемъ разумѣетъ *tabula tabulata*. М.

(**) Что въ желчномъ пузырьѣ, въ его протокѣ (*ductus cysticus*) и въ самыхъ желчныхъ камняхъ, естли только они не въ самомъ большомъ желчномъ каналѣ, либо въ его опверстии въ двенадцатидюймовую кишку, находясь, не бываетъ причина желтяницы: то сіе нѣтъ можно изъ диссертаціи Г. Д. Бизура (*Diff. qua istius levis adumbratur praecepta. Sal. Avnville, 1763, p. 38. et 39*). Блаженной памяти Король (Фридрихъ) имѣлъ въ желчномъ пузырьѣ три большіе и три малые угловатые камни; однако у него не было не только желтяницы, но и никакихъ оной признаковъ. При томъ у младенцевъ Г. Галлеръ, которыхъ онъ весьма много послѣ смерти вскрывалъ, никогда въ желчномъ пузырьѣ камней не сыскивалъ. (*Vid eius opuscula anatom. P. 2. p. 325. Sinesci также смр. 328. и слѣд.*)

что и накопившуюся мокроту и клейкія жидкости сюда причислить должно; ибо оныя у новорожденного младенца вышесказанныя отверстія могутъ запереть, и слѣдовательно въ состояніи бывающіе произвести желтѣяницу (*). А сіе тѣмъ удобнѣе можетъ воспослѣдовать, что большой желчный каналъ, на концѣ при своемъ отверстіи въ двенадцатидюймовую кишку, идетъ между оболочками оной и косвенно опровергается.

Еслили у младенца высосанное имъ молоко въ желудкѣ отъ кислоты сплыворжится; то и самый сей творогъ вышесказанное отверстіе можетъ затворить. Сіе самое можетъ также воспослѣдовать, когда его кормятъ одною только почти мучною кашницею. Равнымъ образомъ закрывается отверстіе онаго пропюка и тогда, когда отъ кислоты слѣдается въ животѣ рѣзь и случится вышеупомянутая кишка. (**)

Мла-

(*) Моргагнъ (*de fedib et causis morborum* Ер. II. 48 Ал. 60) думаетъ, что желтѣяница у новорожденныхъ младенцевъ отчасти происходитъ отъ сокращенія опрѣзанной и перевязанной вмѣстѣ съ пуповиною крововозвратной жилы, которая оказывается въ воротную (*Vena porta*), а отъ части отъ прекращенія преждевѣшняго прилитія крови изъ дѣтскаго мѣста, которою содержащаяся въ печени прежде разжиживалась; бо-льшѣ же не принимаетъ никакихъ причинъ. М.

(**) Что младенцы, сосавши грудь разсердившейся своей матерью, либо кормилицы въ лицѣ сплыворжятся желтѣи; то я сіе примѣнилъ, однако еще не дозналъ, происходитъ ли отъ того настоящая желтѣяница.

Младенецъ, отлученный уже отъ груди, и питаемый другимъ рода пищею, самъ собою весьма удобно можетъ быть причиною желшняицы, когда онъ гланикомъ много кушаетъ нехорошо перевариваемую имъ пищу, тѣмъ незрѣлые плоды, или другую какую либо нехорошую и грубую пищу, которой его желудокъ не въ состоянн сварить и передѣлать въ пищеварительный сокъ. Ибо отъ сего происходитъ, что двенадцашидюмвая кишка либо отъ излишества, либо отъ грубости пищи сдавливаясь, или будучи оною раздражаема сузивается. Въ обоихъ сихъ случаяхъ застаивается естественное теченіе желчи.

Часто еще бываетъ у младенцевъ желшняица и отъ приключившейся имъ отъ какой либо причины сильной рвоты, либо отъ крѣпкаго проносного, когда кто имъ по неразумію оное дастъ; либо отъ причиняемаго глистами всякаго рѣзу въ животъ. Въ семъ случаѣ оная происходятъ отъ того, что соль, находящаяся въ желудкѣ и въ кишкахъ, болѣе и болѣе распространяется, и вышеупомянутое отверженіе общаго желчнаго канала отъ того затворяется.

Сверхъ сего не рѣдко младенцамъ приключается опасная желшняица послѣ долговременной или непорядочной лихорадки, а наипаче когда они многократно ее имѣли, и во время продолженія ея ихъ весьма рвало, либо когда отъ жестокости либо закосѣнія близъ или такъ ослабѣли или внутренности и испортилась кровь, что у нихъ отъ того подѣлались великіе запоры или

зашвердвнѣя, могущія зашворяшь желчныя протоки. (*)

И такъ когда одна или другая изъ нихъ, либо многія изъ вычисленныхъ мною причинъ препятствуютъ желчи имѣть естественное свое теченіе: то она въ великомъ количествѣ въ желчныхъ протокахъ скопляется, возвращается въ желчный пузырь и оный расширяетъ. А отъ сего расширяющагося также и желчные протоки, приходятъ въ раздраженіе чувствительныя жилы, въ желчномъ пузырь и въ желчныхъ протокахъ раздѣляющіеся, и иногда происходитъ и самая горячка.

Послѣ печеночныя чувствительныя жилы весьма тѣсно имѣютъ сообщеніе съ желудочными: по изъ сего слѣдуетъ, что когда печень страдаетъ, то и желудокъ ей сосрадашь долженъ; для того въ сей болѣзни позывъ на пищу исчезаетъ, въ желудкѣ ощущается боль, приключается тошнота и самая рвота, дыханіе становится шажелое, младенецъ безпрестанно беспокоится, корчится, кричитъ и не беретъ груди.

Слѣдовательно желчь въ сей болѣзни должна прогоняема быть посредствомъ насочныхъ сосудовъ (*Vasa lymphatica*) въ кровобозвратныя жилы (Смъ при вышеупомянутую диссертацію Д. Винаури стр. 31. примѣч. 5.), куда пришекая мѣшается съ кровью, и по томъ вмѣстѣ съ оною проходитъ во всемъ тѣлѣ до самой кожи, т. е. до самыхъ малѣйшихъ

(*) Г. Гилари (*Observ. on the and Dis. of. Barbados p. 61.*) упоминаетъ о повальной желтицѣ, которой младенцы иначе отъ 3 до 8 лѣтъ были подвержены. М.

шихъ окончаній кровеносныхъ жилъ, и къ опдѣляющимъ и испражняющимъ сосудамъ.

Отсюда происходитъ, что все желто, а особливо блѣднѣе въ глазу, виски и ноги желтѣютъ (*), моча выходитъ желтая, и полошину либо бумата, въ одну обмоченная, получаетъ также желтый цвѣтъ, рубашка и простыня отъ поту больного желтѣетъ, слина и кровеносныя подъязычныя жилы бывають желты, самый жиръ, отъ крови опдѣляющійся, бываетъ накогожъ цвѣту. Желтѣетъ также мозгъ, грудныя и чревныя внутренности, мышцы, перепонки, кости и хрящи. Самая кровь, какъ я самъ и другіе примѣтили, получаетъ желтый цвѣтъ. Особенно я сіе видѣлъ у одной знатной Госпожи, которая вмѣстѣ съ желшняницею имѣла колюще въ боку (*pleuritis*), и потому ей должно было нѣсколько разъ пускаться кровь.

Поневже желчь бываетъ горька; то и все то, что больной употребляетъ въ пищу, ему кажется горькимъ. Сверхъ сего многіе Врачи примѣтили, что нѣкоторымъ больнымъ въ сей болѣзни все предъ ихъ глазами находящееся казалось желтымъ.

Разлившаяся во всемъ тѣлѣ желчь остропою своею производитъ весьма чувствительный на повер-

(*) Больныхъ желшняницею должно осматривать днемъ, ибо они при свѣчѣ вежелшыми кажутся. Шенкъ и Ридлинъ доказываютъ, что у нѣкоторыхъ даже и волосы бывають желты. (*Observ. med. L. III. obs. I Schenk, Lin. med. A. 1697. Febr. 7. p. 28. Riedlin*).

верхности онаго зудъ, который взрослыхъ, а
наипаче когда онъ долго продолжается, нуще все-
го ночью весьма беспокоитъ.

Сего еще недовольно, что желчь назадъ бу-
дучи поворочена мѣшается съ кровью, и имѣмъ про-
изводить великій вредъ: она сверхъ того ли-
шаетъ зрѣтъ сие больного той значной пользы,
которую онъ будучи въ здоровомъ состояніи полу-
чалъ отъ прилитія оной въ кишки. По сей при-
чинѣ въ желпяницѣ кислота въ оныхъ умножает-
ся. Младенецъ получаетъ рвѣзъ въ животѣ и пре-
терпѣваетъ все происходящее отъ него припадки.
(Смолпр. Опдѣл. 7.). Пища у него худо варится, и
потому изъ оной не хороший выдѣлывается пита-
тельный сокъ. А когда онъ бываетъ въ худомъ
состояніи, то и самая кровь теряетъ существен-
ную свою доброту. Присемъ больной претерпѣ-
ваетъ запоръ, вѣтры, и твердое и раздутое
имѣетъ брюхо. Испражняемый имъ калъ ли-
шается естественнаго цвѣту, бываетъ бѣлъ, ли-
бо, еслии еще не испражнился у младенца пер-
вый дѣтскій калъ, черенъ.

По симъ признакамъ нетрудно различить
желпяницу отъ прочихъ болѣзней. Объ ней мож-
но судить по желтому цвѣту на глазномъ бѣл-
ку, на вискахъ, на лбу и на всей поверхности
тѣла, по желтой моче, которая краситъ жел-
тымъ цвѣтомъ обмокнутыя въ оную полотенца
и бумагу, обыкновенно бываетъ густа, и на по-
добіе полченнаго кирпича на дно сосуда осѣдаетъ;
по бѣлому калу, съ которымъ большею частію
сопряженъ бываетъ запоръ; по отвращенію боль-

наго опѣ всякой пищи, по ворчанью въ брюхѣ, по чувствуемой боли около сердца, по напряженію, шажесши и ощущаемой боли въ боку около нижнихъ реберъ.

Въ жестокой желтяницѣ и слина бываетъ желпа и густа, языкъ желтый; все больному кажется горькимъ; потъ его мараеъ желтымъ двѣшумъ даже и самое серебро, при немъ находящееся. (V d. Jctri Boeilli Histog. et obs. med. Phys. Cent. II 1. Iac. Werfer de Aporixia p. 273.) Зудъ въ нощи весьма безпокоитъ, глаза шемѣющѣ, и нѣкоторые больнымъ все предъ нхъ глазами находящееся кажется желтымъ.

Еслили въ мочѣ примѣчается нѣчто похожее на глетъ; то обыкновенно болѣзнь бываетъ упряма.

Изъ сего довольно усмотрѣть можно, которую желтяницу легко и которую шрудно лѣчить. Новорожденнымъ младенцамъ приключающаяся желтяница удобно излѣчивается; а бывающая у взрослыхъ по различію ея причинъ, либо удобнѣе, либо съ большимъ шрудомъ врачуется. Въ обоихъ сихъ родахъ желтяницы бываетъ несносный рѣзъ въ животѣ, судорги, и еслили не подать заблаговременно нѣдаждающей помощи, слѣдуетъ самая смерть.

Скорѣе можно излѣчить ту желтяницу, въ которой нѣтъ никакой горячки, нежели ту, которая съ оною бываетъ соединена.

Еслили у больного желтяницею сдѣлается равномерный по всему тѣлу и шепалый потъ; притомъ моча, прежде того бывшая желшою и пѣни-

нистою, либо темною и изчерна желтою, начнетъ получать естественный свой цвѣтъ; станетъ само собою слабнѣть и калъ по прежнему будетъ имѣть желтый цвѣтъ: то сіе подаетъ несомнѣнную надежду о скоромъ окончаніи болѣзни.

Когда послѣ воспослѣдовавшаго легкаго попу прекратится зудъ; то не остается послѣ него и желшаго цвѣту на шѣлѣ.

Лѣченіе въ сей болѣзни должно сообразовать съ причинами оной. У новорожденныхъ младенцевъ удобно можно ее испробовать испражненіемъ, посредствомъ легкаго слабительнаго, гущаго калу, прежде рожденія ихъ на свѣтъ въ кишкахъ скопившагося. Оное же слабительное наилучше составляетъ изъ манной кашки и нѣсколькихъ грамовъ ревеню, и давать по чайной ложкѣ за каждымъ разомъ чрезъ три часа до тѣхъ поръ, пока не начнетъ въ брюхѣ ворчать, ибо послѣ того обыкновенно начнетъ скоро слабнѣть. Когда такимъ образомъ первый калъ и густыя клейкости совершенно изъ кишекъ будутъ изгнаны, и испражненія бывающія низомъ получаютъ себѣ свойственный цвѣтъ: то желшнянца сама собою прерывается. Еслили же сама мать поспѣетъ послѣ родовъ начнетъ кормить свое дитя; то, кромѣ молока, никакихъ лѣкарствъ бывающихъ ненужно пошому, что первое молоко матери для ея младенца бываетъ слабительнымъ лѣкарствомъ.

Но совсѣмъ ошибенно лѣчить должно желшняницу, когда она происходитъ отъ рѣзу въ животѣ. Въ такомъ случаѣ должно изслѣдовать, точно ли младенецъ имѣетъ въ себѣ кислоту, о которой удо-

удобно изъ вышеписанныхъ признаковъ (спр. 39 и 313) заключать можно. Потомъ употребить тамъ же противъ кислоты предписанныя лекарства, и напоследокъ дать изъ манной каши слабительное, при томъ предписать матери или кормилицѣ приспосованную диету, и совѣтовать во всемъ поступать такъ, какъ въ ономъ же Описаніи упомянуто.

Когда мы знаемъ, что больное дитя, уже оплаченное отъ груди, употребляло большею частію такую пищу, которая въ себѣ имѣетъ нѣкоторую клейкость, какъ на пр. жидкую либо густую изъ муки кашу и тому подобное; много бѣло, а особливо нездоровой и грубой пищи, нехорошо ее пережовывало; при томъ брюхо у него вздуто и твердо: то въ воспослѣдовавшей при такихъ обстоятельствахъ желтицѣ должно велѣшь давать ему сколько можно побольше питья воды, ячяго отвара, либо съ небольшимъ количествомъ чистаго меда смѣшенной сыворошки, дабы развести и разжижить сырости, а потомъ оныя питья удобнѣе посредствомъ легкаго рвотнаго (смолр. спр. 272.) исправить. Впрочемъ оное для тѣхъ младенцевъ, у которыхъ, какъ се часто случается, сама собою происходитъ рвота, бываетъ ненужно. Но послѣ рвоты всегда полезно дать легкое слабительное. Въ семъ намѣреніи для дѣтей недосыпающихъ людей я всегда употребляю Бургавовъ сабуршафранный прѣнный эликсиръ, (*Mixt. proprietatis Boerhaave sine acido*) и даю оного ежедневно по 6. 8. или 10 капель въ небольшомъ количествѣ наливки изъ аударной мясы, на подобіе

добіе чаю здѣланной и медомъ послащенной. Раз-
ную сему приносятъ пользу Алкалическое сабуро-
вое вино (*Vinum аbstersum аlcalinum*), по Лондонской
Фармакопей сдѣланное, естли его употреблять
такимъ же образомъ по 15 или 20 капель на каж-
дый приемъ. Для дѣтей же dospашочныхъ людей
можно употребить горькую ревенную настойку
(*Tinctura Rhei аtака с. v.*), которой давать по од-
ной или по двѣ дѣтскія ложки каждый день;
либо эликсиръ, печеночнымъ (*Exir hepaticum*) мною
названный. Последнее изъ сихъ лѣкарствъ рѣдко
въ семъ родѣ желтяницы бываетъ безуспѣшно.
Дѣлается же оное слѣдующимъ образомъ:

R. Rad. Rhei selectiss. Возьми порошка отборнаго
соп.из. ℥VIII ревеню 8 ундовъ,
Arcan. Tartar. ℥III . Виноуксусной соли 3 унца,
Aqua Simp. com. f. Коричневой воды 3 или 4
v. Cong. IV. кружки.

Digere loco f.igidiusculo vase Настой въ холоднава-
оіаніо per IV hebdomada, томъ мѣсяцъ чрезъ че-
vas saepius agitando, deinde тыре недѣли; закупоривши
adde сосуда, взбол-
таывая почаще и послѣ
привавъ

Flaved. Cort. Aurant. Свѣжей желѣзности померанцевой
rec. ℥II . корки а унца,

Semin. Cardam. min. Мѣлко смолченнаго кардамо-
contus. ну,

Foeniculi aa ℥ss . Укропнаго сѣмя попопунца.

De gere per octiduum, Настой чрезъ 8 дней чаще
vas pluries agitando; взбалтывая;

Residuo post colatur cum ex- Напоследокъ оспальное про-
preffione affunde дѣдившии выжавши, прилей

Dccoel depurat. rad. Ci- Чистаго взвару корня солн-
chor ℥VI . цевой сесстры 6 ундовъ.

Agita

Agita et per linteum expref- Взболтай и процѣдиша
fum adde priori colaturae сквозь полоптенце, смылай
et in mixtus dissolve съ прежде процѣженнымъ
и распусти

Sachari 3XXIV.

Сахару 24. унца.

D. S. elixir hepaticum.

Надпиши : печеночный
эликсиръ.

Принимать по двѣ дѣтскія ложечки за
каждымъ разомъ.

Хотя опѣ сего лѣкарства чрезъ нѣсколько
дней и сдѣлается брюхо мягкимъ, припомъ боль-
шой не будетъ чувствовать никакой боли ни въ
ономъ ни въ правомъ издохѣ: однако еще его не
должно скоро выпускать на открытой воздухѣ:
но должно содежать въ теплотѣ и давать ему
по нѣскольку разъ въ день пить чай изъ бузино-
выхъ цвѣтѣвъ, дабы посредствомъ ровной испари-
ны вышло вонъ изъ пѣла то вещество, опѣ ко-
торого произошелъ желтый цвѣтъ на кожѣ.

Еслили желтизна произошла опѣ рвоты;
то она сама собою проходитъ, коль скоро рвота
по предписаннымъ въ особливомъ объ оной Опдѣ-
леніи наставленіямъ будетъ прекращена, жел-
тый же цвѣтъ кожи проходитъ опѣ частаго
питья вышеупомянутого чаю.

Еслили же напротивъ того оная сдѣлалась
опѣ крѣпкихъ проносныхъ; то должно спараться
немедленно произвестъ младенцу рвоту. Сіе же
удобно можно сдѣлать, еслили ему дать напить-
ся теплой воды, съ несоленнымъ коровьимъ либо
деревяннымъ масломъ смѣшанной, и послѣ того
вложить въ ротъ обмоченное въ масло перушко, опѣмъ
около гортла пощекотать. Такимъ образомъ оста-
шокъ лѣкарства, еслили оное еще въ желудкѣ

находится, рвотой вонъ выходитъ. Въ пропня-
номъ же случаѣ можно уничтожить его дѣйстви-
е избыткомъ пищемъ жирнаго супу или теплаго
молока съ прѣсными сливками, и наспавливаніемъ
промывательныхъ изъ молока и деревяннаго масла,
которыя могутъ прекратитъ рѣзъ и какъ бы сма-
зать кишки. Прекративши такимъ образомъ
рѣзъ, должно стараться испребитъ и желтый
цвѣтъ, такъ какъ выше сказано. Если же опъ
пропсныхъ желудокъ ослабѣетъ; то должно да-
вать для подкрѣпленія его чрезъ нѣсколько не-
дѣль каждыи день по 30, 40 или 50 капель ре-
венной горькой настойки, по Эдинбургской фарма-
копей сдѣланной.

Когда желтяницы причиною бываютъ глѣсты:
то вонервыхъ должно по описаннымъ въ 22 Ошдѣ-
леніи признакамъ изслѣдовать, точно ли оныя на-
ходящіяся; по томъ стараться предписанными шамъ
же лѣкарствами ихъ испребитъ.

Если же младенецъ долго былъ боленъ
личорадкою, часто она въ нему возвращалась и
послѣ того брюхо сдѣлалась твердо и раздуто;
то сіе неложнымъ служитъ доказательствомъ,
что у него въ печенѣ, либо въ околѣжащей ей
либо внутренности находится запоръ и отвердѣ-
ніе. Оно вышеписанные желчные протоки при-
давливаетъ и причиняетъ сего рода упрямую и
долговременную желтяницу, которая, если ес-
ослабитъ безъ надлежащаго лѣченія, перемѣняет-
ся въ водяную болѣзнь. Но какъ для приведенія
въ разрѣшеніе сихъ затвердѣній много требуется
времени; то при употребленіи лѣкарствъ ещѣ

ко же должно быть перетлаиву, сколько болѣзни упряма.

Младенцамъ недостаточныхъ людей въ семъ случаѣ можно давать 1) слѣдующія пилюли:

R. farop. Venet.	ЗII.	Возьми Венеціанскаго мыла
		два унца,
Ехтраѣ. Rad. Тагахас.		Экспракшу корня сол-
ЗI.		нцовой сестры 1 унцъ,
Mell. fusc. q. f. M F.		Меду потребное количе-
		ство, сдѣлай пилюли
pilul. pond. gr. III. D. S.		въсомъ въ три грана,
		надписи:

Разрѣшающія пилюли, принимать по 10, 15, или 20 въ день.

2) Послѣ оныхъ давая запивашь каждыи разъ по полфунта, либо по цѣлому фунту сыворошки, такимъ образомъ приготовленной, какъ упомянуто на сир. III. Однако извѣстно, что такую можно дѣлать только весной. Для того въ прочіа времена года можно употребить вмѣсто ея взваръ изъ двухъ драхмъ корня пырею (Radix Gratiolae) и одной драхмы корня хасимнаго (Radix Tachasae), слѣдующимъ образомъ приготовленные: вытѣписанные корни прежде должно вымыть, изрѣзать въ кусочки и вскипятить два раза съ двумя фунтами свѣжей воды; послѣ процѣдить и подсластить нѣсколько медомъ. Такимъ образомъ должно оный варить ежедневно.

3) Когда они могутъ имѣть мясныя похлебки; то должно варить ихъ съ хасимовыми листьями (Tachasae), съ кувселемъ, съ шпинатомъ, энди-

вѣю и другими симъ подобными правами, естѣ-
ли только время года сіе позволяетъ.

4) По ушрамъ и вечерамъ тереть брюхо су-
конкою чрезъ цѣлую четверть часа, и послѣ шрениа
всегда припаривать оное обмокнушою въ теплый
уксусъ, съ деревяннымъ масломъ смѣшенный, и
выжатою тою же либо подобною оной суконкою.
Но какъ болиголовъ (Cicuta) вездѣ сыскать можно,
при томъ дешево оный продается; то можно съ
пользою дѣлать изъ него припарку по ушрамъ и
вечерамъ послѣ шрениа, которую составляешь слѣ-
дующимъ образомъ: Взявъ три горсти травы боли-
голова, зашишь въ мѣшечки, и обмочи въ крѣп-
кій взваръ, изъ оной же травы свареный, вы-
жать и прикладывашь умѣренно теплые, а какъ
скоро они начнушъ просыхать, то прикладывашь
вмѣсто ихъ другіе.

5) Больного младенца заохочивать вмѣстѣ съ
другими дѣтьми прыгать и играть; а особливо
на открытомъ воздухѣ, естѣли позволяетъ время
года. Естѣли же будетъ въ такихъ обстоятель-
ствахъ мальчикъ, умѣющій уже ѣздить верхомъ;
то сіе тѣлодвиженіе ему весьма великую помощь
принесетъ пользу.

При всемъ семъ вслѣдствіи долженъ онъ наблю-
дать предписанную въ Ошдѣленіи обѣ Аглинской
немочи діету.

Что касается до младенцевъ доснапочныхъ
людей; то ихъ можно лѣчить такимъ же обра-
зомъ. Только вмѣсто означенныхъ подъ N. 1. пи-
люль, можно имъ давать пилюли Барона фонъ
Сперка изъ болиголовнаго экстракта (Extractum
Cicutae) стр. 112 либо слѣдующія:

К.

R. Sapon. Alicant. 3X. Возьми Аликанскаго мыла
10 драхмъ,
Rhei opt. Самаго лучшаго ревеню,
Extract. Marrub. alb. Экстракта бѣлой шандры,
Tartar. Tartarus. aa 2X. Щелочной соли по 10
скрупуловъ,
Mell. fusc. q. s. Чистаго меду пошребное коли-
ство;
M. F. pilul. pond. Смѣшай вмѣстѣ и сдѣлай пи-
гул. III. люли вѣсомъ по три грана,
Folio Lun. obduc. Посеребри и надпиши:
D. S.

Разрѣшающіе пилюли: принимать по 3 по
утру и въ вечеру, несною запивая ихъ сы-
ворощкою, а въ прочія времена года взваромъ,
подъ N. 2. предписаннымъ. (*)

Можно также давать имъ по чайной ложкѣ
печеночнаго эликсира, всякой день по столько разъ,
чтобъ онъ не производя поносу свободно слабилъ;
либо слѣдующаго состава:

R. Flaved. Cort. Aurant. Возьми желтосни по-
меранцовой корки два
3IIб. унца съ половиною,
Ч 3
Vin

(*) Младенцевъ удобно можно приучить принимать
пилюли, естли ихъ обмазывать померанце-
вымъ сиропомъ, либо тому подобнымъ, для вку-
су ихъ приятнымъ. Естли же они не могутъ
ловсе никакихъ пилюль глотать, какъ на пр.
Сперковыхъ: то должно растворить одну драх-
му болголовнаго экстракта въ 6 унцахъ воды,
бузиновыми двѣтами настоянной, и нѣсколько
подсластивши сиропомъ княженицы, давать еже-
дневно по дѣтской ложкѣ по два или по три
раза. Либо можно давать пить и самый бол-
головъ вмѣстѣ чаю.

Vin. Mosell. $\frac{3}{4}$ х.	Мозельскаго вина 10 унцовъ.
Conquassentur, usque dum vinum saporem augantissimum Assumsent. Adde	Болтай до тѣхъ поръ, пока вино получитъ помранцовый вкусъ.
Arcan. Tartar. $\frac{3}{4}$ пш.	Послѣ прибавь Виноуксусной соли для унца съ половиною;
Conquassando solv. et adde	Болтай распуши оный и прибавь
Sachar. alb. $\frac{3}{4}$ VI.	Сахару 6 унцовъ.
Conquassa, donec et hoc solutum sit, et filtra.	Болтай еще пока оный распушился и процѣди.

Но потъ родъ желтяницы, который происходитъ отъ наростаго въ общемъ желчномъ протокѣ мяснаго нароста (J. A. Meckeln Obs. Chir. 43. Bonet Sepulchret. L. 3. sect. 18. Obs. 13); либо когда оный протокъ сохнется и потеряетъ свою полость (Bonet. loc. citat Obs. 17); либо когда оный вмѣсто сроснется (Bonet. 1. c. Obs. 8. §. 12; либо окостенѣетъ (Rhodla Obs. med. cent. 2. Obs. 56. p. 121) et Cent. 3 Obs. 3. p. 18. Bonet. 1. c. Obs. 14); либо когда отъсѣченіе оного вверху будетъ простиранно, а внизу надорветъ волоса тонко, бываетъ незамѣчатель; равно какъ и его причина непостижима (*)

Изъ сего явствуетъ, что нѣтъ ни одного такого лѣкарства, которое бы во всякомъ родѣ желтяницы могло быть дѣйствительно, и что не-

(*) Иногда случается еще, что желтяница происходитъ отъ Венерической болѣзни; такъ какъ и потъ сильный и долговременный поносъ, которой Врачи называютъ печеночнымъ (Fluxus hepaticus). Въ такомъ случаѣ никакія лѣкарства, кромѣ рилутиныхъ не помогаютъ. (Смолпр. Ошдѣленіе о любострастной болѣзни.)

несправедливо таковыми почитаютъ : желтую кожу пѣшущьяго зоба, бѣлую часть гусиного каку, молодыя березовыя почки, въ крѣпкомъ винѣ варенныя, шафранъ, желтую краску, корень сокольяго перелесту (*Gentiana alba*), звѣробой и проч. Сіе происходило отъ одного только суевѣрія, или легковѣрности, которое инымъ внушаетъ, будио они сими лѣкаршвами излѣчивались.

Такъ на пр. одинъ Офицеръ, о которомъ я выше (на стр. 117.) упомянулъ, думалъ, что онъ посредствомъ вышеупомянутой желтой кожи, съ бѣлою частию гусиного каку и небольшимъ количествомъ сахару смѣшенной, сшертой въ порошокъ и принятой внутрь излѣчился отъ сей болѣзни, когда, лишь только онъ сіе принялъ, его нарывъ, въ печени бывшій, (который до того времени придавливалъ желчныя протоки, и тѣмъ самымъ производилъ желтизну) въ желчный пузырь прорвался, и потому гной изъ онаго во первыхъ въ желчный пузырь, а по томъ и оттуда чрезъ протокъ онаго (*ductus cysticus*) выливаться могъ, не придавливая больше общаго желчнаго протока, въ двенадцатидюймовую кишку отворяющагося.

Подобныя сему мысли имѣла одна немолодая Госпожа, которая думала, что она начала на самое лучшее лѣкарство противъ желтизны, кою она нѣсколько разъ въ году спралада. Всегда въ ней вдругъ приходила весьма сильная желтизна съ болью въ желудкѣ, тошнотою, стѣсненіемъ въ груди, рвою, горячкою и чувствительною болью въ правомъ боку : всѣ сія принад-

жи сопровождаемы были самою желшняницею и на-
послѣдокъ слѣдовалъ поносъ. Когда нѣсколько
начинала проходить горячка, то она всегда пила,
по совѣшу нѣкошораго челоѣка, по немногу съ
молодыми березовыми опрысками варенато крѣп-
каго пива. Послѣ чего желшняница скоро проходи-
ла и не возвращалась до тѣхъ поръ, пока чрезъ
два мѣсяца не слѣдовали тѣже самые припадки
съ одинакимъ окончаніемъ. Она превозносила по-
хвадами свое лѣкарство: однако позабыла припомъ
упомянуть, что каждыи разъ во время сего ожес-
точенія пускали ей кровь, наставляли смягчаю-
щія промывательныя, припаривали уксусомъ, съ
деревяннымъ масломъ смѣшеннымъ, желудокъ и
правый бокъ, что она много пила маслянаго изъ
сѣменъ сѣлааннаго молока, и что съ поносомъ вы-
ходили у нее желчныя камни. Но какъ сіи кам-
ни посредствомъ мягчишельныхъ лѣкарствъ чрезъ
прошокъ желчнаго пузыря прогоняемы были въ
общій; то сей по мадой мѣрѣ при своемъ отвер-
стии въ двенадцатидюймовую кишку, по причинѣ
ихъ множества, былъ затворяемъ, и отъ того са-
маго происходила желшняница, которая какъ толь-
ко оныя въ сію кишку проходили, вмѣстѣ съ го-
рячкою и болью исчезала, не занимствуя никакого
пособія отъ онаго ся пива. Напронивъ того раз-
драженіе, отъ оныхъ камней происходящее, и
между тѣмъ накопившаяся въ желчныхъ прошо-
кахъ желчь, которой напослѣдокъ отворялся путь
къ выходу, единственною причиною были сего по-
носа и избытка изъ кишекъ испражнения. Послѣ
того, когда сія Госпожа многократно перенесла

пакъ и самая болѣзнь весьма уменьшилась, а желчница шикъ сдѣлалась легкою, что всегда въ короткое время проходила. Не смотря на то она все сіе приписывала своему лѣкарству, хотя оное въ семъ случаѣ столькожъ дѣйствовало на желчные протоки, какъ и на мочеточники. При томъ чѣмъ въ большемъ количествѣ, и чѣмъ больше выходили камни; тѣмъ желчные протоки больше разширялись, и сносившею становилась каменная долика.



ОТДѢЛЕНІЕ 21

О лихорадкѣ.

Когда младенцу въ первый разъ приключится лихорадка; то она такъ же какъ и у взрослыхъ людей, естли ея надлежащимъ образомъ не лѣчить, бываетъ долговременна и непорядочна.

Лихорадка не безпрерывно продолжается, но извѣстные часы либо и цѣлые дни больного остаются свободнымъ; а послѣ того опять въ извѣстные же часы къ нему приходитъ. Последнее обыкновенно называютъ пароксизмами или ожесточеніями лихорадочными. Каждое ожесточеніе начинается больше или меньше примѣтнымъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ жаръ, а потомъ потъ. По происшествіи поту больной опять чрезъ извѣстное время находится въ здоровомъ состояніи, пока тѣ е. не придетъ новое ожесточеніе. Естли оное каждый день бываетъ, то лихорадка называется

Ежедневною (quotidiana); естли же приходитъ оное чрезъ день, то именуется *Тридневною* (tertiana); а естли на четверый день возвращается; то *Четырдневною* (quartana). Но естли оное хопя и ежедневно бываетъ, однако такое имѣетъ различіе, что бывающее на пр. въ Понедѣльникъ въ разсужденіи своего времени и жестокости сходствуетъ съ шѣмъ, которое слѣдуетъ въ Среду; а Четверговое равнымъ образомъ въ разсужденіи времени и жестокости со Вторничнымъ, то лихорадка называется *тридневною двойною* (tertiana duplicata.) Естли же большой имѣетъ оное два дни сряду, а въ третей оный лихорадки бываетъ свободенъ; то она именуется *двойною четвердневною* (duplex quartana). Когда тѣмъ, которые имѣютъ четвердневную лихорадку, начинаетъ приходить ожесточение каждый день, то обыкновенно говорятъ, что *четырдневная лихорадка пережилась въ ежедневную*: однако сіе несправедливо. Ее должно называть въ такомъ случаѣ *тридвойственной четвердневною*. Ибо естли прилѣжно примѣчать; то можно увидѣть, что ожесточенія оной въ разсужденіи времени и жестокости Четверговое сходствуетъ съ Понедѣличнымъ, а Пяничное со Вторничнымъ и Субботнее съ бывающимъ въ Среду.

Каждое ожесточеніе должно надлежащимъ образомъ съ терпѣливостію пережидать; въ проливанномъ же случаѣ лихорадка удобно можетъ слѣлаться непорядочною. Ежедневно мы видимъ, что, естли кто не переждавши терпѣливо пошу, который во всякомъ ожесточеніи послѣ жару
слѣ-

слѣдуетъ, вѣшается чего-нибудь холоднаго, скинешь съ себя платье, переменяешь рубашку, либо встанешь съ постели, и тѣмъ самымъ его останавливаешь: по вѣсело онаго потчасъ слѣдуетъ новый ознобъ и за нимъ жаръ, либо одинъ только жаръ, который не иначе оканчивается, какъ вторично воспослѣдовавшимъ попомъ. А когда и въ то время больной сдѣлаетъ такую же погрѣшность; то опять слѣдуетъ то же, и опять ожесточеніе оканчивается попомъ, который мы во всякомъ случаѣ должны поддерживать, пока онъ самъ собою не перестанетъ. По прошествіи же онаго можно осушиться и переменить рубашку. Сими самымъ способомъ и у младенцевъ лихорадка дѣлается порядочною. Ибо они будучи не въ состояніи никакимъ другимъ образомъ намъ изъясниться въ претерпѣваемыхъ ими во время жару и поту припадкахъ, безпрестанно кричатъ; а мы спараясь ихъ крикъ прекратить и успокоить, беремъ ихъ изъ колыбели и тѣмъ самымъ протушаемъ и останавливаемъ попомъ. Омиъ чего еще больше умножаются припадки, коихъ младенцевъ могъ бы изоставиться, если бы можно было его успокоить не вынимая изъ колыбели до тѣхъ поръ, пока все ожесточеніе не окончится довольнымъ попомъ.

Я не намѣренъ здѣсь вычислять различныхъ мнѣній о настоящей причинѣ лихорадки, ни описывать тѣхъ случаевъ, отъ которыхъ зависитъ происхожденіе оной (*). Довольно съ меня показать,

(*) Удивительно, что хотя во время ознобу чувствовался спужа, однако больной въ самой вещи

зашь, какимъ образомъ оную должно лѣчить и увѣрить, сколь нужно о томъ спараться, не полагаясь на одно печеніе времени и природу. Ибо хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иные такимъ образомъ и выздоравливаютъ: однако у насъ часто примѣтно, что сіе обманчиво. Переменный ознобъ и жаръ въ нѣсколько ожесточеній такъ разслабляетъ тѣло, что всѣ силы истощаются, и такъ разводятся кровь, что жидкая оной части чрезъ потъ теряются, жирная перепонка истончается, здоровый цвѣтъ въ лицѣ исчезаетъ, больной становится желтъ, получаетъ зашверднѣнія во внутренностяхъ, раздутіе желудка, водяную болѣзнь и другіе припадки, коихъ послѣ мы не въ состояніи бываемъ излѣчить. А когда младенцы будучи слабого сложения, получатъ осеннюю лихорадку: (*) то тѣмъ еще нужнѣе бываетъ въ скорости употребить для него надежное средство; ибо въ противномъ случаѣ легко послѣ оной можеть воспослѣдовать Агалинская немочь.

О

щи имѣетъ въ себѣ либо обыкновенную теплоту, либо еще 5 или 6 градусами и большую. Сіе можно доказать Термометромъ.

- (*) Осенними лихорадками почитаются тѣ, которыя приключаются между Августомъ и Февралемъ мѣсяцами. Въ прочія же времена года случяющіяся называются весенними. Послѣднія часто проходятъ сами собою; а первыя почти никогда. Чѣмъ ранѣе осеннія лихорадки начинаются; тѣмъ больше людей обыкновенно оными спаряжуютъ. У насъ въ сѣверной части лихорадки бывають весьма тяжелы и упрямы. То же примѣтити можно и надъ Иностранными людьми, кои въ нашей землѣ зимельствуютъ.

О взрослыхъ людяхъ имѣющахся повѣствованія, что иногда имѣ долговременная лихорадка приносила пользу. Славный Магемашикъ де ла Гиръ четыредневною лихорадкою излѣчился онъ бывшаго въ немъ сильнаго препешанія сердца, и послѣ того достигъ до глубокой старости. Впрочемъ можетъ спастись, что лихорадочная корка онъ сбихъ сихъ болѣзней его за однимъ разомъ излѣчила. Посредствомъ сей же самой лихорадки въоторый человекъ избавился отъ жеспокой и долговременной боли въ правой лопаткѣ. Одинъ знаменитый мужъ имѣя чрезъ нѣсколько лѣтъ продолжающуюся въ лѣвой лопаткѣ боль, получалъ въ осени 1766 года четыредневную лихорадку, которая послѣ нѣсколькихъ ожесточеній во все прекратилась. Но когда онъ посредствомъ наштапирю и лихорадочной корки отъ лихорадки излѣчился, то прежняя его болѣзнь опять въ томъ же мѣстѣ появилась. А когда она опять прошла, то вмѣсто оной заболѣли зубы, которые были выдвѣны приложеннымъ на самомъ верху лѣваго плеча нарывнымъ пластыремъ. Съ того времени онъ не чувствовалъ боли нигдѣ. Но что касается до младенцевъ, то сего заключенія дѣлать не должно. Ибо большая часть ихъ болѣзней происходитъ отъ кислоты, которая въ лихорадкѣ скорѣе умножается, нежели уменьшается. Одна польза, которую и у младенцевъ онъ лихорадки примѣнилъ, есть та, что отъ нее они скорѣе растутъ. Одинъ мальчикъ будучи боленъ два года съ половиною четыредневною лихорадкою, по увѣренію Г. Шульца, бывшаго Галлскаго Профессора, въ сіе время выросъ на цѣлый аршинъ.

Я не спору, что иногда и безъ лѣкарствъ могутъ младенцы избавляться отъ лихорадки, а особливо весенней. Однако что касается до осенней, то она рѣдко прекращается прежде двухъ или трехъ мѣсяцевъ, да и то только тогда, когда младенецъ получитъ въ лѣвомъ боку подъ ребрами твердую опухоль (*risenta febrilis*) (*), либо другую какую либо болѣзнь, могущую ее прекратить. Я знаю одного младенца, который былъ

про-

(*) Сія опухоль (по Аглински *Ague-sake*) есть родъ несовершеннаго перелома, и кажется, то самое, что Гиппократъ называлъ запоромъ селезенки. Въ теплыхъ климатахъ она чаще примѣчается (*Brocklespys Obstru. on Camp d'felez. S. 261.*), младенцамъ она меньше бываетъ опасна, нежели взрослымъ людямъ, а напротивъ въ военныхъ Гошпиталахъ находящихся: не смотря на то, что Сидентамъ и Г. Фонъ Розенштейнъ по сему предсказываютъ у оныхъ скорое окончаніе осеннихъ лихорадокъ; Г. Варанетъ Принцель (*Dis. of the Army Ed. 7. p. 182.*) Г. Морно (*Dis. in m. l. Hoff. p. 182.*) и Г. Броклесби (шамъ же) нашли оную весьма опасною и примѣтили, что либо расположеніе къ водяной болѣзни съ оною сопряжено бываетъ, либо дѣйствительная послѣ оной слѣдуетъ водяная болѣзнь. Что думалъ Г. Баронетъ, то сыскали Монро и Броклесби при вскрываніи мертвыхъ тѣлъ несомнительнымъ; ибо сія болѣзнь соспола въ запоръ и увеличиваніи селезенки, которая возрастала сверхъ четырехъ и пяти фунтовъ. Есть также примѣры, что въ лихорадкѣ все существо селезенки было испорчено, и что сія внутренность разорвавшись нечаянно, убивала больныхъ. Таковыя два случая находящіяся въ *K. ved. Acad. Handl. 1776 f. 88. и ff. M.*

продолжавшейся чрезъ три мѣсяца лихорадки тѣмъ избавился, что заразился отъ своихъ братьевъ оспою. Одному также мальчику, у котораго была четырехдневная лихорадка, въ свободные отъ оной д и прививка была оспа. Отъ чего лихорадка прекратилась, и никогда не возвращалась какъ въ оспѣ, такъ и по окончаніи оной (Ingkessidningen N. 47. 1769.).

Лихорадка скрывается иногда подъ видомъ другихъ болѣзней, и въ то время трудно оную узнавать. Я видѣлъ въ Гесфѣ одного младенца, который чрезъ день имѣлъ сильное кровотеченіе изъ носа, и уже столько потерялъ крови, что непременно лишился бы жизни, если бы я не началъ въ скорости давать ему лихорадочную корку. Одна Госпожа имѣла чрезъ два дни жестокую боль и рдѣніе въ глазахъ, которая возвращалась въ опредѣленные времена, и ничѣмъ оной было не можно отвратить, кромѣ лихорадочной корки. Я помню также объ одномъ человѣкѣ, у котораго чрезъ день приключались въ правомъ боку спазмы, какіе происходятъ отъ камня; но я ихъ излѣчилъ посредствомъ лихорадочной корки. Другому приключался въ такое же время жестокой сухой кашель, и послѣ оного глубокой сонъ и потъ: однако и онъ равнымъ образомъ избавился отъ него посредствомъ лихорадочной корки. Сію скрытую лихорадку узнавать можно потому, что каждое оной ожесточеніе наблюдаетъ точное время, начинается потягистою, а оканчивается потомъ, кислый запахъ имѣющимъ. (Vid. Haller. Elementa Phytolog. p. 7 p. 54.), при томъ же

между ожесточеніями въ уринѣ бываетъ сполченному кирпичу подобна осадка (*). Таковыя лихорадки не терпятъ времени, но пребываютъ скорого вспомошествованія.

Самыми же опаснѣйшими бываютъ тѣ лихорадки, которыя во время ожесточеній имѣютъ другіе припадки; какъ на пр. сильную рвоту либо мытъ, кровавый поносъ, боль въ лѣвомъ успѣѣ желудка, весьма сильный, но не умаляющій жару, либо холодный потъ; шакже тѣ, въ которыхъ безъ явной причины бываютъ обмороки и удушье; шѣ, въ которыхъ ознобъ не перестаетъ и не перемѣняется въ жаръ и потъ; тѣ, съ которыми соединенъ бываетъ глубокій сонъ шакъ, что больной лежитъ на подобіе пораженнаго пострѣломъ; и шѣ, которыя перемѣняются въ злую непрерывную горячку. Таковыя лихорадки бываютъ смертоносны, и пошому должно ихъ въ скорости довольными приемами лихорадочной корки стараться прекращать: въ противномъ же случаѣ больной можетъ лишиться жизни прежде, нежели пройдетъ претсее, четвертое, либо пятое ожесточение. Такого рода лихорадки иногда бываютъ и у насъ, а особливо въ Италіи, Англіи, на ошровахъ Миноркѣ и въ Ганноверѣ. Обыкновенно утверждаютъ, что умирающимъ лихорадкою смерть приключается во время ознобу: однако я нахожу, что въ Миноркѣ болъшею частію боль-

ные

(*) Сколь необманчивы сіи признаки, шо сіе доказываетъ Г. Медикусъ въ своей прекрасной Исторіи перемѣжающихся болѣзней.

ные умирали въ жару. Сіе утверждаетъ также и Г. Линдъ (*).

Все сіе я здѣсь упоминаю только для того, чтобъ показать, что лихорадка есть болѣзнь не маловажная, но такая, которая заслуживаетъ вниманіе и требуетъ, когда въ ней примѣшны худыя припадки, неукоинительнаго лѣченія. Для того я теперь приступаю къ описанію нужнаго для сего наставленія, касательно младенцевъ.

Когда младенецъ заболитъ лихорадкою, то должно его положить въ теплую постель, оную же поспавить, когда можно, въ простынной и чистой горницѣ. Ибо тамъ, гдѣ больной лихорадкою лежитъ, примѣчается кислый запахъ, отъ попу исходящій, который онъ, находясь въ маломъ покоѣ, удобно можетъ въ себя впитывать а отъ сего лихорадка можетъ сдѣлаться упрямѣе для излеченія. Для того весьма полезно горницу держать въ чистотѣ, полъ въ ней посыпать свѣжими сосновыми вѣтвями, и, когда позволяющъ время года, погода и прочія обстоятельства, отъво, ятъ иногда дверь или окошки въ свободные часы отъ лихорадки, наблюдая однако ту предосторожность, чтобъ на больного не дулъ сквозной вѣтеръ. Когда ему можно ошвестъ покой въ са-
момъ

(*) Essay on Diseases in hot Climates, Appendix concerning Intermittent Fevers. p. 313. Онъ говоритъ также, что ему никогда не случалось видѣть, чтобъ кто умиралъ во время ознобу, но всегда больные лишались жизни различными припадками во время продолженія жару.

момъ верхнемъ жильѣ, то пѣмъ для него лучше. Но естьли сего сдѣлать не лзя, то должно безпрестанно класть по немногу на огонь дровъ въ печь, либо въ каминъ, дабы ошъ сего въ горницѣ возобновлялся воздухъ.

Во все время продолженія ознобу больной ничего пить не долженъ. Ибо все, что онъ тогда ни выпьетъ, единственно только служишь къ умноженію его мученія, безпокойства и бываешь причиною долговременнѣйшаго продолженія ожесточенія. Лучше всего, естьли онъ употребляетъ довольно питья въ свободные часы онъ лихорадки, какъ на пр. взвару изъ корней пырею (*Radix Graminis*) и Хасимнаго (*Radix Tanaxis*), который вкусомъ бываетъ непротивенъ; а предъ наступленіемъ ожесточенія, по совѣту Г. Тиссопа, нѣсколько чаю изъ бузиновыхъ цвѣтовъ, смѣшеннаго съ небольшимъ количествомъ меду. Естьли же въ сіе время воспослѣдуетъ рвота, то должно ей поспособлять питьемъ теплой воды, которая по той причинѣ уже должна быть въ готовяности.

Во время жару долженъ больной пить въ большомъ количествѣ чай, вливая въ оный по нѣскольку капель рейнвейну; либо водою разведенную сыворотку (которая лучше всего потушаетъ жаръ); либо хлѣбную воду, смѣшенную съ небольшимъ количествомъ лимоннаго соку, сахару и рейнвейну, либо чай съ лимоннымъ густымъ сокомъ (*Citronmarmelade*), либо слабое пиво, съ равнымъ количествомъ воды и съ небольшимъ лимоннаго соку и сахару смѣшенное; либо ячный взваръ, разпустивши въ немъ немного желе изъ оленяго рога;

рога; либо взять зрѣлой красной смородины, ягоды Норландской княженицы (*Vaccae rub. Act.*), либо земляники, ягоды простой княженицы, морошки (*), либо клюквы (**), налить на оныя кипятку, и когда оный начнетъ пристывать, сбить и смѣшать съ рейнвейномъ, либо распустить сдѣланный для сего изъ оныхъ кисель въ водѣ. Больнымъ одно питье скоро скучнымъ спавшимся: для того необходимо нужно переменить въ немъ дѣлать. Жаль только, что жала прекращается однимъ кислымъ питьемъ; ибо въ лихорадкѣ и безъ того бываетъ кислота, а особливо у малолѣтнихъ дѣтей. А естли бы не

III 2

пикъ,

(*) *Vaccae rub. chamaemori.* Сія ягоды растутъ въ Швеціи и Норвегіи въ великомъ количествѣ на болотистыхъ мѣстахъ, и вкусомъ бываютъ весьма приятны, по причинѣ ощущаемой въ нихъ легкой кислоты и холодительнаго соку. Однако оны зимою больше употребляютъ, нежели для лѣкарства употребляются. Для сего ихъ привозятъ изъ Норландіи, гдѣ оны наибаче въ великомъ количествѣ родятся, въ южныя провинціи Швеціи. Объ нихъ лучшее можно имѣть понятие изъ изряднаго рисунка Г. Эдера (*Flor. Dan. Tab. I.*), нежели изъ всѣхъ описаній. М.

(**) *Vaccae vaccini oxycocci.* Оныя всѣхъ сего рода ягодъ бываютъ кислыя, хотя ихъ въ Россіи простой народъ ѣстъ въ великомъ количествѣ еще незрѣлыя. Въ Санктпетербургѣ ихъ покупаютъ мерзлыя, раставяши наливаютъ водою и ставятъ на всю зиму. Отъ того сія вода дѣлается похожа на Бургонское вино, и для питья бываетъ приятна. (*Vid. Gorteri Flor. ingrica p. 59.* Хорошій рисунокъ сего растенія находящійся *in Flora Danica Tab. 80.*) М.

накѣ, то бы полезнѣе всего пить чистую воду, либо жидкій съ цыплятами вареный супъ.

Естьли больной не будетъ пить до шѣхъ поръ, пока жаръ достигнетъ высочайшей своей степени, то шѣхъ лучше. Опъ онаго бывающая погда боль въ головѣ удобно проходитьъ, естьли больной позволитъ себѣ лицо покрыть полотенцемъ. Ибо испарина овымъ остановленная смягчаетъ поповыя скважины лица, и шѣмъ самымъ немедленно производитъ потъ. Холодные же припарки въ сѣ время причиняютъ вредъ. Потъ всегда должно терпѣливо перелидать. При продолженіи онаго можно позволить больному пить столько, сколько ему захочется, только не давая много за одинъ разомъ и не употребляя холоднаго питья. Не нужно рукъ окупывать одѣяломъ; но довольно, естьли онъ лежатъ покрытыя полотенцемъ, либо плашкомъ. Естьли же онъ обнажены, то преждевременно потъ останавливается. Когда онъ уже самъ собою перестаетъ, то должно больному надѣть чистую рубашку, которую прежде нагрѣть и накупить мастикию. Ибо естьли она недостаточно суха и тепла; то не воираетъ въ себя нечистыхъ мокротъ, въ потовыхъ скважинахъ еще остающихся. Окуриваніе же полезно для того, чипотъ потовыя скважины не пришли въ расслабленіе. По пропесивн ожесноченія дитя можно вынуть изъ колыбели и погрѣть его предъ жаромъ, дабы испарина, которая еще продолжается, удобнѣе могла раздѣляться и не останавливаться въ потовыхъ скважинахъ, либо на кожѣ. Но прежде, нежели его опять положатъ въ постель,

стель, должно перемѣнить на ней бѣлье, либо
прежнее утюгомъ выгладить.

Въ разсужденіи пищи должно наблюдать,
чтобъ больной ни во время ожесточенія, ни предъ
наступленіемъ оного не употреблялъ никакой;
но ѣлъ бы прежде оного за четыре либо за пять
часовъ, дабы прежде нежели оно придетъ, пища
уже была переварена. Въ лихорадкѣ обыкновенно
запрещается молоко, соленое и копченое мясо,
сырая зелень, круто сваренныя яйца и все жирное.
Наилучше, естли больной можетъ довольство-
ваться жаркимъ, мясною похлебкою, съ перло-
выми крупами вареною, пивнымъ супомъ, съ
яйцами и пивнымъ супомъ съ хлѣбомъ сдѣлан-
нымъ. Онъ не долженъ оныгачать себя пищею,
но ему ѣсть нужно только такое количество, ко-
шорымъ бы можно подкрѣпить свои силы. Голо-
домъ или постомъ прогонять лихорадку рѣд-
ко удается, а Тулпій примѣрами ушверж-
даетъ, что отъ сего слѣдовали еще и худые
припадки.

По прошествіи перваго ожесточенія должно
помышлять, что прилично больному въ свобод-
ные часы отъ лихорадки принимать. Но какъ
все сіе состоитъ, либо въ рвотномъ, либо въ
слабительномъ, которыя служатъ къ нѣкоторому
оолегченію лихорадки, но одно изъ нихъ, которое
нужнѣе немедленно должно употребить, пока она
еще не вошла въ силу.

Рвотное бываетъ нужно, когда младенецъ
прежде болѣзни имѣлъ хорошій позывъ на пищу,
много ѣлъ, а наипаче суровой и грубой пищи,

когда языкъ и горло его нечисто; когда онъ имѣетъ противный вкусъ во рту и вонючій изъ анага выходитъ запахъ; когда во время ожесточенія приключается обморокъ, когда нижняя губа дрожитъ и при томъ больной жалуется, что его пощипывъ, либо уже и начинало рвать. Оное въ семъ случаѣ можно для него сдѣлать изъ корки Искякуаннаго корня такъ, какъ о семъ упомянуто въ Описаніи о судоржномъ кишлѣ (стр. 340) Только нужно знать, въ которое именно время его давать должно? Обыкновенно оное даютъ за три часа прежде ожесточенія для того, чтобъ оно до наступленія анага оказало свое дѣйствіе. (*) Однако я увѣренъ, что еще съ большею пользою можно оное употреблять пощасъ послѣ ожесточенія. И пошому желательнѣе, чтобъ оное всегда пили въ первомъ либо второмъ ожесточеніи даваемо было, естъли только позволяютъ младенческія силы. Но когда уже лихорадка у младенца была

разъ

(*) Съ время для даванія рвотнаго наипаче избирали Сиденгамъ и Бургавъ. Но Томсонъ (Medic. Essays and observ. in Edinb. Vol. 4. p. 406) въ 20 дѣтвей своей Практикѣ испыталъ, что оно наилучше дѣйствуетъ во время ознобу, либо, когда уже довольно больного ознобило, при наступленіи жару. Согласно съ онымъ также и увѣренія искуснаго Практика Гренгера (Nüßpatheia apomatae Batavae p. 76.) Примѣченное же г. Фонъ Розенштейномъ время не столько извѣстно: однако оно тѣмъ не меньшее заслуживаетъ вниманіе. Съ самое время и для тѣхъ же причинъ избираетъ и г. Колумбьеръ (Code de Médecine militaire T. 4. p. 88.) М.

разъ нѣсколько, то съ нимъ должно подождать до
пѣхъ поръ, пока послѣ ожесточенія больной со-
берется съ силами. Потѣ какъ снаружи послѣ
всякаго ожесточенія на поверхности пѣла показы-
вается, а съ нимъ вмѣстѣ выходитъ нѣсколько
и лихорадочной матеріи: такъ равно выступаетъ
онъ и внутри. Слѣдовательно нѣкоторая часть
оной, выходящая съ вышеписаннымъ потомъ,
оспаются внутри пѣла въ желудкѣ, въ киш-
кахъ и въ печени, изъ которой втѣснѣ съ
желчью проходитъ въ кишки. Для того
весьма полезно, заблаговременно оную испражнять,
т. е. прежде, нежели она чрезъ всасывающіе со-
суды и молочныя жилы войдетъ въ кровь. Сіе
самое бываетъ причиною, что иногда одинъ разъ
данное рвотное прекращаетъ лихорадку. Если же
изъ вышеписанныхъ признаковъ заключается, что
нужно дать вторично рвотное, то должно оное
такимъ же образомъ употреблять послѣ слѣдую-
щаго ожесточенія.

Если же примѣчается, что брюхо твердо,
раздуто, въ немъ ворчитъ и ощущается вели-
кая боль въ спинѣ: то должно одинъ либо два
раза дать слабительное. Для сего я большею ча-
стію употребляю слѣдующій порошокъ:

R. Rad. Jalapp. gr. X. Возьми Яллицнаго корня 10
грановъ,

Ari preparat. Нѣмецкаго инбирю,

Salis absynthii aa gr. IV. Полынной соли по 4 грана,

Tartar. vitriolat. gr. II. Винокуросной соли 2 грана,

M. F. pulvis D. S. Смѣшай вмѣстѣ и сдѣлай по-
рошокъ, надпиши:

Легкій слабительный порошокъ.

Ш 4

Опытъ

Опій должно принять въ свободное время отъ лихорадки въ какомъ супѣ и въ выпаянъ пакѣ, чѣмъ онъ оказалъ свое дѣйствіе за два часа прежде ожесточенія.

Еслили продолжаются вышеписанные признаки, то можно въ свободные дни опій лихорадки оный повлорить. Я многихъ знаю, которые однимъ имъ избавились отъ лихорадки.

Помеже въ двойной шридневной лихорадкѣ всегда одно ожесточеніе бываеши сильнѣе, а другое легче; и каждый разъ послѣ сильнаго ожесточенія до обѣда больному бываеши всего легче: въ оной сіе время должно избирать для даванія слабительнаго.

По прошествіи трехъ ожесточенія должно давать младенцу въ свободные часы отъ лихорадки чрезъ два или три часа по столовой ложкѣ слѣдующаго противъ лихорадки состава: Возьми одну драхму полынной соли, распустивъ въ одномъ фунтѣ воды, приливай туда постепенно около двухъ унцій лимоннаго соку, или дѣтѣхъ поръ, пока не будиши болѣе приметно никакого кнѣнія, потомъ прибавь помаранцоваго сиропа столько, сколько требуется для приятнаго вкуса. Въ случаѣ недосылка лимоннаго соку можно употребить хорошій виноградный укусъ. Однако то, что должно принимать предъ наступающимъ ожесточениемъ, должно быть въ несколько теплее. Когда слѣдующее ожесточение не ми уеши больнаго, то должно надлежащимъ образомъ излѣдовать, явнѣ ли прежде упомянутыхъ признаковъ, для которыхъ бы надлежало употребить еще либо ровное, или слабительное; и въ такомъ случаѣ одно изъ
нихъ

нихъ повторивши, продолжашь лихорадочной сосна въ двѣ порѣ, пока совсемъ не пройдетъ лихорадка.

Можно заключать, что больной скоро отъ оной избавится, изъ нижеслѣдующихъ обстоятельствъ: 1) Когда въ пятый день ожесточеніе не бываешь ни долговременнѣе ни сильнѣе прежнихъ, 2) когда послѣ онаго слѣдуетъ изобильное испражненіе мочи, и въ оной дѣлается блѣдная осадка, 3) когда слѣдующія по томъ ожесточенія сменяются слабѣе; и 5) когда у него въ сіе время выступившъ на носу либо на губахъ сыпь. Ибо еслили она случится прежде; то (какъ я часто сіе примѣшалъ) предвѣщаетъ упрямую лихорадку, а особливо, еслили она въ первый разъ приключится.

Еслили же сихъ признаковъ не бываетъ и лихорадка по прежнему продолжается; то должно продолжашь также и употребленіе лихорадочнаго соснава, а при томъ сшарашься, чѣмъ младенецъ выѣсно ознобу и дрожи имѣлъ жаръ и потъ при началіи лихорадки. Особливо нужно для сего прилѣжно примѣчать, во сколько часовъ ожесточеніе бываетъ ранѣе, или позжѣ, или оно всегда въ одинакое время приходитъ (послѣднее означаетъ долговременную лихорадку:) ибо въ противномъ случаѣ не можно узнавать, въ которое время больному должно производиться потъ.

Для сего я употребляю различныя средства:

1) Велю больному цѣлый часъ или полчаса до наступленія лихорадки лежать въ теплой постели и пить теплый чай, либо жидкій пивный супъ съ шминомъ, и при томъ припаривать брю-

хо въ нѣсколько разѣ свернутою фланелью, обмокнутою въ составъ изъ равнаго количества несоленатаго коровьяго масла и уксусу, посредствомъ мѣшанія на огнѣ сдѣланный. Сію фланель должно обмокнувши выжать, затернуть въ тонкое полотенце и прикладывать такъ теплою, какъ только младенецъ можетъ стерпеть.

2) Для инопорыхъ нелюсїю фланель еще полишь Унгарскою, либо въ недостаткѣ оной, простою водкою.

3) Иногда употреблю разрезанный ржаной хлѣбъ, который завернувъ въ тонкое полотенце и помочивши Унгарскою водкою, либо канфарнымъ спиртомъ, прикладываю къ брюху такъ теплый, какъ только можетъ больной терпѣть.

Воспослѣдовавшій отъ сего попѣ я стараюсь поддерживать во время ожесточенія теплымъ чаемъ, теплою сывороткою, либо подобнымъ пому литьемъ, для младенца прїяннымъ. При наступленіи слѣдующаго ожесточенія поступаю такимъ же образомъ; и симъ способомъ обыкновенно мнѣ удавалось вылѣчивать лихорадку, еслии только она была незлая.

На семъ основываются почти всѣ проспыкѣ Бабѣ лѣченія, употребляемые въ лихорадкѣ. Известно, что Древнїе прикладывали нарывный пластырь къ замышку, либо къ внутренней сторонѣ згиба ручной кисти и старались, чтобъ оный началъ нарывать въ то самое время, когда должно было прийти ожесточенію. Отъ сего вместе ознобу слѣдовалъ жаръ и попѣ. Равнымъ образомъ теперь прикладываютъ снаружи шарухи

такъ называемую жгучую крапиву (*) къ рукѣ
изъ то мѣсто, гдѣ ощупишельно бываетъ бѣшене
жилъ, которая также нарывающъ и часто прино-
ситъ пользу, еслии только начинаетъ оказы-
вать свое дѣйствіе при наступленіи лихорадки
и еслии производитъ такой жаръ, который въ
со-

(*) Ни въ какой болѣзни леченіе снаружи не имѣ-
етъ въ Швеции такой довѣренности, какъ въ
лихорадкахъ. Г. Ф. Ризенштейнъ открывашъ
также здѣсь и ихъ тайность. Ибо нарочитое
объязываніе морпей больнаго, намазываніе его
брюха и другія тайныя ихъ ухватки вообще
сюда принадлежатъ. Отъ болѣзни называемая
и шва по Шведски Aeltgräs, которая однако
болѣе извѣстна подъ именемъ *Ranunculus flammula*.
Давно уже извѣстна ѣдкость всѣхъ ви-
довъ сей травы, но болѣе всѣхъ доказалъ
оную Г. Крафтъ (*Experimenta de nonnullorum Ra-
nunculorum venenata qualitate, horum externo et interno usu* 1766.). Нѣкоторые виды оной болѣе въ
себѣ содержатъ ѣдкости, а другіе меньше,
такъ что *Ranunculus ficaria* употребляютъ даже
вмѣсто салату. равнымъ образомъ по опытамъ
Г. Крафта и *R. auricomus*, *terreus* et *lapidinosus*
также съ салатомъ кушать можно. Но что ко-
сится до *R. sceleratus* и *bulbosus*, то весьма опа-
сно ихъ испытывать потому, что они на ко-
жѣ нарывающъ, производятъ пузыри и раны, и
потому можно ихъ употреблять только вмѣсто
нарывающаго пластыря. И г. Крафтъ шестю дѣ-
лалъ опыты надъ сими и другими 700 видами
сего растенія, стараясь принудить ихъ оспро-
ту, одинъ только щавель и вода могли сіе
сдѣлать. Жаль только, что жгучая крапива въ
достоинныхъ примѣчаніяхъ опытахъ г. Соч. опу-
щена. М.

состояніи уничтожить ознобъ. Напротивъ того иѣкоморые мажутъ брюхо смолою и бѣлымъ лукомъ обыкновенно наподобіе подковы. Отъ чего дѣлаются пунырышки либо нарываеиъ и пузырь. Другіе соспавляютъ пластырь изъ равнаго количества сажи, инбирю и соли, смѣшавъ въ яичнымъ желткомъ, и прикладываютъ на рукѣ къ вышеупомянутому мѣсту. Сей пластырь каждые двенадцать часовъ перемѣняютъ до тѣхъ поръ, пока онъ не принесетъ желаемого успѣха. Иные дѣлаютъ подобныя пластыри, либо припарки изъ сажи, нашатырю, паутины, перцу, вѣрмасу, либо скипидару. Все равно, которое бы лѣкарство изъ всѣхъ сихъ ни было употреблено; только бы оно нарвало пузырь, сдѣлало раздраженіе и въ извѣстное время вмѣсто ознобу произвело жаръ. Подобное симъ лѣкарство сообщилъ мнѣ одинъ мой пріятель, о которомъ онъ увѣряетъ, что ему удавалось, какъ молодыхъ такъ и старыхъ людей въ 24 часа вылѣчивать отъ непорядочной и четырехдневной лихорадки. Оно состоитъ слѣдующимъ образомъ: Возьми курительнаго табаку столько, сколько требуется на трубку умеренной величины, смѣшай съ двумя противъ онаго частями крошеннаго кислаго хлѣба, прилей туда нѣсколько винограднаго уксусу, чтобъ можно было сдѣлать родъ тѣста въ ожиданіи ожесточенія. Послѣ раздѣли на двѣ равныя части и, намазавъ на ветошку, привяжи въ самомъ началѣ онаго къ обвѣмъ рукамъ въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ щупаютъ пульсъ. Отъ сего произойдетъ зудъ и жжение. Однако тѣсто должно лежать чрезъ цѣ-
лый

мый день, (но не болѣе сего) сдѣлавшихся же послѣ него пузырьковъ не должно прорѣзывать. Я самъ сіе пробовалъ лѣвомъ въ 1753 году на многихъ больныхъ, изъ коихъ однако нѣкоторые отъ сего выздоравли, а другіе никакой не^нполучили пользы. Одинъ вѣроятно достойный муаъ утверждаетъ, что онъ видѣлъ также хорошее дѣйствіе отъ слѣдующаго пластыря: Возьми двѣ драхмы есріаку, одну драхму терисипину, сѣрныхъ цвѣтовъ, квасцовъ и перцу по 20 грановъ, 10 капель перегоннаго рупинаго масла и 10 грановъ канфары; сдѣлай два пластыря и приложи къ м.упрненной поверхности ручной кисти. Сверхъ сего я слышалъ, что нѣкоторые весьма хвалятъ прикладываніе свѣжей селезки убитаго живошнаго въ натуральной ея теплотѣ въ младенческому желудку. Самъ я еще сего не пробовалъ: однако думаю, что фланель, о которой я выше упомянулъ, лучшее можетъ оказать дѣйствіе. Иные также зашиваютъ въ маленький мѣшечекъ небольшое количество воичей камеди (*Gummi aloe foetidae*) и канфары и привѣшиваютъ на шею больному. Однако я никогда отъ сего не примѣнилъ никакой пользы, хотя и многихъ видѣлъ, что они сіе пробовали. Канфара, снаружи привѣшенная, у нѣкоторыхъ производитъ потъ, и для того ее въ семъ случаѣ употребляютъ. Для сей же самой причины даютъ взрослымъ людямъ въ лихорадкѣ чеснокъ и часто съ желаемымъ успѣхомъ. Просперъ Аллинъ повѣствуетъ, что онъ какъ себя, такъ и другихъ нѣсколькихъ вылечилъ отъ лихорадки промывательнымъ, изъ одного фунта маюранаго взва-

ру и трехъ унговъ лаврового масла составлен-
нымъ. Нѣкоторые втираюшъ горячишеслыныя ма-
сла по всей длинѣ хребта. Такъ на пр. Фрескѣ
пишетъ, что онъ вылечилъ одного человека, ко-
торый впрочемъ заблѣлъ четырьедневною лихорад-
кою, смѣшавъ вмѣстѣ укропное и ромашковое ма-
сла. Пр. Аллинъ советуешъ, сдѣлать пласпырь изъ
равнаго количества пшеничной муки и ладану
(*Thus mascul.*), смѣшавъ оныя съ сокомъ кудрявой
мяты и, намазавши на полопенге, теплый при-
кладывашъ къ хребту. Г. де Гаенъ (*Ratio medendi*
Rat. 12. p. 262.) пишетъ, что одна женщина,
которая была больна пять недѣль четырьедневною
лихорадкою, избавилась отъ оной принявъ въкупѣ
нѣсколько сѣры при наступленіи ожесточенія, ибо
она отъ сего получила сильный пошъ. Послѣ то-
го имѣвшее бытъ ожесточеніе не воспослѣдовало, и
лихорадка никогда не возвращалась, хотя она съо-
ро послѣ того принимала и слабительное. Равнымъ
образомъ сіе средство у насъ у прѣспыхъ людей
въ долговременномъ было употребленіи. (*)

Однако злой лихорадки не должно опнажи-
ваться такимъ образомъ лѣчить. Двойная три-
дневная лихорадка, въ которой бываюшъ самыя
опаснѣйшіе припадки въ чолныя дни (*dies pates*)
большеею частію бываетъ злая. Изъ трепяго
ожесточенія въ тридневной лихорадкѣ обыкновен-
но можно заключать злая ли она, или нѣтъ. Когда
уже въ сіе время нѣкоторые изъ вышеписанныхъ
ху-

(*) Г. де Гаенъ (*Rat. med. T. II. p. 65.*) много опи-
сываетъ такихъ къ рукамъ прикладываемыхъ
и другихъ прощиву-лихорадочныхъ лѣкарствъ. М.

худыхъ припадковъ примѣчаются; но оныя съ четвертымъ ожесточеніемъ еще въ большей свирѣпости возвращаются. Въ семъ случаѣ я тотчасъ начинаю употреблять лихорадочную корку. Равнымъ образомъ я принимаюсь за сіе списительное лѣкарство и тогда, когда примѣчаю, что ожесточеніе въ пятый день бываетъ долговременнѣе, тяжелѣе и злое прежнихъ; либо когда младенецъ слабъ, и, какъ только уснешь, то весь потомъ обливается. Что сіе средство безвредно, то не только я, но и другіе Врачи, если бы то было надобно, могли бы доказать многими примѣрами. Должно только наблюдать, чтобъ она была настоящая и употребляема въ изобильномъ количествѣ до тѣхъ поръ, пока оною не испребится лихорадочная матерія. Ибо если сколько нибудь оной въ тѣлѣ останется, то она на подобіе сѣмени размножается и производитъ опять новую лихорадку. Она въ семъ сходствуетъ съ чесоткою. Если въ сей сѣрные дѣйствія не довольно время и въ маломъ количествѣ были употребляемы: то она опять возвращается. Для того возвращеніе лихорадки происходитъ не отъ лихорадочной корки, но отъ того, что ее давали въ весьма маломъ количествѣ и чрезъ короткое время. Всѣ припадки, лихорадочной коркѣ приписываемые, въ древнія времена чаще оставались послѣ лихорадки, нежели теперь, хотя она тогда въ Европѣ еще была и неизвѣстна (*). Ибо

оная

(*) Однако спустя два года послѣ изданія сей Книги вышло въ Стокгольмѣ сочиненіе одного Медико-

начая вошла въ употребленіе здѣсь около 1649 года, а сверхъ того до 1679 года мало еще ее и употребляли. Въ Шведіи начали ее давать внутрь по прошествіи 1690 года. Впрочемъ весьма трудно сдѣлать лихорадочную корку такъ пріятною, чтобъ младеицъ ее могъ принимать. Чтою то меня, то я оную большую частію употребляю слѣдующимъ образомъ: (**)

Возьми три драхмы мѣлко сполченой лихорадочной корки, вари въ одномъ фунтѣ воды до тѣхъ поръ, пока останется оной только три унцѣ;

дико-Хирурга по имени Жана Франсуа Бускета (Sur l'abus du Chinchina 1766), въ которомъ онъ утверждаетъ, что и самыя упрямыя лихорадки можно вылѣчивать небольшими пріемами лихорадочной корки и хвалишь Шведскихъ Врачей за непростибельное злоупотребленіе сего лѣкарства. — Пустьъ говорятъ, что хощаѣ Резенштейны. М.

(**) Г. де. Гаснѣ (Rat. med. P. 12. p. 261.) говоритъ, что одна знатная Госпожа дѣлала пріимною для своего дитяти лихорадочную корку слѣдующимъ образомъ: Велѣла варить при унцѣ оной въ двухъ фунтахъ воды чрезъ полтора часа, и протрудивши процѣживать сквозь пропускную бумагу. Крупный порошокъ въ семь взварѣ, когда онъ простывалъ, опчаси осѣдалъ на дно, а опчаси оставался на дѣльной бумагѣ. Хотя сѣ взварѣ и слабѣе, однако вкусомъ пріятнѣе. Безспорно, что самый порошокъ лихорадочной корки лучше дѣйствуетъ, однако шѣмъ, кои имѣютъ чувствительный желудокъ, лучше давать взварѣ. Но какимъ образомъ можно давать оную младеицамъ въ облаткахъ, о томъ я уже упоминалъ выше на стр. 339.

унца; потомъ взваръ процѣди и на лихорадочную корку налей два унца воды померанцовыхъ цвѣтовъ, процѣдивали сию воду смѣшай съ прежде процѣженнымъ взваромъ; нанослѣдокъ прибавь полуунца, либо цѣлый унцъ ячменнаго сыропу, по Парижской фармакопеи сдѣланнаго; онаго можно больше или меньше прибавить въ разсужденіи различнаго младенческаго вкуса, ибо нѣкоторые любятъ слаще, а другимъ сладкое вовсе прошивно. Сего лѣкарства должно давать по чайной чашкѣ такъ часто, чтобъ онъ въ свободные отъ лихорадки часы выпивалъ по двѣ такія бушылки. Хотя слѣдующаго ожесточенія и не будетъ, однако не смотря на то больной долженъ выпивать ежедневно по такой же склянкѣ до тѣхъ поръ, пока получитъ природный слѣдъ цвѣтъ въ языкъ, почувствуетъ себя попрежнему совершенно здоровымъ и въ самые шѣ дни, въ которые приходило ожесточеніе, не будетъ ощущать въ себѣ никакой перемены. Тогда должно ослабить употребленіе лихорадочной корки послѣ тридневной лихорадки на 7 дней, а въ ежедневной и четырехдневной на 13 дней. По прошествіи же оныхъ должно давать выздоровѣвшему опять каждый день выпивать по такой же бушылкѣ онаго взвару чрезъ 7 дней. Сіе называется первымъ повтореніемъ. Послѣ сего подождать столько времени какъ и прежде, а потомъ давать каждый день по цѣлой склянкѣ выпивать чрезъ 7 слѣдующихъ дней. Сіе называютъ вторымъ повтореніемъ. Такимъ же образомъ я дѣлаю шреще и четвертое повтореніе; а еслии младенецъ былъ боленъ четырехдневною лихорадкою, то всегда вѣлю для безопасности употребить еще и пятое повтореніе. Еслии же больному наскучилъ сей взваръ;

то можно давать лихорадочную корку слѣдующимъ образомъ:

Возьми изрѣзанной въ мѣлкѣе кусочни сухой зрѣлой лимонной и померанцовой корки по од очу у цу съ половиною; сполки въ мраморной ступкѣ въ мѣлкій порошокъ; приливай шуда при безпре-
стальномъ мѣшаньи постепенно виниевой воды шесть унцовъ, да при унцѣ воды померанцовыхъ цвѣтовъ; и жѣ, процѣдивши и выжавши остатокъ, прибавь при драхмы порошка лихорадочной корки, двѣ драхмы некрѣпкой коричной воды и при драхмы померанцоваго сыропу. Сего смѣсавъ должно давать младенцу каждый разъ по столовой ложкѣ такъ часто, чтобъ онъ всю сию склянку выпивалъ между двумя ожесточеніями. Можно еще давать порошокъ лихорадочной корки въ миндальномъ молочѣ, либъ въ жидкомъ шоколадѣ. Одно дитя нѣкогдаго значнаго Господина, которе уже имѣло привычку къ вину и вышеписаннымъ образомъ приготовленнаго лихорадочной корки не принимало, выдѣчнлѣя слѣдующимъ виномъ, лихорадочною коркою насильянычѣ

R. Pulver. Chinchin. ℥VI Возьми порошка лихорадочной корки 6 унцовъ,

Coque с. aqua fontan. ℥VI Вари въ 6 фунтахъ рѣч-
ad ℥II ной воды, пока оспа-
нешся только 2 фунта,

Megmati residuo affunde Прибавь къ остатку бѣ-
Vini alb. Gallic. opt. $\text{℥II}\frac{1}{2}$ лаго самаго лучшаго
Французскаго вина 2
фунта съ половиною.

Digere per horam. Exprime & Повари на легкомъ огнѣ
affunde de novo чрезъ часъ, выжми и
прибавь еще

Vini

Vini optimi $\mathbb{H}1\mathbb{B}$ Самого лучшаго вина полтора фунта,
 Digere per horam, cola & ex- Подержи на легкомъ
 prime. огнѣ чресѣ часѣ,
 In colaturis mixtis solve super igne процѣди и выжми;
 Sacchari albi $\mathbb{Z}LV$ Смѣшай оба сіи процѣженные
 взвары вмѣсто и распусти
 въ оныхъ на огнѣ
 Сахару 15 унцовѣ,
 et adde Послѣ прибавь
 Flaved. cort. aurant. rec. • Желтости свѣжей поме-
 malis N. II. рандовой корки изѣ двухъ
 поморандовѣ.
 Ebulliant semel, addendo Вскипяти однажды, при-
 Pulveris Coccionell, $\mathbb{Z}1\mathbb{B}$ бавивъ порошка кандляр-
 ского сѣмѣ одну драхму
 съ половиною.

D. S. Надписи:

Вино, лихорадочное коркою растоянное; принимать
 по двѣ столовыя ложки, каждыя два часа, въ свобод-
 ное время отъ лихорадки.

Младенцу не вредитъ, естли онъ побольше
 употребитъ лихорадочной корки; но напротивъ
 того худо, естли онъ ее употребитъ мало.

Когда младенецъ ничего не можетъ при-
 нять внутрь, то должно его лѣчить наснаива-
 ниемъ изъ взвару лихорадочной корки промыва-
 тельныхъ. Но прежде сего въ случаѣ надобности
 должно ему вмѣсто слабительнаго наснаить обы-
 кновенное промывательное; а послѣ того наснаива-
 ние промывательныя и изъ взвару лихорадочной
 корки, употребляя онаго по нѣскольку унцовѣ за
 каждыиъ разомъ, оный оставшии въ кишкахъ

моглоушается всасывающими сосудами и относится въ кровь. (Vid. Haller Elementa Physiol. P. 7. p. 178.) Еслили же одно промывительное вонъ выдеиъ, то должно онять другое воспавиъ.

Когда лихорадка пройдеиъ, то родители просятъ, чтобъ дано было ихъ дѣтямъ какое нибудь слабительное: однако оное рѣдко бываетъ нужно. Ибо хорошая лихорадочная корка обыкновенно сама слабитъ. Но еслили младенецъ иметъ запоръ, то можно ему дать слабительное; только должно его соснавлишь изъ ревеню и лихорадочной корки. Лихорадочная корка въ пѣлъ сполькоаь ошасеиъ мало, какъ и самый хлѣбъ.

Еслили лихорадка приключишея младенцу въ то время, когда онъ сосетъ грудь, то больше ничего ему не нужно, какъ только 1) очистиъ надлежащимъ образомъ желудокъ и кишки ревеннымъ эликсиромъ, и 2) давать кормилицѣ лихорадочную корку такъ, какъ бы она сама имѣла лихорадку. Она можетъ ее принимать въ порошокъ, но для избѣжанія непріятности можно ей давать оную въ облашкахъ.

Въ 1750 году приключился мнѣ шепъ родъ лихорадки, которую врачи называютъ полунридневною (Semitartica). Въ оной было пѣ одинъ день одно, а въ другой два ожесточения. Но какъ я имѣлъ недавно предъ тѣмъ въздую брыжжечную лихорадку (Febris menterica maligna), то такъ мнѣ лихорадочная корка была противна, что я никакимъ образомъ ее принимать не могъ. Для того всѣаь варить б унцовъ порошка лихорадочной корки въ водѣ на подобіе размазни, и оную завернувъ въ полотенице, прикладываешь на шрешій день умѣренную теплую хъ брѣху. А какъ только она начина-

да проснываться, то опять ее нагрѣвали. Отъ чего лихорадка новее ослабла. Я продолжалъ послѣшного еѣю припарку чрезъ 7 дней и довольно скоро чрезъ то возвращалъ свои силы и прежнее здоровье. Г. доктору Ци (*) также сѣе пришло на мысль,

Ц 3

ж

(*) Наружное употребленіе лихорадочной корки въ лихорадкахъ исторіе въ болѣе приходить начинать употребленіе. Она употребляется въ промывательныхъ, въ густыхъ припаркахъ и въ мѣлкѣмъ порошокѣ вмѣстѣ ванны. Ова первые роды уже давно были извѣстны, ибо еще Гесавецій дѣлалъ изъ оной промывательныя, которыхъ также и Тортин (Therap. Pres. feb. p. 760.) дѣйствія не вовсе отвергаетъ, и которыхъ попомъ онъ весьма многихъ врачей съ пользою употребляемы были. Что Тортин опровергаетъ припарки, то сѣе неудивительно потому, что онъ разумѣетъ о прилаживаніи оныхъ къ рукѣ, гдѣ шушаетъ бѣшеніе жилъ. Примѣру Г. Фонъ Роз. по лѣдовалъ съ успѣхомъ Г. Ганнесъ (Brief ub. d. Fieber u. s. w. 1768. S. 77.), только съ тѣмъ различіемъ, что онъ велѣлъ варить лихорадочную корку съ виномъ. А. Г. Пие (тамже) велѣлъ сшить изъ шелкаго полотна безъ рукавовъ камзолъ, и велѣлъ въ оной зашить мѣлко сплоченую лихорадочную корку (ибо крупный порошокъ большому лежать мѣшалъ), которой для ченыхъ ребенка и пятилѣтняго младенца довольно было отъ 4 до 6 унцѣй. Онъ утверждаетъ дѣйствительность оной двенадцатью описанными имъ примѣрами. Себы еще больше могло утвердиться, что лихорадочная корка дѣйствуетъ иначе своими шовками и пропитательными частицами, естли бы не полезно было въ Медицинѣ знать о томъ, что такое именно въ ней есть дѣйствительнаго. Но Г. Александра (Exerptum-

и онъ многократными наблюдениями утверждаетъ, что весьма удачно выльчивались младенцы какъ отъ лихорадокъ, такъ и отъ ослабляющихъ горячекъ наружнымъ употребленіемъ порошка лихорадочной коры. Ван. оо изъ воды, къ которой была варена лихорадочная кора, также Г. Вилл. Александеръ себя самого выльчивалъ отъ лихорадки. Въ разжуденіи затрудненія въ давленіи лихорадочной коры малымъ дѣтямъ таковыя изобрѣшенія привлекаютъ на себя вниманіе. (*)

ОТ-

tal. 1845) on the external application off Antiseptics и проч. стр. 33.) есть новѣйшій и лучшій способъ леченія лихорадки посредствомъ ванны. Онъ для сего варитъ въ водѣ одинъ фунтъ лихорадочной коры и вскипѣ, прежде потерши ноги, спавшихъ ихъ въ узкомъ слудѣ послѣ окончанія ошептченія М.

(*) Липовцеваго масла въ лихорадкѣ (Oleum Pirri in antra's) никогда я для дѣтей не употреблялъ. Но часто предписывалъ оное взрослымъ также и въ чепыредивной лихорадкѣ, а именно: по приготовленіи надлежащимъ образомъ шѣла больного, я давалъ оное по 30 капель въ небольшомъ количествѣ съ хлѣбомъ варенаго пивнаго супа, за пача предъ лихорадочнымъ ошептченіемъ, и жалъ, чтобъ въ горнищѣ въ тѣ часы, когда должно было ожидать ошептченія не было никакого шума. Въ то время больной получалъ сонъ и сильный потъ, и такимъ образомъ избавлялся отъ лихорадки. Еслили же его тогда крѣпомъ разжудавали; то въ сие время никогда не было успѣху, но должно было въ другой разъ спрѣжѣшес слышать запрещеніе. Нашатырь чрезъ долгое время въ лихорадкѣ славился, но по причинѣ его противна-

ОТДѢЛЕНІЕ 22

О глистахъ.

Глисты многихъ болѣзней бываютъ причиною. Для того спраждущіе оными немедленно должны спараться о освобожденіи себя отъ оныхъ. Ибо чѣмъ долѣе они въ нѣбѣ остаются, тѣмъ болѣе въ нѣмъ умножаются и возрастаютъ; и, покуда не будутъ изстреблены, ни на одинъ часъ не можно больному обрадоваться себя здоровьемъ. Коль скоро кто имѣющій оныя, будучи въ чужомъ домѣ, покушася въ необыкновенный для него пищи, употребилъ что нибудь сладкое; либо сами съѣлъ глисты по какой нибудь причинѣ начнутъ шевелиться, извиваться и сосать, или какъ бы пробуравливать кишки: то и опасенъ онъ получаетъ припадки. Малолѣтніе дѣти и молодые юноши въ ту же минуту се ощущаютъ. Напротивъ того старыя, которыхъ кишки не столько бываютъ

III 4

чув-

го вкуса, не можно дѣтей принудить оный принимать. Рѣдко я въ состояніи съѣлъ угговорить взрослыхъ, довольно его употреблять. Однако одинъ знашій мужъ принялъ оного двѣ драхмы въ день въ тепломъ овяномъ супѣ, и тѣмъ извелся отъ чешыредисной лихорадки. Только спустя несколько недѣль опять оную получилъ, и тогда лучше ему помиривалась лихорадочная корка. Для простыхъ людей, которымъ все сносно, оный можно употреблять. Однако должно сию съѣду повторять такъ часто, какъ и лихорадочную корку, ибо я примѣнилъ, что тѣ, которые оной не повторяли, снова получали лихорадку.

чувствительны, и крѣпкіе люди, которыхъ внутренняя поверхность кожи покрыта бываетъ кѣскою мокрошю, не такъ скоро чувствуютъ ихъ движеніе. Однако всѣмъ они причиняющъ одинакій вредъ, лишая ихъ пиранія и удѣлая оному свои испраженія и испарину. По сей причинѣ большой глистячи либо мало, что худое получаютъ цѣланы; либо шомымъ бываетъ безпрестаннымъ голодомъ. (*) Чѣмъ больше либо имѣетъ въ себѣ глистовъ, и чѣмъ болѣе оныя бываютъ величавы; тѣмъ онѣ чаще и жестокайшимъ подверженъ бываетъ припадкамъ. Для тѣхъ, которые имѣютъ въ себѣ глисты, всегда опаснѣе бывающъ воспалительныя болѣзни и оспа. Следовательно не должно оживаиваться прививать оспу тому младенцу, о которомъ извѣстно, что онъ имѣетъ въ себѣ оныхъ.

Глисты заражаются отъ своего сѣмя такъ, какъ и всѣ животныя. Изъ яйца мухи бываетъ муха, изъ куриного яйца выводима цыпленокъ, а не змѣя, а изъ гусиного цыпленокъ, а не рыба. Такимъ же образомъ и отъ червя рождаются червь, а не что другое. Си сѣмена могутъ войти въ чаше тѣло съ пищею и пишемъ, а инаиаче съ водою, которую мы пьемъ, и которую чашемъ въ кухняхъ нашу посуду. Простой народъ пьетъ много воды, а инаиаче лѣтомъ, и чаше пьема нечиспой. Онѣ тѣмъ кощное

(*) Г. .J. Нитерпѣ пишъ въ своемъ писмѣ къ г. де Гасну (Rat. med. P. 12. p. 219.), что одна женщина, которая много у себя имѣла плоскихъ глистовъ, по причинѣ голоду день и ночь встѣ была принуждена была. Да сіе и неудивительно поному, что у нее было 18 плоскихъ глистовъ, которыхъ послѣ у нее выгнаны.

ное мясо и сало. На всѣхъ сихъ вещахъ черви тысячами могутъ положить свои яйца, которыя послѣ съ оными бывають глотаемы, и въ желудкѣ и въ кишкахъ высиживаются. даже самыхъ не большихъ червей можно иногда съ нечислою водою проглотить. Можеть быть не по какой другой причинѣ простой народъ столь часто страждетъ глистами. Пошому примѣчено, что между бѣдными больными, которыхъ, по христіанскому объ нихъ попеченію покойнаго Бишофа, господина Дампоръ Калсній при цѣлительныхъ Сестринихъ водахъ снабждалъ пропитаніемъ и пользовалъ, всегда почти при изъ четырехъ одержимы были отъ глистовъ происходящими болезнями. Въ измѣстныхъ рыбахъ, какъ на пр. въ лещахъ, въ угряхъ въ головляхъ и проч. (*) часто сыскиваны глисты, а особливо плоскіе. Вѣроятно, что болышю частію и мы употребляя оныя въ пищу, вмѣстѣ съ ними глотаемъ и вышеписанные глисты. Для того примѣчено, что глисты почти обыкновенными бываютъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много находится рыбы. Въ Стокгольмѣ чаще они случаются, нежели въ Упсалѣ. Въ Финляндіи и Россіи весьма много ихъ бываетъ. Въ Голландіи каждый второй, а въ Швейцаріи каждый десятый человекъ подверженъ бывашъ плоскимъ глистамъ. Хотя не лзя спорить, что тѣ, коихъ мы обыкновенно находимъ на пр. въ лещахъ, бываютъ плоски и бѣлы; однако болышю частію не имѣють

(*) Смотри о семъ пространнѣйшее описаніе Г. Д. Факса Berättelser til Konigl. Coll. med. 1765 S. 281 и folg.

еосставявъ (*). Но нѣкоторыя изъ нихъ бывають и съ сжаващи, каковыя я имѣю для приѣбра, котораго вынулъ изъ леѣа, пойманнаго въ Мелерѣ въ западномъ Яггальмскемъ заливѣ. А понеже глансты того же самаго рода, каковы находящая у людей, по свидѣтельству Кавадара (Финъ Линнея, немивняго Архимидскаго Г. Менандри и Г. Д. Ундера, бывають въ водѣ, то нѣтъ никакого сомнѣня, что они равнымъ образомъ выходятъ и въ рыбахъ (**). Рукишй еще больше се доказываетъ въ

(*) Глансты, о которыхъ зѣ въ Г. Свенмаркѣ упоминаетъ, называются онѣ Линнея *Faciola intestinalis* (Sch. nat. Ed. 12 Т. II. I. Р. 2. р. 1672.). Спермихъ ихъ описывалъ и выражаетъ описатъ въ Шведскихъ сочиненіяхъ (1747 Tab. 5. lit. 6 Januarii mens.). Но лучше сего описалъ ихъ Г. Монтихъ (Schwed. Abhandl. 1763 S. 14 folg. Stockholm). Онъ между прочимъ упоминаетъ объ одной женѣ, имѣющей весьма достойную примѣтанія Историю, у которой вмѣстѣ съ малыши, оторванными палескими, крульми, и малыши продолговатыми (*Ascarides longicauda*) многократно выходили сѣ глансты. Въ другое время одна женщина кушая леѣа, примѣтила у себя живой плоскій гланстъ на языкѣ. М.

(**) Новѣйшіе рапорты Провинціальныхъ Шведскихъ Врачей, на особенной вопросъ Медицинской Коллегіи въ оную приланные, такъ же утверждаютъ, что плоскіе глансты болѣею частію бывають въ такихъ мѣстахъ, гдѣ изобильно рыбы, и которыя лежатъ недалеко отъ моря. Для того въ Бьернеборгѣ каждый четвертый человекъ оныя въ себѣ имѣетъ. Г. Факсѣ весьма много трудился о изслѣдованіи сего, и нашелъ ихъ въ леѣѣ, въ трескѣ, въ угрѣ, въ семгѣ, въ лососѣ (*Alburnus*), въ угрѣ (*Toniarius*), и въ другихъ

нѢ Анатомическихъ своихъ наблюденийхъ (*Observ. Anatom. p. 84*). Безспорно, что рыбу ѣдятъ уже свареную, и сабдовашельно не только самые черви, но и айды ихъ посредствомъ шепалоны должны быть умеренны. Однако, что не всегда они отъ варения умираютъ, то сѣ не только я, но и другіе въѣсть со мной бывшіе семь человекъ собственными глазами видѣли. А именно: причесно было однажды на столъ блюдо лещей, и между ними въ одномъ былъ плоскій глестъ (*), который былъ еще живъ и двигался. Причина сему та, что

гихъ рыбахъ. По наблюдениямъ его они наипаче находящаяся въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ, т. е. при окончаніи рыбой лавы (*Смолпр. Fortschritt af. Prov. Dsch. Bericht. стр. 179 261. 264*) Сабдовашельно миніе Г. Югана Гильса (*Histoy of animals стр. 15*) который думалъ, что плоскіе глесты животноми въ воду приносящая, больше основывается на выдумкѣ, нежели на справедливости. Желательно бы только, чтобъ Гг. Провинціальныя Врачи описывали аккуратнѣе виды глестовъ. Не смотря однако на сѣ примѣры, которые доказываютъ, что отъ многого употребленія рыбы раждаются въ человекѣ плоскіе глесты, извѣстн о мнѣ, что другіе Испытатели Природы по своимъ опытамъ нашли сѣо виду безвредною. (*Смолпр. Befehdungen d. Berlin. Gesellschaft Naturforschender Freunde t 757 и t. w*) — Но время показавъ, которая сторона больше имѣетъ справедливости. М.

(*) Ученъ Г. Ф. Р. употребилъ здѣсь названіе свойственнѣе Теніе, отъ начала нѣтъ Натуральной системы Г. Линнея (*Ed. 12. Tom. I P 2. p. 1078.*) являющаяся, что въ сѣмъ случаѣ отъ видѣвъ и досточный оному глестъ называемый *faciola*. М.

что у насъ ѣдятъ рыбу нехорошо свареную. Сколь великій переносилъ глисты жаръ, но сіе доказалъ г. Провинціальный Врачъ д. Монтии въ сочиненіяхъ Королевской Академіи Наукъ 1763 года (смотри стр. 113. (*).

Рядный человекъ можешь себя предохранить отъ того, чтобы не проглотить яицъ сихъ червей, пѣтъ паче, что ихъ въ одномъ стаканѣ воды тысячу вынуть можно. Однако для чего не всякій подверженъ бываетъ глистамъ? Потому что ихъ яйца въ желудкѣ и въ кишкахъ могутъ быть истреблены только тогда, когда 1) въ оныхъ бываетъ умеренная теплота, 2) когда онѣ остаются спокойно на одномъ мѣстѣ. А сіе случается, когда они закупаются въ ту естественную кислоту, которая покрываетъ внутренности желудка и кишекъ, либо когда они делаютъ ничѣмъ не прерываемы въ стѣнкахъ кишекъ; либо когда не бываютъ безпрестаннымъ бѣгствомъ бѣгущихъ жилъ, въ желуд-

(*) Равнымъ образом не скоро умираютъ и малые глисты (Ascarides), какъ явствуетъ изъ наблюдений г. Кулеса. Но онъ видѣлъ, что онѣ будучи варены чрезъ 12 часовъ въ кипящей похлебкѣ, остались такъ же невредимы, какъ были и прежде. (Vid. eius Tractatus hist. de ascarid. & lambrico lato L. B. 1729). Г. Факсъ однако, который такъ же приписываетъ причину многихъ глистовъ, которымъ Шведские жители бывали подвержены, недоеданию рыбы; дѣлая опыты надъ оною, имѣющею въ себѣ плоскіе глисты, въ короткое время умерщвлялъ ихъ тѣмъ, что ее варила въ солоной водѣ и примѣшалъ, что чѣмъ солонѣе бываетъ вода, тѣмъ скорѣе умираютъ глисты. (Prov. Doctores Barstetter, Medicen Fortsättning S. 283). М.

лудкѣ и въ кишкахъ раздѣляющихся, раздроблены; 3) когда не бываютъ въ скорости посредствомъ червообразнаго движенія желудка и кишокъ вонъ испражнены; 4) когда не бываютъ испариною, изъ потовыхъ скважинъ желудка и кишокъ исходящую, размочены и расплавлены. Такъ напр. видимъ мы, что посвящая роль размякаши и не въ состояніи бываетъ отъ себя дать отросшковъ, когда безпрестанно на нее лить дождь. Выпущенная такъ же изъ рыбы нора не можетъ родить рыбы, когда она находится въ сухой водѣ; а наполнивъ нору весьма скоро выводится изъ нее рыба въ стоячей. Въ подводныхъ саму оспойтсисвахъ обыкновенно находятся слабые люди. Напротивъ того у крѣпкихъ людей кишки сильнѣйше имѣютъ сокращеніе, вѣдущая жила ударяютъ съ большою силою, испарина вырветъ въ большемъ количествѣ и теплота въ большой степени такъ, что часто восходитъ до 94 градусовъ по Фаренгейтову термометру: у слабыхъ же людей она не восходитъ до такъ великой степени. Слѣдовательно, естли слабый человекъ и вмѣстѣ съ нимъ крѣпкаго сложения будутъ употреблять одинакую пищу и питье, и туду тѣло оба равное количество съмени гнистовъ: то изъ сего можно заключить, что у перваго они легко расплаются, а у послѣдняго оныхъ не будутъ, естли только они и у сего отъ употребляемой имъ нечистой воды, либо отъ другой какой нибудь причины не накопятся въ тѣло великомъ количествѣ, что нѣкоторая оныхъ часть можетъ оснаться въ вышеписанной клейкости, либо въ кишечныхъ спивахъ, какъ еи можетъ случиться съ простыми людьми. Но изъ вышеупомянушаго явствуетъ, что младенцы гни-

спамъ

спамъ больше, нежели варелые, женщины больше, нежели мужчины и безъ движения находящіяся больше, нежели всегда оное опирающіе, бываютъ подвержены. Сіе утверждено самымъ опытомъ.

Хотя и въ ни одной части въ человеческомъ тѣлѣ, въ копирѣ бы какіе либо насѣкомые, либо черви (*) не могли зародиться: однако глистны наипаче извѣдываясь въ желудкѣ и въ кишкахъ.

Люди подвержены бываютъ наипаче пяти родовъ глистамъ (**).

Пер-

(*) Весьма много родовъ оныхъ описалъ г. Палласъ въ своей диссертаци (de insectis viventibus intra viventes).

Но въ оныхъ прибавить еще должно червь называемый Линнеемъ *Musca metacrita*, котораго у одного человека до тысячи разъ вывели. Г. Л. Спарманъ, который сіе описываетъ (п. Vet. Acad. Handb. 1773 S. 65), думаетъ, что муха находила случай свои яйца такъ, какъ *Oestrus boeathonoides* у лошадей класны въ задній проходъ, ибо въ домахъ его не бываетъ. Но по саму чрезъ задній проходъ могли бы и чиния названная и черви входить въ тѣло, а равнымъ образомъ и еще больше должно бы имѣть стараніе о числостѣ тайныхъ удоевъ. М.

(**) Прежде г. Ся. савдую Линнеею, принялъ было только 4 рода глистовъ, однако теперь оны такъ, какъ и во второмъ изданіи сей Книги еще двумя ш. е. лажными глистами безъ составовъ (*Fasciola intestinalis*) и нилькъ подобными (*Gordius aquaticus*) умножилъ. Но еще сюда можно причислить описанные Г. Редереромъ съ хвостами глисты (*Trichinides*), которые видомъ и величинною бываютъ подобны малымъ (*Ascarides*), но имѣютъ сзади весьма толкій хвостъ, вдвое длиною самое туловище превосходящій, а срединѣ гибкій жоботъ. Сей глистъ будучи вынутъ
сверш-

Первые изъ нихъ бываютъ подобны червямъ, зараждающимся въ сыру и называются малыми. (Afcaris linn. Syst. nat. Ed. 7a Tom. I. p. 1076). Оные боль-

свертывавшаяся на подобие улишки, а въ своемъ жившѣ длиннѣ прямо. Сте можно видѣть въ Гемматинскихъ въдохомскихъ (ф. 25 1761), въ сочиненияхъ г. Проф. Бриссо рга (Osteiv. de animalibus infus. p. 6 174) и пространнее того въ диссертаціи г. Дейом. Валлера (Diff. de veribz insectis p. 41 174. Таб. 3. Fig. 4. a. b.) Г. Линней такъ же его принявъ подѣ названіемъ Afcaris trichura (Mant. plant. 2. p. 543) доказательно сыскалъ, чтооу стромный Комматинскій Цепылашель і едеснава. г. Эта выдакъ въ свѣтъ свое писаніе какъ оо оныхъ, такъ и о другихъ многихъ, имъ върыбахъ сысканныхъ и ссравнѣхъ червяхъ. Въ рукописномъ онъ своемъ проявленіи, которое мнѣ соудало, называеъ сего рода червь Echinosporus trichura. Онъ описываеъ рѣзъ оного слѣдующимъ образомъ: Proboscis trichura, echinata, peristoma; а видъ такъ: Corpus tris, angustum, politum attenuatum in caudam filiformem (corpore quadruplo angustiore et duplo longiore).

Г. Проф. Палласъ нашель сии глисты въ желудкѣ одного живошнато, оспрагоиъ называеъ Laccata adora; только онъ съ другими примѣчательными не согласуеъ въ томъ, что тонкій хвостъ, который онъ считаеъ за хвостъ или заднюю часть червя называеъ переднюю, ибо онъ примѣнилъ на самомъ кончикѣ оного буторокъ (intestum) по рдинѣ имѣющій ямочку, и кругомъ оной напередѣ лучей преснирающіеся крючки, которыми онъ впаиваетъ въ оолочни желудка. Слѣдовательно сей буторокъ съ такою же справедливостію долженъ бы счипаеъ головкою такъ, какъ и у плоскихъ глистовъ, а потому и употребляемое доселѣ его наименованіе

Tri-

большую часть двѣшомъ бывающѣ бѣлы, весьма малы и съ обоихъ концовъ тонки, только одинъ ихъ конецъ еще нѣсколько бываетъ толще, нежели другой (*), имѣютъ свое гнѣздо въ заднепроходной, а иногда и въ ободочной кишкахъ, чрезмѣрно

Tachinae должны были уничтожено. Г. Палласъ весьма сходнымъ его нащолъ нипки подобнымъ (Goidius) Vid nov. Commentar. Acad. Scient. Petropol. T. 19 p. 449 liq. Tab. 10 fig 6 — Кромѣ сихъ упоминаетъ еще г. Лейбъ (Medical Transactions Vol. I. p. 54) объ одномъ родѣ червей, которыхъ онъ называетъ Boitz, и которыхъ нѣкогда чловѣкъ вмѣстѣ съ весьма многими малыми гангами, принявши растворъ въ водѣ большое количество поваренной соли, выблевалъ. Сии ганги въ конскомъ желудкѣ часто сыскиваются; однако у сего чловѣка они были гораздо меньше, и почти равны величиною пшеничному зрну. Давая, что сие описаніе еще недостаточно доказано. М.

(*) Сие взято изъ примѣчаній г. Флаума (Hist. rhybol. alsacien 1762), которому должно отдать честь, что онъ лучше всѣхъ, по сие время извѣстныхъ Сочинителей, чрезъ столько вѣковъ извѣстный червь описалъ и отрицовалъ. Между прочимъ онъ намъ показалъ, что на туловищѣ оного находящагося великое множество круглыхъ морщинъ; однако оныя такъ бывающѣ тонки, что ихъ можно видѣть только посредствомъ хорошаго Микроскопа; впрочемъ одна изъ нихъ четверть линіи отъ толщаго конца бываетъ нѣсколько примѣшнѣе и составляетъ такую бразду, которая бываетъ похожа на продолговатую головку, имѣющую на самомъ окончаніи вырѣзку, представляющую ротъ, къ заднему же концу оныя морщины бывающѣ длиннѣе, но уже и предспав-

мѣрно скоро движутся, часио выползаютъ вонъ и опять вползаютъ, и нерѣдко у малолѣтнихъ дѣвицъ выползши и заползши въ мочеиспускательный сѣводъ, идѣтъ въ ономъ, такъ и около него причиняютъ нестерпимую боль, а иногда и печеніе бѣли. Сей червь никогда не бываетъ одинъ, но всегда ихъ находится великое множество (*).

Ъ

Вшо-

ставляютъ настоящіе сосиски. У сей глисты примѣтилъ онъ, однако только одинъ разъ, не большіе бугорки, похожіе на ноги, но точно ли оныя суть дѣйствительныя ноги, онъ не утверждаетъ. Жаль, что онъ не приложилъ шруца и изслѣдованіи внутренняго содержанія — Г. Линней (Faun. Svec. Ed. 2 S. 304) утверждаетъ, что сего рода черви находятся въ блохахъ, въ гнилыхъ корняхъ растѣній и въ кишкахъ у лошадей. А 1. Паддасъ (Diss. de infectis venteribus intra viuentiu S. 13) нашолъ ихъ въ кишкахъ лягушекъ и въ легкихъ водяной ящерицы съ двурѣзнымъ хвостомъ. Но при описаніи сего описалъ въ своихъ наблюденіяхъ 1. Факсъ (Provinc. Doct. beritt. Forts. S. 232), какимъ образомъ входитъ сей червь въ человеческое тѣло: ибо онъ его смыкалъ въ шрекъ и въ налимъ, а особливо въ печени первой въ весьма великомъ количествѣ. М.

(*) Какъ изъ описаннаго въ упомянутомъ предѣлѣ сочиненія (Medical Transactions) случая можно видѣть, что малыя глисты иногда даже въ самой желудокъ заходятъ, такъ равнымъ образомъ примѣръ одного изъ здѣшнихъ ученыхъ утверждаетъ, что иногда только одна такая глиста бываетъ, или по крайней мѣрѣ весьма не многа: ибо у него самого иногда по одной или по двѣ выходили безъ всякихъ припадковъ. М.

Видовъ рода глисты называются круглыми (*Lumbricus teres* Linn. S. N. I. n. p. 1076 Var. y). Они принадлежатъ къ роду земляныхъ червей (*), похожихъ на дождевыхъ, хотя и бываютъ бѣлы и не имѣютъ примѣтнаго пояса (*Singulum*), какъ оныя. Впрочемъ примѣнилъ и оный г. Феласумъ (*Verhandlung over de Worm Tab. 3*) и, какъ явствуетъ изъ Гистинскихъ ученыхъ Ведомостей, г. Франъ деиъ Вошъ (*Histoire constitutionis erism. verminosae*) на каждой изъ сихъ глистъ находитъ до ста колецъ и болѣе. Г. Ландростъ О. Фонъ Минхгаусенъ на одномъ дождевомъ червѣ насчиталъ ихъ 140. На всѣхъ же сихъ кольцахъ,

выдаю-

(*) Если бы г. Ф. Розъ болѣе утверждалъ на собственныхъ своихъ наблюденіяхъ и не вѣровалъ чуждымъ описаніямъ, то бы конечно онъ Историю круглыхъ червей, которые столь часто въ людяхъ бываютъ, и которыхъ Врачи *Lumbricus* или *Lumbricus teres* называютъ, гораздо исправнѣе написалъ. Ибо извѣстно, что онъ приписываетъ здѣсь имъ нѣкоторыя свойства, и до четвертаго рода глистъ (*Ascaris lumbricoidea* Linn.) касающіяся. Но и даже большая часть Испытателей Природы и Практиковъ имѣютъ сей же самый порокъ, но я для избавленія погрѣшности въ пользу Врачей, свое мнѣніе чрезъ г. Руаса (*Diss. de Ascaride lumbricoide Linn. verminum intestinalium apud homines vulgarissimo. Goss. 1779*) предлагалъ. Для того я описанное г. Линнеемъ превращеніе землянаго червя (*Lumbricus terrestris* Linn.), которое должно быть въ человеческихъ кишкахъ, за весьма рѣдкое происшествіе почитаю; и признаюсь, что я сего никогда не примѣнилъ. Дабы избѣгнуть дальняго повторенія, я изъясню только слѣдующія ихъ различія, *Lumbricus terrestris. verm. teres, altero*

выключая большое, или поясѣ, находящіяся 4 двой-
ственные ряды тонкихъ жала или щетины (Setae);
скаждовашельно, когда червь имѣетъ 100 колецъ,
то на немъ находится 800 шакowychъ щетины,
кошорыя онъ можетъ выставливать и опяшь въ
себя вбйраться. По срединѣ онаго стоятъ сѣи ще-
тины перпендикулярно, а на обонхъ концахъ лѣ
срединѣ закрываливаются (*). Посредствомъ ихъ
въ состояніи бываетъ онъ удобно ползати, крѣпко
держась за кишки, оныя раздражая, царапая,
ранивъ и причинявъ вѣзличныя припадки. Мо-
жетъ шакъ же онъ причинявъ различныя беспо-
койства и своимъ ртомъ, на томъ концѣ, гдѣ
примѣчаются три небольшие бугорка, находящими-
ся. Обыкновенный дождевой червь можетъ саж-
маться вмѣсто, сокращаясь и дѣлаться тол-

н 2

спытъ

altero extremo attenuatus, distincte annulatus, astotariam
asculatus; т. е. земляной червь круглый, имѣю-
щій одинъ конецъ заостренный, кольцы одно
отъ другаго отдѣленные, и вѣсь жала. Asta is
lumbicoides: vermis teres, distincte attenuatus, rugosa
annulatus, nudus, ore tripodi; т. е. круглая глѣста,
круглый червь, съ обонхъ концовъ заостренный,
имѣющій кольца морщиноватыя, нагій, съ шре-
завизымъ ртомъ. Скаждовашельно, что здѣсь упо-
минаетъ г. Сочинитель о шрезахъ не большихъ бу-
горкахъ, на одномъ концѣ находящихся, о разли-
чій онаго видовъ, о нѣкоторыхъ частяхъ, въ
кошорыхъ сто сыскивали, и о нѣкоторыхъ опы-
тахъ, въ челоѣтскаго тѣла надъ нимъ учинен-
ныхъ, принадлежатъ только къ послѣднему
червю, но объ особливыхъ качествахъ онаго про-
спраніе будещъ упомянуто ниже. М.

(*) Сѣи наблюдения сдѣлааъ г. Проф. Муррай (Vid.
eius Observationes de vermibus in sepra obvis et de lumbrici-
corum setis p. 63).

ешымъ, напротивъ того глнста, въ чловѣкѣ находящаяся, сего дѣлать не въ состояніи. Первый бываетъ мякотъ какъ живой, такъ и мертвой, а послѣдняя тверда и раздута. На сей такъ же съ перваго взгляду можно примѣнить кольца, однако они бывають какъ бы вдоль скашег. Рѣдко сія глнста въ чловѣкѣ находится одна, но обыкновенно ихъ бываетъ много. Только въ послѣднемъ случаѣ всегда они бывають невѣлики. Для того есшн выдетъ большая глнста, то можно заключать, что либо ихъ весьма мало осянется, либо нѣтъ больше ни одной. У одной бѣдной восьмилѣтней дѣвушки, которая была больна глнстами, и которая по целой четверти часа, либо иногда и получаса послѣ приключившихся ей судоръ лежала безъ чувствъ, выгналъ я посредствомъ ниже сего описанныхъ мною пилюль болѣе 90 глнстъ. Глнсты, въ людяхъ находящіяся, нныя бывають мужескаго, а другія женскаго пола; напротивъ того дождевые черви всѣ бывають обоимъ. Сколь они снаружи ни похожи кажутся одинъ на другаго, однако на внутреннемъ ихъ строеніи очевидное находится различіе, какъ сіе примѣтили, разсматривая внутренности дождеваго червя, г. Виллизій (Anima brutorum cap. 3) а въ чловѣкѣ бывающихъ глнстъ, Реди, Валиснери, Тисонъ и Клейнъ. Что они удобно могутъ пробуравливать оболочки кишекъ и изъ оныхъ выползать въ брюшную впадину, то сіе многие примѣнили. Но довольно здѣсь упомянуть только одинъ примѣръ, который описалъ г. Штеркъ (Ann med. 2. S. 228). Глнсты сего рода у людей бывають не только въ моздахъ и въ кишкахъ, но иногда и въ почкахъ. (Vid. Ruysschii Observat. anat. chir. n. 64 & Pallas l. c. p. 13 19). Сверхъ
этого

ного дю Верней (*Histoire de l'Acad. R. 1700*) нашолъ у одного пятилѣшняго мальчика, который прежде смерти имѣлъ великую боль въ корнѣ носа, одну глнсту въ головѣ во всюду простирающеюся пазухѣ подспой мозговой оболочкѣ (*Sinus longitudinalis durae matris*). Оныя сыскиваны такъ же у телѣтъ, у рыбъ, у свиней и другихъ животныхъ (*Vid. Pallas I. c.*). У собакъ часто сн черви бываютъ въ почкахъ и причиняющъ имъ различные припадки (*Pallas I. c. 19*). Реди, Батливи, Ангри, де Клеръ, Ланзони, Торши и другіе славные мужи казали ихъ живыхъ въ разныхъ жидкостяхъ, дабы испытать, какимъ средствомъ скорѣе ихъ можно умертвить; однако опыты ихъ такъ между собою были несогласны, что весьма мало опъ нихъ мы имѣемъ пользы. Въ холодной водѣ оныя скоро умирающъ, какъ сіе примѣтилъ между прочими г. Фанъ денъ Бошъ.

Ртуть для нихъ смертоносна. Думаютъ такъ же, что они умирающъ опъ винограднаго и горячаго вина, однако я видѣлъ, что одна глнста, вышедшая по утру изъ нѣкотораго мальчика, будучи положена въ спиртъ, жива была до самаго вечера. Они такъ бываютъ живущи, что никогда не умирающъ опъ ядовитаго сѣмя шравы, мышечнымъ перомъ (*Semen stirpis agriacae*) называемой. Г. Палласъ умертвивъ онымъ собаку и вскрывши оную, нашолъ вмѣстѣ съ онымъ сѣмемъ живыхъ круглыхъ и небольшихъ плоскихъ глнстовъ (*Vid. I. c. p. 48*).

Третій родъ составляютъ плоскія глнсты (*Taenia*, *Linn. S. N. I. c. p. 1323*), которыя похожи бываютъ на пясомку. Сей червь бываетъ плоскій, долгій, по большей части бѣлый составный. Думаютъ что у него безпрестанно прирастающъ новыя со-

составы такъ, какъ и у Сертуларіи (*Sertularia*). Оный иногда бываетъ въ человѣкѣ одинъ только, а иногда много вѣдругъ. Одинъ конецъ оного бываетъ широкъ, и имѣетъ длинныя составы, а другой мало по малу становится уже, и составы частъ отъ часу бываютъ короче такъ, что на самомъ оного окончаніи и посредствѣ увеличительнаго стекла ихъ никогда видѣть не можно. Можетъ случиться, что это его шей, весьма малымъ бугоркомъ оканчивающаяся. Сей бугорокъ болѣею частію Врачи называютъ головою. Узкій свой конецъ можетъ онъ простиавать и сокращать (*V. d. Naep. apud de Naep. l. c.*). На широкомъ концѣ составы можно одинъ отъ другаго отстигивать. Сии составы называютъ особливymi глистами (*Vermes ciceritini*) для того, что каждый изъ нихъ самъ собою можетъ жить; однако несправданно приписываютъ имъ сіе названіе (*). Когда не много аршинъ выдѣтъ плоской глисты; то кажется, что всѣ оного составы имѣютъ одинакую длину и ширину. Если же выдѣтъ разомъ 16 либо 20 аршинъ, то легко можно примѣлить, что онъ ширѣ всего бываетъ по срединѣ. Но составы ширѣ бываютъ короче, нежели на такъ называемомъ ши-

ро-

(*) Составы сами собою могутъ иногда одинъ отъ другаго отдѣляться, а наипаче по примѣчанію г. Кеннега (*Act. Helvet. Vol. I. p. 32.*) весной и осенью. Въ такомъ случаѣ иногда много такихъ частей выходитъ, но при всемъ томъ животное оспаетъ. Однако иъопытыя примѣчались, какъ на пр. г. Консоланъ (*Journal de Medicine par Mr. Roux Tom. 20 p. 445*), который дѣлалъ крѣпкія проносныя, сии глисты считали за особливые отъ плоскихъ. М.

ромъ концѣ Кладый составъ имѣетъ возвышеніе или круговатый насосецъ. Первый видъ (Species) гласнѣ имѣетъ одно возвышеніе на краю, а другой два на поверхности (*). Сей насосецъ жи-
 въ 4 вой

(*) Оба вышеупомянутые виды, самые обыкновеннѣйшіе суть людямъ. Первый имѣетъ составъ даннаго и называющіеся опъ Линнея *Taenia Schoni* (S. V. Nat. ec. 12. Tom. 2. p. 1323 Spec. 1.); а второй имѣетъ составъ ширѣ, и именуется *Taenia vulgatis* (Spec. 2.). Кромѣ сихъ рѣдко у людей, но весьма часто у собакъ, находится третій видъ *Taenia lata* (Spec. 3.), который различается опъ прочихъ шѣмъ, что въ ономъ бывающъ по одному насосу на поверхности каждаго сегмента. Теперь лучшее понятіе имѣющъ о головкѣ плоской гласнѣ. На узкомъ концѣ послѣдняго вида г. Боннетъ (Memoires de Mathematique et de Physique presentées à l'Acad. R. des sc. Tom. 1. Tab. I. N. S. 478 et seq.) примѣтилъ четыре небольшіе, по срединѣ имѣющіе опверстія, и между собою соединенные, бугорки. Г. Ф. Розенштейнъ описываетъ оныя явственно ниже, по собственному своему наблюденію, и Редерсръ (Prog. de Taenia p. 7.) видѣлъ оныя на одной плоской гласнѣ съ долгими составами, которая теперь между Анатомическими Препаратами содержится, и на которомъ я самъ такъ точно, какъ на другихъ видахъ плоскихъ гласнѣ явственно се видѣлъ. Младший первый се примѣнилъ. Сіи четыре бугорка вмѣстѣ съ небольшимъ, по срединѣ находящимся холмомъ, который спереди имѣетъ опверстие и стороны зб загнутыхъ движимыхъ щетинъ, въ два ряда, растущихъ, составляютъ голову плоской гласнѣ. Тѣ, которые не сыскавъ на головѣ червя щетиннаго вѣща, либо размашивали такіа гласнѣ, у которыхъ была сіа часть
 скры-

вой червь можетъ высовывашь и опять яъ себя
выпигивашь (*) Посредствомъ онаго онъ сосетъ яъ
желудкѣ и въ кишкахъ; но можно сказать, что
они

скрыта, либо у которыхъ щепины были при-
лашы. Однако кажется, что не всѣ виды
плоскихъ глистѣ на узкомъ концѣ имѣютъ по
четыре выщепленныхъ бугорка. Ибо у *Taenia vul-*
garis Феръ (Anal. de Abînthio p. 125) только три
примѣтилъ, а г. Ф. Девернъ (Diff. de *Taenia* p. 80)
ни одного не нашолъ. По примѣчаніямъ г. Пал-
ласа (Diff. citat. p. 30.) принадлежатъ четыре бу-
горка къ характеру плоскихъ глистѣ. По сей
причинѣ онъ такъ же причисляетъ къ виду пло-
скихъ червей музырнаго червя (*Hydra Hydrala*
Linn. Syst. nat. Ed. 12. Tom. I. Pars 2. p. 1320. *Taenia*
hydragena Pallas), котораго онъ весьма хорошо
Miscellan. Zoologie. N. 13. und. in Stalfund. Magazin
St. I. S. 64 и folg. (снеси сюда краткое его описаніе
гъ его *Elenchus Zoophytorum* p. 413) описалъ и оп-
рисовалъ. Исторія о плоскихъ глистахъ напо-
слѣдокъ получила великія приращенія въ obja-
сненіи, изъ коихъ нѣкоторыя весьма исходны
съ симъ сочиненіемъ. Много такъ же въ семъ
пособило благоразуміе г. Испанскаго Совѣтника
Миллера, какъ по явствуетъ изъ весьма обстоя-
тельныхъ его наблюдений (*Natuae curiosog. art. 14.*
p. 129). Главнѣйшія изъ оныхъ доказательства
состоятъ въ томъ, что плоскій червь не есть
вѣкъ пасткомыхъ, либо цѣль многихъ живопныхъ,
но единственное и особенное пасткомое, имѣющее
на переднемъ концѣ ротъ, а отверстія въ со-
ставяхъ опредѣлены для мѣшанія яицъ, что
размноженіе ихъ бываетъ чрезъ яицы и едва
посредствомъ ливаго плода, что длина его тѣмъ
прирастаетъ, и что составы, возлѣ головы на-
ходящіеся, увеличиваются. М.

(*) Confer Komg. in Act. Helv. Tom. I. p. 28.

они иногда могутъ приносить и пользу, ибо явственно примѣшнѣ можно, что опияный составъ, положенъ будучи въ теплое молоко, весьма раздувается.

Не вѣроятно почти, сколь долгие они въ чело-вѣческомъ тѣлѣ вырастаютъ. Мнѣ не случилось видѣть, чтобъ когдалибо вышло ихъ болѣе 80 аршинъ, однако нѣкоторые видѣли до 300 аршинъ. Докторъ фанъ Девернъ повѣствуетъ, что одинъ муликъ принявши рвотное, выдевалъ 40 Голландскихъ аршинъ, но еще больше бы выдевалъ, если бы онъ испугавшись, что всё у него кишакъ ртомъ выходятъ, не перекусилъ ихъ. Изъ сего такъ же явствуетъ, что они не только въ толстыхъ и въ тонкихъ кишкахъ, но и въ самомъ желудкѣ бывають. У собакъ весьма часто сие примѣчно. Впрочемъ Докторъ Родинъ въ прелней тонкой кишкѣ въ мертвомъ тѣлѣ плоскую глисту нашелъ длиною въ 16 футовъ (*).

Когда выходитъ плоская глιστα, то она кажется длиннѣе и ширѣ, нежели спустя нѣсколько времени. Если она выходитъ живая; то удобно примѣшнѣ можно ее сжиманье, во время котораго она дѣлается то уже то ширѣ, и на краю

Ѣ 5

какъ

(*) Г. Спранбергъ (Tal om Felen vid Chron. Sinkdomars botande S. 12) повѣствуетъ, что у одной дѣвки отъ среднихъ чиселъ Іюня 1759 до среднихъ чиселъ Сентября 1764 года вышло 793 $\frac{1}{4}$ аршина кусками. Я сию Исторію для того здѣсь повторяю, что въ ономъ славномъ Журналѣ сдѣлана опечатка, будто столько вышло ихъ вдругъ, и сія погрѣшность тѣми, которые больше читають Журналы, нежели частныя записки, распространилась. М.

какъ бы свертывается и извивается. Съ самое пресмыкание ощутишьельно въ брюхѣ тѣмъ, колъ имѣютъ въ себѣ плоскіе глицсты. Онъ при своемъ выходѣ иногда кажется мертвымъ, однако послѣ оказывается живъ. Я часто сіе примѣшалъ даде и послѣ того, когда онъ уже чрезъ 24 часа лежалъ на олопкѣ на тарѣлкѣ. Когда я его положи въ посудательную чашку, обливалъ не большимъ количествомъ теплой воды, то онъ начиналъ двигаться и извивался. А какъ только началъ послѣ обливанья его холодною водою, то онъ лежалъ замертво. И такимъ образомъ я по моему произволению попеременно его то умерщвлялъ, то опять оживлялъ. А когда я чрезъ долгое время попеременно употреблялъ то холодную то теплую воду, то у него опидблялась напоследокъ весьма тонкая кожа, которую онъ весь былъ покрытъ. Что онъ имѣетъ чувствительность, то я часто сіе примѣчалъ, ибо коль скоро я допрогивался къ нему кончикомъ тонкихъ ножицъ; то онъ тотчасъ начиналъ извиваться, и его составы дѣлались всегда короче и ширѣ. А что онъ имѣетъ обоняние, то сіе видѣть можно между прочимъ изъ излюденій г. Кенца (на сказ. мѣст.). Когда его нѣсколько выдешъ, то кажется, что всего его легко можно вытянуть. Однако я испыталъ, что сіе не возможно. Ибо сколь бы осторожно его ни тянуть, однако начинаешь болыной чувствовашъ въ брюхѣ, какъ бы великое множество каубковъ и такой зудъ, что онъ можетъ случить судорги, естли не перестанетъ тянуть и не опрѣзашъ глицсты. Естли тогда перевязашъ его шелковою ниткою, то она втяги-вается на цѣлые два либо три аршина въ брюхо, однако вскорости оппадаетъ, и не много повода выходишъ вовъ.

Изъ

Изъ сего уже нѣсколько заключать можно, почему сѣи глисты трудно выгонять, и что сѣе затруднение тѣмъ болѣе увеличивается, что онѣ вышеупомянутыми своими насосами прикрѣпляются къ кишкамъ. Сверхъ сего онѣ и у людей плазъ какъ у рыбъ и собакъ остриемъ узкаго своего кончика, который чаятельно есть общій ихъ рожъ (ибо каждый составъ кромя онаго имѣетъ свой сосисвенный, т. е. насосецъ) въ кишку плазъ вниваяются, что не легко ихъ можно отъ оной отдѣлять. Велферъ (de Cicuta aquat. cap. 3.) примѣтилъ, что онѣ въ кишку вниваются на подобіе пиявицы, когда она сосетъ кровь. (Смотр. Терреншвандово письмо къ Фанъ Свишену *Commentar. Von Swieten Tom. 4. p. 739.*)

Тизонъ, вскрывши собаку, видѣлъ одного плоскаго живаго червя, котораго широкій конецъ лежалъ свободно въ заднепроходной кишкѣ, а тонкій плазъ къ первой тонкой былъ прикрѣпленъ, что едва можно было его булавкою опияшь. Но онъ послѣ того опять прикрѣплялся по прежнему и равно трудно было его отдѣлять. Изъ сего такъ же видѣть можно, что до тѣхъ поръ нельзя сказать, что уже нѣтъ болѣе плоскихъ глистъ, пока не выдѣстъ весь тонкій ихъ конецъ. Ибо естли частіи онаго останется, то онъ опять вырастетъ. Даже, естли бы остался и одинъ составъ, то равнымъ образомъ можешь изъ него быть долгій червь. Вѣроятно, что плоская глестина плазъ велика выросши можешь, что больше не въ состояніи бываешь помѣщаться въ кишкахъ, но нѣкоторая частіи оной должна бываетъ выйти вонъ. Иногда нѣкоторая частіи оной можешь сгнить, либо

уме-

умереть, и тогда она съ испражнениями опрыскается или дѣкарсивами изгоняется. Безъ сомнѣнія иногда какой нибудь оной составъ разрывался либо перегнивалъ; либо сіе бываеиъ между двумя поперечными краями, гдѣ она безпрестанно дѣлается уже до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не отпадеиъ. Я примѣнилъ, что сіе бываеиъ двоякимъ образомъ либо гнилость начинаеиъ на обоихъ краяхъ, и представляеиъ какъ бы два полукруга, которыя своими выпуклыми краями одинъ къ другому прилегаютъ; либо она зараждается по срединѣ и на обоихъ краяхъ оставляетъ только по одной нити. И по сей шо причинѣ часто безъ всякихъ дѣкарствъ плоскія глисты кусками выходяиъ. Сверхъ того извѣстно, что сіи черви и въ человѣка бываюиъ. Что оныя въ водѣ и въ рыбѣ находяиъся, шо я сіе доказалъ свидѣтельствами досшойныхъ вѣроятія мужей на стр. 409. Смощри такъ же сочиненія Королевской Академіи наукъ 1747 года стр. 113). Оныя такъ же сысканы въ кишкахъ собакъ, кошекъ, ягнятъ, хуръ, гусей, голубей, равно какъ и въ кишкахъ недавно вышедшаго на свѣтъ ягниска, какъ сіе примѣнилъ г. Дарелли. Изъ сего удобно заключить можно, что плоскія глисты въ насъ могутъ быиъ врожденныя, а особливо когда миѣ извѣщенъ одинъ примѣръ, что изъ одной фамиліи двѣ сестры, мать и бабушка имѣли въ себѣ плоскія глисты. Сіе еще больше утврждаюиъ собранныя г. Деверномъ (*Diff. de vermibus intestinum* р. 31.) наблюденія, и повѣствованіе де Лилія о своей и медвальной дочери, у которой выходили глисты, хотя она ничего еще въ пищу не употребляла, кромѣ молока собственной матери. Док. Проф. Брен-

Брендель въ Гештингѣ хранилѣ великое множество круглыхъ глистовъ, которые онѣ сыскалъ въ тонкихъ кишкахъ недоношеннаго зародыша. (Vid. Pal-las l. c.)

Четвертаго рода глисты называются маальми продолговатыми (*Ascaris lumbricoides* Linn. S. N. l. c. p. 1076). Сии совсѣмъ похожи на маалыя глисты, и на обоихъ концахъ такъ же какъ и они бывають толкы, только длинны въ четверть аршина, либо и больше. Ихъ всегда смѣшиваютъ съ глистами втораго рода (*).

Пя-

(*) Четвертаго рода глисты наилучше различаются отъ дождеваго червя тремя подосными соску возвышеніями или губами, на самомъ окончаніи передняго конца находящимися, которые еще Тизонъ (Phil. Transact. n. 147 Tab. l. c. 1c.) и Валлисниери (*Opera fisico-medice* T. I. Tab. 34. vid. etiam Clerici Hist. lat. lumbr. Tab. 10 fig. 3.) описали и описовали. Ибо я ихъ у дождевыхъ червей совсѣмъ не примѣтилъ. (Vid. Murray Observat. de vermibus p. 75 in notis) У маалыхъ глистовъ такъ же ихъ не бываетъ. Вышеписанныя возвышенія суть не что иное, какъ три круглые бугорка, которые треугольникомъ между собою такъ расположены, что одинъ отъ другаго раздѣляются своимъ опроверженіемъ, въ срединѣ находящимся. Сіе опроверженіе у круглыхъ глистовъ видѣть можно только тогда, когда ихъ подавишь со стороны. Я сомнѣваюсь, что бы кто действительно примѣнилъ, что они высовываютъ опшуда настоящій нососецъ. Дѣйствіе же проихъ бородавкоу у круглыхъ червей, въ людяхъ случающихся, можно доказать спросивъ ихъ, которыя я у толстаго, длиннаго, круглаго червя лашадинаго примѣнилъ. У сего я кромѣ трехъ боро-

Пятый родъ составляютъ плоскія глисты не-
составныя (*Fasciola intestinalis* Linn. Syst. Natur. Ed. 12
р. 1078). Г. д. Монтиль вынулъ ихъ изъ одной
дѣлвы, и хорошо описалъ въ сочиненіяхъ Короле-
ской

бродявокъ видѣлъ не большой круглой криво-
копый съ первымъ виду казался, что сжимае-
лется особливую часть; однако при почтѣйшемъ
ислѣдованіи я нашелъ, что онъ на три части
онѣмъ тремя бразями, на основаніи бродявокъ
оканчивающимся, раздѣлялся. Онъ сего спрѣ-
нія происходилъ при губы, которыя при своемъ
окончаніи были угловатыя, приномъ острыя и
тверже другихъ частей, по малой мѣрѣ можно
было, умая, что онъ хрящеватыя, но, когда я
ихъ рѣзалъ перочиннымъ ножичкомъ, то отъ
него выходилъ некоторый сокъ. Можно
переднюю часть губъ считать за хрящевые зу-
бы, и слѣдовательно когда они кусаютъ, то
отъ того рана такъ, какъ и отъ угрызенія жа-
вца, должна быть треугольная. Валлиснери у
круглыхъ глистовъ шпачки примѣталъ ме-
жду тремя угловатыми носецъ. Слѣдовательно
сихъ строеніе отъ нихъ, которые сываютъ въ
человѣкѣ, должно быть различно. Однако мо-
жетъ быть все се различіе состоитъ только въ
небольшой отлѣченности положенія малыхъ сихъ
частей. На шудовидѣ круглыхъ глистовъ при-
мѣчается великое множество круглыхъ мординъ,
однако безъ щетины, но онѣ мордины такъ
тонки, что ихъ перчить нельзя. Никогда не
можно примѣнить на сѣ червь большого полу-
кружия или пояса, которое рѣдко не бываетъ у
дождеваго червя. Некоторые изъ нихъ, по край-
ней мѣрѣ по наблюденіямъ г. Тизона, суть му-
жского, а другія женского пола. У женскихъ нахо-
дится множество сѣмянныхъ сосудовъ, которые

ской Академии Наукъ 1763 года (спир. 113). Сие гласитъ бывающъ толпы, и имѣющъ вдоль пообѣимъ споронамъ простирающіяся бразды. Каждая ограда ссѣпощъ изъ однихъ только сдавленныхъ морщинистыхъ пятнушетъ. Большой кониъ они имѣющъ тугой, а къ другому концу мало по малу сплюснываются шонъ до самаго окончанія, конорымъ

въ своемъ началѣ имѣющъ кавалъ, разделяющійся на двѣ другіе (яичники), конорые въ величественномъ мажествѣ искусно между собою сплетенными шонками, но гораздо самую червя длиннѣйшими, протокани перепутываются, сквозь общіе шонки бывающъ шонки и иногда изъ вышедшихъ листовъ выпадаютъ. (Хорошій Рисунокъ сего червя гдѣль можно in *Petebomi De-ter. et delib. Stomachidae fig. 6.*). Сие самое нѣкоторыхъ Примѣчательей заставило думать, будто они живые родятся Въ яичникахъ весьма великое количество бываетъ яицъ, изъ чего можно заключать о великомъ умноженіи сихъ червей. Слѣдовательно сей есть долгій круглый червь, конорый раче прочихъ въ человеческомъ шлѣ бывающъ. Г. Шаттскій Совѣтникъ Маллеръ (Hampov. Magazin 1773 N. 27.) лучше всѣхъ его писалъ. Нѣкоторыхъ живыхъ, выходившихъ изъ людей, называлъ я попеременно по горячую по холодную воду; онъ чего они по замирали по спяще оживали. Въ теплой водѣ они много дегились и извивались. Практическія заключенія, конорыя я изъ сего явленія и ихъ спороны почерпнулъ, описаны въ вышеупомянутой моей Диссертаціи de *Ascaride lumbricoide* p. 34. Sq.) Тѣрнъ долгихъ круглыхъ, какъ ему кажется, видѣлъ въ великомъ количествѣ въ печени въ трескѣ весноты, а г. Факсъ въ двухъ окуняхъ въ Іюлѣ (Fort - litten. f. Prov D D. berättelser S. 130 и 232) М.

рыбѣ весьма крѣпко впиваются въ рыбу такъ, что всегда должно его прирывать, еспли не положишь рыбы въ холодную воду. У нихъ по краямъ находящіяся зубчатые кольца, которыя весьма кажутся остры, еспли по нихъ повесить персиомъ внизъ. Наипаче се примѣчается на твердыхъ частяхъ, и се по бывастъ причиною рѣзу, при всякомъ испражненіи чувствуемаго, когда съ онымъ выходящъ сн глистъ. Надъ сими глистами, изъ рыбы вынутыми, г. Докторъ дѣлалъ опыты, и когда ихъ клалъ на буквое уголье, то они два или три раза оные гасили своею салізью прежде нежели умерли. На самыхъ раскаленныхъ угольяхъ часто они живы были чрезъ двѣ минуты. Сей самый Врачъ повѣствуетъ, что одна женщина въ Голландіи нечаянно взяла было нѣ ропъ съ языкомъ лоша кусокъ живаго сего глиста; но, почувствовавъ на своемъ языкѣ нѣчто необыкновенное, выплевала его вонъ.

Сюды принадлежатъ еще шестой видъ глиствъ, которыя называются тонкими (*Gordius* (*) *Linn. Syst. nat. Ed. 12 Tom. p. 1075*), и которыхъ Антонъ Роландсонъ Марпинъ (*Abhandl. d. Schwed. Acad. der Wiss. 1771 S. 261*) весьма исправно описалъ. Сн глиствы имѣютъ туловище цилиндрическое, съ обоимъ концомъ быкаютъ тонки; однако одинъ изъ нихъ гораздо бываеетъ тонѣ шакъ, что еспли ихъ облить теплою водою, то онъ прости-
ваеетъ

(*) Г. Марпинъ примѣтилъ въ немъ великое подобіе съ тѣмъ червемъ, который называется опѣ Анн-ея *Gordius argenteus*, только онъ бываеетъ весьма различенъ цвѣтомъ, и шакъ бываеетъ бѣлъ, какъ мѣлъ (*Schw. Abh. на сказан. мѣст.*) М.

вается на подобіе весьма острого окончанія шила. Цвѣтомъ сіи глансты бывають бѣлы, кромѣ выше-
помянушаго конца, который нѣсколько блѣднѣе про-
чихъ частей. Кожица ихъ имѣетъ почти такой
же цвѣтъ, а внутренность или кишка нѣсколько
бываетъ блѣднѣе, и для того естели сію глансту
положить въ спиртъ, то она представляетъ
рѣзрѣзанныя ниточки. Она извивается различ-
нымъ образомъ и кажется, что своимъ тонкимъ
концомъ, который безъ сомнѣнія есть ея ротъ,
получаетъ питание, у рыбъ скрывается она въ воз-
душный пузырь и тамъ расплывается и возра-
стаетъ. Самая большая изъ нихъ бываетъ дли-
ною въ дюймъ, старѣйшія бывають живущее,
нежели молодшія. Онѣ проѣвши вышеписанный пу-
зырь изъ онаго выползываютъ, однако оный и послѣ
остаётся растянутъ. Потомъ проходятъ сквозь
жижки, печень и жабры.

Г. Мартынъ находилъ ихъ въ морской рыбѣ
(*Gadus virens*), въ Фрели (*Salmo fario*), въ сельдѣ (*Clupea
Harengus*), чаяшельно въ небольшой, и въ Анчоусѣ
(*Salmo Eperlanus*). Оныя лежатъ на подобіе сверну-
тыхъ нитокъ въ салынкахъ или въ молокахъ у
сельдей. По той причинѣ никакъ не смѣетъ ѣсть
малыхъ Анчоусовъ въ Гелсингфорсѣ не разрѣзавши
прежде спинки и не вынувши воздушнаго пузыря.
Интательный сокъ сославляетъ ихъ пищу.

Г. Мартынъ, который самъ подвергся былъ
симъ гланстамъ, описываетъ для ихъ узнаванія
слѣдующіе признаки. Онъ говоритъ, что у боль-
ныхъ оными чешется въ носу, а особливо въ вече-
ру, ротъ наполняется слюною, вдругъ приклю-
чается рвота, ночью бываетъ потъ, безпокойный
сонъ, приключаются судорги и терзаніе въ пече-

ѣн и около селезенки, опѣ чего дѣлаются вѣтры, соединенные съ болѣе около сердца, щеки рдѣютъ, а особливо лѣвая. Приключается тоска, грусть, боязнь и склонность къ гнѣву такъ, что больной сердится за самую малость; въ нѣтъ чувствуется тяжесть, усталость и слабость, брюхо раздувается и распухаетъ какъ прежде, такъ и послѣ испражнения ланизъ, ощущается боль подъ ребрами и склизью рвешъ по большей части послѣ того, когда послабитъ, а иногда и прежде. Свербежь въ носдряхъ и мокропную рвоту Г. Мартынъ починаетъ самымъ вѣрившимъ знакомъ тонкихъ тлиствъ (*).

Рѣдко всѣ сии виды тлиствъ случаются вѣдругъ въ одномъ человекѣ. Однако у одного изъ бѣдныхъ людей чепырехлѣпного младенца, которъ былъ весьма худъ и слабъ, и которому мать для подкрѣпленія силъ дала нѣсколько горячаго вина, не много спустя вышло весьма много не большихъ короткихъ тлиствъ, но чепыре аршина понныхъ и небольшихъ плоскихъ, и десять, подъ вторымъ и чепвертымъ видомъ описанныхъ. А когда

(*) Г. Бродъ повѣствуетъ, что въ одномъ мѣстѣ не подалеку отъ Марленстада въ Восточной Голландіи находились въ различныхъ источникахъ родъ такихъ тонкихъ червей (Gordius), и что естли кто изъ людей либо изъ другихъ животныхъ ихъ съ водою проглатитъ, то многимъ изъ нихъ, естли вскорости ихъ послѣдствіемъ хрипкихъ проносныхъ дѣкарствъ не выгнать, приключаются судорги и самая смерть (См. о семъ Fortætning af Prov. Doct. betænt. S. 98). М.

да онѣ вышли, то ребенокъ оправился; сдѣлался подвижнѣе и получилъ прежнія свои силы. (*)

Въ нѣкоторые годы гонимы бывающѣ въ болышнѣмъ количествѣ, а въ нѣкоторые въ меньшемъ. А когда случится вмѣстѣ съ ними другая какая либо повальная болѣзнь, то какъ ринѣ, такъ и иномъ весьма великое ихъ множество вычлѣпилось. Сие случилось съ болышюю частію нашей контингенты пѣхоты, которая въ 1743 году возвратилась изъ Финской армии. Но отъ чего сие произошло, отъ погоды, что они пили нечистую воду, или предшествовавшая тихая погода служила къ насѣженію большаго количества мухъ, или гонимы заражались отъ другой какой либо причины; сего безъ подробнаго изслѣдованія не можно съ точностію утвердить. То только извѣстно, что таковыя повальныя болѣзни излечимы быть не могутъ прежде, нежели употреблены будутъ сіи насѣкомыя. Но иногда онѣ сами произвѣщаютъ горячку, либо уже имѣющуюся приводятъ въ болышее ожесточеніе, либо дѣлаютъ оную ипорядочною, либо прежде начинающуюся болѣзнь усилити производя коликъ, напыщеніе брюха, бредъ, судороги и проч. (**). Г. Фавъ Девернъ въ 1752 году, осенью, пользовалъ одного крѣпкого Селадана болыною лихорадкою. Во время ожесточенія весьма дрожали у него члены, а особливо руки, и онъ имъ отъ безпрестанно смѣялся прѣтвивъ своей воли, бленіе жилъ имѣлъ скорое, слабое, дрожащее и иногда перемежающееся. Для этого онѣй Врачи дали ему рвотное, послѣ

h1 2

ко.

(*) Сносн примѣчаніе о смѣ на стр. 408. М.

(**) Смолд. изъ сен Boich Historia constit. epid. termi-
nofae 1769 М

котораго вышло рвотю много клейкой мокроты, и вмѣстѣ съ оною большая круглая глиста. Симъ окончилась всѣ его мученія и въ скорости переспала лихорадка. (Снеси о семъ повѣствованіе Д. Факса in *Veratt. til K. Coll. med.* 1765. стр. 84.)

Припадки, глистами причиняемые, зависятъ

1) Отъ ихъ величины и многого количества. Чѣмъ глисты многочисленнѣе и чѣмъ больше, тѣмъ болѣе онѣ отнимаютъ у насъ пищанія. Для того у нѣкоторыхъ больныхъ глистами, а особливо плоскими, бываетъ весьма сильный позывъ на пищу. Часто случается, что имъ такъ хочется ѣсть, что естли въ скорости имъ не дать куска хлѣба, то они впадаютъ въ обморокъ. По сей причинѣ также тѣ, которые кушаютъ только въ обѣдъ, по утру больше претерпѣваютъ мученія, а напрошивъ того легче имъ бываетъ, когда они поужинаютъ и позавтракаютъ. (Смолр. *Abhandl. der Konigl. Acad. der Wissen.* 1747. стр. 119.). Для того роженица, спирающая плоскими глистами, должна больше другихъ ѣсть, дабы можно ей избавишься отъ причиняемыхъ ими беспокойствъ.

2) Отъ того, что часто глисты свернувшись въ клубокъ и зарывшись въ мокроты, въ одномъ мѣстѣ лежатъ, что обыкновенно называется ихъ гнѣздомъ. Отъ сего кишки въ которомъ нибудь мѣстѣ раздуваются, либо заперты бываютъ, и опухода происходитъ барабанный опухоль (*tumpanitis*), колика, рвота и самая тягучая

спрашная болѣзнь, которую называютъ *Miserere mei*.

3) Онѣ ихъ испарины и испражнений. Ибо оныя, такъ какъ постороннее вещество, къ гнилости удобно преклонное, могутъ причинить простой или кровавый поносъ; либо, опниены будучи въ кровь посредствомъ всасывающихъ лимфическихъ и молочныхъ сосудовъ, произвѣсть опасную горячку. Равныхъ слѣдствій ожидать должно и тогда, когда онѣ умершия не будутъ въ скорости изъ тѣла изгнаны.

4) Также и онѣ того, что онѣ иногда пробуравливаютъ кишки и выдѣляютъ изъ оныхъ въ пустоту брюшную. Какимъ образомъ онѣ сего дѣлаютъ, мы совершенно еще не знаемъ; но что сего часто случается, по доказываютъ намъ многие вѣроятія достойные Врачи (см. пр. Haller. *Anatomic. diffinitat.* Pars 6. p. 718. также Ablandl. *der Mensch.* 1747. стр. 14 (*). Думаютъ, что сего самое случилось съ Иродомъ Агриппою. (Дѣяній Апостол. Гл. 12)

5) Но больше всего онѣ ихъ движения, познания и созанія. Въ движение онѣ приходятъ либо когда безпокоитъ ихъ пища, которой онѣ не любятъ, либо дѣкарешиа, онѣ коихъ онѣ стараются скрыться, или удержаться въ кишкахъ. Пища для гнѣшъ бываетъ припича вообще всякая твердая и соленая какъ на пр. соевая семга, кислая вина, кушанья, приправленные лукомъ, янсъ, экс-

и 3 м,

трактъ

(*) Весьма примѣчательна достойна сия Книга по тому, что въ ней описывается такой случай, что плоская гнѣша выдѣла воетъ изъ тѣла сквозь рану, въ паху находившуюся. М.

практь солодковаго корня, сахаръ и медъ. На прошивъ того молоко для нихъ прѣкисло. Оно иногда превращаетъ припадки, отъ глицеръ происходящія; однако не рѣдко ихъ и умножаетъ, когда глицеръ находится въ кишкахъ весьма много, стараются вверхъ къ нему пробраться къ самому желудку. А понеже желудокъ и кишки бывають чувствительны и удобно приходятъ въ раздраженіе; то не удивительно, что отъ движенія и сосанія глицеръ происходитъ судорги, изгата, несорочный вкусъ, бѣлѣтъ языкъ, дѣлается въ груди одышка, тошнота, рвота, ворчанье, вѣтры и боль въ брюхѣ, рѣзъ въ животѣ, иногда поносъ, а иногда запоръ, щемота въ желудкѣ и проч.

А какъ желудокъ и кишки со всѣми частями тѣла имѣютъ великое сообщеніе; то отъ раздраженія оныхъ, глицерами причиняемого, можетъ воспослѣдовать и во всемъ ономъ расширка, когда судорги вездѣ распространяются. Еслили отъ оныхъ сморщивается кожа, то слѣдуетъ дрожь. Еслили сжимаются почки, то моча становится бѣдною, либо перестаетъ течь. Еслили судорги воспослѣдуютъ въ гортань; то отъ того дѣлается помѣшательство въ глотаніи. Равнымъ образомъ отсюда происходятъ и всѣ прочіе припадки у страдающихъ глицерами, Врачами примѣченныя, а именно: слабое и иногда перемежающееся бѣненіе жилъ, препешаніе сердца, рвоторки, круженіе головы, неспособность въ произношеніи рѣчи (смотри. Abhandl. der Acad. der Wiss. 1747. стр. 111.), безгласіе, слѣпота, шумъ въ ушахъ, пужливость, уныніе, лишніе чувства, бредъ

бредъ, мечтательное пробуживаніе со сна, безпокой-
ныя сновидѣнія, печальныя размышленія, жесто-
дая тоскливость, тревога въ шлѣ, икота,
корчи (*) падучая болѣзнь и поспрѣлъ. Въспъ
такіе примѣры, что иные будучи больны гли-
стами, вдругъ дѣлались сумасшедшими и бѣше-
рыми; а какъ только выгнаны были оныя изъ
нихъ; то сіи самые люди становились такъ
кротки, какъ агнцы. Часто также глисты вы-
звѣютъ причиною остановавленія мѣсячнаго крово-
теченія, у женщинъ бывающаго. Спраждающіе
оными кормилицы подвержены бывають прежде-
временному оскудѣнію молока. Въ такомъ слу-
чаѣ груди у нихъ такъ, какъ иногда губы,
прессыются и соски окружаются сѣдыми круж-
комъ. Докторъ Синтелій упоминаетъ объ одной
дѣвицѣ изъ знатной фамиліи, которая имѣла
отвращеніе отъ пищи и снѣданное на оную по-
бужденіе такъ, какъ будто беременная. Брюхо
у нее было велико и перестало мѣсячное крово-
отеченіе. Сие ввергло въ печаль ея родителей,
которые подозрѣвая на худое ея поведеніе, прика-

БІ 4

закъ

(*) Два брата отъ глистъ мучимы были при
полномъ ихъ разумѣ по всему тѣлу прости-
рающимися судорогами такъ часто, что едва
иногда чепьере или нить минушь отъ нихъ
могли быть свободны. При семъ случаѣ одна-
ко достойно было примѣчанія то, что сколь
оныя ни были жестоки, всегда потчасъ пере-
спавали, коль скоро кто нивуль дунулъ въ
лицо больнаго. Понемѣ. Г. Валтомъ въ семъ
самъ свидѣтель, то не лѣзя сумѣваться объ
истинѣ сего повѣствованія (Bonlauneg af Prov.
Doct. berätt. S. 221.). М.

зали разыскавъ настоящую сему причину; на что въ опытахъ себѣ получили, что ихъ дочь беременна. Для того оставили ее безъ всякаго леченія, и она вышла въ сухоту и умерла единственно отъ незнанія и нерадѣнія. По вскрышии однако мертвато ея тѣла сыскано, что она непорочна. Въ маткѣ не было никакого зародыша, но вмѣсто того въ кишкахъ сыскано великое количество слизи и мокротъ, внутри которыхъ лежала плоская глѣза столькожъ длинная, какъ и самыя кишки. И такъ должно согласиться съ Врачами, что нѣтъ ни одной столь жестокой и столь спранный болѣзни, которой бы не въ состояніи были глѣзы произвести. По сей-то причинѣ они, если случится какая либо необычайная и спранный болѣзнь, вдругъ и безъ явной причины воспослѣдовавшая, всегда спрашиваютъ, нѣтъ ли у больного такихъ знаковъ, которые бы удостовѣряли, что у него находясь глѣзы. О сихъ знакахъ я здѣсь намѣренъ прежде упомянуть вообще, а по томъ опишу порознь, по какимъ именно изъ оныхъ каждый видъ глѣзъ узнавать должно.

Общими признаками глѣзъ бываютъ: перемѣнный цвѣтъ въ лицѣ, которое по бѣдно, по красно бываетъ; синій кружокъ подъ глазами; свербежъ въ носу; часто бывающая боль въ головѣ потчасъ послѣ кушанья, ротъ наполненный слюною по утруамъ проснувшись, и течение оной изъ рта ночью; беспокойный сонъ и нечаянное пробуживаніе; больной свободѣ всего моветъ лежать на брѣхѣ, скрививъ во снѣ зубами, и, кажется, какъ будто чтонибудь глот-

глотаетъ, соевый вспахнетъ, говоритъ, кланчетъ другихъ, но топчасть онять должися и спитъ; по утруамъ чувствуетъ жажду, имбеть великую склонность въ обморокамъ, часто кружнися голова, затиниъ въ унахъ, иногда дѣлается тошнота и отвращеніе отъ пищи, либо, что еще чаще случается, слѣзуетъ чрезвычайный аппетитъ; изо рта выходитъ противный запахъ, десны тнютъ и покрывающся ранами, приномъ приключается рвота, стѣсненіе груди ниже сердца, колика и рѣзъ въ животѣ, а особливо около пупа; брюхо вдругъ раздувается и боли пѣ, безпокояиъ въшры, чувствуется въ немъ какъ будто что сосетъ и шевелится; иногда бываетъ сильный поносъ, а иногда запоръ, калъ выходитъ поночиъ, большой, какъ выше упомянуто, большою частію жстъ сдншкомъ много, но при всемъ томъ бываетъ сухъ, по утру ему тяжелъ, а особливо естли онъ въ вечеру не поулянаетъ и по утру не позавтракаетъ, всѣ припадки больного въ началѣ и въ окончаніи каждаго мѣсяца ожесточаются; въ заднемъ проходѣ чувствуется зудъ, который иногда бываетъ такъ несносенъ больному, что онъ отъ него впадаетъ въ обморокъ; часто бываетъ побужденіе къ испражненію на низъ или лиаъице; страждущіе глистами бываютъ невеселы, задумчивы и неспособны къ опправленію своихъ должностей, иногда сверхъ обыкновеннаго печалаяся, сами не знаютъ, чего имъ хочется. Инымъ изъ нихъ тяжело бываетъ говорить такъ, что они не могутъ произнести ни одного слова; ные дѣлаются бѣшеными (Maci), ные безумными (vid. Eph. N. C. Dec. 3, A. 3.

Объ. 135.) ; иные безъ явственной причины пол-
чаютъ судорги и лежатъ въ забытіи. Когда
они не бывають сильны, то изо рта не выхо-
дитъ никакой пѣны; елики же онѣ жестоки,
то много оной выходитъ. У нѣкоторыхъ нѣ-
мѣетъ все шло, они впадаютъ въ обморокъ,
послѣ снѣ оного пробуждаются съ жестокими су-
доргамн, становятся бѣшеными, засыпають и
наконецъ спустя нѣсколько времени встають въ
полномъ разумѣ, но только чувствуютъ уста-
лость въ нѣдѣ. Инымъ часто хочется пить,
другіе имѣють сухой кашель, подобный судор-
жному (Comment. L. t. Norimb. A. 1732. p. 46'). Не-
скоро сн больные оправляются послѣ принесенной ими
болѣзни. Они подвержены бываютъ прелетанію
сердца. Александръ Монро утверждаетъ, что
великое разширеніе глазнаго зрачка есть самымъ
вѣрнѣйшимъ признакомъ гниетъ (Vid. Commentar.
van. Swieten Tom. 4. p. 721.). Весьма вѣроятнымъ
также признакомъ починать можно и то, когда
кто почувствовавъ въ себѣ безпокойство, поспѣ-
шася отъ оного получитъ облегченіе, коль скоро
выпьетъ стаканъ холодной воды. Причина сего
является изъ вышеказаннаго въ разсужденіи
дѣйствія холодной воды на круглыя и плоскія
сопавныя и несопавныя гнисты. Однако са-
мымъ вѣрнѣйшимъ признакомъ оныхъ почи-
нается, когда онѣ либо цѣлые, либо нѣкоторые
ихъ частн выходятъ.

Никогда не должно ожидать въ одномъ
человѣкѣ всѣхъ мною здѣсь вычисленныхъ при-
знаковъ. Довольно, елики только нѣкоторые
изъ оныхъ будутъ. Для того безошибочно я за-

рассказывалъ объ одной десятилѣтней дѣвицѣ, что она имѣла глоссы, когда увидѣла, что, хотя она много бѣла, она была худъ, лицо имѣла блѣдное, и подѣ глазами снѣгій кружокъ, нѣсколько разъ въ началѣ ущербу Мѣсяца принуждена была, по причинѣ гнѣвшейся у нее въ кофтикахъ и въ ногахъ боли, лежать въ постелѣ. Я далъ ей противъ глоссовъ порошокъ (который будетъ ниже описанъ) и шѣмъ се вытѣчалъ. Случилось мнѣ также видѣть одного мальчика, который безъ явной причины былъ сухъ, и часто былъ боленъ, не жалуясь, чтобъ что-нибудь особливо у него болѣло. Но когда онъ просыпался по утру, то всегда застаивали его лежащаго на брѣхѣ. Послѣ этого даны были ему ртутныя пилюли, которыя выгнали изъ него спонкую и молодую плоскую глоссу. Франъ Девернъ повѣствуетъ, что когда одному двенадцатилѣтнему злѣшему мальчику нечаянно приключился обморокъ, корчи, судороги и несильная надущая блѣдность: то онъ велѣлъ ему давать вино и воду, въ которой была варена ртуть. Послѣ чего скоро вышли двѣ большія круглыя глоссы, и шѣмъ прекратились оныя весьма жестокие его припадки. Г. Линдестолпъ, будучи призванъ къ одной десятилѣтней дѣвицѣ, которая наипаче жаловалась на колѣшье въ лѣвомъ боку, имѣла сухой кашель, несильную жаръ, полное вѣнне ана, великую жажду, сухость во рту и перемежающуюся колику, временемъ ни чего не могла говорить и спрэдла судорогами. послѣ узнавъ, что все сие происходило отъ глоссы. Для этого прописалъ противъ оныхъ для все нѣ-

сколь-

сколько порошковъ. Но когда она два изъ нихъ приняла, но чрезъ два дни около обѣда приключились ей столь жестокия судорги, что ноги заворачивались къ хребту. По происшествіи оныхъ однако больная не чувствовала никакихъ припадковъ и спала до самаго вечера. Послѣ когда мать, въ намѣреніи перемѣнивъ ее постель, сняла ее съ оной, упала на полъ живая круглая галста длиною въ поларшина, и извивалась на ономъ на подобіе змы. Она во время судоргъ вышла изъ нее совсѣмъ голая; но послѣ того вышли съ непраженіями нанизъ и нѣкопорыя оставшія послѣ ее плѣвы и линовіща, которыя совершенно представляли луковыя перья. На послѣдокъ она совсѣмъ выздоровѣла. (Man sehe sein Buch von den Wümem S. 20.).

Когда кто чувствуетъ въ кишкахъ нѣкоторое безпокойство и ворчанье, а особливо въ одномъ боку, брюхо дуется, ощущается тяжесть ниже груди и тошнота, приключается тоска, при томъ оная тяжесть, по принятіи не пр. довольнаго пріема полыннаго экстракта, всегда съ чувствованіемъ волнующагося движенія исчезаетъ то въ маломъ случившійся нѣкакого сумѣнія о галстахъ. Г. Деалі (Annoentat. p. 349.) упоминаетъ объ одномъ юношѣ, который въ правой сторонѣ въ брюхѣ и поясницѣ имѣлъ такъ жестокую боль, что принужденъ былъ правую ногу заворачивать внутрь и начиналъ уже хромать. Родиссан его думалъ, что онъ ее вывихнулъ, однако Врачъ видя, что сей молодой человѣкъ имѣетъ запоръ, и частую боль въ брюхѣ, что у него часто бываетъ рожь наполненъ слюною, сѣрбишь въ носу и мо-

ча похожа на сыворотку, заключающъ, что причиною его болѣзни суть глисты, конюшыхъ когда онъ выгналъ, то больной совершенно спалъ здоровъ.

Еслили же кто узнаетъ, что больной страдаетъ глистами, желаетъ еще знать какого именно рода оныя суть. то онъ долженъ наблюдать нижеслѣдующіе признаки:

Въ плоскихъ глистахъ больной чувствуетъ въ брюхѣ сосаніе и нѣчто живое и извивающееся; въ бѣлу ощущаетъ тяжесть на подобіе клубка; иногда съ каломъ у него, а особливо послѣ слабительнаго; либо послѣ кушанья въ великомъ количествѣ моркови, либо послѣ питья березовицы, либо послѣ употребленія сосновой мязи, выходитъ нѣчто похожее на отурчяныя, либо длинные сѣмена, т. е. тѣ самыя чашницы, которыя по краямъ имѣютъ насосы. Г. Линней больше ихъ считалъ похожими на основныя сѣмена (*Semina Cardui*), равно какъ и чашницамъ другихъ глистъ приписываетъ подобіе ячмыныхъ зеренъ. (смотри. *Dubois Disposit. de Taenia descripta in Amoenitat. Academ. Linn. Vol. 2. p. 66. 1797.*)

Особливыми признаками круглыхъ глистъ бывающъ паразитіе и рѣзъ въ животѣ, а особливо около пупка, а иногда и извиваніе.

Признаки же малыхъ глистъ суть: зудъ около задняго прохода, частое побужденіе къ испражненію внизъ и печальный и унылый духъ (*).

Спра-

(*) Прочіе припадки, малыми глистами въ бѣлѣхъ и въ отдаленныхъ частяхъ причиняемые, опи-

Справдудіе глншамн не всегда, но нѣ извѣстныя нслько времена претерпѣваютъ онѣ нхѣ безпокойства. Вольшею часіною въ нсходѣ Мѣсяца н нѣ новомѣсячн (*) ожесточающнся нхѣ мученія, а особливо, есшлі онн имѣютъ въ себѣ плоскія глнсты.

Есшлі нхѣ скоро нспрѣмннѣ не лзя, а прншомѣ прнпаданн, онѣ нхѣ прнсходящнє, прѣбуютъ облегченія, шо сему можно посорнпѣ разлчнымѣ образомѣ.

1) Можно данѣ больному выпнпѣ однѣ лнбо два фунта коровьяго, только что выдоеннаго н еше нспалаго молока. (Нво варенѣе молоко не такѣ скоро прѣкращасѣ онѣе прнпаданн.)

2)

описалѣ н собственными прнмѣчанія дѣлнойными Испортнми ушверднлѣ г. Фелсумѣ (H. Felsum, *ascaridum pathologica* 1769. Cap. 4. 5. 6. 7). М.

(*) Я не ушверждаю, чтооѣ сѣ зависѣло отѣ дѣйствія Луны. (Vd. Haller's Element. Physiol. P. 7. P. 11. et 152.) однзко, что дѣйствнтельно сѣ вызваетъ, въ томѣ я увѣренѣ собственнымѣ моимѣ прнмѣчаніемѣ. Глнсты прнходяшѣ въ движеніе нслько въ нзвѣстныя времена: такѣ на пр. малыя глнсты подзаютъ только ввечеру.

Г. Ф. Р. такѣ былѣ увѣренѣ о справедливостн сего нзоложенія, что нскалѣ въ своемѣ письмѣ къ Г. Мурраю, что онѣ сѣ видѣлѣ надѣ премногнми младенцнми, н что далѣ въ случаѣ нептннн Календаря, онѣ разсудя по прнпадкамѣ, моѣ сказанѣ безъ ошнбки, которе число. Посему неуднвнтельно, что г. Боч. во время дѣченія шоль великѣе имѣлѣ вннма-

2) Либо дать ему легкое рвотное такъ, какъ о семъ упомянуто въ Отдѣленіи о судорожномъ кашлѣ. Сими способомъ я многихъ дѣтей во время ожесточенія избавлялъ отъ различныхъ весьма тяжелыхъ припадковъ. Я здѣсь представляю одинъ только такой примѣръ. Въ 1752 году однажды вышла по утру у нѣкоторой четырнадцатилѣтней дѣвочки большая круглая глиста. После чего она каждый вечеръ чрезъ цѣлые 21 день весьма громко кричала, начиная отъ семи и продолжая до одиннадцати часовъ. Когда ее спрашивали, для чего она кричитъ, то она на все никакого другаго отвѣща дасть не могла, какъ только, что у нее животъ болитъ. Призываемые Врачи всячески шарались, предпринимали самыя отборныя лѣкарства, которыя только извѣстны подъ именемъ убивающихъ глисты: однако ни малѣе въ томъ не имѣли успѣха. Я будучи призванъ на Совѣтъ, велѣлъ ей дать порошокъ Инсектуаннаго корня въ то самое время, когда она начинала кричать. После того хотя

она

занте къ симъ общностямемъ. Г. Циммерманъ (Von der Erfahrung Th. 2. S. 108.), который также никакого вліянія Луны въ члвчское тѣло не принимаетъ, упоминаетъ объ одной жевчницѣ, что у нее всегда при началѣ Мѣсяца отъ 2 до 8 часовъ либо и болѣе выходило плоскихъ глистъ. Малыя глисты по примѣчанію Г. Виссена (Essay on the med. Confusion of Great Ventr. l. 332) два раза въ Мѣсяцъ, т. е. при уменьшеніи Луны сіянія одну дѣвцу безлочноли больше, нежели въ другія времена: а Г. Фелсумъ (Hist. path. aiscr p. 150.) примѣтилъ тоже самое въ новомѣсячн. М.

она много лѣкарствъ прошивъ гландъ, а особливо во время приобщенія къ оспѣ, которая ей благополучно въ 1758 году была привита, принимала. однако ни одна гланда не вышла, и по сіе самое время никакихъ признаковъ, вызывающихъ быліе оныхъ, не имѣетъ.

3) Взрослымъ людямъ во время омертвѣнія я давалъ въ небольшомъ количествѣ винограднаго либо горячаго вина по 30 или по 40 капъ вызываемыхъ маточныхъ капель Д. Дуріеца (*) въ случаѣ, когда подозрѣвалъ, что круглыя гланды причиняютъ тошноту, обмороки и небольшія судорги.

4) А когда заключалъ, что отъ плоскихъ гландъ происходитъ уныніе, тоскливость, тяжестъ нѣас груди и напыщеніе брюха; то давалъ въ виноградномъ винѣ одну или двѣ
сто-

(*) Г. Фонъ Р. или лучше сказать Г. Гартманъ сихъ капель описываетъ (*Diff. Idea Pharmacopoeae reform.* р. 18,) слѣдующій рецептъ.

R. Gummi aff. foetid. ℥^β Возьми дурнаго духу
полдрахмы,
Opii Опія

Salis volat. С. С. в а ℥^β Лешучей соли оленяго
рогу по полу унцу,

Essent. Castor. ℥^{III} Бобровой эссенции три унца.

Digere et cola. Настой и процѣди.

Изобрѣтатель оныхъ былъ Лейбмедикъ Королевы Христины, однако по увѣренію достойной своего Сочинителя Истории Великой сей Королевы г. Надвор. Совѣт. Аркентсда была
„savant, mais — habile et grand Comedien, faisant parade de ce que d'autres avoient inventé
„avant lui,, (Memoires, Tom. I. р. 255.) М.

столовые ложки полынной эссенции. Она такое имела действие, что тяжестъ и напыденіе брюха вдругъ и съ извивающимся въ одномъ боку движеніемъ прекращались (*).

Впрочемъ сии лекарства приносятъ одно только облегченіе, чрезъ нѣсколько времени продолжающееся, а самой причины, отъ которой зависить вся болѣзнь, не истребляютъ. Одни только рвотными посредствомъ соприсенія, которое они внутри дѣлаютъ, могутъ принудить глисты, оставить то мѣсто, гдѣ они вгнѣздились, и такимъ образомъ выгнать вонъ. А что они имѣютъ сіе дѣйствіе, то удостовѣряютъ насъ какъ упоминаемый Бруцеромъ случай (*L'education medicinale des Enfants* Р. 2. р. 60.), такъ и Диссертація во время предсѣдательства г. Лейбмедика Фигеля (*de usu vomitivorum ad expellendos vermes, Göttingae 1765.*) заим�ваемая (**). И такъ я намѣренъ здѣсь показать, какимъ образомъ можно убивать и выгонять глисты.

Малыя глисты часто выходятъ отъ того, когда кто ѣстъ сырую морковь, либо употребляетъ бере-

(*) Еслили не прекращали оныхъ поносницы, въ холодную воду омоченныя и съедъ дала имъ приладываемыя.

(**) Поневѣ дѣйствіе рвотныхъ въ разсужденіи скората облегченія припадковъ, отъ глиствъ происшедшихъ, еще недовольно извѣстно, то я съобщу читателю о семъ многие опыты г. Милля (*Vie, in Brit. military Hospitals*) и г. Спрэнгера (*Tal om feilen vid. Chron. Sjukdomars behandling* стр. 15). М.

резовой или сосновый сокъ въ такомъ количествѣ, что послѣ его слабѣтъ. Равнымъ образомъ естѣли вложить въ задній проходъ кусокъ свижаго сала привязавъ къ нему нитку, и послѣ оное, спустя нѣсколько времени, опять вынуть; то всегда съ нимъ вытаскивается ихъ великое количество. А дабы ихъ вѣкъ изгнать, то должно такимъ образомъ сіе часто повторять, каждый разъ употребляя новое сало. Можно ихъ также выгнать промывательнымъ изъ молока, недавно выдоеннаго и небольшого количества соли составленнымъ, либо сдѣланнымъ изъ нашей обыкновенной кислой минеральной воды, смѣшавъ съ малымъ количествомъ соли (*); либо взята
для

(*) М. Г. Геберденъ (Med. Transactions by the College of Physicians in London Vol. 1.) упоминаетъ объ одномъ больномъ, который получилъ облегченіе отъ промывательнаго, изъ теплаго молока наспавленнаго. А жидкіе и поносъ его прекращены были промывательнымъ изъ молока, съ деревяннымъ масломъ смѣшеннаго. Когда сей больной принималъ порошокъ, изъ поддрыхмы ревеню и толнягожъ числа киноари составленный; то всегда его слабило склизью, на личный бѣлокъ похожую, и съ оною выходило великое множество сихъ глестъ. Напроставъ того когда онъ принималъ одинъ только ревенъ, то никогда ихъ такъ много не выходило. Но иногда ихъ весьма трудно выгонять. Г. Геберденъ (въ четвертомъ издѣленіи) упоминаетъ объ одномъ больномъ, который въ Февралѣ мѣсцѣ 1757 года имѣлъ великую боль въ желудкѣ, тошноту, рвоту и заворъ, почти совсемъ не спалъ и никакого не имѣлъ позыбу на
дицу

для сего одну драхму мѣлкаго сахару и столько колѣ въ порошокъ стертаго кончетьяго калу, смѣшавъ съ теплымъ (неваренымъ) молокомъ, и пять или шесть вечеровъ сряду въ задній проходъ вливать.

Ъ 2

По-

лищу, весьма былъ сухъ и не могъ не только ходить но и стоять; животи его былъ твердъ и пригнутъ къ спинѣ. Моча всегда выходила похожая на сыворожку и дѣлалась въ ней белая осадка. Калъ былъ твердый и похожъ на овечій; припомъ никогда его само собою не слабило. Много лѣкарствъ онъ употребилъ, однако безо всякой пользы. Напоследокъ приговорилъ ему нѣкто, выпить распущивъ въ водѣ нѣкоторое количество поваренной соли. Онъ тотчасъ распущивъ оной два фунта въ двухъ фунтахъ воды, и все сіе въ одинъ часъ выпилъ. Скоро послѣ того сдѣлалось ему тошно, почувствовалъ онъ тяжесть въ желудкѣ, воспослѣдовала жестокая рвота; и когда въ четвертый разъ его вырвало, то вышло вмѣстѣ съ рвотою много глистъ, изъ коихъ нѣкоторымъ были малыя, а другія похожія на бывающихъ въ кишкахъ у лошадей, величиною съ пшеничное зерно. Наконецъ послѣ 14 дневнаго запору послабило его 6 или 7 разъ въ великомъ количествѣ вонючимъ и съ кровью смѣшаннымъ каломъ, съ которымъ равнымъ образомъ вышло весьма много такихъ же глистъ. Оправившись потомъ опять на третій день, принялъ онъ такой же пріемъ, и почти съ такимъ же дѣйствіемъ; вторично у него вышли рвотою глисты, только меньшія. Хотя онъ отъ сего выздоровѣлъ, однако для безопасности принимаетъ еще за два или за три дни передъ новолуціемъ по полфунта

толи

Полезно также варить на легкомъ огнѣ въ плотно закупоренномъ глиняномъ горнѣ унцѣ ршупи въ одномъ фунтѣ воды, после прибавить шута нѣсколько меду и растапливанъ промывательное. Повторяя сіе нѣсколько разъ можно совершенно испребить глисты.

Втрочѣмъ надежнѣе всего настаивавить клистиръ изъ табачнаго дыму (*). (Смолтр. Med. Observations and Inquiries Vol. 2. сир. 307.)

Круглая глисты выгонять труднѣе. Для того, кто хочетъ въ семѣ имѣть усѣбѣ, долженъ наблюдать слѣдующее: 1) Избавить для сего начало либо окончаніе ущерба мѣсяца, 2) Давать лѣкарства во время завтрака поному, что глисты обыкновенно въ сіе время, будучи голодны, могутъ шо сѣбѣсть, что для нихъ есть смертоносно; 3) Давать оныя въ недавно выдоенномъ шенломъ млочѣ, либо въ нескръикомъ меду, либо въ ршупиной водѣ, и за нѣсколько времени прежде, нежели они больного послабѣнѣ, вѣдѣть настаивить промывательное изъ полфунта, или цѣлаго фунта теплаго недавно выдоеннаго молока, дабы ихъ приманить на низъ; 4) Больной шо, что ему должно принять, не долженъ

соли, распущенной въ одномъ фунтѣ воды. Но еспѣли бы онъ употреблялъ менышій прѣмѣ соли, шо бы нескръикомъ меньше страдалъ, а привсемъ шомъ мало по малу достигъ бы своего намѣренія.

(*) Онъ табачной наливки вмѣсто промывательнаго настаиваванной одинъ Врачъ, о которомъ описывалъ г. Геверденъ (Med Translations Vol. 1. p. 45.) больше видѣлъ вреда, нежели пользы.

женъ самъ приготавливать ни нюхать: ибо вѣ-
роятно, что въ такомъ случаѣ глисты прячу-
тся глубже. 5) Намѣревая или испробить вну-
тренними лѣкарствами, не должно предъ тѣмъ
никакъ прикладывавъ снаружи, въ против-
номъ же случаѣ онѣ далеко скрываются. Но есть-
ли больной, спустя нѣсколько времени послѣ при-
нятія противъ глистъ лѣкарства, получитъ
въ какомъ нибудь мѣстѣ внутри брюха жесто-
кую боль и судороги; то сіе значить, что пу-
да собрались глисты и стараются вылезти изъ
кишечъ въ пустую брошную. Для сего долж-
но ихъ отсюда прогнать. А сіе можно сдѣлать
помазавъ на ономъ мѣстѣ вѣселою нефтью (Re-
troicem), либо прикладывая смѣсь умѣренно теплой
густой припарки, изъ полынныхъ верху-
шекъ, чесноку, пшеничной муки и свѣжей сы-
чачей желчи сдѣланной и въ тонкую ветошку
завернутой. 6) За нѣсколько дней прежде прини-
манія лѣкарства, больной долженъ воздерживать-
ся отъ молочнаго кушанья; но напрошавъ много
долженъ употребить суровую, твердую и со-
леную пищу, супъ съ лукомъ, хрѣнъ, порту-
лакъ, кореньями приправленные кушанья, и въ
вечеру, предъ самымъ принятиемъ лѣкарства,
сѣсть кусокъ сельди и великы. Первое имѣетъ
то дѣйствие, что глисты приходивъ въ сла-
бость, ниже опускаются, и следовательно удоб-
нѣе бываютъ ихъ выгнать: а послѣднее спо-
собствуетъ къ тому, что онѣ съ большею жад-
ностью и въ большемъ количествѣ ѣдятъ лѣ-
карства

Порошокъ, который я большею частію про-
тивъ сихъ глистцъ употребляю, составляется
слѣдующимъ образомъ:

R. Sals martis Lond.	Возми марцалальной соли
gr. IV	4 грана,
Semin. Santonic. gr. X	Цыцварнаго сѣмя 10 гра-
	новъ,
Rad. Jalapp,	Ялапнаго корня
Mellis sincer. aa ℥i.	Меду по одному скрупулу
M. E. p. subtil.	Смѣшай и сдѣлай мѣлкій
	порошокъ.

Ялапный корень прежде должно хорошо стѣ-
реть съ сахаромъ

Сего пріема для взрослою человека довольно
но; онъ долженъ принять больной по упру
такъ, какъ выше упомянуто. Еслии ему не-
претивно, то я прибавляю на каждый пріемъ по
одной капля перегоннаго пажмоватаго масла. Когда
больной имѣетъ крѣпкую натуру, то можно
количество ялапы увеличить онъ 5 до 10 гра-
новъ. Еслии же онъ слабаго сложенія, то дол-
жно дать сего порошка небольшоую чайную ложе-
чку. Но еслии сие количество не довольно его
слабитъ; то должно оное чрезъ день, смотря по
сложенію младенца, половиною либо и цѣлою чай-
ною ложечкою увеличить. Во время дѣйствія
сего порошка послѣ всякаго разу, когда поспѣваетъ,
должно давать пить сунъ. Сие лѣкарство боль-
ной долженъ принимать три дни подрядъ всегда
въ началѣ и въ окончаніи ущербу мѣсяца. для
того всякой разъ можно выписывать изъ Апте-
ки по шести шяковыхъ порошковъ. Еслии еще
при томъ выпивать въ сн дни по фунту или по
больше ршущной воды, то тѣмъ скорѣе можно
испре-

испробитъ глисты. Оную же можно пригото-
вить либо вышесказаннымъ, либо нижеслѣдую-
щимъ образомъ:

R. Rad. Gram.	3II.	Возьми корня пырею двѣ
		драхмы,
Flaved Cort. Avrant.	3б.	Желшости померанцо-
		вой корки поадрахмы,
Cinnamon. alb. gr.	VI.	Бѣлой корицы 6 гра-
		новъ,
Aquae fontan lib.	VIII.	Рѣчной воды 8 фун-
		товъ,

Смѣшавши все вмѣсто, вари до тѣхъ поръ,
пока останется только четвертая часть воды.
Послѣ процѣдивши, прибавь два унца ршуши;
напей въ легкомъ духу чрезъ ночь въ хоро-
шо закупоренномъ глиняномъ сосудѣ. По утру
сливши воду, прибавь къ оной нѣсколько чиста-
го меду столько, сколько потребно для прият-
наго вкусу бодьнаго.

Теперь весьма хвалить чай изъ иссопу про-
тивъ глистъ. Онъ вошелъ въ употребленіе
слѣдующимъ образомъ: Одна женщина пила оный
отъ кашля, и каждое утро давала его своему
ребенку также по нѣскольку чашекъ, отъ чего
сей имѣлъ ту пользу, что изъ него вышло ве-
λικое множество глистъ.

Когда младенцъ не можетъ принимать по-
рошка; то я обыкновенно предписываю слѣдую-
щія пилюли:

R. Extract. Tanacet.	Возьми пижмового экс-
Semin. Sapon. contus. aa	тракта,
gr. VI	Столченого дытварнаго
	ѣмля по 6 грановъ,

Salis martis Lond. gr. IV. Марциальной соли 4
грана,

R sin Jalapp. c. amygdal. Ялановой смолы, съ мл -
probe int gr. VI. дальною хворло снор-
той 6 грановъ,

Olei dest illat. Tanacet. Перигоннаго пилмовато
gr. I. масла одинъ гранъ.

M F pilul. gr. II. fol. Смѣшай все вмѣсто, сѣб-
argent. obducend. алы пилюли въсомъ въ
2 грана, посеребри.

Взрослому можно оныхъ давать за каждыиъ
разомъ по 11, а младенцу смотря по различно
возрасту по 3, по 4 или по 5.

Тѣмъ, которые могутъ принимать какъ
порошокъ такъ и пилюли, весьма полезно давать
въ вечеру пилюли, а по утру порошокъ. Одна-
ко въ такомъ случаѣ не должно примѣшивать къ
пилюлямъ яланной смолы, и давать ихъ на каж-
дый прѣемъ только по 8.

Напротивъ того елики младенецъ не мо-
жетъ принимать ни порошка ни пилюль: то
должно давать ему почаще конфектъ изъ пы-
шварнаго сѣмя (*) (*Semen Santonici*), либо
по-

(*) Г. Розенш. говоритъ, что въ нихъ Антекахъ
находяся двоякаго рода сѣмена, ш. е.
Semen Santonici и *semen Zed aiae*. Последние весь-
ма малы и мѣлки, приномъ такъ бывающъ
съ мѣлкими стибельками и чѣсти ази ан-
сиповъ перемѣшаны, что елики давать ихъ
больному, то въ каждомъ прѣемѣ весьма мало
будетъ содержаться самыхъ сѣменъ. По сей
причинѣ лучше собирать Г. Линней вмѣсто
оныхъ собирать полсвой Полюнь (*Abrotanum*
сам-

посыпать овнымъ сѣмямъ хлѣбъ, масломъ или мѣломъ намазанный, и вслѣдъ бѣны и засыпавши припомъ лишь рлупную воду. При семъ можно съ иногда давать по два ушра сряду по не-
большой ложкѣ ревеннаго эликсира (Elixir Rhei.). Но еслили младенецъ во все ничего не принимаетъ, то должно привязывать къ его брюху вышеописанную густую припару, и доставлять ему послѣднимъ промываніемъ свободное испражненіе изломъ.

Когда припадки опять при слѣдующей перемѣнѣ Луны возвращаются; то можно дать младенцу другое какое нибудь лѣкарство, на пр. распустиши въ двухъ синоловыхъ ложкахъ воды 3 или 4 граа желѣзнаго купоросу, прибавить туда нѣсколько меду, и давать принимать сей сосисавъ каждое ушро; потомъ въ послѣдніе дни исхода мѣсяца давать по два ушра сряду въ меду либо въ водѣ, медомъ подслащенной, по 3 капль ревеннаго либо Бургавова эликсира (Elixir prorogatum Boerhaave cum aceto) (Не должно въ худую енѣрону толковать, что въ такомъ случаѣ больной испражнялся чернымъ каломъ, ибо сей цѣль происходитъ отъ желѣза). Либо кельши давать небольшія пилюли изъ дурнаго духу, (Aqua fetida), желѣзнаго купоросу и нѣкотораго количества меду, и посеребривши давать по 2 или по 3 вдругъ, одинъ, либо два раза въ день. А въ послѣдніе дни исхода мѣсяца также да-

Б 5

Ваше

сѣмрепре) и беречь для употребленія. Должно на бѣаться, что Аптекари будутъ послушны сему шоль справедливому совѣту.

нать вышеупомянутый эликсиръ, дабы нѣсколь-
ко слабило. При употребленіи сихъ пилюль киш-
ки наполняющіяся противнымъ запахомъ и вку-
сомъ, отъ сихъ лѣкарствъ происходящимъ, по-
чему глистамъ мѣсто пребыванія ихъ стано-
вится несноснымъ и заставляетъ ихъ оное оста-
вить. Пилюли можно давать въ яблочномъ мар-
меладѣ, либо въ подобномъ тому. (Confeg. v. Swieten
Comptemat. T. 4. p. 733). Можно также вмѣсто
оного эликсира дать слабительный порошокъ,
слѣдующимъ образомъ составленный: Возьми
ялапного корня 12, 15 либо 20 грановъ, сопри въ
вѣсма мѣлкой порошокъ съ равнымъ количе-
ствомъ сахару, прибавь одну каплю коричнеаго
масла, и раздѣли на двѣ части. Оный скоро и до-
вольно слабитъ.

Г. Биссетъ вѣсма похваляетъ прошивъ
глистъ, а особливо прошиву круглыхъ, листы но-
нчей чемерицы (*Helleborus foetidus* Linn. f. *Helle-
borus* max. Gesner). Онъ ихъ употребляетъ
двоимъ образомъ: либо ссушивши и столкну
въ мѣлкій порошокъ, даетъ взрослымъ по 15
грановъ, либо выжавши изъ нихъ сокъ, варитъ съ
сахаромъ сиропъ и даетъ по одной драмѣ или
побольше. (*)

Г.

(*) Въ Клевеландскомъ Герцогствѣ (Bisser's Essay
on the medical conjunction of Great-Britain p. 333.)
наипаче листы сей травы заслужили себѣ
похвалу. Она растетъ въ Швейцаріи, въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, въ Англіи и
Франціи, и въ Регнаулшовой Ботаникѣ подъ
ложнымъ названіемъ *Hellebore noir*, *Pied de Griffon*
ошрисована. Простой народъ въ Клевеландѣ
дѣ-

Г. Бровнъ (*) еще въ 1757 году въ писанной имъ Ямайской натуральной Истории почишаетъ несравненнымъ противъ галстѣ лѣкаршвомъ

ра-

дѣтямъ отъ 5 до 7 лѣтъ даетъ воды съ свѣжими диспанн вареной по одной драхмѣ, а порошки изъ оныхъ до 15 грановъ, продолжая по два либо и по три утра сряду. Настоящий пріемъ почти всегда большую производитъ рвоту и часто легкій поносъ, а слишкомъ увеличенный причиняетъ великую тошкитосность, которая однако, лишь только начнетъ рвоту, проходитъ. Что же касается до вредныхъ либо и смертоносныхъ дѣйствій, которыя ей приписываетъ г. Коокъ (*Oxford's Magazine for March, 1769. p. 99.*), то оныхъ г. Биссетъ не видѣлъ. Онъ также въ своей Практикѣ совѣтуетъ лучше употреблять сиропъ изъ соку, изъ листовъ сей травы выжатого и съ сахаромъ свареннаго; однако онъ прежде выжиманія помачиваетъ не много сполченые сіи листы въ виноградной укусѣ съ тѣмъ, чтобъ нѣсколько уменьшитъ ихъ дѣйствіе. Сего сиропа можно давать по одной чайной ложечкѣ въ вечеру, и также по одной либо по двѣ по утру по два или три дни сряду младенцамъ отъ двухъ до шести лѣтъ. Напоследокъ еще сей Сочинитель опытомъ дозналъ, что полезно оный на тощѣ конецъ, чтобъ слабило, смѣшивая съ равнымъ количествомъ спиритовенной настоекъ (Tinctura thei spiritiosa). М.

(*) Самое исправнѣйшее описание и рисунокъ однолѣпняго сего растенія оставилъ намъ г. Линней (*Amoen. acad. Vol. 5. p. 133. 149. Tab. 2.*), который его называетъ *Spigelia anthelmia*. Оно обыкновенно растетъ въ южной Америкѣ, а именно въ Бразиліи само собою; въ восточной

растѣіе, Спигеліевою глосивницею (Spigelia) отъ Линнея названное. Онѣ совѣтуетъ оное варить двѣ горсти въ двухъ фунтахъ воды до тѣхъ поръ, пока половина оной выпарится. Послѣ того процѣдивши, прибавляетъ къ ней для приятности вкуса нѣсколько лимоннаго соку и сахару,

и

ной же Индін, а особливо въ Ямайкѣ, садятъ его въ городахъ. Г. Цамприккѣ Бровнѣ (Gentleman's Magazine 1751. р. 544.) первый описалъ оного дѣйствіе противъ глоснѣ и повѣстивуемъ, что оно въ нѣкоторыхъ Англическихъ Колоніяхъ въ Америкѣ съ великою пользою употребляемо было. По послѣднему повѣствованію г. Бровна (Natural History of Jamaica 1756. р. 156.) не только корень, но и цѣлѣ растѣіе либо сухое либо свѣжее такъ, какъ и фрѣ Р. упоминаемъ, можно употреблять. Послѣ того дѣланы также опыты надъ нимъ и въ Европѣ, а наипаче въ Англіи. Г. Броклесби (Observations on cal and medical observations р. 282 199) вучвъ травы съ корнемъ около драхмы, наливалъ чашыцѣмъ унцами кипячей воды, и настоявъ давалъ на три приема въ то или 14 дней, онъ чего онъ видѣлъ пользу; онъ также упоминаетъ, что Генклей настоявалъ двѣ драхмы травы сего растѣія шестью унцами воды. Однако г. фрѣ Свипенъ (Commentarij. Т. 4. р. 737) весьма не похваляетъ Спигеліевою глосивницу: ибо ему нѣкто въроизія достойный слызвалъ, что ее въ Америкѣ Французы прозвали Бланковомою отравою, и что она чрезвычайную производилъ ревну и весьма сильно слабилъ. Кромѣ Бровна повѣствуютъ также Броклесби и др. тѣ, что она въ издѣіемъ будучи употреблена колическѣ, такое оказывалъ дѣйствіе, какъ онъ (орум) и производилъ круженіе головы, судороги, сонъ и проч. М.

и даетъ больнымъ по два, по три или по четыре унцѣ чрезъ каждые шесть или двенадцать часовъ чрезъ три дни сряду, потомъ даетъ слабительное, съ которымъ непременно выходятъ глисты. Г. Бровиъ повѣствуетъ, что сие питье виводитъ соръ такъ какъ опій, однако больной послѣ оного бываетъ бодръ и имѣетъ веселые глаза. Въ Россіи одинъ Врачъ съ великою пользою употреблялъ сие лѣкарство. Я слышалъ, что и г. Бергъ его хвалитъ; г. Даббергъ одобряетъ его также въ писанномъ ко мнѣ имъ письмѣ. Онъ упоминаетъ объ одной женщинѣ, которая весьма много страдала отъ глистъ и имѣла смѣшеніе въ груди: но когда она сшила употребляя Сингеллеву глистницу, то у нее вышло 13 круглыхъ глистъ. Онъ даетъ сей травы по два либо по три раза въ день въ порошкѣ до 25 грановъ, а пивки отъ 1 до 2 и до 3 драхмъ. Такимъ образомъ велитъ продолжать больнымъ чрезъ 14 дней, но при томъ каждый третій либо четвертый день даетъ имъ слабительное, съ оною же смѣшенное. По увѣренію его она, будучи употребляема въ такомъ количествѣ, не производитъ ни сна, ни другихъ какимъ либо худыхъ слѣдствій (*).

(*) Никогда не должно смѣшивать сей травы съ другими видами. Какъ на пр. *Spigelia marylandica* L. Indian Pink, которая есть четырехлѣтнее растѣніе, растетъ въ Сюдкарولينѣ, и употребляется оной одинъ только корень. Она такъ же въ *Essays and Observations physical and literary* Vol. 3. p. 151. описана и описована. О ея

Я часто съ великою пользою младенцамъ давалъ настойку, изъ одного унца толчената дѣтскаго сѣмян и одного фунта спирту сдѣланную. Для сего должно, смѣшавъ обѣ сѣи вещи, чрезъ нѣсколько дней настоявъ, послѣ процѣдить и самый крѣпкій спиртъ вымѣтивъ. Въ сей настойкѣ я распускаю нѣсколько Марціальной соли и даю по небольшой дѣтской ложкѣ каждыя утро при продолженіи ущерба мѣсяца, а на послѣдокъ два дни сряду даю слабительное, вышеписаннымъ образомъ изъ мланнаго порошка приготовленное.

Г. ф. Г. Фишеръ весьма похваляетъ экстрактъ изъ незрѣлыхъ орѣховъ, съ водою сдѣлан-

ся весьма хорошемъ противъ глицъ дѣйствіи Шарлесковскіе, Линнѣйскіе (тамъ же Vol. 1. p. 436. 1799.) и Гарденскіе Врачи (на сказ мѣст. Vol. 3 p. 145. 1799.) весьма увѣрительно утверждаютъ. Для двуклѣпняго младенца большею частію на одинъ прѣмъ довольно бываетъ 12 грановъ въ порошокъ и 20 грановъ въ чаю: а для взрослыхъ порошка требуется отъ 60 до 70 грановъ, а наливши отъ 2. 3. до 4 драхмъ. Отъ сего растѣнія, равнымъ образомъ и въ излишнемъ количествѣ принятаго, кружится голова, дѣлается обморокъ и шемнота въ глазахъ, производящъ судорги въ глазомъ являющъ и другіе припадки, которые однако неопасны и удобно излѣчиваются. Корень слабѣе, а естели сего дѣйствія не производящъ, но едва можно отъ него ожидать успѣху. Для того иногда нужно бывающъ къ оному примѣшивать сладкую рпушь либо ревенъ. Большею частію весьма полезно бываетъ прежде того дать рвотное. Смотр. Appar. medicam. Murray T. 1. p. 362. M.

данный, который по увѣренію его въ двѣ минуты умерщвляетъ дождеваго червя. Онъ распускаетъ его двѣ драхмы въ четырехъ драхмахъ коричной воды, и даетъ двухлѣтнимъ и трехлѣтнимъ младенцамъ по 50 капель. Послѣ того спустя 6 или 8 дней, даетъ имъ со ршутью составленное слабительное (*Saxana mecuriale*).

Г. Докторъ де Лилль въ своемъ Сочиненіи о прелетаніи сердца весьма похваляетъ составъ изъ одного скрупула экстракта черной чемерицы (*Nelleborus niger*) и полскрупула желѣзнаго купороса, который онъ распускаетъ въ одномъ унціи воды кудряваго йолча (*Aqua cardui benedicti*), послѣ подслащиваетъ небольшимъ количествомъ фиалковаго сиропа либо меду на пр. драхмою (*). Младенцы могутъ принимать оного по чайной ложкѣ наощахъ.

Чеснокъ также можетъ быть хорошимъ домашнимъ лѣкарствомъ противъ глистъ для тѣхъ, кои къ употребленію его не весьма привыкли. Онъ можно есть наощахъ по одному, по два или по три зубчика, либо съ хлѣбомъ, масломъ намазаннымъ, либо мѣлко сѣзавши принимать въ молоко. Нѣкоторые младенцы еще избавились отъ глистъ, принимая по четыре либо по шести столовыхъ ложекъ

ро-

(*) Описанный здѣсь составъ съ рецептомъ г. де Лилля (*Tractatus de palpitatione cordis* p. 253) не сходствуетъ потому, что по оному еще прибавляется три драхмы крѣпкаго слабительнаго Гамеховаго конфекта (*Confectio Hamesh*). Г. Ф. Р. также употребляетъ его собственнымъ ему образомъ.

росолу изъ коровьяго масла. Ибо естѣли его такимъ образомъ чрезъ нѣсколько дней принимашь, то оубо начинается сладость и выгоняетъ глисты. Свѣжая морковь также выгоняетъ оныя, естѣли дитя можетъ ее сколько есть, чтооубо она произведетъ поносъ. Равную приносятъ ползу березовица и сосновый сокъ, когда ихъ кпо употребляетъ до тѣхъ поръ, пока они не произведутъ вышеписаннаго дѣйствiя.

Естѣли же глисты которыми нибудь изъ вышеписанныхъ ахарсовъ (у лунъ выпаны: но должно оное нѣсколько разъ сряду во время новаго ущербу мѣсяца такимъ же образомъ, какъ и прежде повторяшь, дабы ничто изъ слѣдъ насѣкомыхъ либо изъ ихъ яицъ не осталось. Сверхъ сего надо также стараться желудокъ и кишки привести въ прежнюю крѣпость. Для того полезно давать младенцамъ до 30, 40 или и до 60 капель горькой ревенной настойки, (Tinctura Ictem ga Edinb.) съ виномъ сладкою. А естѣли оная не довольно укрѣпляетъ, то я нѣ даю чрезъ нѣсколько недѣль сряду въ такомъ же количествѣ Лондонское маршальное вино (Vinum chalybeatum Lond.).

Естѣли кто страдаетъ глистами, будучи одержимъ какою либо воспалительною болезнью, то я возмущу лишь ртутную воду, и въ оной вмѣсто меду прибавлять сырую лимонной кислоты (Syrup s aceti limonis citi) по столько, сколько того требуетъ прiятность вкуса и жидкости больного; либо чай съ лимоннымъ сахаромъ или съ лимоннымъ мармеладомъ. Можно также оную замѣнить, смѣшавъ вмѣсто двѣ части деревян-

наго

нато мисла, одну часть лимоннаго соку и одну часть мѣлкаго сахару и давали больному по 4 или по 5 рѣзъ въ день по столовой ложкѣ; либо можно ввести въ обыкновенное его питье нѣсколько капель фіялковой настойки (*Tinctura violae*), чтобы оно нѣсколько было кислото. Сверхъ сего я велю прикладывать къ брюху вышеупомянутую густую примочку, изъ полыни, бычачей желчи и проч. сдѣланную. Известно также, что канфара выгоняетъ глисты, притомъ она равна какъ и уксусъ въ воспалительныхъ болѣзняхъ приносить облегченіе, для того полезно въ семъ случаѣ сдѣлать слѣдующее питье: Взявъ одну драхму канфары, и, положивъ въ каменную ступку, помель на нее 15 капель спирту, дабы удобнѣе растереть; потомъ хорошо стерши, смѣшавъ съ двумя унциями мѣлкаго сахару, растутили все въ 10 унцахъ хорошаго винограднаго уксусу и давали больному по столовой ложкѣ каждый часъ, либо чрезъ два часа.

Всего труднѣе выгнать всю плоскую глисту. Причиною сему бывають отчасти ея длина и многочисленныя кривизны кишекъ, а отчасти то, что она, пока не умретъ, всегда прикрѣпляется къ кишкамъ посредствомъ своего тонкаго конца и ртовъ, въ сосисахъ находящихся. Потому по большій, когда ее выгоняють, претерѣваютъ великія мученія. Если бы мы имѣли такое лѣкарство, которымъ бы можно ее, не причиняя никакой боли въ желудкѣ и кишкахъ, умертвить: тобы легко мы могли ее сдѣлать. Ибо она въ такомъ случаѣ, будучи мертвая, не въ состояніи бы была вышеупомянутымъ
В
остро-

остроконечіемъ и ртани прикрѣпляться; но свободно бы въ оныхъ лежа, вмѣстѣ съ каломъ вонъ испражнялася. Однако въ несчастію мы еще лишены такого средства.

Я уже упомянулъ, что она извивается въ полоскательной чашкѣ, естли на нее налить теплой воды; но напрошивъ того въ мгновеніе ока опускается на дно и лежитъ замертво, коль скоро пуща елишь холодной воды. Сіе самое заставило меня думать, что ее можно выгнать холодною водою, естли, давъ прежде больному слабительное, въ то самое время, когда оно начинаетъ оказывать свое дѣйствіе, ввести оную и въ довольномъ количествѣ. Я себѣ представилъ, что холодная вода въ сосиски слѣдуетъ острый ея конецъ недвижимо и опорождать отъ внутренней поверхности кишекъ ея насосы, и такимъ образомъ она будучи не въ силахъ болѣе прикрѣпляться, должна вытѣснѣ съ каломъ во ѣ выйти. Я сообщилъ сіе мнѣніе г. Дарелли, коимъ Медицинскимъ факультетомъ былъ определенъ во унсалъ для пользованія убогихъ больныхъ, на кошты умершаго Бишофа Д. Калсеніуса, содержащихся при Сепрскихъ цѣлебныхъ водахъ, и просилъ его при случаѣ испытать, справедливо ли оное, или нѣтъ? Въ слѣдствіе чего онъ, спустя давъ недѣли послѣ того, прислалъ ко мнѣ одну пласкую глесту, симъ способомъ изъ нѣкоторой дѣвки выгнанную, которая была длиною въ 17 аршинъ и еще вся цѣлая. Острый ея конецъ еще былъ неповрежденъ и на самомъ окончаніи

бнаго

бываго можно было примѣнить небольшой буро-рогъ съ четырьмя по сторонамъ дырочками, которыми иногда явственно, посредствомъ увеличительнаго Куфрова стекла, были видимы, а теперь и одними глазами ихъ можно видѣть. Ибо она и по сіе время въ числѣ другихъ, примѣчанія доспѣвшихъ вещей, въ Упсальской Гошпитали содержится. Потомъ г. Дарелли вынулъ еще многія глицеры симъ способомъ, не упоминая для сего никакихъ слабишальныхъ, кромѣ яланповаго корня по утру, и такъ называемой проносной настойки (*Tinctura catholica*) Д. Рошена послѣ объѣда (*) Симъ самымъ способомъ

В а

также

(*) Сія настойка, или эссенція, какъ ее Рошенъ называетъ, описана въ его начальномъ введеніи къ *Limén* (6. Aufl. S. 135.) слѣдующимъ образомъ:

- | | | |
|-----------------|------|------------------------|
| R. Rad. Jalapp. | ЗVI. | Возми яланпата корня 4 |
| | | унца, |
| Semla. Cathart. | ЗI. | Желтѣяничнаго сѣмя 1 |
| | | унца, |
| Scammon. optim. | Зз. | Скаммону самого лучша- |
| | | го полунца, |
| Gummi Gut. | ЗII. | Желтой гумми 2 драхмы. |

Столяши все въ крупный порошокъ, налей одною либо полторы буштыками спирту, чрезъ лимонную корку или иному подобное перегнаннаго. Поставь въ теплое мѣсто, и когда спиртъ покраснѣетъ, то слившй его, налей опять онаго полбуштыки или больше; и настой такимъ же образомъ. Сливши оба сіи спирты вмѣсто, настой еще третию частью новаго спирту. Лезекъ (*Auletiense Arzneiweis* S. 134.)

мзз

также многихъ выѣчилъ онъ глистъ г. Линдагуапъ, пользуя больнымъ при цѣлительныхъ водахъ, равно какъ и выѣшній. г. Професоръ Сидрей, послѣ него шуда опредѣленный. Если бы вода въ желудкѣ и въ кишкахъ могла быть чрезъ полчаса либо и чрезъ нѣкій часъ холодною либо можно бы было время такъ опредѣлять, чтобы

называетъ сию шинку у *Elmer pignus Michaelis* и соснавляетъ ее нѣкимъ образомъ. Понемѣ въ оную входитъ желтая камедь (*Gutti Guttae*), которой дѣйствіе изъ новѣйшихъ опытовъ извѣстно; но она дѣйствуетъ не такъ какъ простое слабительное. Еще покойный г. Совѣт. Вергофъ, котораго пракъ почитаютъ попомки, съ пользою предписывалъ сгущенный сей сокъ противъ плоскихъ глистъ. Покойный Калпшмидтъ (*Progr de Thapsia*) упоминаетъ также о семъ ея дѣйствіи. Г. Биссепъ (*Med. Essays and Observations* стр. 192) въ разсужденіи употребленія желтой гумы (*Gamboge*) говоритъ пространно. Онъ дѣлалъ ее нѣ которому фланскому Капитану (стр. 192) сперва по 15 грановъ, смѣшавши съ горечавковымъ экстрактомъ (*Extracium Gentianae*) и сдѣлавши изъ нихъ при илюли, изъ которыхъ онъ принималъ двѣ въ вечеру ложась спать, а одну слѣдующаго утра, а послѣ того спустя одинъ, или больше дни по 20 грановъ съ нѣкимъ же экстрактомъ и въ тѣхъ самыя времена. Онъ чего вышелъ у него больше куски плоскихъ глистъ и великое множество малыхъ. При употребленіи сего лѣкарства совѣтовалъ онъ (стр. 195.) лежать въ постели до тѣхъ поръ, пока не начнетъ слабить; естли сидѣть, либо ходить, шо удобно можетъ
во

впасть въ ту самую минушу, когда начинаетъ слабительное оказывать полное свое дѣйствіе, ее пить, и принять бы она топчась изъ желудка въ кишки выходила; тобы никогда сіе средство не было обманчивымъ. Но какъ не всегда сіе удается, то должно многократно сіи способъ повторять, дабы онъ него видѣть насмѣшную похвату (*).

При цѣлительныхъ водахъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Больной, страдающій плоскими глистами, по привычкѣ своимъ къ онимъ, послѣ вояжу одинъ день ошдыхаетъ; потомъ обыкновенно принимаетъ слабительное и пьетъ по ушрамъ чрезъ 7 или 8 дней минеральную воду. Привычки такимъ образомъ къ холодной водѣ, принимаетъ въ надлежащее время по ушрамъ слабительное, составленное изъ пр. изъ поддрахмы или изъ двухъ скрупуловъ яланного корня, либо изъ полуунца или и цѣлаго унца винокламенно-щелочной Сейгистовой соли (*sal polychrestus Seigwee*). Послѣ того, какъ только примѣнитъ, что онъ уже начинаетъ дѣйствовать, выпиваетъ

Ѣ 3

етъ

воспослѣдовать рвоты: сверхъ сего похваляетъ онъ ее и противъ круглыхъ глистовъ для взрослыхъ людей. Г. Герреншванда лѣкарство также содержитъ въ себѣ, какъ ниже будетъ упомянуто, желую гумми. М.

(*) Сіе самое лѣкарство можно также употребить и противъ круглыхъ глистовъ. Г. фанъ день Бошъ Н. Ног. солитик. ерд. вегт. л. стр. 352 повѣствуетъ, что нѣкоторые люди, принявъ крѣпкое слабительное, съ пользою пили великое количество холодной воды. М.

стѣ первый стаканъ минеральной воды и повто-
ряетъ оный каждыя три, четыре, или пять
минутъ, не смотря на то, что одну ли, пол-
тора или и двѣ бутылки оной выпьетъ. Ибо
она скоро испражняется низомъ, и потому сво-
имъ количествомъ не можетъ причинить ника-
кого вреда. Только не должно ее пить чаще се-
го, потому что она скорѣе не можетъ выходить
изъ желудка въ кишки. Еслили въ такомъ случаѣ
выдетъ цѣлая глениа, и боляго оспанку оной ни-
какнхъ не остается знаковъ, то симъ прекра-
щается и все лѣчение. Еслили же она не выхо-
дитъ, либо выходяшъ только нѣкоторыя ея части,
то спустя одинъ день, опять се повторяющъ,
и въ случаѣ надобности послѣ обѣда принимаетъ
болягой отъ бо до 100 капель вышепомянутой
слабительной Ротенцовъ настойки, съ столовою
дошкою жищерового сыропу (*figurus e trina cervi-
na*) хорошо смѣшенной. Когда же она и послѣ
сего не выходитъ, что иногда бываетъ рѣдко,
то останавливаютъ больного въ покой и даютъ
только по утрутамъ обыкновенную мѣру воды; а
потомъ продолжаютъ опять лѣчить его такимъ
же образомъ два утра сряду. И симъ способомъ
его врачуютъ до совершеннаго выздоровленія.

Нѣкоторая Госпожа, просившая прежде у
меня совѣта въ разсужденіи претерпѣваемыхъ
ею отъ плоскихъ глений припадковъ, на мое
требованіе прислала ко мнѣ подробное описаніе
своего состоянія, въ которомъ она тогда нахо-
дилась. Но понеже оное не только подтвержда-
етъ выше мною сказанное; но еще и содержитъ

и себѣ другія различныя полезныя, касательныя ей манеры, примѣчанія — по и за нужное почелъ здѣсь привести собственные ея слова.

„Мои родичи мнѣ сказывали, что я въ младенчествѣ была больна глистами. Впрочемъ я не помню за собою никакой болѣзни до самаго 1742 года, въ которомъ мнѣ исполнилось 20 лѣтъ. Вамъ извѣстно, Господинъ Архиащербъ! что тогда была вездѣ мода пить горькую воду. Я оную также пила, сама не зная для чего, по тому что не чувствовала въ себѣ никакой болѣзни, выходящая тогда изъ желудка пупырышковъ безо всякаго вѣща, голубые у меня на шѣѣ были видимы. Спустя три или четыре недѣли, впадала я въ сильную горячку, которая была соединена съ судорогами. Послѣ того хотѣла горькую продолжать, однако судорги чрезъ цѣлый годъ съ болѣею то съ меньшею жестокости продолжались. О плоскихъ глистахъ мнѣ и въ умъ тогда ни однажды не приходило. Я еще теперь помню, какія употребляла лѣкарства. Въ 1741 году весною вы предписали мнѣ пить сыворопку съ сокомъ, изъ ибунки (Vesca-bunda) и изъ лопечной травы (Cochlearia) выжатымъ. Я пила оную чрезъ 5 или 6 недѣль, и въ самомъ дѣлѣ не только поправилась, но и совершенно чрезъ нѣсколько лѣтъ была здорова. Въ 1747 году, лѣтомъ, пила я цѣлительную Тиргартенскую воду, хотя и не ощущала въ себѣ никакой болѣзни. Признаюсь также, что я пила ее безпорядочно и не наблюдая притомъ никакой диеты. Спустя послѣ того четыре недѣли, выпила я по случаю рюмку Мозельскаго

нина, которое было несколько затхло и противно. Опѣ чего мнѣ пошасъ спало много и чрезъ часъ я впала въ обморокъ. Въ слѣдующую ночь почувствовала я деспкій рѣзъ около пупка и не-
сносную боль подѣ желудкомъ, которая хотя послѣ и прошла, однако чрезъ каждые пять дней возвращалась. Тогда я рѣшилась сама собою принять слабительное. И вспомя о Ропеновой слабительной пастойкѣ, о которой вы мнѣ сказывали, приняла въ одинъ день, когда мои припадки нуще ожесточились, двойной оной приемъ посладивши сиропомъ. Чрезъ часъ начало меня сильно слабить, и напоследокъ вышло 5 аршинѣ плоской глисты, которую я въ первый еще разъ увидѣла и ее пошчасъ къ вамъ послала. Послѣ того рѣзъ унялся и я могла спокойно спать: однако была весьма слаба. Въ 1748 году была я Нормалмскую вогу чрезъ 10 недѣль сряду. Въ то время часто выходили изъ меня куски плоской глисты, однако всегда только тогда, когда я принимала по утру оную слабительную пастойку. Впрочемъ она въ то время не дѣлала мнѣ столько тревоги, сколько прежде принимала; и сіе можетъ быть пошому, что холодная вода нѣсколько червя обезсилила. Но во всякое время, когда я ни принимаю сіе или другое какое нибудь слабительное, весьма должна беречься рвоты, отъ которой только шѣмъ и избавляюсь, что тогда какъ въ пищу, такъ и въ питье употребляю все холодное. При продолженіи употребленія слабительной воы, когда я принимала слабительное кромѣ обыкновенной мѣры, шла оную

все

все преждеробѣденное время до шѣхъ порѣ, пода-
саившееся дѣйствовало, а за тѣмъ слѣдовало
мнѣ облегченіе. Въ одно лѣто вышло изъ меня
20 аршинъ плоской глисты. Сіе самое слабитель-
ное я употребляла и послѣ того чрезъ все время,
когда была бодна глистами. Однако напослѣ-
докъ оное столькожъ мало пропихивъ ихъ дѣй-
ствовало, какъ и Корнахиновъ порошокъ (Pulvis
Cognaschi). Тогда вы мнѣ совѣтовали принимать
по вечерамъ отъ 10 до 12 капель Диппеліеваго
масла (Oleum anisale Dippelii), а по утрумъ и слѣ-
дующее слабительное. Я сіе дѣлала, пропуская не-
сколько между шѣмъ времени, чрезъ цѣлый годъ
съ такимъ успѣхомъ, что каждыиъ разъ, когда
только я принимала сіи лѣкарства, выходила
часть плоской глисты. Но когда я одинъ разъ
не приняла оного масла: то глисты нимало не
вышло. Напослѣдокъ мнѣ и оное весьма спало про-
тивно. Въ 1753 году вознамѣрилась я при Норр-
маамскихъ водахъ все свое стараніе употребить,
чтобъ выльщиться совершенно отъ глистѣ.
Для того принимала каждый вечеръ цуцварное
сѣмя (Semen Santonici), смѣшивая оное въ первые
8 дней съ небольшимъ количествомъ сѣрныхъ
дрѣзговъ. Но послѣ принуждена была оныя осна-
вить потому, что чувствовала отъ нихъ ночью
жаръ и безпокойство, хотя и прочемъ и видѣла
отъ нихъ явственную пользу, ибо всегда мнѣ
было примѣтно, что они глисту безпокоили.
Въ то время чрезъ каждые три дни по утрумъ
принимала я слабительное, либо изъ Корнахиноваго
порошка, либо изъ винскамонной слочной Сейтне-

твоей соли согорящее. Последнее изъ сихъ двухъ лѣкарствъ лучшее оказывало дѣйстви-
 тельно же оной соли должна была я употреб-
 ляшь за однимъ разомъ; по сему научили меня
 собственные опыты, которые я въ прежніе годы
 надъ собой дѣдала. Ибо я примѣтила, что ес-
 ли либо слишкомъ много, либо часто ее при-
 нимаю; то не выходитъ глѣзта. Всегда прежде
 принятия оной чрезъ два дни должна была ее
 пишемъ воды изнурять, или пониже въ киш-
 ки опшлоскивать. Въ каждый третій день, какъ
 я уже выше упомянула, принимала слабительное,
 и спустя нѣсколько потомъ пила по 12 или
 по 14 фунтовъ воды. Я не запомню, чтобъ
 когда либо такимъ образомъ не выгнала нѣкто-
 рой части глѣзны. Наврошивъ того въ шѣ дни,
 въ которые не принимала слабительнаго, пила
 оной только по 6 фунтовъ.

„ Все сіе я продолжала чрезъ пять недѣль
 съ такимъ успѣхомъ, что вышло изъ меня 80
 аршинъ плоской глѣзны. Самый длиннѣйшій
 кусокъ оной былъ длиною въ 20 аршинъ. Кромѣ
 сего кажется мнѣ, что нѣкоторая еще часть
 оной осталась въ мокротахъ, ибо я иногда въ-
 оныхъ при испражненіи явственно примѣчала
 край глѣзны. Однако сіе лѣчение меня такъ
 истощило, что я, не смотря на то, что бла-
 го 4 раза въ день, весьма была суха и въ такую
 пришла слабость, что чрезъ долгое время не
 могла возвратитъ прежнихъ своихъ силъ. Въ
 1754 году опять я употребляла оную воду
 вмѣстѣ съ двѣма же лѣкарствами, только слаби-
 тель-

предельное принимала по одному разу въ недѣлю; послѣ онаго также всегда выходило по нѣскольку аршинъ глисты, которой однако я не мѣряла.

„Наконецъ чрезъ нѣсколько лѣтъ находилась я въ добромъ здоровьи. Но когда въ ожиданьи мнѣ сказали, что я до тѣхъ погѣ не могу быть свободна отъ сей глисты, пока она не выйдетъ вся съ своимъ острымъ концомъ. то я рѣшилась опять въ 1758 году пить цѣлительную воду. Для того добжала въ деревню и пила тамъ родниковую воду, которая, по опытамъ и увѣренію нѣкоторыхъ, въ разсужденіи своего свойства сходствуетъ съ минеральною Норрмалмскою. Въ случаѣ же, когда она мнѣ причиняла запарѣ, иногда я пила по два или по три стакана горькой воды, и употребляла также между тѣмъ два раза свои вышеписанныя слабительныя. Однако въ то время изъ меня никакихъ глистъ не выходило, не знаю, потому ли, что сія вода была не хороша, или, что я недостаточно холодную ее пила, или что не принимала по вечерамъ цыцарнаго сѣмля. Въ осени опять глиста, которая чрезъ долгое время всегда почти пребывала покойна, начала мнѣ причинять новыя безпокойства, и ежедневно почти больше или меньше ихъ дѣлать.

„Для меня странно то, что я чувствую до обѣда нѣкоторое стѣсненіе подъ желудкомъ и сжатіе во всемъ желудкѣ, которое до того увеличивается, что у меня по лицу течетъ холодный потъ, и я сама едва не падаю въ обморокъ. Однако онаго еще со мной не случалось.

Болезнь

Большую часть сіе продолжается не долго, только часто приходитъ. Впрочемъ однажды въ осени оно меня мучило чрезъ 14 дней; отъ чего я даже и ночью пробуждась. Теперь я намѣрена, еслили время позволишь, принявша за то же лѣченіе, которое употребляла въ 1753 году, и надѣюсь симъ способомъ совершенно избавиться отъ глнстъ. На требованіе ваше, г. Архіатеръ! прибавляю я сюда еще нѣкоторыя обстоятельства. Когда я встаю по утру изъ теплой постели, то весьма должна беречься, чтобъ не простудить себѣ спины. Ибо въ такомъ случаѣ тотчасъ я чувствую такой рѣзъ около пупка, что должна согнуться, и не въ состояніи бываю ни стоять ни сидѣть прямо. Кромѣ сего еще подергиваетъ меня въ спинѣ. Но продолженіе сего такимъ образомъ чрезъ часъ или болѣе слѣдуетъ поносъ. Послѣ того все обыкновенно на сей разъ перестаетъ, однако иногда многократно въ день возвращается, и каждый разъ одинакое имѣетъ продолженіе. Иногда такимъ образомъ по временамъ приходитъ чрезъ нѣсколько дней сряду. Впрочемъ я обыкновенно, когда только время позволяетъ, въ самомъ началѣ стараюсь сіе прекращать, ложась тотчасъ въ постель, и еслили сіе усилію заблаговременно ослабѣть, то тогда проходитъ безъ поносу. Въ такомъ случаѣ я лежу въ оной часъ или полтора часа, т. е. пока не согрѣюсь; послѣ того остаюсь почти совсѣмъ безопасно въ тотъ день. Тогда самое со мной бываешь и тогда, когда я ѣмъ холодно, либо что нибудь сладкое. Больше всего беспокоитъ меня глнста "до обѣда, и еслили я

не

не имѣю отъ нее никакого мученія въ сіе время, но и цѣлый день остаюсь отъ онаго свободна. Прежде я думала, что сіе происходитъ отъ того, что я не завтракаю; однако ошиблась. Ибо когда глосна захочетъ меня мучить, то кушанье не помогаетъ. Однако по большей части по утру я не бываю тогда потому, что въ такомъ случаѣ сосаніе ея становится мнѣ несноснымъ. Въ окончаніи исхода мѣсяца и въ началѣ новомѣсячія больше я чувствую мученія; отъ лѣкарствъ же я чувствовала одинакое облегченіе какъ въ первое, такъ и въ послѣднее время. Равнымъ образомъ безмокишь меня глосна и тогда, когда я подвержена бываю только нашему полу свойственнымъ припадкамъ. Мясное кушанье для меня всего полезнѣе, а наибаче въ вечеру. Какъ я однажды въ вечеру мяса не ѣла, но поѣла одною только супу, то въ самую полночь пробудилась отъ сильнаго сосанія ниже груди, которое чуть меня не ввергнуло въ обморокъ, и мнѣ казалось, какъ будто бы я вовсе ничего не ѣла: однако я не могла встать, но прекратила сіи припадки выпивъ спаканъ холоднаго нива. Я примѣтила, что наилучше для меня молока съсѣмъ не употреблять. Какъ я однажды чрезъ 6 лѣтъ отъ онаго воздерживалась; то всегда со мной дѣлалось хуже, когда я его хотя не много отвѣдывала. Но когда заключала, что уже съсѣмъ освободилась отъ глосны; то начала опять встать молочное, отъ чего не примѣчала никакихъ безпокойствъ до самаго 1759 года, въ которомъ она опять начала меня преслѣдовать. Тогда я

опять

опять оставила молоко. Я опасаясь, не отъ молока ли она выросла болѣе и получила новыхъ силы. Вязаная рыба, а особливо когда она лежала прежде въ росолѣ, для меня вредна. Иногда мнѣ худо дѣлалось отъ одного запаха, отъ росолу происходящаго. Всѣ кушанья, крѣпительными такъ называемыя, для меня вредны, равно какъ и смѣшенные съ сахаромъ, сладкія и приправленные пряными кореньями. Отъ сладкихъ винъ также я получаю тошноту. Пряный хлѣбъ мнѣ вредитъ. Впрочемъ чай, кофій, соленыя и копченныя вещи (что другимъ покажется страннымъ) мнѣ никогда не причиняли безпокойствъ такъ какъ и самый лукъ. Хлѣбъ же, въ супѣ, въ холодной водѣ, либо въ чаю размоченный, для меня вреденъ. Для того я всегда принуждена ѣсть оный сухой.

„Отъ горькой воды никогда у меня ни одного куска глисты не выходило, хотя я оной въ 1750 году и довольное количество пила. Того рода глисты, которыя бываютъ подобны огуречнымъ семенамъ, я никогда у себя не примѣтила; напротивъ того самыя малыя глисты съ красными головками (Engerlinge) одинъ годъ я видѣла въ великомъ количествѣ. Они выходили не отъ слабительныхъ, но отъ наслаивавшихся промывашельныхъ. Брюхо у меня не распухаетъ и не втягивается внутрь, но дѣлается твердо; когда глиста держится въ верху, и когда я по утрамъ нарочно, либо по какому нибудь случаю претерпѣваю отъ нее безпокойство. Въ то время я всегда, для освобожденія отъ шажестей

грудн

Трудн и брюха, должна бываю съ себя спать даже
косынку. Всякія слабительныя для меня мучи-
тельны, и, причиняютъ жестокий рвѣзъ и напри-
е брюха, что однако я приписываю глицеръ.
Хотя оныя обыкновенно причиняютъ мнѣ нѣ-
мощу, однако рѣдко производятъ рвоту. Если
же она и иногда случится; то всегда пош-
есть прекращается, какъ только начнетъ сла-
биться. Иногда я въ такомъ случаѣ думала,
чтобы глицеръ не пошла сичъ нушемъ; однако
я ей въ томъ препятствовала пишемъ холодной
воды. Цыцарное съмя никогда мнѣ не причи-
няло никакого безпокойства; но напрошнѣ того
большую частью я онымъ избавляюсь отъ муче-
ній. Можеть быть оное ей прописно, и посто-
му она прячется отъ него ниже. Вы, г. Архіа-
ндръ, также желаете знать, что я чувствую
тогда; когда выходитъ глицеръ? Она безъ по-
мощи слабительнаго никогда не выходитъ. По
принятію же онаго я примѣчаю, что глицеръ на-
ходится при желудочномъ отверстіи, или не
далеко отъ онаго, и въ то время я чувствую
вышесказанное мученіе или спѣшеніе. А когда
она послѣ того выходитъ, то прежде загнѣбае-
тъ внизъ. И по мѣрѣ того сколько она внизъ
опускается, умножается боль въ брюхѣ и оное
опускается ниже въ сѣни. Я также чувствова-
ла, какимъ образомъ она какъ будио соприли-
вается и не хочетъ выходить; даже кажется;
будио она вливается; и тогда-то происходятъ
жестокия мученія. Однако не меньше того дѣ-
лается и облегченіе, когда она выходитъ; и
тогда

тогда ощутимеленъ бываетъ ознобъ въ затылѣ
проходѣ. Та часть гланды, которая сперва по-
казывается, бываетъ неровна, но какъ бы изгры-
зена, и никогда не бываетъ такъ здорова, какъ
послѣ нее оторвавшійся конецъ; отрывъ же всег-
да бываетъ на соснахъ. За эту часть, которая
сперва показывается, должно тянуть сколько
можно побольше. Послѣ сего на сей разъ все ос-
тается по прежнему ибо во время другихъ
испрямленій больше гланды въ этотъ день не
выходитъ. Еслили ее скоро не захватить и не
тянуть осторожно; то она опять прячется
внутри. Когда уже больше ничего не вытяги-
вается; то я чувствую, что какъ будто что
нибудь около спины сопротивляется и послѣ
оторвавшись отскакиваетъ назадъ,,

Слѣдствія, которыя должно изъ сего
заключать, явствуютъ сами собою. Для того я за
нужное почитаю сказать только то, что сія
гганда была того рода, которой имѣетъ по
сторонамъ насосы, и что она была самая широкая
изъ тѣхъ, которыя мнѣ случалось вытѣчь.

Чѣмъ больше выдетъ частей гланды, и чѣмъ
онѣ будутъ длиннѣе; тѣмъ меньше останется
припадковъ отъ остатку оной. Даже я знаю
нѣкоторыхъ людей, что они послѣ того, какъ
у нихъ вышло нѣсколько аршинъ гланды, чрезъ
многіе годы никакихъ отъ нее не чувствовали
безпокойствъ.

Еслили кто не имѣетъ случая употребить
вышесказаннаго средства; то должно по крайней
мѣрѣ

мѣрѣ стараться прогнать глисту ниже и ее обезсилить. Первое сокращаетъ путь для ея изгнанія, а послѣднее лишаетъ ее способности прикрѣпляться.

Изъ опытовъ мы знаемъ, что для глисты сего рода соленое либо копченое мясо, вешнина, просоленная лососина, кислая капуста, кушанья, лукомъ и хлѣбомъ приправленные, съ пряными травами испеченный хлѣбъ и кислая вина бываютъ пропитаны. Равнымъ образомъ неприятны для нее чеснокъ, вонючая камедь, цыцварное сѣмя, сѣрные цвѣты, марциаллыя лѣкарства и полынный экстрактъ, отъ которыхъ она желая скрыться, опускается ниже въ кишки. Почему при употребленіи уже сихъ вещей чрезъ нѣсколько дней сряду, отъ одного жолко голоду она обезсилѣетъ. Если же припомъ еще принимаешь и лѣкарства, которыя для нее суть смертоносны, а послѣ употребить слабительное, дабы се либо привести въ сильное движеніе, либо заставить употребить всю свою силу для удержанія себя въ кишкахъ; то она отъ того придетъ въ великую усталость. По сей причинѣ для изгнанія оной должно два дни сряду принимать слабительное. Ибо въ первый день еще можетъ она прикрѣпляться, а въ другой уже должна обезсилѣть, и слѣдовательно выйти вонъ. Если же больной въ состояніи принять одно слабительное по утру, а другое послѣ обѣда; то тѣмъ лучше: ибо въ такомъ случаѣ глιστα не будетъ имѣть времени оправиться.

Намѣревающий такимъ образомъ пользоваться, долженъ

1) Избравъ для сего начало либо оконча-
нїе ущербу мѣсяца.

2) Чрезъ два дни сряду не долженъ ни-
чего, кромѣ выше предписаннаго, ни пить
ни ѣсть.

3) Въ то же самое время долженъ каждыя
два или три часа принимать по 10 слѣдующихъ
пильюль:

℞. Ехигаѣ. Тапасеті Возми пижмоваго экстрак-
ту,

Аѣас fœtid. Вонючей камеди,
Sem Santon. aa ʒss Цыцварнаго сѣмя пополу
et gr. VI. драхмѣ и по 6 гр,

Vitriol. Mart. gr. XII.

Meil. fœcer. q. f. Меду потребное количе-
ство.

M. F. pilul. pond gr. I. Смѣшавши все вмѣсто,
fol. argente obduc. D. сдѣлай пильюли нѣсѣмъ
по 1 гранѣ, послѣ по-
серебри.

Сии пильюли должно продолжать до тѣхъ
жорѣ, пока больной не почувствуетъ облегченїя
подъ грудью, и вмѣсто того не сдѣлается у
него нѣкоторой боли въ нижней части брюха и
ознобу въ спинѣ. Ибо сіе значитъ, что глѣзна
опустилася ниже. Потомъ

4) Тотчасъ должно стараться ее выгнать;
сіе же можно сдѣлать помощію порошка дял-
ятаго корня, котораго можно дать на пр. 8
или 9 лѣтнему ребенку 12, или 15 и до 20
грановъ за однимъ разомъ, смотря по крѣпости
его силъ. Однако должно прежде оный хорошо
съ сахаромъ стереть. Равный сему приемъ должно
чрезъ

чрезъ день повторить, а есѣли онѣ не довольно дѣйствуетъ, то можно его увеличить. При этомъ всякій разъ, когда послабимъ, велѣтъ по спазму выпивать холодной воды. Для взрослого же можно употребить на одинъ приемъ двойное онаго количество.

Порошокъ г. Лейбмедика Герреншванда чрезъ нѣсколько лѣтъ почитался самымъ надежнѣйшимъ противъ плоскихъ глистѣ лѣкарствомъ, который и дѣйствительно рѣдко бываетъ обманчивъ. Составъ онаго прежде былъ неизвѣстенъ: однако наконецъ онѣ его Врачамъ открылъ и показалъ, что его можно дѣлать либо ярче либо слабѣе. Его составляли изъ 15, 20 или 30 грановъ корня пепорошнику (*Filix*), изъ желтой гумми онѣ: до 5 грановъ и дикаго аврану (*Gratiola*) онѣ 5 до 12 грановъ (*). Приготовивъ при таковыхъ порошка за день прежде

Э я

ихъ

(*) Я думаю, что сей составъ взятъ изъ диссертации г. Андре (*de Taenia Gronnigen 1769, Gott. Anz. 1769, S. 1408*). Однако г. Герреншвандъ самъ продолжая чрезъ Геттингъ, открылъ г. Шредеру, что его порошокъ состоитъ изъ 10 до 15 грановъ желтой гумми и изъ 15 до 20 грановъ приведенной въ хрустали поынной соли. Такойъ приемъ составляетъ онѣ для взрослыхъ. Онѣ обыкновенно производитъ рвоту и поносъ. Давши его разъ больному, должно чрезъ два часа повторить, и послѣ такимъ же образомъ каждые два часа повторять до тѣхъ поръ, пока не выйдетъ вся глиста. Не пок. Лейбмедику (Фотелу (*Prælect. de cogn. et cur. morb. p. 652.*)) г. Герреншвандъ объявилъ, что онѣ къ выщепи-

сан-

ихъ употребленія должно дать больному порошокъ, изъ 10 грановъ сладкой ринуши (*Mergistia dulcis*) и равнаго количества сѣрнаго скаммоу (*Diagridium sulphuratum*) составленный. На другой день послѣ того должно дать по утру и въ вечеръ написанныхъ одинъ порошокъ, который обыкновенно производилъ рвоту и слабиль. Послѣ того чрезъ

саннымъ лѣкарствамъ прибавляетъ еще ясеновые угля. Еслии сдѣланъ упомянутый сочинителемъ составъ съ описанными мною, то отъ того только большая рана дается неизвѣстность, и изобрѣстелево открытіе, которое онъ различными Врачамъ сообщалъ, не весьма каженъ въбранимъ.

Г. ф. Р говоритъ, что въ онъ долженъ входить и папоротниковый корень. Сие самое заставляя меня упомянуть нечто о Нуффершиновомъ порошокѣ противъ плоскихъ глистъ. Я умаачиваю о томъ, что справедливо ли похваляли еще изъ давныхъ временъ папоротникъ (Феофраста Ересна, или иныя: только то извѣстно, что касается до лѣкарства 1. Нуфферъ, что сей корень до 2 или 3 драхмъ въ водѣ, на онъ перетнутой, либо въ водѣ линовыхъ цвѣтовъ даваемый, дѣйствіе свое отчасти долженъ заимствовать отъ слабительнаго кнышка (*Bolis*), изъ 10 до 12 грановъ ринуши панацей, равнаго количества скаммоной смолы, 5 или 7 грановъ желной гумми, въ Гладиншовомъ конфектѣ (*Confectio Hyacinthi*), послѣ того чрезъ два часа принимаемого. (*Voquez Traitement du Taena ou solitaire pratique a Morat en Suisse exacte et erprouve a Paris 1775.*) Ибо кпо сочтемъ сие слабительное простымъ. Но сие лѣкарство употребляешь только *Taenium latum* 1. М.

чрезъ два часа дать другой, который произведетъ сильный потъ, и съ онымъ бѣлышею частью выгоняетъ всю глисту. Но если бы сего не воспользовало, то спустя еще два часа должно дать и третій. Впрочемъ иногда случается, что глина на другой день послѣ того выходитъ. Но послѣ каждой ризы, когда послабишь, больной долженъ пить жидкій супъ. Перваго виду глисту всегда онъ выгоняетъ пѣною, а другаго (*secunda species Placen*) по часамъ. Онъ пишетъ въ своемъ къ мнѣ письмѣ, что онъ никому не даетъ сего порошка, не узнавъ совершенно, точно ли онъ имѣетъ глисту. А се онъ заключаетъ изъ того, когда въ испражненияхъ примѣчаетъ родъ небольшихъ бѣлыхъ зернушекъ, которыя должны выходить, когда больной приметъ полунца, либо и цѣлый унцъ сыропу персиковыхъ цвѣтовъ. Корень пашпоршика всѣ похваляютъ противъ плоскихъ глистъ, а когда онъ ихъ убиваетъ, либо проницаетъ имъ прикрѣпляясь; то въ то же самое время желтая глина и дикой аравъ все дѣло довершаютъ изгоняетъ ихъ вонъ. Ибо оба сѣи лѣкарства весьма скоро и сильно слабятъ. А потъ порошокъ, который дается за день передъ тѣмъ, равно какъ и тѣ, которые принимаются одинъ за другимъ въ одинъ день, должны привести глисту въ такое безсудіе, что она послѣ принятия двухъ или трехъ не въ состояніи бываетъ болѣе держаться въ кишкахъ.

Впрочемъ если бы наблюдать всѣ сѣи обстоятельства, то она вся должна выйти, какое бы слабительное употреблено ни было, если бы

только оно скоро и сильно дѣйствуетъ. Но сей причинѣ и г. Д. Нитерпъ выгналъ 18 цѣлыхъ плоскихъ глистъ у той Госпожи, о которой я уже выше упоминалъ. Онъ далъ ей на сей ко- нецъ 5 пилюль, изъ 12 грановъ Скаммону (*Scam- monium vegetum*), изъ 6 грановъ яланнаго корня и 2 грановъ Турбишу минеральнаго съ небольшимъ количествомъ спирту сдѣланныхъ. Три изъ оныхъ приняла она 10 Сентября по утру, а про- чия чрезъ часъ; и онъ въ томъ же еще день вы- гнали 7 живыхъ и цѣлыхъ глистъ, 9 на дру- той по утру да въ вечеру к мерзую. Видя однако, что она не совершенно онъ оныхъ осво- бодилась, далъ онъ еще 4 Октября тѣже самыя пилюли, увеличивъ ихъ полграномъ Турбишу ми- неральнаго. Послѣ чего 6 Октября вышла изъ нее еще одна. Но какъ она еще и послѣ того не была совершенно здорова, то онъ велѣлъ упо- требить опять оныя пилюли, которые и выгна- ли много мертвыхъ малыхъ (*Vermes siccitissimi*) и много живыхъ круглыхъ глистъ, послѣ че- го больная совершенно выздоровѣла.

Сѣи самыя пилюли предписывалъ еще преж- де сего Баронъ фонъ Свингенъ одному молодому человѣку, кося и съ другимъ наѣбреяемъ, т. е. противъ любострастной болѣзни. Однако онъ вы- гнали изъ него одну плоскую глисту цѣлую. Послѣ того онъ употреблялъ сѣи самыя лѣкар- ства даже и пропивъ сѣи глисты, и часто съ успѣхомъ. Но понеже онъ весьма сильно дѣй- ствуютъ, то онъ давалъ ихъ только два раза въ мѣсяцъ. Но естли ихъ употребить при ра- за; то обыкновенно глиста точно выходятъ (*Vid. Commentar. T. 4. p. 731.*). Пох.

Пок. Д. Гасселквистъ въ своемъ путешествіи въ Обѣтованную Землю повѣствуетъ, что плоскія глисты въ Египтѣ весьма часто случаются, и что въ Каирѣ четвертая часть жителей, а наипаче что касается до Жидовъ и черни, оными страдаютъ. У нихъ за наилучшее противъ сего почитается средство бѣлая нефть (Petroleum), которой они даютъ въ водѣ на каждый пріемъ чрезъ три дни сряду послѣдніе три дни ущерба мѣсяца отъ 20 до 30 капель, послѣ того на четвертый день больные принимаютъ слабительное. Если же въ такомъ случаѣ не выходятъ глисты; то они ждутся слѣдующаго ущерба мѣсяца, и тогда опять приступаютъ къ сему же лѣченію. Сіе самое кончѣно заставило Сочинителя Деревенскаго Врача предписать сіе лѣченіе. Онъ (ср. 423.) повѣствуетъ, что чрезъ 14 недѣль тщетно онъ одному больному плоскою глистою всякія предписывалъ лѣкарства. Правда онъ выгналъ нѣкоторыя части, однако не цѣлую глисту. Послѣ того предписалъ онъ ему по полудрагмы бѣлой нефти и скиннидару, и велѣлъ все сіе въ три раза принять. Однако больному, которому наскучили лѣкарства, показалось сіе не много; и потому онъ все принялъ вдругъ, но съ такимъ успѣхомъ, что глιστα вся вышла. Скоро послѣ того предписалъ онъ еще одной женщинѣ, тою же глистою страдавшей, сіе самое лѣкарство, и совѣтовалъ ей принять онаго по утра 35 капель; а когда глιστα не выйдетъ, то еще 40 въ полдни. Послѣ чего вышло немедленно 9 аршинъ мертвою глистою.

Когда только нѣкоторая часть глисты покажется; то велѣтъ слегка ее тянуть до нѣхѣ порѣ, пока не будетъ примѣчено ссrophивленія. Потомъ больной долженъ лечь на узкую постель и къ глистѣ привязать что нибудь тяжелое, которое бы ее тянуло, но не могло опорваться. Оное должно свѣсить съ постели и положить больного на правый бокъ. Еслили только онъ будетъ имѣть перпѣние, то конечно избавится такимъ образомъ естли не всей глисты, то по крайней мѣрѣ большой оной части, а иначе естли онъ позволитъ себѣ пропускать свою глисту сквозь высверленное дерево, которое смазавши масломъ, должно нѣсколько вложить въ задній проходъ. Ибо се служилъ къ тому, чшобъ сжимагелъная задняго прохода мышца (*Musculus Sphincter ani*) не могла стать глисту, которая безъ того легко можетъ бытъ придавлена.

Недавно я слышалъ, что въ Каламарѣ одинъ человекъ такое мученіе претерпѣвалъ отъ плоской глисты, что даже многократно съ тоски покушался на свою жизнь, онъ чсто однако другіе его отвращали. Напоследокъ когда даны были ему какіе то три порошка, то изъ него вышли глисты, и нѣмъ прекратились всѣ его страданія. За небольшую цѣну досталъ я себѣ оныхъ описаніе, которое здѣсь и сообщаю, а именно:

Должно взять мѣлко сполченнаго и просѣянаго въ уголь пережжонаго камня, мѣалаго, но несполченнаго порошу по полторы драхмы и семь зеренъ перду хороша сполченнаго.

Смѣ-

Смѣшавши все сіе вмѣсто, раздѣлить на три части и давать по одной три утра сряду въ небольшомъ количествѣ горячаго вина въ то время, когда наименѣе беспокояшъ глѣсты. Всякой разѣ оныя непременно должно запивать одною или двумя столовыми ложками тогожъ горячаго вина. Еслили сіи порошки не причиняютъ въ брюхѣ никакого особеннаго движенія; то слѣдующій разѣ приемъ ихъ должно увеличивать. Но еслили въ такомъ случаѣ глѣста не выходятъ; то должно принимать въ 4 и 5 день по утрамъ въ водѣ по 40 грановъ ополченнаго въ порошокъ яланповаго корня (*).

Я намѣренъ здѣсь еще упомянуть объ одномъ родѣ лѣченія, посредствомъ котораго одинъ знаменитый Господинъ избавился отъ той плоской глѣсты, которая имѣетъ по сторонамъ насосы, такъ что съ 1748 года, никогда онъ болѣе не претерпѣвалъ отъ нее никакихъ припадковъ. Оно состояло въ томъ, что онъ, 1) ѣлъ напѣцакъ по два или по три зубца чесно-

25

ку

(*) Простой народъ въ Вѣнборгѣ обыкновенно извѣщается отъ плоскихъ глѣстъ употребленіемъ внутрь въ великомъ количествѣ скипидару; а въ восточной Ботани составомъ, изъ равнаго количества корабельной смолы и мѣла составленнымъ, котораго прикидаютъ по столовой ложкѣ по утрамъ чрезъ 7 дней сряду. Последнее изъ сихъ лѣкарствъ сначала причиняетъ весьма великое беспокойство, такъ что иногда даже отъ него происходятъ судорги, которыя однако тотчасъ по выходѣ глѣсты прекращаются. (Fortassin. of. Prov. Doct. belgic. S. 166. и 263.) М.

ку по два, по три или по четыре раза въ недѣлю, либо съ чаемъ либо съ холодною водою; 2) бѣдя верхомъ на лошади каждую недѣлю, два раза дѣлалъ сильное тѣлодвиженіе, либо подалъ ошѣбжалъ; 3) многократно принималъ по столько, сколько можно захватить кончикомъ ножа, такъ называемаго Гернаго песчанаго (°) съ равнымъ количествомъ бѣлаго Французскаго вина смѣшеннаго. Собственное больнаго о семъ повѣствованіе находится уже въ сочиненіяхъ Королевской Академіи Наукъ (1766 года): однако я считаю за нужное здѣсь оное повѣстовать.

Въ

(*) У г. Дореали (Sacken - Apothek S. 34.) патшалъ я слѣдующій онаго составъ:

R. Rad. Gen. rubr. Возми корня соколяго перелешу,

Al. foetid. v. Myrrhae. Волнющей камеди либо смирины,

Camphor. Канфары,

Cort. Aurant. fess. Сухой померанцовой корки,

Castor. Бобровой слруи,

Extract. Aloës Сабуриаго экстракту по одной драхмѣ,

Croc. ʒi. Шафрану одинъ скрупулъ.

Contus. grosso modo Крупно столкши, настпой 4
fient cum spirit. фунтами спирту и 4 фун-
via. ℞iv. тами,

vini Portug. ℞ii. per Португальскаго вина чрезъ
VI. v. VII. dies in 6 или 7 дней.
digestione.

Col. D. Процѣди. М.

„Въ 1747 году, когда мнѣ въ Осени исполнилось 44 года, почувствовалъ я сначала боль и ворчанье въ брюхѣ, а особливо въ лѣвой сторонѣ. Ошѣ чего когда у меня раздувалось брюхо и дѣлалось спѣсненіе въ груди; то каждой разѣ приключалась тоскливость, уныніе и печаль. Я приписывалъ сіе непорядочному желудку, и сперва старался тому пособить полымнымъ экстрактомъ, разводя оный либо винограднымъ виномъ, либо водкою въ довольномъ количествѣ. Сіе имѣло такъ хорошее дѣйствіе, что спѣсненіе груди и напыщеніе брюха миновались, но всегда проходили съ ощущеніемъ иъкощораго движенія въ лѣвой сторонѣ, которое я прежде почиталъ за вътры. Однако послѣ примѣнилъ въ исправленіяхъ небольшія бѣлыя часиницы, похожія на оуречныя сѣмена; хотя и не зналъ еще, что изъ сего заключать должно. Въ 1748 году приключилась мнѣ жестокий поносъ безъ явной мнѣ причины. Тогда въ первый еще разъ вышла изъ меня плоская галиста. Я удивился сему и думалъ, что то была часть кишки. Не смотря на то однако я ее опорожно тянулъ, и понеже не только ошѣ того (не чувствовалъ никакой боли, но еще ощущалъ облегченіе; шѣ до пѣхъ поръ не переставалъ тянуть, пока больше она не стала выхотить и опорвлася. Въ сей разъ вышло изъ меня ся два аршина. Когда я сей кусокъ порядочно разсмотрѣлъ, то нашелъ, что онъ еще двигался. Я сіе такъ оставилъ, однако былъ здоровѣе прежняго и имѣлъ хорошій аппетитъ. Съ того времени я заключаю, что уже совершенно выздоровѣлъ; однако прошивное тому увидѣлъ.

дѣлѣ, какъ однажды послѣ сильной верховой бѣды вышла изъ меня великая часть гланды, которую я также тянулъ осторожно, пока она не оторвалась. Она равнымъ образомъ была жива, и когда я ее полоскалъ въ теплой водѣ, дѣлала различныя движения. Тогда же въ первой разѣ сталъ я помышлять, какимъ бы образомъ избавиться отъ сего рода испорченнаго гланды, который меня по малой мѣрѣ по одному дню каждой мѣсяцъ беспокоилъ. Для того началъ я съ своей стороны его пощипывать пальцами въ экстрактомъ, и не употреблялъ приномъ въ пищу ни молока, ни другихъ какихъ либо сладкихъ вещей; но примѣтилъ, что отъ сего приключались мнѣ многія безпокойства и движеніе въ лѣвомъ боку. Въ томъ же самомъ 1748 году присовѣтовалъ мнѣ нѣкто изъ пріятелей моихъ, есть напощакъ чеснокъ. Я тотчасъ лѣвомъ же началъ, и употреблялъ оного по 2, 3, или 4 раза каждую недѣлю по 2 и 3 зубца, которые я ѣлъ либо съ часмъ, либо съ холодною водою. Я рѣзалъ его иногда и въ мѣлкіе кусочки. Въмѣсто слабительнаго я употреблялъ такъ называемый Германовъ листаментъ, послѣ котораго иногда пилъ по полрюмки бѣлаго Французскаго вина, и съ меня два либо три раза слабло. Осенью въ Септябрѣ мѣсяцѣ отправился я по своей должности въ Эмменландию, и на пути употреблялъ чеснокъ а иногда вышеупомянутый эликсиръ съ шампанскимъ усьмкомъ, что однажды, когда меня послабло, вышла изъ меня совсѣмъ цѣлая часть плоской гланды не оторвавшись. Я ее хорошо размашивалъ, но не примѣтилъ въ ней ни малей-

лѣйшаго движенія. Во время моего пребыванія въ Эмменланди, на обратномъ пути и по прибытіи въ Спогголдъ въ началѣ Октябрю мѣсяца, я находился въ добромъ здоровьѣ. Въ Ноябрь мѣсяцѣ я долженъ былъ по своему званію ѣхать въ Готтенбургъ. На семъ пути однажды, когда я по утру хорошо позавтракалъ и довольно послѣ того отѣхалъ, почувствовалъ въ животѣ жескую боль, послѣ того весьма довольно меня преслѣдало, и вышла большая часть плоской глисты, у которой, сколько я ни разсматривалъ, не приметилъ ни малѣйшаго знаку движенія или жизни. Равнымъ образомъ послѣ того времени я не видѣлъ никакихъ признаковъ глисты, ни припадковъ, отъ оныхъ происходящихъ. Но когда меня глиста безвонно, то я отъ того не искудалъ. При томъ всегда имѣлъ хорошій аппетитъ, и елъ какъ мнѣ случилось когда либо, прежде обыкновеннаго кушать, чувствовалъ не обыкновенное сосаніе въ желудкѣ и извиваніе въ лѣвомъ боку.,,

Въ тѣхъ же снѣмкахъ сочиненіяхъ на 1747 годѣ находящійся примѣръ, подтверждающій весьма хорошее дѣйствіе противъ глистъ вышеписаннаго эликсира, которое онъ оказалъ надъ тѣмъ самымъ мальчикомъ въ Або, (*)

Что

(*) Одному мальчику, у котораго непримѣнно было никакихъ признаковъ плоскихъ глистъ, кромѣ того, что онъ только былъ весьма простъ и невоворошлѣвъ, дали вмѣсто потѣхаго лѣкарства онаго эликсира въ надлежащемъ количествѣ горячаго вина. Послѣ чего онъ вдругъ почувствовалъ побужденіе къ испраж-

Что чеснокъ имѣетъ весьма хорошее противъ глистъ дѣйствіе, и что онъ отъ долговременнаго его употребленія умирающіе; то я сіе опытомъ уже доказалъ въ вышеписанныхъ сочиненіяхъ Кор. Академии Наукъ 1760 года (стр. 136.). Однако я то здѣсь повторяю:

Одна замужняя Госпожа, имѣвшая отъ роду лѣтъ около 20, чрезъ дѣвѣтъ 1755 годѣ спрала-ла посклиивостію, соединенною съ нѣкоторымъ опчаяніемъ, безпрестаннымъ плачемъ и частыми обмороками; но напоследокъ получила облегченіе отъ дѣлительной воды, называемой Спа-вассеръ, изъ Пуртоньерскаго источника получае-мой, и всегда находилась довольно здорова, хотя и была суха и весьма блѣдна. Она употребляла потомъ сію воду каждыи годѣ, и какъ каза-лось не безъ пользы. Въ 1759 году опять она занемогла, но уже тогда употребляла на мѣстѣ своего пребыванія различныя лѣкарства съ такъ великою пользою и успѣхомъ, что показалась часть плоской глисты, которая по сторонамъ имѣла нагосцы. Несмотря на то однако при-падки ея иногда продолжались.

Вѣ

испражненію нанизъ и съ онымъ вышло вели-кое количество плоской глисты. Весьма испу-жавшись и думая, что выходятъ кишки, прибѣжали сказать о семъ Сперингу, который однако заключилъ, что то была плоская глиста и пришедши лично нашолъ оную, ко-торой не смотря на надкось прибогшихъ лу-да койней столько еще осмалось, что можно бы еѣ наполнить дѣлую шапку. (Смотри ориги-налъ, который мимоходомъ здѣсь упомянутъ стр. 3.) М.

Въ началѣ 1760 года требовала она у меня для сего совѣта. Почему я уговорилъ ее, ѣсть каждое утро по одному или по два зубца чесноку, и слѣдующее лѣпо опять пить Спагастеръ. Она продолжала ѣсть чеснокъ каждое утро до самаго Іюля мѣсяца, ш. е. пока не начала пить вышеупомянутую воду. Послѣ десятидневнаго употребленія оной, проѣхала она 15 миль, потомъ отдохнувши одинъ день послѣ своего пути, продолжала употребленіе оной каждое утро, не смотря на то, что великаго труда ей стоило, оную въ себѣ удерживать. Пребывая на ономъ мѣстѣ, ѣла она каждый вечеръ землянику, которая всегда въ слѣдующее утро ее слабила. Въ третій день по утру, послѣ начатія опять употребленія воды, или въ четвертый день послѣ путешествія, приключились ей жестокия судорги съ рвотомъ въ животѣ и болью въ головѣ, и прежде нежели она выпила одну буылку оной, вышла изъ нее плоская глиста, свернувшая въ клубокъ, вся со всѣмъ своимъ тонкимъ концомъ. Оный имѣлъ подобный тому бугорокъ, о которомъ я выше упомянулъ. Что же касается до четырехъ вышеобъявленныхъ дырочекъ, то я ихъ не могъ примѣтить потому, что у меня не было тогда никакого увеличительнаго стекла. Составы снота были весьма часты. Напоследокъ оная Госпожа окончила свое употребленіе цѣлительной воды, болѣе не имѣла никакой тошноты, и могла пить воду безъ затрудненія. Позывъ на пищу, котораго она чрезъ все прежнее время не имѣла, опять сдѣлался порядочный, и чрезъ 14 дней пономъ получила она
 преж-

прежній здоровый цвѣтъ въ лицѣ и сдѣлалась полною.

По сей причинѣ я думаю, что она не имѣетъ въ себѣ глисты, и впредь будешь пользоваться совершеннымъ здоровьемъ. Какъ только она у нее вышла, то я велѣлъ ее вложить въ теплую воду однако она не двигалась, кромѣ своего тонкаго конца и около осмой части аршина по срединѣ. Дошя я ее облилъ еще теплѣйшею водою; однако все только лишь часть пресмыкалась, а остальная пребывала мертва. После того, когда я влилъ шуда холодной воды, то и вышеупомянутыя части переспали двигаться. Но опять онѣ тотчасъ пришли въ движеніе, коль скоро я облилъ ее вторично теплою водою.

Изъ сего я заключаю, что большая часть ея была мертва; и другой уже случай меня увѣрилъ, что сему причиною дѣйствіе чесноку. Слѣдовательно я утвердительно сказать могу, что чеснокъ во все можетъ умертвить глисту, естли только долго оной употреблять. Госпожа оная употребляла его чрезъ 6 мѣсяцовъ, онѣ чего большая часть изъ 16 аршинъ его умерла, ибо она была длиною въ 16 аршинъ. Чаятельно и оспальная часть равнымъ образомъ чрезъ 6 мѣсячное продолженіе употребленія оного умерла бы, естли бы то для оной Госпожи было нужно, и естли бы глиста прежде того не вышла; не смотря изъ то, что можетъ быть тонкій ея конецъ крѣпче и живуще прочихъ частей. Въ клубокъ она свернулася можетъ быть по причинѣ бы-

бывшаго на пути прясенія. А когда она свернется въ клубокъ, то меньше въ кишкахъ занимаетъ мѣста, нежели лежи вдоль Слѣдовательно въ такомъ случаѣ прикрѣпляется она только не многими нитками, и потому легче бываетъ ее выгнать. Ч.по же касается до оной Госножи, то еще нѣмъ удобнѣе было ее изъ нее выгнать, потому что большая часть ея была мертва. Земляника всегда то имѣетъ двиспие, что, при употребленіи минеральныхъ водъ, елиши ее въ вечеру, по упу слабишь, и иногда такъ сильно и съ такими жестокимъ рѣзомъ, что нужно бываетъ поносъ останавливать коричною водою. Въ семъ случаѣ она служила вмѣсто слабительнаго и выгоняла глицеру въ то самое время, когда холодная вода живую еще часть оной почти умерщвляла и лишала способности прикрѣпляться.

Ревенная настояща, о которой я часто упоминалъ, готовится такъ, какъ описывали въ ея. Дорелли въ своей Деревенской Аптекѣ (Soccel Apothek стр. 229 (*)). Напротивъ того пу, которая употребляется противъ глицеръ, соизнужаютъ слѣдующимъ образомъ:

Ю

Р.

(*) Я сообщая здѣсь изъ полезной сей Книги слѣдующій рецептъ:

R. Rhen Alexandr.	Возьми ревеню Александрій-
3ii	скаго 2 унца,
Uvae. ursi.	3i Изъему 1 унцъ,
Cort. Citr.	Лимонной корки,
Rad. I.quirit. aa	Солодовкаго корня по по-
3ss	лунца.

Сал.

R. Rad. Rhei Alex.	Возьми Александрийскаго
℥III.	ревеню 3 унца,
Raffol. mai. exac. ℥I.	Измому 1 унцѣ,
Flaved. cort. Aurant.	Желтосни померанцовой
℥ss.	корки полунца,
Rad. Liquirit. ℥II.	Солодковаго корня 2 драх-
	мы,
Cardam. min. JIV.	Мѣлкаго кардамону,
Hyarom. vet. ℥II.	Сларата пшпейнаго меду 2
	фунта.
Conc. cont. mixt. di-	Срѣзавши, споласни и смѣ-
ger. per quadradu-	шавши все вмѣсто, настой
um.	чрезъ четыре дни;
Col. express. add.	Прощѣтивши и выжавши при-
	бавь,
Extr. Tanac. ℥ss.	Пижмоваго экстракта пол-
	унца,
Sacchar. alb. ℥III.	Сахару бѣлаго 3 унца.
M. D.	Смѣшай.

Cardam. min. ℥II.	Мѣлкаго кардамону 2
	драхмы.
Vin. Portugall. ℥II.	Португальскаго вина 2
	фунта.
M. dig. per biduum.	Смѣшавши вмѣсто, настой
	чрезъ два дни;
Colat. express. add.	Прощѣтивши и выжавши
	прибавь,
Extract. Enul. ℥ss.	Пижмоваго экстракту полу-
	нца,
Sacchar. alb. ℥III.	Сахару бѣлаго 3 унца.
D. S.	Надпиши: Ревениах на-
	стойка.
	M.



ОТДѢЛЕНІЕ 23.

Объ Англической немочи.

Когда младенецъ имѣетъ большую голову, полное и блѣднораспухлое лицо, напряженные на шеѣ крововозвращныя жилы; а прочія нѣла части напропихъ много тѣлеса, кожу опвислую, брюхо, а особливо съ правой стороны раздутое и на костяхъ въ составѣхъ нараспан: то уже въ немъ находится несовершенная Англическая немочь (*Rachitis incompleta*). Но если онъ имѣетъ еще только нѣкоторыя изъ вышеписанныхъ припадковъ, какъ на пр. распухшія въ составѣхъ кости; то она бываетъ у него въ первой степени. Напротивъ того если онъ уже и мышцы его нѣкъ ослабѣющъ, что онъ ходить бываетъ не въ состояніи; то тогда болѣзнь его находится въ самой высочайшей своей степени, и называется совершенною Англическою немочью (*Rachitis completa*).

Вѣроятно, что и сія болѣзнь у насъ новая. Она впервыхъ въ Англіи въ Дорсетскомъ и Коммерселскомъ Графствѣхъ примѣчена между 1612 и 1620 годами, и въ первый разъ описана Англическимъ Врачомъ, по имени Глассенъ. Въ Англическихъ режистрахъ о умершихъ никого отъ оной скончавшагося до 1634 года не означено. Изъ Англіи она привезена во Францію, и опшудла чрезъ нѣсколько времени въ Голландію. Въ которое же время въ первый разъ она примѣчена въ Швеції, того неизвѣстно. Она еще доселѣ на Шведскомъ языкѣ не имѣетъ и никакого названія, если не подъ именемъ *Riset* въ нѣкоторыхъ

рыхъ мѣстахъ ее разумѣютъ, хотя подъ онѣмъ нныя толкуютъ чахлосць младенческую (*Atrophia infantum*). Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ простой народъ таковыхъ дѣтей называетъ рожденными отъ Домоваго, будучи въ такомъ глупомъ мнѣнїи, будто настоящія ихъ дѣти нѣкоторымъ Лѣшимъ, въ ихъ мысли существующимъ, подмѣнены. Англичане называютъ сїю болѣзнь *Rickets*; Франдузы *Pluete*, а спраждущихъ ею младенцевъ *Enfant poté*. Нѣмцы же такъ какъ и мы называютъ Аглинскую немочью.

Хотя теперь во всей Европѣ вѣтъ ни одного такого мѣста, гдѣбы сїя болѣзнь не могла родиться: однако болѣею частію она свирѣпствуетъ на низкихъ, болотистыхъ и мокрыхъ мѣстахъ. По сей причинѣ болѣе находится несчастныхъ такихъ дѣтей въ Англии, въ Голландіи, въ Парижѣ и въ Страсбургѣ, нежели въ другихъ мѣстахъ. А наипаче въ Страсбургской крѣпости, которая спонѣ ниже самаго города, такъ много ихъ въ разсужденіи числа жителей находились, что, къ великому своему удивленію г. Докторъ І. Н. Бухнеръ, въ одно время между прочимъ сыскалъ въ одномъ домѣ 11. дѣтей, отъ однихъ родителей рожденныхъ, которыя всѣ болѣны то въ большей, то въ меньшей степени сєю болѣзнію. Сте самое ему и подадо случай, сдѣлать объ оной столько полезныхъ и примѣчаній достойныхъ изблюденій, которыя я по причинѣ ихъ вѣрности сюда включить намѣренъ.

Еще неизвѣстно, можетъ ли младенецъ на свѣшъ родиться съ сєю болѣзнію, хотя г. А. Г. Клейнъ

Клейнъ и приводитъ одинъ таковой примѣръ (Nov. act Acad. nat. Cur. Vol. I. p 146 (*)). Я видѣлъ также одного блѣднаго крестьянскаго мальчика, о которомъ родители утверждали, будто онъ родился съ сего болѣзню; однако каждаго можно положить на рассказы незнающихъ людей. Но вѣроятнѣе всего то, что сего болѣзнь въ первой разѣ можно примѣшнѣ во время прорѣзу зубовъ.

Когда младенцу въ то время начинаетъ тѣломъ худѣть, кожа его дѣлается обвислою, брюхо, а особливо съ правой стороны раздувается, голова увеличивается, лицо становится полнымъ, но блѣднымъ, крововозвратныя шейныя жилы напрутаются и кости въ сосудахъ распухаютъ: то уже онъ имѣетъ дѣйствительную Аглинскую немочь. Если не стараться всѣми силами въ скорости сему пособить; то сѣи припадки день ото дня еще умножаются. Лобная кость начинаетъ выплываться; черепныя кости, швами (Suturae) между собою соеди-

Ю 3

ня-

(*) Галиссону извѣстенъ одинъ только таковой примѣръ, да и то не самымъ имъ примѣченный. Больше всего примѣчанія достойно наблюдение г. I. Гейнр. Клейна (D.H. filicis casum Rachitidis congenitae, 1763, о сему самомъ упоминаетъ и Авишоръ), если только въ ономъ не другая какая либо болѣзнь подъ симъ именемъ описывается; ибо кромѣ припадковъ, свойственныхъ Аглинской немочи, были и постороннѣе. Онъ говоритъ о такомъ младенцѣ, который родился вмѣстѣ здоровымъ и жилъ только 10 дней. М.

няющіяся, одна отъ другой расходящіяся; кожа становится полсною и морщинистою, а особенно въ составѣ кисти ручной. Зубы желтѣютъ, чернѣютъ и кусками крошатся, а новые медленно и съ трудностію на ихъ мѣсто выходятъ, и, елики заблаговременно болѣзнь не вылѣчить, то и они такой же участи бывають подвержены. Грудь по сторонамъ бываетъ какъ бы вдавлена, а грудины вымучиваются иногда больше въ правую, а иногда въ лѣвую сторону; ребра становятся широкими и показываются на нихъ бугры, а особенно гдѣ томъ мѣстѣ, гдѣ они соединяются съ хрящами, имѣющими соединіе съ грудиною. Ключицы весьма кривляются, а особливо хребетъ, либо напередъ, либо назадъ, либо въ которую нибудь сторону накриваются. Нѣкоторыя кости со сторонъ бываютъ плоски и кривы, а именно бедренныя и обѣ находящіяся между колѣномъ и спиною нижнюю; пошомъ и обѣ кости локотнич. Кости, изъ составляющія, бываютъ какъ бы сдавлены и косы, отъ чего и самый тазъ дѣлается узкимъ. Нѣкоторыя изъ нихъ не вырастаютъ до послѣдней длины и, что всего страннѣе, бывъ прежде твердыми, становятся мягкими и гибкими; и поному Сочинители описываютъ нѣсколько такихъ примѣровъ, что нѣкоторые младенцы примѣннымъ образомъ становились меньше; либо бывають такъ крошечки, что отъ малѣйшаго движенія ломаются; либо на нѣкоторыхъ мѣстахъ мягки, а на другихъ напротивъ того тверды, каковыя случаи, хотя они, слава Богу, и рѣдко бывають, Врачи видѣли. Мышцы ма-
ла

ле по малу такъ дѣлаются отвислы и слабы, что больные не въ состояніи бывають вставать съ постели и ходить. Прикалывается также слабая медленная анхорака, которая наиболее ночью ожесточается и оспальный жиръ, въ кожѣ находящійся, истощивается. У нѣкоторыхъ хрипитъ въ груди и бываетъ мокротный кашель, однако они накопляющуюся мокроту глотаютъ. Другіе напротивъ того имѣютъ только сухой кашель, какъ сіе случилось съ младенцемъ Т. Мора въ началѣ болѣз. къ сему присоединяется спѣсненіе въ груди, которое послѣдокъ плакъ увеличивается, что больной можетъ задуниться, еслили онъ не въ состояніи бываетъ на рукахъ въ постели приподниматься. Иногда они вдругъ распухаютъ такъ, какъ будто воздухъ находится между жиромъ и кожей. Моча начинаетъ выходить каплями, либо изъ глазъ текутъ слезы и лицо онадеетъ и становится меньше. На послѣдокъ прикалываются судорги, которыхъ ужасному ихъ бѣдствію желаемый привозитъ конецъ. Достойно примѣчанія, что нѣдо сихъ больныхъ послѣ смерти не скоро просыхиваетъ и не одеревенѣваетъ. Кровь ихъ бываетъ весьма клейка и водяна, и при томъ оспра. Хотя оболочкой ея остропы оцсаль не лзя, однако легко можно объ ней судить по ея причинамъ и дѣйствіямъ. Внутренности, а особливо печель и желчный пузырь, весьма вызываютъ велики. Равнымъ образомъ и брыжечныя железы увеличиваются и отвердѣваютъ. Въ желчномъ пузырьѣ ни мало не бываетъ желчи. Больные младенцы голосъ имѣютъ толще, нежели какой въ ихъ

дѣта быть долженъ. Нѣкоторые изъ нихъ бываютъ остроумны и преждевременно разсудительны, а другіе напротивъ того весьма непонятны. Последнихъ г. Бухнеръ видѣлъ больше, нежели первыхъ. Непонятные сносятъ самую крайнюю дѣкастерва, а остроумные напротивъ того нѣтъ. Последнихъ мозгъ бываетъ кровяной, а первыхъ мякоть и водою наполненъ.

Обыкновенно эти больные бываютъ сонливы и дышатъ только ртомъ. Большею частію имѣютъ они сильный аппетитъ; весьма подвержены бываютъ кровоизлітіямъ, судорогамъ и палучей болѣзни. Г. Бухнеръ утверждаетъ, что онъ по нѣскольку разъ имѣли естественную оспу, что однако я никогда не принималъ, и мнѣ кажется невѣроятнo, чтоождъ каждый разъ у нихъ была дѣйствительная оспа. Рѣдкіе изъ нихъ выростають: однако я зналъ двухъ, кошотые довольно были велики, и ихъ хребетъ также былъ прямъ. Сладкія вещи, какъ по сахаръ, изюмъ, яблоки, груши и проч. обыкновенно въ сей болѣзни вредятъ. Больные подвержены бываютъ ознобу, жару и часной рвотѣ, которая у нихъ цѣлые три либо четыре дня сряду иногда продолжается. Большею частію умирають они тиснами. Сдаться можешь, что онѣ, будучи приведены въ движеніе сладкими вещами, производятъ вышесказанные припадки. Еще не доказано, мальчиковъ ли большее число бываетъ подвержено Англической немочи, или дѣвочекъ. Взрослымъ оная рѣдко приключается. Однако таковыя примѣры изсылають д-ръ Верней и Бурлава. Къ счастью она меприличива, и,
околы

сколько по сіе время известно, неслѣдственно. Тѣ женщины, которыя сію болѣзнь имѣютъ, либо прежде имѣли, не должны безъ довольнаго себя испытанія выходить за мужъ. Ибо когда ихъ плазъ сдѣлается узкимъ, то либо роды у нихъ должны быть тяжелы, и младенцы рождающіеся мертвые, либо онѣ сами прекращаютъ въ оныхъ свою жизнь.

Не у всѣхъ сія болѣзнь бываетъ въ такъ великой степени; но нѣкоторые имѣютъ одно только оной начало, а другіе большее или меньшее ожесточеніе. И поному когда они исправятъ родъ своей жизни, либо перемѣнятъ свое содержаніе, или будущъ употребляютъ лѣкарства: то могутъ чрезъ долгое время въ посредственномъ, либо и въ добромъ здоровьѣ жить, хотя то однажды приключившійся къ ихъ плазъ порокъ навсегда въ немъ остается.

Къ причинамъ, располагающимъ младенцевъ къ сей болѣзни, принадлежатъ все то, что можетъ слѣдствіемъ разслабить и размягчить твердыя части плазъ. А именно 1) Рожденіе отъ слабыхъ и больныхъ родителей, либо отъ прожодающихъ свою жизнь въ лѣнкости и роскоши, сверхъ мѣры употребляющихъ чай, сахаръ или жирную пищу, либо зараженныхъ любовраспашною болѣзнію, и отъ оной либо не излечившихся, либо истощившихъ себя многократнымъ снотечемъ. Таковыя матери не рѣдко рожаютъ либо недоносковъ, либо мертвыхъ младенцевъ, либо такихъ, которые въ большей или меньшей степени заражаются Аглинскою немощью. 2) Про-

исхожденіе отъ такихъ родителей, которые, по причинѣ недоспѣлку, дѣтей своихъ кормяшъ ху юю пищею. По сей причинѣ чаще сія болѣзнь примѣчается въ домахъ богатыхъ и бѣдныхъ людей, нежели средняго состоянія. 3) Происхожденіе отъ старыхъ родителей. 4) Воспитываніе на извѣдѣ, махрыхъ и болонистыхъ мѣстахъ. 5) Возвращеніе старую кормилицею, либо имѣющею старое, въ излишнее количество, или густое молоко, изъ котораго не могла въ младенцѣ выдѣлываться хорошая кровь; либо имѣющею недоспѣлое или кислѣе молоко, такъ что младенецъ либо не могъ надлежащаго получать питания, либо заранѣе приуменьшенъ былъ употреблѣть грубую пищу, которой его желудокъ сваривать былъ не въ состояніи; либо такою, которая приведена была въ слабость какою нибудь воспитательною болѣзнію, или жестокою лихорадкою. Бываютъ примѣчается такая нибудь изъ вышеписанныхъ причинъ; то младенецъ отъ этого становился слабъ, получалъ въ тѣлѣ кислоту и расположеніе къ Англической немочи. 6) Вскормленіе кормилицею такою, которая, имѣвъ любострастную болѣзнь, несовершенно отъ оной вывѣчалась, либо зараженною цыньюю, золотухою, или ракомъ; либо имѣющею скрытую печаль, либо беременною, либо пьяницею. Бургавъ пишетъ, что одна мать, вскормивъ осьмѣро дѣтей собственною грудью, девятую поручила кормилицѣ, но съ соболѣзнованіемъ послѣ того видѣла ея въ Англической немочи. 7) Всегдашнее содержаніе младенца въ сырой горницѣ, въ которой моютъ либо сушатъ бѣлье; ша-

итакже когда оставляютъ его лежать въ мокрыхъ пеленкахъ, не скоро распеленываютъ, когда онъ помочится, либо помарается, даютъ долго сидѣть на суднѣ съ обвязанными кобняками и бѣдрами, всегда носятъ на рукахъ, либо держащъ на кобняхъ, всегда кормятъ жидкою пищею, даютъ много сладкихъ вещей, часто жидкую молочную кашницу, плоды; ночью поятъ такимъ нивомъ, которое долго на ламинѣ либо на пчкѣ стояло и прокисло. Все сіе останавливаетъ въ тѣлѣ испарину и умножаетъ мокроты, коихъ поглащаемы бывають всасывающими сосудами, производящъ кислоту и расслабляютъ тѣло. 3.) Вознание мазьми въ тѣло чесотки, и запусценіе судорожнаго кашля, либо лихорадки, безъ употребленія заблаговременно надлежащей помощи.

Чѣмъ больше случится въ младенцѣ такихъ причинъ, тѣмъ больше онъ бываетъ подверженъ Аглинской немочи, и напротивъ того Чѣмъ долѣ оныя въ тѣлѣ остающа, тѣмъ пруднѣе ему отъ оной избавиться.

Изъ сего родители напередъ могутъ заключать, должно ли имъ въ разсужденіи своихъ дѣтей опасаться Аглинской немочи или нѣтъ, и слѣдовательно заблаговременно надлежащими способами въ состояніи оную опярратить. На прѣстѣли какой человекъ знаетъ, что онъ долго спрядылъ любострасіиною болѣзнію, и пропитъ оной, какъ сіе обыкновенно бываеиъ, употреблялъ различныя лѣкарства безпорядочно и не наблюдая дѣйствы, и, не въ состояніи будучи скоро оными излѣчиться, два или три раза при-
нужденъ былъ перенесчь сию опеченіе; естѣли
та-

шаковый, говорю, женившись возметъ еще за себя нездоровую жену, а она, родивши на свѣтъ живое дитя, отдастъ его кормить цыгнгошной кормилицѣ и имѣющей спарое молоко; то онъ напередъ можетъ узнать, что его дитя либо будетъ недолговѣчно, либо получитъ Аглинскую немочь. Для того онъ долженъ паче всего стараться, сыскать хорошую кормилицу и отворачивать всѣ, могущія способствовать сей болѣзни, причивы, а между тѣмъ употреблять всѣ возможные для прекращенія ея средства. Агличане опасаются оной, когда ихъ дѣти начинаютъ прежде говорить, нежели ходить. Однако при семъ должно знать, что дѣти тѣмъ скорѣе начинаютъ говорить, чѣмъ больше съ ними болтаютъ и разговариваютъ, а напротивъ того тѣмъ ранѣе начинаютъ ходить, чѣмъ меньше ихъ носятъ либо держатъ на рукахъ, но больше оставляютъ сидѣть на землѣ либо ползать. Чѣмъ позже прорѣзываются у младенца зубы, тѣмъ больше должно опасаться Аглинской немочи. И хотя бы онъ прежде того былъ бодръ и здоровъ, стоять и ходить могъ; однако справедливо при прорѣзѣ зубовъ (который хотя бы соединенъ былъ съ родимцемъ или нѣтъ) оной опасаются, когда въ то время кожа бываетъ опухшая, брюхо раздутое и грудь нѣсколько напередъ выпученная; что наипаче отъ девятаго мѣсяца до втораго году примѣчать должно.

Черемъ а, въ младенческомъ вѣкѣ во время прорѣзу зубовъ случающаяся, бываетъ причиною, что сія болѣзнь тогда открывается. Хребетъ не прежде кривляется, какъ когда младенецъ

уже начинаешъ ходить. Голова въ сравненіи съ прочимъ тѣломъ бываетъ велика потому, что швы, черепныя кости соединяющіе, бываютъ неплотны и раздаются. Тяжеснѣ оной и слабость мышцъ бываетъ причиною, что младенцы ее держать прямо не могутъ. Кожа на шѣлѣ бываетъ морщиновата потому, что жиръ исчезаетъ, а мышцы становящся опвислыми. Мышцы бываютъ блѣдны, и лишаются своего краснаго, здоровымъ людямъ свойственнаго цвѣту для того, что кровь бываетъ жидка и водяна. Брюхо бываетъ велико, возвышенно и раздуто потому, что внутренности оного соразвительно бываютъ велики, и сверхъ того желудка и кишки вѣтрами бываютъ растянуты.

Опѣсненіе въ груди у нихъ бываетъ по той причинѣ, что впадина, легкія въ себѣ содержащая, суживается. А сіе происходитъ отчасти отъ того, что грудь по сторонамъ бываетъ сдвлена, а отчасти отъ того, что неестественная величина чрезвычныхъ внутренностей преняствуетъ грудобрюшной преградѣ, во время вдыханія воздуха надлежащимъ образомъ внизъ опускаться. Однако самую главную причиною сего быть можетъ слабость и безсиліе приподнимающихъ ребры мышцъ, и напоследокъ иногда скопленіе въ грудной впадинѣ, либо въ околосердинъ великаго количества воды, которая способствуетъ къ произведенію сего прииздка. Еслили сіе случится на пр. въ правомъ боку, то большой не въ сосисолнѣ бываетъ лежать на лѣвомъ. Еслили же вода накопится въ околосердинѣ, то обыкновенно онъ сгибается напередъ.

По-

Понже стѣсненіе груди препятствуетъ крови съ головы и съ лица внизъ опускашся, для того крѣпкія шейныя жилы напрягаются. Сильный позывъ на пищу, который у сихъ больныхъ случается, происходитъ отъ кислоты, въ желудкѣ находящейся, а кислота рождается отъ недостатку желчи, который происходитъ также отъ потери жиру, а особливо въ салниѣ. Что действительно находится кислота, то се довольно можно примѣнить по кислому дыханію, по кислымъ опрыскамъ и по недостатку желчи. Безъ сомнѣнія она же бываетъ причиною и мягкости костей, ибо изъ многихъ опытовъ извѣстно, что кости не только минеральныя кислоты, но уксусъ и сыворожка изъ молока, посредствомъ печатяго ласудка спороживающего, могутъ размягчать и распирать. Горбъ на спинѣ появляется отъ того, что хребетъ закрывавшся и на одномъ мѣстѣ вылучивается. По сей причинѣ шея представляется коротче, а голова какъ будто входитъ промѣлъ лопатокъ. Когда хребетъ бываетъ кривъ, то спанъ становится короче, и пошму кажется, что у сихъ младенцевъ руки и ноги въ сравненіи съ прочимъ тѣломъ длинны. Туловище бываетъ косо, когда хребетъ наклонившся въ одну изъ сторонъ. Бѣдры и ноги бываютъ кривы, нежелѣзны, потому что они несятъ на себѣ тяжесть тѣла. Что сухость тѣла происходитъ не отъ забору чувствительныхъ жилъ, отъ стеновой жилы начинающагося; то се довольно явствуетъ изъ наблюденій, Вилсаувою, Галлеромъ и І. Г. Брувомъ описанныхъ. Слѣбости мышцъ

иначе должно приписать, что таковые больные любяшѣ сидѣть и лежать; однако заставляешѣ ихъ бывъ въ семъ положеніи и облегчение, которое они отъ того чувствуютъ въ дыханіи. Но въ то время, когда они сидятъ либо лежатъ, чревные мускулы не бывающѣ въ напряженіи, и следовательно больше при вдыханіи въ легкія воздуха раздвигаясь. Для сей же самой причины и лежатъ они согнувши ноги.

Естьли сія болѣзнь еще въ своемъ началѣ; то обыкновенно ее можно излечить. Однако весьма различнаго она пребудетъ леченія, и при ономъ все, чѣмъ только можешѣ ей способствовать, должно стараться опираишѣ. Естьли родители перадивы, либо недовольно расторопны, а присматривающіе за младенцемъ неусердны, непослушны и нерачительны; домъ, въ которомъ живетъ больной, весь нечистъ, погода въ то время весьма дождливая, и младенческія обстоятельства не позволяющѣ ему жить на высокомъ и сухомъ мѣстѣ: то трудно бываешѣ его вылечить.

Когда болѣзнь уже нѣсколько усилилась, и младенецъ не можешѣ болѣе ни ходишѣ ни споишѣ, то рѣдко удаешся его вылечить. Тѣ младенцы, которымъ во время болѣзни приключается чесотка, удобнѣ прочихъ отъ сей болѣзни выздоравливаютъ. Естьли въ то время, когда болѣзнь находится въ своемъ ожесточеніи, больному случится зашибишѣся, упадешѣ, либо переломишѣ кости, то весьма опасаться должно, чтобъ она отъ того не увеличилась, либо и не достигла высочайшей своей степени. Седьмой и
мѣщ-

пятнадцатой годъ въ сий болѣзни весьма опасны. Но въ оныя она либо во все проходитъ, либо пуще ожесточается.

Лѣто для сихъ больныхъ бываетъ самымъ лучшимъ временемъ, а вѣнчае теплое и сухое. Изпрошивъ того Осень и Зима весьма несносны. Тѣ, которые въ сии времена лежатъ въ постели, часто при наступленіи лѣта начинаютъ вставать и ходить. Они имѣютъ сіе общаго съ преспастьными людьми и съ подверженными пострѣлу. Кровотеченія, какъ изъ носу, такъ и изъ другихъ частей, рѣдко имъ приносятъ пользу. Если они плачутъ либо откашливаются кровью; то рѣдко сему причиною бываютъ разорвавшіеся сосуды, но обыкновенно кровь выходитъ изъ разслабленныхъ потовыхъ скважинъ, будучи въ оныя болѣзненнымъ ожесточеніемъ иногда вогнана.

Число шло ихъ иногда вдругъ распухаетъ, то сіе не означаетъ никакой перемѣны. Но опухоль часто онъ воспослѣдовавшей рвоты въ два дни проходитъ. Если она не минуетъ, но бываетъ долговременна, и только съ одной стороны переходитъ на другую, (на пр. съ лѣвой руки и ноги на правую), изъ глаза на той сторонѣ, гдѣ она находится, текутъ слезы, сопряжена бываетъ съ нею, хотя и нежесткая горячка, лицо опадетъ и сдѣлается морщинистымъ, непрерывное побужденіе къ испражненію низомъ (Тенесмы), либо другіе судоржные припадки весьма ожесточатся; то приближается ихъ рѣшеніе, и одна смерть скоро ихъ избавляетъ отъ всѣхъ мученій.

Есть-

Естьли въ ихъ натурѣ сдѣляется такъ великая перемѣна, что они, имѣвъ прежде поносъ, спануть подвержены запору, либо имѣвъ прежде свободное испражненіе мочи, начнувъ оную испускать съ трудностію, либо она у нихъ и совсѣмъ запрется: то скорого можно ожидать окончанія бѣдственной ихъ жизни. Естьли лицо примѣтнымъ образомъ оладѣетъ, то не много болѣе четырнадцати дней жить имъ остается. Естьли оное почернѣетъ, а ноги лишатся чувствъ; то едва они могутъ болѣе трехъ или четырехъ дней въ живыхъ остаться. Сего же самаго ожидать должно и тогда, когда вонючее бываетъ у нихъ дыханіе.

Что сія болѣзнь въ Швеціи у крестьянскихъ дѣтей находится, то я самъ довольно сіе примѣнилъ. Однако доспойно бы примѣчанія изслѣдовать, не только ли она бываетъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя находятся возлѣ большихъ дорогъ, либо Господскихъ домовъ, куда удобно можетъ быть занесена любострастная болѣзнь.

Для лѣченія оной требуется много времени, и иногда цѣлый годъ на сіе употребить должно. Сіе неудивительно потому, что болѣзнь чрезъ долгое время усиливается и для того, что и діѣта въ семъ случаѣ не меньше либо еще и больше лѣкарствъ должна дѣйствовать. Крѣпкое тѣло расслабить легко, а слабое и болѣное укрѣпить напрошавъ того трудно и не скоро.

Тѣ, кои не въ состояніи для своихъ дѣтей много дѣлать издержекъ, должны довольствоваться двумя лѣкарствами. Изъ которыхъ пер-

ное испребляетъ кислоту и составляется изъ полунца чистой щелочной соли или поташу, въ одномъ фунтѣ чистой родниковой воды распу- щеннаго, оное должно въ бутыль держати и давати каждае утро смотря по возрасту отъ 20 до 80 или и до 100 капель въ стаканъ воды. Однако сего не должно употреблять безпрестан- но, но попеременно по 3 или 4 дни сряду да- вати, и между тѣмъ столькожъ времени пере- ждать. Другое также испребляетъ кислоту, но сверхъ того напиче еще способствуетъ пище- варенію и выдѣлыванію изъ пищи такого пища- тельнаго соку, изъ котораго дѣлается хорошаа кровь; отворяетъ устья всасывающихъ и моло- чныхъ сосудовъ, въ кишкахъ находящихся, разрѣ- шаетъ кдежности, разводитъ густыя мокроты и разбиваетъ заоръ, въ брыжейкѣ бывающій, и своимъ раздраженіемъ способствуетъ пресмы- кающемуся движенію кишекъ и испражненію на- низъ. Оное составляется изъ 10 грановъ Вени- цейскаго мыла, одного грана сгущенной бычачей желчи и 5 грановъ порошка корня Нѣмецкаго ин- бירו (Rad. ari rraeragal.). Смѣшавши все сіе вмѣ- сто, должно сдѣлать 8 пилюль, каждую въсомъ въ 1 гранъ; послѣ ихъ посеребритъ, либо, что лучше, посыпать нѣсколько мѣлко сполченою и просѣянною корицею, и давати по 4 передъ обѣ- домъ и по столькожъ передъ ужиномъ. Намѣре- ніе оныхъ есть замѣнить дѣйствіе естествен- ной желчи. Ихъ можно выписать изъ Аннеки вдругъ на три мѣсяца и держати въ погребѣ въ хорошо закуперенномъ стеклянномъ сосудѣ.

Атланскіе Врачи совѣщаютъ шаковыхъ больныхъ купаться въ холодной водѣ, либо оную на мѣхѣ свысока посредствомъ воронки лить. Оба сии способа употребляютъ также и у насъ, однако весьма рѣдко. Одна дѣвица употребляла шаковыя ванны противъ сей болѣзни чрезъ три лѣта сряду, и совершенно отъ оной выздоровѣла. При нашихъ минеральныхъ водахъ дѣлающъ такое же лѣченіе, и я видѣлъ въ 1760 году подобное тому при Докѣ (*) надъ однимъ больнымъ, которыйтуда былъ привезенъ. Оное весьма примѣчана достойно потому, что сей больной ни ходить ни стоять не могъ; однако, когда чрезъ 14 дней сряду опускали на него посредствомъ воронки холодную воду, то онъ такую получилъ крѣпость въ членахъ, что даже пригати и танцовать былъ въ состояніи. Служа воды великое дѣйствіе имѣетъ участіе въ ихъ лѣченіи. Ничто такъ скоро не возвращаетъ мышцамъ прежней крѣпости, какъ холодная вода, какъ и обыкновенныхъ ваннахъ употребляемая, такъ и опускаемая на больныхъ посредствомъ воронки. Ежели же кто сего дѣлать не можетъ, то можно каждый вечеръ идучи въ постель велѣть себѣ тереть тѣло грецкою губкою, въ холодную воду обмокнутою.

Понеже недоставочныхъ людей дѣти не могутъ наблюдать дѣтпы; то по крайней мѣрѣ родители ихъ должны горницу держать чисто и тепло, и часто накуривать можжевелинкою.

Я в

дипля

(*) Силу и дѣйствительное дѣйствіе сей минеральной воды наилучше можно видѣть изъ сочиненія г. Протѣ. Бергга (Tal om kalla Bad i Göttes och Lösa Badningar i Gynnekets, 1764.) М.

дитя въ мокрую погоду не выпускать на дворъ, держать сухо его плащь, не давая ему кислаго молока, либо пива, и по нѣскольку разъ въ день тереть пѣло суконкою, накуренною можжевельною смолою сполько, сколько то можетъ больной свестъ.

Одинъ Французскій Врачъ противъ Аглинской болѣзни весьма похваляетъ корень Марены (*Rubia tinctorum*), (*) которое лѣкарство недорого. Оно можно смѣшивать полдрахмы съ 10 гра-

(*) Мы извѣстны теперь два Французские Врачи, которые сей корень противъ Аглинской немочи весьма похваляютъ. Одинъ изъ нихъ есть г. Левретъ (*l'art des Accouchemens* 1766. p. 277.). Онъ ссылается въ семъ на 12 или 13 лѣтніе свое опыты, однако думаетъ, что еще нѣсколько должно его испытывать прежде, нежели онъ за совершенно дѣйствительный приметъ. Когда одні только кости спаниваются мягкими, а другихъ при томъ припадковъ не бываетъ: то можно давать либо кормилицѣ, либо ребенку изваръ сего корня, медомъ подслащенный. Еслили же находятся при томъ и другіе припадки, какъ на пр. поносъ, либо запоръ, глисты, ошвердѣніе брюха, то должно смѣшивать сей корень съ другими противъ оныхъ дѣйствующими лѣкарствами. Сіе лѣченіе должно продолжаться нѣсколько мѣсяцовъ сряду. Однако больному въ короткое время спанившись легче, и онъ начинаетъ ходить прямо держа спину. Самыя кривизны долгихъ костей явственно отъ оного исправляются. Второй врачъ есть г. Косиеръ (*Quaestio medica: An rachitidi Rubia tinctorum? Par* 1758. *Vid. Comment. de reb. in sc. nat. et med. gest.* Vol. 8. p. 540.). М.

гранами сухой померанцовой корки и 15 гранами столбчатого шмину, и все срубивши варить въ помурявленомъ глинномъ горшкѣ въ 6 фунтахъ свѣжей воды до шѣхъ поръ, пока останешся только 4 фунта. Послѣ проснудивши и давши ошстоялься, воду слить и держашъ въ стекляныхъ сосудахъ для ежедневнаго употребленія вмѣсто обыкновеннаго пищья. Поелику вышеупомянутый Врачъ ссылается въ семъ на многократныя опыты; то я умалчиваю о наблюденіяхъ, г. Проф. Бемеромъ надъ симъ корнемъ учиненныхъ, равно какъ и о шѣхъ, которые описаны въ Энциклопедіи (Том. 7. р. 479.)

Корень водяного щавля (Herba britannica (*)) равную въ сей болѣзни можетъ принести пользу, естли его такимъ же образомъ какъ Марену приготавливать и употреблять.

Напротивъ того достаточные люди могутъ поступить далѣе, и шѣмъ лучшаго и скорѣйшаго для дѣшей своихъ ожидать облегченія. На сей конецъ они могутъ

1) Кислому стараться испреблять посредствомъ капель, составленныхъ изъ полуца щелочной

Я з

чной

(*) *Rumex aquaticus* L. Хотя корень сего растѣнія въ Швеции весьма дѣйствительнымъ найденъ: однако онъ въ Нѣмецкихъ Аптекахъ неизвѣстенъ, равно какъ и въ Нѣмецкихъ сочиненіяхъ о лѣкарствахъ. Единбургскіе же Врачи содержатъ оную въ своихъ Аптекахъ подъ именемъ *Hydrodylarathum* и *Herba Britanica*, о чемъ можно читать Комментаріи на *New Dispensatory*

чной соли виннаго камня (*Sal tartari*), въ одномъ фунтѣ свѣжей и чистой рѣдниковой воды разпу- щенной, копорыя въ бутылкѣ должно держать и давать младенцу, смотря по различію возра- ста, отъ 20 до 100 капель въ стаканѣ воды по утру и послѣ обѣда, такимъ же образомъ, какъ выше сказано, три или четыре дня сряду упо- требляешь, и между тѣмъ по столькожъ времени переживатьъ. Такимъ образомъ оныя должно продолжать до тѣхъ поръ, пока у больного бо- лѣе не будетъ примѣтно никакихъ знаковъ ки- слоты, какъ на пр. кислаго дыханія и кислаго поту.

2) Еслили сии капли не слабятъ, что ча- сто можетъ случиться отъ соединенія щелоч- ной соли съ кислотою: то иногда нужно быва- етъ дать младенцу горькой рвенной наспойки (*Tinctura rhei atræ*), либо такъ называемой воде- рвенной (*Aqua rhei*), смотря по возрасту и сложенію, одну, двѣ или три не большія ло- жечки.

3) По окончаніи каждаго обѣденнаго и ве- черняго стола, должно ему давать по 5 или по 6 пилюль вѣсомъ въ 3 грана, составленныхъ или 9 грановъ спирмонаширпаго сгущенія (*Soupe de gal Helmont*), изъ одного грана высу- шеной бычачей желчи и равнаго сему количесва по-

1753 спир. 148 В., что довольно извѣстно, что Абр Мунипинъ (*de vera Herba Britannica Dis- tectatio*) оную считаетъ за одно и то же траву *Herba Britannica vegetum*, и приписываетъ ей всѣ тѣ дѣй-

корень корня Нѣмецкаго инбирю (*); все сіе смѣшавши вмѣсто, прежде должно составить густый составъ похожій на тѣсто, а потомъ сѣблать изъ него пилюли, которыхъ посеребрить и держать въ хорошо закуперенной спеклянной банкѣ. Таковыхъ пилюль можно выписать изъ Аншески за однимъ разомъ на одинъ, либо на два мѣсяца. Оныя въ разсужденіи выщелисаннаго студения весьма бывающъ сходны съ человеческою желчью потому, что оное состоитъ изъ тонкаго масла и лучшей щелочной соли.

4) Если примѣчено, что описанныя подъ N. 1 капли не такъ часто бывающъ нужны: то должно начать давать младенцу каждый день лихорадочную кору, а особливо въ порошокъ по 20, 30 или и по 40 грановъ въ день. Оную должно помочить водою, и сѣблать изъ оной родъ тѣста, помочъ свернувши въ кашытокъ, давать младенцу по столько за однимъ разомъ, сколько

Я 4

ко

дѣйствию, которыхъ дѣйствіе ей приписывали — Въ Шверин оная въ уваженіи по причинѣ своего дѣйствія въ дыглы и упрямыхъ ранахъ, и употребляется какъ внутрь, такъ и снаружи; а порошокъ оной употребляютъ для укрѣпленія и очищенія зубовъ. Она точно оказываетъ сіе дѣйствіе, и еще лучше дѣйствуетъ, нежели извѣстный конскій щавель (*Larathum asutum*). Ея горькій и вяжущій вкусъ уже подастъ объ ней хорошее мнѣніе, но понеже она растетъ у насъ, а наиначе воздѣянъ и воды въ весьма великомъ количествѣ, то сіе служитъ новою приливою, чтобы ее рекомендовать. М.

(*) Сего корня не должно тереть въ порошокъ прежде, нежели онъ понюхавшися, потому что давній порошокъ теряетъ свою силу.

ко онъ безъ затрудненія проглотить можетъ. Я уже выше упомянулъ, какимъ образомъ легко можно заохочивать дѣтей, принимать лѣкарства. Существенная соль лихорадочной корки также въ семъ случаѣ полезна. Для того я велѣлъ одному младенцу, который уже въ немалой степени имѣлъ въ себѣ Аглицкую немочь, употреблять оную въ пилюляхъ ежедневно по 10 грановъ чрезъ 9 мѣсяцовъ; при томъ каждое утро и вечеръ крѣпко тереть тѣло суконою, мастикою накуренною, и совѣщавалъ, чтобъ каждый день въ небольшой колясочкѣ по горницѣ его возили. Сѣе все имѣло такой успѣхъ, что онъ спалъ въ состояніи ходить, и послѣ никакаго знака прежней болѣзни не имѣлъ.

Еслили лихорадочная корка больному пропиваа; то можно ему давать пить Спаавассеръ изъ Пугоньерскаго источника. (*) А когда оной отпуда достать не лзя, то можно ее дѣлать по примѣру г. Проф. Мюро (**) искусственную

(Еппауа

(*) Сей источникъ, по причинѣ пріятности вкуса и лешучей соли, въ водѣ находящейся, другимъ чешыремъ, въ Г. находящимся, предпочитается, хотя то въ разсужденіи своей пияжести водѣ источника Герансперскаго и уступитъ долженъ. И такъ изъ одного только онаго вода почитается самою полезною. М.

(**) Изобрѣтеніе его состоитъ въ томъ, что онъ вливаетъ въ обыкновенную воду сколько желѣзнаго купоросу, чтобъ она имѣла въ себѣ такое же количество марціальныхъ частицъ, какое содержишь въ себѣ настоящая минеральная вода. А сѣ можно узнать чрезъ прилише

(Essays et Obs. de Medicine, de la Societ  d'Edimbourg Tom. 3. p. 66.). Либо можно употреблять для сего жел зную пулю (Boule de Mars), которую зашивъ въ тонкое полошенье и пов сивши на никит  въ полфунт  родниковой воды, каждое утро держаъ до т хъ поръ, пока она не получитъ такого цв та, каковъ бываетъ отъ настоящаго чаю. Сію всю воду младенц  долженъ до об да выпивати, а пуля должна на окошк  до сл дующаго утра вис ть.

5) Можно также сверхъ того по вечерамъ употреблять для младенца снаружи холодную воду вышеписаннымъ образомъ. И такъ сіи суть

А 5

самых

тѣхъ къ оной настойки изъ чернильныхъ ор шковъ. А именно, взявъ известную м ру минеральной воды, должно вливать въ оную по каплямъ вышеписанную настойку до т хъ поръ, пока она бол е не станетъ перем няти своего цв та. Потомъ наливъ равное количество оной настойки въ такую же м ру простой воды, приливать каплями въ оную зеленый купоросъ до т хъ поръ, пока она не получитъ свойственнаго минеральной вод  цв та. Еслили такимъ образомъ узнать однажды пропорцію жел зныхъ или марціальныхъ частицъ; то легко можно посл  того опред ляти настоящую м ру раствора и для большаго количества (Medical Essays and Observations Vol. 2. p. 50.). Но еще лучший и в рн йшій способъ, какъ составлялъ сію или другія ц лительныя воды, описываетъ г. Бергманъ (in K. Vet. Ac. Handl. Vol. 26. S. 94. и folg.). М.

самыя дѣйствишельнѣйшія лѣкарства пропавъ сей болѣзни.

Однако къ сему должно присоединить еще и хороше содержаніе. Въ разсужденіи котораго должно наблюдать слѣдующее: 1) Младенца должно переселить, естли только можно, съ мокраго, бѣлошитаго и низкаго мѣста на высокое и отъ воды отдаленное. Наилучше, когда только можно по здѣлать, опредѣлить для его жилья горницу въ самомъ верхнемъ этажѣ. Сверхъ того не должно его въ мокрую погоду выпускать изъ горницы, и накуривать оную масничкою, можжевельникомъ или тому подобнымъ. Должно также ее содержать чисто и довольно тепло, и даже лѣтомъ нѣсколько прохладивать, дабы воздухъ въ ней былъ сухъ, чистъ и ненаполненъ испариною, изъ живущихъ тамъ людей исходящею. Когда надобность не требуетъ вымыть въ оной полъ, то должно перенести дитя въ другую горницу и оставивъ его тамъ до тѣхъ поръ, пока она не просохнетъ. 2) Младенца должно сколько можно почаще въ небольшой колясочкѣ, въ которой бы онъ могъ покойно сидѣть, въ горницѣ, либо въ хорошую погоду и на открытомъ воздухѣ возить, и нѣсколько разъ въ день все шло сукоюю, мажничкою накуреною, шерсть. Когда дитя весьма сонливо; то должно его разгуливать и не давать много спать. Для того горница его должна быть свѣтла и стоять яблзи жилья другихъ людей, дабы отъ нихъ происходящій шумъ въ оной былъ слышенъ. Больной при томъ долженъ спать на твердой постелѣ, не на пуховикѣ,

но на набитомъ соломою матрацѣ (*). 4) Плавье его, а особливо рубашку и чулки должно часто перемѣнять, и оныя ежедневно посредствомъ выглаживания утюгомъ высушивать. Оное платье должно быть блѣдое, либо красное, сѣяли то младенцу непротивно. Ибо одна дѣвица, о которой упоминаетъ Д. Бухнеръ, то особенное имѣла, что всегда получала падучую болѣзнь, когда видѣла что нибудь красное. 5) Онъ долженъ сколько можно питаться однимъ только сухою пищею, и никогда до сыта не наѣдаться. По той причинѣ не годится для него чай либо нечистая вода, жидкіе супы, жидкая изъ муки каша, не давно испеченный, или мягкій хлѣбъ. Всякое жирное кушанье ему вредно, равно какъ и кислая, или къ окисанію склонныя вещи, каковы суть: жирное мясо, жирные супы, сыръ, масло коровье, кушанье съ деревяннымъ масломъ; также сладкія вещи, плоды, молоко и сыворотка. Не должно также позволять таковымъ большимъ вареной рыбы и варенаго мяса. 6) Питаніе ихъ должно состоять изъ воды, съ небольшимъ количествомъ не кислаго вина смѣшенной, либо изъ хорошаго поллива, съ небольшимъ количествомъ хмелю варенаго; а хлѣбъ должно замѣнять хорошими и негустыми сухарями. Впрочемъ можно позволить ему есть такіе мясные супы, съ которыхъ снять жиръ, также и яйцами

(*) Въ Англіи и Голландіи обыкновенно имѣютъ дѣтей, Аглинскою немочью одержимыхъ, класть вместо соломы на перестелъ (Felix mas). Сія трава полезна не только по причинѣ своей твердости, но и для вяжущей своей силы. М.

цѣлми приправленные, пивные супы съ яйцами, пивные супы съ хлѣбомъ, яйца всмятку, жареное изъ живюспин, изъ ягнятины, шедяшины и говядины, жареную чешуйчестую рыбу, гаше, желе изъ говяжьихъ ногъ и жареные печонки, рыбы, шелячи, куринныя, голубивыя, ушныя, гусинныя и другихъ животныхъ пшицъ, что обыкновенно Повара *Фол-грасъ* называютъ. Сверхъ сего въ кушанье всегда должно всыпать нѣсколь-ко чего янвудъ прянаго, какъ на пр. корицы, мушкатнаго орѣха, либо мушкатнаго цвѣту.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 24.

О головной водяной болѣзни.

Жалкое состояніе шѣхъ младенцевъ, у кото-рыхъ голова, въ разсужденіи обыкновеннаго размыру шѣла, бываетъ велика и скоро растетъ въ то самое время, когда прочія части шѣла никакого почти не имѣютъ приращенія, но впрошивъ много сожнутъ. Сей припадокъ назы-ваютъ Головною Водяною болѣзнию (*Hydrocephalus*). Впрочемъ она, слава Богу, рѣдко у насъ случается. Для того я могъ бы ее здѣсь и пропу-стить, естли бы не считалъ, что она принад-лежитъ къ предпринятому однажды мною намѣ-ренію. Можетъ быть нѣкоторые по крайней мѣрѣ пожелаютъ объ оной имѣть понятіе; а па-че чаянтя она, къ несчастію иногда и случиться можетъ. Я сомнѣваюсь также, чтобъ нѣкоторые изъ шѣхъ младенцевъ, кои означены неизвѣстною

болѣзнію (*) умершими, не отъ самаго перваго начала плачевнаго сего припадка лишились жизни. Сіе самое случилось недавно предъ симъ въ одномъ знатномъ домѣ.

Когда младенецъ родится на свѣтъ съ сею болѣзнію, то причиною оной могутъ быть различныя причины. Къ онымъ, можетъ быть, принадлежатъ также и наружныя припадки (**),

(*) Желательно бы было, чини въ Шведскихъ реэстрахъ нынѣшній перечень былъ перемѣненъ. Ибо въ ономъ заключаются, кромѣ оспы, кори и судоржнаго кашля, и всѣ прочія младенческія болѣзни, не смотря на то, что и другіе многіе припадки, какъ на пр. родимецъ, поносъ, рвота и тяжелый прорѣзъ зубовъ прошлому народу также довольно известны. Г. Кавалеръ Варгениинъ (Vetens-Kara Acad. Handl. 1755. S. 249) уже на сіе жалуется. И такъ легко можно видѣть, сколь великое число ежегодно оныя составили бы въ присланномъ мнѣ ономъ пріятелѣ реэстрѣ 1760 года, каковыя во всей Шведіи обыкновенно пишутъ, по означенному числу я сыскалъ умершихъ неизвѣстною болѣзнію однихъ только мальчиковъ въ одномъ году 5332, да дѣвочекъ 4451. Г. Арх. Генслера мнѣніе (Beuung zur Geschichte des Lebens u. d. Fortpfl. der Menschen auf dem Lande S. 52. und folg.) о сочиненіи въ домосней о болѣзняхъ порознь заслуживаетъ особенное вниманіе. М.

(**) Чини сія причина невыдуманная; по сіе можно видѣть изъ одного достойнаго примѣчанія случая водяной болѣзни, въ которой верхнія кости черепа были раздѣлены, и между толстою мозговою оболочкою и внутреннею над-
ко-

а особливо на младенческую головку действующее, какъ изъ пр. естали иногда беременная женщина брюхомъ ударится обо что либо твердое; либо когда зародышъ лежишъ чрезъ весьма долгое время въ одинакомъ положенн; что можетъ воспослѣдовать, когда она носитъ узкое платье, либо долго осматривается безъ движенія не перемѣняя своего мѣстоположенія, либо продолжительные имѣшъ запоры. Однако сие можешь произойти и отъ неизвѣстныхъ намъ причинъ, а особливо отъ вкоренившихся въ родимеляхъ скрытыхъ болѣзней. Хотя совершеннаго о семъ не можно имѣть свѣдѣнн; однако я всѣ оныя обстоятельства здѣсь упомянушъ намеренъ потому, что они обыкновенно могутъ быть причиною превращеннаго строенія зародыша, и потому беременныя всячески ихъ убѣгать должны. Хотя нечаянное испуганне отъ неприяшной вещи, которую нечаянно беременной видѣть либо слышать случилось, также для зародыша вредно: однако неслѣдуетъ, чтобъ оное могло способствовать такому пороку. Естали вышеупомянутое безобразіе головы еще въ маткѣ достигнетъ высочайшей своей степени; то непременно должна роженица имѣть тяжелые роды, о чемъ г. Стадтфизикъ

Норк-

костною плѣвою находилось великое количество воды. Причина случилась за восемь дней прежде родовъ, и была того рода, которая часто производитъ преждевременные роды, кровоизлитіе изъ матки и самую смерть роженицы при неестественныхъ родахъ. (Смотри Joh Thad. Linkosch Progr. de Hydrocephalo fetus partu. Prag. 1773.) М.

Норкепингскій Д. Іаковъ Гиденъ (*) въ прислан-
ныхъ имъ въ Медицинскую Коллегію рапортахъ
достойный примѣчанія упоминаетъ случай. Впро-
чемъ послѣ такъ ранняго начала сія болѣзнь
шѣмъ меньше бываешь жалка, что скоро пре-
кращается жизнь.

Правда болѣею частію сія болѣзнь при-
чается уже по прошествіи нѣсколькихъ недѣль
либо и мѣсяцовъ послѣ рожденія младенца на
свѣтъ: однако часто и въ такомъ случаѣ не
безъ основанія можно заключать, что она на-
чалась еще въ утробѣ матерней во время образова-
нія младенца; либо онъ ее получалъ при родахъ,
когда его головка въ узкомъ проходѣ дол-
гидше, либо весьма была сжата. Ибо сіе за-
держаніе въ родахъ иной младенецъ можеть пере-
нести безъ вреда, а другой вълѣтъ, ил. е. смотря
по различію расположенія и строенія его шѣла.
Впрочемъ не рѣдко случались и другія различныя
осложительства, которыхъ также, поелѣу они
ими себѣю были не маловажны, считали при-
чиною сей болѣзни, да и резонно, когда она
позже начиналась. Такъ на пр. приписывали при-
чину

(*) Смори Berattelser rörande Medicinal-Verket, af år
1765. S. 300. Повсѣе въ семъ случаѣ головка ма-
ленческаго была застрявши: то Г. Черепъ на спѣ-
лообразномъ шву позвонками г. Смелли вскрытъ.
Сначала послѣ того вышло нѣсколько крови, а
потомъ великое количество воды, и роды
окончены безъ дальнѣйшаго затрудненія. Млад-
нецъ въ первые два дни находился довольно
здоровъ, но въ третій получилъ жестокаго су-
дорга, который продолжались весь тотъ день,
и въ четвертый лишили его жизни. М.

чину оной простудѣ головы и вогнанной внутрь
чесоткѣ, хотя по сти случаи часно бывають и
безъ оныхъ слѣдствій. Иногда заключали, что
нѣкоторые возрастѣйшія дѣти получали оную
отъ несчастнаго какого либо приключенія, либо
отъ жестокой горячки. Въ такомъ случаѣ такъ
же жизнь ихъ была непродолжительна, хотя
нѣкоторые изъ сихъ младенцевъ жили по 3, по
4, а иногда и цѣлые 10 лѣтъ. Одинъ жилъ
болѣе 20 лѣтъ. А въ одномъ недалеко отъ Уп-
сала находящемся селѣ за нѣсколько лѣтъ предъ
симъ умерла одна женщина 45 лѣтъ, у которой
на шестомъ мѣсяцѣ отъ роду сдѣлалась чрезвы-
чайно большая голова, и послѣ она претерпѣла всѣ
отъ оной болѣзни происходящіе припадки. Об-
стоятельное о семъ повѣствованіе можно чи-
тать въ Диссертациіи док. Лейбм. Авривалля
(*de Hydrocephalo interno annotum XLV, ispr. Caroli*
D. Ekmark 1763) (*)

Есть-а

(*) Г. Соч. сей Книги собралъ различные случаи
больныхъ сею болѣзною, которые не смотря
на бѣдственныя свои обстоятельства долго жа-
ли; между ими жившіе 14 и 24 г-да были
всѣхъ счастѣ. Однако г. Христ. Готтл. Бюп-
тлеръ повѣствуетъ объ одной женщинѣ, что
она, имѣя водяную головную болѣзнь, жила до
31 года. Смори оное оное о семъ описаніе,
Кенигсб. 1773 года, 4. — Я могу здѣсь приба-
вить Исторію объ одной дѣвицѣ, называемой
фонъ Целлерфельдъ, которая здѣсь въ Гет-
тингѣ въ среднихъ числахъ Октябрю 1767 го-
да случилась. Мать, которая ее на рукахъ
держала, сказывала, что уже ей одинадца-
тый

Естьли такимъ образомъ голова безобразно приростае; то съикнове оно разшпрется и черепъ. Ибо въ то время кости онаго можно ощущать непосредственно подъ ногтями, волосами покрытыми, которыя въ то время не уступаютъ давлению. Всегда и уши увеличивавшиеся также и черепъ во всемъ своемъ пространствѣ, а особливо съ черепъ и въверху, и съ въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ никакого въ томъ соприкосновенія. По той причинѣ лобъ былъ очень весьма широкъ, а еще и того больше высокъ и выпучивался надъ глазами и на лицѣ, которое отъ того казется гораздо уже и коротче. Въ началѣ сей болѣзни кости, будучи

и

еще

шый и тѣ, хотя они тогда была на чашырхлѣннее лица. Скорость матери не позволяла мѣхъ хорошо рассмотреть безобразіе ея головы: однако высокій и широко выпученный ея лобъ и въ сравненіи съ тѣломъ превеликій запыллокъ каждому представляя въ ней страшный предметъ, который еще больше сожалѣнія былъ достоинъ по причинѣ ужаснѣйшаго изгладу, вывернутыхъ глазъ, выкунутому языку и неспособной улыбкѣ. Она ничего кромѣ Пана не говорила, коимъ именемъ всякаго, кого только ни видѣла, на вопросъ матери притискивала. Чрезвычайный апатизмъ, на который и сама мать жаловалась, давала она явственно знать горизиннымъ своимъ крикомъ, и се однимъ только хлѣбомъ досыта накормить было можно. Впрочемъ какъ отецъ, такъ и мать, которые были не только сами здоровы, но и много имѣли здоровыхъ друзей, приписывали причину сего порока нечаянному ея испуганію, на 18 недѣль послѣ рожденія случившемуся; ибо спустя послѣ того 27 недѣль явившіяся открылись знаки сей болѣ-

еще между собою посредствомъ вышеупомянутыхъ швовъ несоединены, остаются одна опѣ другой опдаленными такъ, что иногда ширнее, а иногда узшее между оными разстояние можно пѣмъ оцѣнать можно. Но еслили младенца, не смотря на бѣдственную его жизнь, чрезъ нѣсколько лѣтъ въ живыхъ остается; то каждая изъ сихъ костей вырастаетъ со всѣхъ сторонъ и послѣ либо всѣ вмѣстѣ сходящаяся, либо посредствомъ въ большихъ косточекъ, въ промежуткахъ ихъ малю по малу начинающихся и нарастающихъ, соединяются. Однако у шѣхъ большихъ, которые до сего доживали, послѣ того не примѣчено такъ великаго приращенія головы. Изъ чего заключать можно, что взаимное опдаленіе головныхъ костей только въ молодыхъ лѣтахъ бываетъ признакомъ болѣзни. Впрочемъ

сіе

болѣзни. Хотя сему мать не вѣрила; однако когда ей описали естественнымъ образомъ раздѣленіе головныхъ костей, и показали ся прѣзрачность, держа оную противъ свѣта, то она тогда увѣрилась. Въ то время кости были уже соединены и голова ровна, кромѣ одного мѣста съ лѣвой стороны, гдѣ видна была длинная бразда, или рубецъ, который по шѣмной кости отъ стрѣловиднаго шва наискось простирался. О слабомъ смыслѣ можно уже было заключать изъ вышенисанаго. Она была весьма сонлива. Ноги были чрезвычайно холодны, и по той причинѣ всегда ихъ мать тепло держа въ спаралась. На лицѣ цвѣтъ былъ весьма нездоровый. Впрочемъ на шѣлѣ, котораго однако обнажить не могъ, я не примѣтилъ никакого порока кромѣ того, что на ссипавахъ перстовъ были опухоли и бугры. М.

се заслуживаетъ великое вниманіе по тому, что и въ такомъ возрастѣ сія болѣзнь начинается, и скорого прѣбыванія вспоможенія, естьли только ее можно излѣчить. Большею частію съ оною прибавляется полстопта и пивердость костей черепа, хотя по и описанъ одинъ шакій примѣръ, что у больного противъ свѣчи внушрешнія головныя части видѣны было можно.

Лишь только начнется сія болѣзнь; по потчасъ младенцу становится несноснымъ верликальное положеніе, и когда его кто спавенъ прямо держитъ, по ему дѣлается тяжело и приключается рвоша и одышка, но коль скоро его олимпъ положить, по се все въ ту же минушу проходитъ. Хотя онъ прежде того нѣсколько часовъ сряду безъ сна могъ пробывъ; однако въ се время почти безпрестанно ему спать хочется. Такыя припадки и у нѣсколько возрастныхъ дѣтей заслуживаютъ вниманіе наблюдение. Что же касаясь до младенцевъ, по, коль скоро они окажутся, прилѣжно должно осмотрѣть, въ какомъ состояніи находится черепъ, а особливо ш.м., и примѣчать, не расширяется ли оное, либо не становится ли длиннѣе. Во время приращенія болѣзни, какъ я выше упомянулъ, прочія тѣла части весьма медленно растутъ, члены бываютъ малы, тонки и сухи. Въ короткое время младенецъ становится не въ состояніи прямо держать тяжелой своей головы, а еще и меньше того становится на ноги. Едва онъ можетъ двигаться, а иногда и вовсе бываетъ недвижимъ. А отъ безпрестаннаго лежанія обезображается больше или меньше его спавъ. Тѣ младенцы, которые долѣ въ сей болѣзни жили, рѣдко

рѣдко выучивались хорошо говорить, большею частію были малоумны (*), рѣдко имѣли совершенство во вѣщныхъ чувствахъ, страдали рвотою, а нѣкоторые подвержены были частымъ судоргамъ. Словомъ, они проеждали самую бѣдственную жизнь. Не великую пакъ же отраду подавали и нѣ не многіе примѣры, въ коихъ описываются нѣкоторые младенцы, либо вовсе сихъ дѣйстви не имѣвшие, либо имѣвшие ихъ не въ такой дѣятельности. Ибо одно лишение способности двигать головою недовольнымъ ли бываетъ мученіемъ?

Вѣрнѣе тѣмъ, ранѣе или позже опъ сей болѣзни умершихъ, явлено доказываетъ, что часто бываешь разинути мокрою, которая съ самыхъ малыхъ лѣтъ до тѣхъ поръ, пока кончи начнуишь имѣть сиротизание, въ ономъ накапливается. По той причинѣ справедливо ся болѣзнь называетъ головою водяною болѣзнию внутреннею (*Hydrocephalus internus*). Вода обык-

но-

(*) Г. Доналда Мэдо (in *Medical Transactions* Т. 2 р. 356.) Исполни объ одномъ мальчикѣ, которому еще не исполнилось 8 лѣтъ, весьма примѣчательна дослѣдств. Он имѣлъ такъ великую голову, что она была въкругѣ въ 2 фута и 4 дюйма. При всемъ томъ онъ былъ столь-кожъ попуеи и разуменъ, какъ и прочіе дѣти сего возраста, имѣлъ ясную память и мало по малу припыкъ довольно хорошо ходить. — Равнымъ образомъ упоминаетъ Г. Дунканъ (*Medical Cases and Observations* р. 239.) объ одномъ мальчикѣ, который хотя еще болѣшую имѣлъ голову, однако говорилъ умѣлъ, и былъ великой болтунъ. М.

новенно сыскывана въ пакѣ называемыхъ мозговыхъ пуспырьяхъ (*Ventriculi cerebri*) (*) ш. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ внутреннее существо мозга

Θ 3

какъ

(*) Оной гдѣшней водяной болѣзни, - кшорая состоитъ въ накопленн воды въ мозговыхъ вудинахъ, савъ нѣ Виттъ *Observation on the Dropsy in the brain* значащихъ послѣ смерти его *Wetness* стр. 723.) гдѣ гдѣ 20 наблюдений, которыя весьма ясно даютъ объ ней понятие. Оная, для различія другихъ скопленій воды внутри черепа, называется водяною болѣзною мозга (*Hydrops cerebri*), но гораздо бы лучше ее называть водяною болѣзною мозговыхъ пуспырей (*Hydrops ventriculorum cerebri*). Г. Макорида (*Introduction to the Theorie and Practice of Physic. Vol. 2. p. 336.*) называеиъ ее *Febnis hydrocephalica*. Вессалій первый (*de corpor. human. libr. a L. I. c. 4.*) оную примѣнилъ. Въ началѣ, какъ примѣнилъ Виттъ, трудно ее различить отъ медленной несорядочной лихорадки, отъ гдѣшъ происходящей. Однако отличаеиъ она уже и тогда отъ другихъ болѣзней рвотю, головою болью и тѣмъ, что больной на свѣтъ глядѣть не можетъ. Между примѣчаниями его описанъ одинъ только мальчикъ, которому не было еще и полугода, а прочие были отъ 2 до 16 лѣтъ Ни у одного изъ оныхъ не примѣнилъ онъ ни опухоли въ головѣ, ни раздѣленія черепныхъ костей, и поному онъ думаетъ, что се случаетъ только у новорожденныхъ младенцевъ. Хотя они весьма любяи дѣлать въ послѣдн; однако часто бываи случаи къ безсонницѣ, нежеи къ гдѣшму сту. У дѣсяти сею болѣзнию умершихъ младенцевъ онъ нашелъ отъ 2 до 5 унцъвъ сыворотъ, шонкой, на оигъ сѣв-

какъ вверху, такъ и по спорочамъ вмѣсто сходится. Особливаго примѣчанія достойно то, что вода сыскивана внутри мозга, заключенная въ собственные пузырьки. Иногда сыскивана она на поверхности мозга, между онымъ и ближайшею къ

связанная воды непосредственно подъ такъ называемымъ мозолистымъ тѣломъ (*Stria callosa*), и сверхъ того у нѣкоторыхъ въ третьемъ и четвертомъ мозговомъ пузырькѣ; но никогда оной не находилъ между толстою мозговою оболочкою и мозгомъ, либо между полукурдями мозга (*Hemisphaeria cerebri*), либо непосредственно на самомъ мозолистомъ тѣлѣ. — Г. Ру *Journal de Médecine, Chirurgie etc.* Tom. 30 p. 20.) видѣлъ также у своего двинца двинцаго брата воду, вышедшую въ каналъ спинной жилы. Кромѣ Винца много сдѣлалъ поспенія, служащаго къ познанію внутренней головной болѣзни, г. Фортергияль и Ватсонъ (*med. Observations et Enquiries* T. 4. p. 40. 78. 321.). Всѣ они въ томъ согласны, что припадки оной бывающіе следствены сѣ происходящими отъ глицъ. Фортергияль рѣдко примѣчалъ сію болѣзнь прежде третьяго года, но чаще всего оную видѣлъ на дѣтияхъ отъ 5 до 10, а на двухъ и между 17 и 19 годами. Онъ находилъ только по 2, по 3 либо по 4 унцы воды внутри мозга подъ мозолистымъ тѣломъ. Нѣкоторые младенцы не смотря на то, что по наружному виду казались быть здоровы, оную въ себѣ имѣли, и въ четырнадцатъ дней лишались жизни. Боль въ какомъ нибудь членѣ, безпрестанную головную боль и испорченый желудокъ онъ счищаетъ самыми точвѣйшими признаками сей болѣзни. Г. Гукъ и г. Ватсонъ примѣтили оную нѣсколько разъ

къ нему тонкою оболочкою, а иногда такъ же между оною и наружною полнѣею мозгового оболочкою, которая была оплѣнена отъ внутренней поверхности черепного свода, и такимъ образомъ давила оной тѣсно. Отсюда въ семъ весьма рѣдкомъ случаѣ великое такъ же количество было воды и въ мозговыхъ пусыряхъ; и потому весьма вѣроятно, что она прежде оныхъ накопилась и послѣ того сыскала себѣ отсюда выходъ. Вода большею частію бываетъ свѣтлая; но иногда сыскана также и смѣшенная съ кровью, либо на дѣхъ пусырей съ гноемъ, а иногда и лопнувшая. Оной сыскивано отъ одного до восьми фунтовъ. Сверхъ того повѣствуютъ, что у одного новорожденнаго младенца оной было болѣе 24 фунтовъ, да и всегда она въ большемъ количествѣ бываетъ у младенцевъ, нежели у взрослыхъ. Впрочемъ и самое малое скопление воды въ состояніи уже сдѣлать въ мозгъ разстройку, и какъ оный, такъ и вода нимъ проходящія чувствительныя жилы къ черепу, которыми онъ со всехъ сторонъ окруженъ, придавить. По сей причинѣ верхняя часть мозга, которая впрочемъ бываетъ толщиною въ два или три перста, иногда сыскана такъ тонка, какъ шнѣ средней величины нити, либо какъ листъ тонкой бумаги, и не примѣчено ни малѣйшаго знака обыкновенныхъ отъ избытка подобныхъ приливовъ. Когда вода долго находилась надъ

и у взрослыхъ. Не всегда она также и у сихъ происходила отъ убою, либо отъ другой какой нибудь наружной причины. Однѣ только разъ г. Ватсону (стр. 324) удалось ее излѣчить. М.

мозгомъ, но оный отъ него былъ весьма слабъ и шиваѣ. Иногда онъ былъ растворенъ не по добле размазни, аюо до самой верхней части сшановой жилы истощенъ.

Иногда случается, что вода въ черепѣ начиняетъ скопляться уже на второмъ или третьемъ году послѣ рожденія. Въ такомъ случаѣ голова увеличивается медленнѣе и только до извѣснаго времени, послѣ чего приливше воды перестаетъ. Тогда голова не много сверхъ обыкновеннаго бываетъ расширена, и только въ томъ оме изъ выпяченныхъ припадковъ показуется; а потому и не подозреваютъ на головную воду. Лзнь (и самое случается съ м... и младенцами, страдающими Аглинскою истощью. Они часто бываютъ малоразумны, имѣютъ раздутое лицо, опекшую кожу, и весьма кажутся похожими на младенцевъ, страдающихъ головою водяною болѣзью; а иногда случается у нихъ даже и настоящая головная водяная болѣзнь. (Смолпр. сыр. 499.) Впрочемъ урокъ у сихъ младенцевъ, въ разсужденіи питания костей существующій, способствуетъ къ увеличиванію головы: ибо костяное существо оныхъ, между шѣмъ какъ бы распухаетъ.

Но часто къ несчастно равнымъ образомъ накапливается вода въ мозгу и взрослыхъ людей, только она у нихъ не расширяетъ черепа по тому, что крѣпость пѣ костей довольное препятствіе сего имѣетъ сопротивленіе. По сей самой причинѣ рѣдко у нихъ она и накапливается въ весьма великомъ количествѣ. Однако, понеже

огая

оная также придавливаютъ мозгъ и происходя-
щая отъ него чувствительная жизнь; но слѣд-
ствія оной съ одинакою бывають сопряжены
опасностию. Оныя же суть слабость, лише-
ние разума, параличъ, посирѣхъ и внезапная
смерть. (*)

Кромѣ сего съ силами наклоненіями въ вну-
тренняя мозга воды соединены бывають еще
другіе вещества, однимъ слава Бѣгу, рѣдкіе
припадки, съ которыми иногда младенцы на-
свѣтъ рождаются. Однимъ изъ нихъ ссоченнымъ въ
мозгѣ опухоли, которая иногда бываетъ по-
добна карасику, и случается либо на лѣвой либо
на правой сторонѣ головы, либо на затылкѣ.
Оная бываетъ различней величины, иногда съ
яйцо, а иногда съ самую голову, либо и боль-
ше (**). Таковыя опухоли бывають успроены на
подобіе мышка, въ янхъ сыскиваны большія или

Θ 5

мень-

(*) Г. Циммерманъ (v. d. Eijlberg Тп. 2. з. 543.)
повѣствуетъ, что одинъ изъ его землякъ въ,
который своею увѣреніемъ представлялъ чудо
въ Нанту, въ наносахъ въ спавъ тауль на по-
добіе скоша, когда въ его мозгъ и между обо-
лочками оная скопилось около фунта воды. Г.
Д. Линъ узнавъ, отъ чего происходитъ сия
его болѣзнь, два раза възвудилъ его рассу-
докъ неправдоюдами воду лѣкарствами; но
наконецъ Природа перестала онымъ лавино-
ваться. М.

(**) Сію болѣзнь называютъ мозговою кралою
(Hernia cerebri); отъ оной г. Сювалье (Colicchio
Observat. medico-chirurg. Falco. I. Art. 1.) много
какъ чужихъ, такъ и собственныхъ написалъ

на-

меньшія части мозга, внутрь имѣющія пустоту, содержащую въ себѣ воду. Сія впадина, посредствомъ большей или меньшей дыры, въ тонкой кости черепна, въ которой сія опухоль прикрѣплялась, находящейся, имѣла сообщеніе съ однимъ изъ мозговыхъ пустырѣй. Вскрытіе сей опухоли вѣвело облегченія ускорило смерть. Изъ всего сего явственно примѣчено, что вода, прежде въ которомъ нибудь мозговомъ пустырѣ скопившаяся, часть мозга сего слабойшее мѣсто хрящеватыхъ оболочекъ, въ которыхъ мало по малу зараждающа кость, выжимала. Большею частію сія болѣзнь въ скорости прекращала жизнь. Однако иногда она будучи не столь велика, такъ какъ изъ удачныхъ опытовъ славнаго Французскаго Врача де Драна явствуетъ, совершенно была вылѣчиваема (*). Смыслъ самый онъ

наблюденій. Опухоль самая большая изъ доселѣ примѣченныхъ начиналась отъ Амфиобразнаго шва (*Sutura lambdoidea*) и простиралась до самаго перваго шейнаго позвонка. Впрочемъ младенецъ былъ живъ до 25 дня послѣ рожденія. Кромѣ упомянутыхъ г. Ф. Розенштейномъ мѣстъ, можетъ еще сія опухоль случиться и на лбу, такъ какъ оную весьма великую на правой сторонѣ онаго примѣтилъ Факстъ (*K. Vet. Acad. Handl. 1778. S. 182. и ff.*) у одной четырехлвпней дѣвицы. При ощупываніи въ оной чувствовалось было бѣеніе, и во время давленія къ голокѣ больная ощущала въ ушахъ шумъ и склонность ко сну. М.

(*) Снеси сюда употребляемый г. Салленеуве способъ лѣченія. Онъ состоитъ сдѣлать изъ свищу

онъ подалъ намъ несумѣнную надежду, что и во всей внутренности черепа такимъ же образомъ распространившуюся водяную внутреннюю головную болѣзнь, когда она еще не застарѣлая, можно излѣчивашь.

Другой порокъ по своему свойству различиваетъ онъ первого однимъ только мѣстоложеніемъ. Иногда на одной части хребта (*), а особливо на поясничныхъ позвонкахъ, иногда

воздѣ

ду блядку в личичю болюе, нежели емя опухоль, и проколовши въ ней нѣсколькѣ дырочекъ, пришить къ мѣстеческой пачкѣ. По средствѣмъ слабаго сего, но равномѣрнаго прижиганія опухоль мало по малу спавовитсѣ меньше, и косы безпрятствѣнно заростаешъ (Memoires de P. Ac. de Chirurgie.). М.

(*) Таковыя примѣры описываетъ г. Генералъ Директоръ Аксель (Abhandl. der Acad. der Wissensch. 1748. im letzten Quartal), которые онъ видѣлъ на двухъ мальчикахъ, изъ коихъ одному было восемь, а другому семнадцать лѣтъ.

Въ разсужденіи необычайнаго возраста, до котораго оба сіи мальчики, не смотря на то, что имѣли водяную болѣзнь хребта, достигли, заслуживаетъ также примѣчаніе описанный г. Тревомъ (Nov. Act. Nat. curios. T. 2. p. 324 и 199.) случай объ одной дѣвицѣ, которой уже болѣе двенадцати лѣтъ было отъ роду. Хотя она страдала водяною головною болѣзнію; однако имѣла здравый разумъ и мѣсячное кровоочищеніе; во на шестомъ году лишилась употребленія ногъ, и послѣ сдѣлавшихся на ногахъ нечистыхъ ранъ умерла. Другой также младенецъ на пятомъ году еще былъ живъ. — Къ сему присовокупить можно еще недавно

опи-

возаъ задняго прохода, рѣшю на другомъ мѣстѣ
спины бываешь опухоль, которая, естли ея по-
давить, мягкости сего ознаменитъ, что тамъ
находится жидкое вещество. Сверхъ того она
причиняетъ параличъ въ нижелъжизни чл-
скахъ: приномъ ноги въ семь случаевъ большею
частью изъволялась, либо безболѣнно ро-
дшущи. Елики сей припадокъ соединенъ съ
сверхъестественною великою тѣлѣ; то
она потчасъ становится хроническою, кода скоро
будетъ вскрыта нижехребетная опухоль; но на-
прямикъ того опять увеличивающа, тогда ея
отверстие закроеся. Вскрытие равнымъ обра-
зомъ и сей опухоли причиняло скоростную
смерть

описанные, по примѣчанію доскойникъ о водя-
ной болѣзни хребта, случанъ, хотя въ нихъ
описываются и не саникомъ долго живише
младенцы, а именно: Изъ наблюдений г. Ге-
вучаппа и изъ описокъ Ученато Хирургиче-
скаго Собранія (Th I. S. 354. и folg Tab. 3.)
изъ Nov. Act. Nat. curios. Томъ 3 Obs 34. p. 141
г. Рава, г. Ганке, да med. u. chir. Wahrh. I.
Samml. n. 1. Roux Journ. de Medicine, Chirurgie T.
29. P. 145. тѣхъ описокъ примѣчанія доской-
никоу, что опухоль, во время вдыханія въ лег-
кия воздуха, увеличивалась, а во время изды-
ханія уменьшалась, и изъ Medicinal-Ver-
keis Hist. S. 237 г. Гаппа. Послѣдній изъ
сихъ Браней имѣлъ одного малюго младенца,
у котораго опухоль была на крестцѣ, а дру-
гую, у котораго раздѣлокъ находился въ шре-
шнемъ и четвертомъ спинныхъ позвонкахъ.
Оба они умерли въ четвертомъ мѣсяцѣ послѣ
своего рожденія. М.

смерть. Сообщение сихъ частей между собою ясно намъ показываетъ Анатомия, изъ которой явствуетъ, что вода, скопившаяся въ верхнихъ либо боковыхъ пустотахъ, выходящъ изъ оныхъ чрезъ известный опытный путь въ каналъ спинной жидкости, по которой опускается внизъ, достигая до крестца въ седмъ мѣсяцъ плодную оболочку и останавливаясь отъ оныхъ мучобъ. Крестецъ состоитъ изъ трехъ, а иногда менѣе число близлежащихъ спинныхъ позвонковъ сзади бывающихъ раздвоенны, тѣ у взрослыхъ людей нащупать можно внизу, тамъ они лежатъ, вмѣстѣ которыхъ однако у зародышей либо у новорожденныхъ младенцевъ бываетъ одинъ единый крестецъ, а иногда и оныхъ не бываетъ. Все сие происходишь либо отъ одного только накопленія воды, либо сверхъ того причиной сему бывающъ и худое строеніе костей, которое водѣ подаетъ случай, оная не представляющая имъ достигнуть полнаго совершенства. (*) По сей самой причинѣ сию болѣзнь называютъ раздвоеннымъ крестцомъ (Spina bifida). Порокъ, которому, когда онъ еще находится въ первой своей степени и бываетъ ближе къ заднему проходу, т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ не издѣлись исполнихъ позвонковъ, каждаго нѣмѣе легко можно пособить, какъ и вышесказанному. Напротивъ того труднѣе его врачевать, когда онъ бываетъ въ утолщенныхъ поз-

(*) Сло неизвестность, въ которой г. Авишрѣ такъ какъ и другіе ученые Мужи находятся, кажется мнѣ и довольно въ моемъ сочиненіи поспѣшно (слова Франца Вилле ex та а offiis conformatione imita: Gott. 1779. M.

позвонкахъ , потому что тамъ не можно посредствомъ одного прижмания исправить пришедшихъ въ распрѣйку костей. Иногда еще случается , что сіе назоленіе воды , въ одномъ вышеписанномъ мѣстѣ сдѣлавшись , просигирается послѣ вверхъ.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ головная водяная болѣзнь имѣетъ свое начало и собственное мѣсто прѣбыванія внутри черепа. Но кромѣ сего бываетъ еще и наружная водяная головная болѣзнь , когда , т. е. жидкая мокрота накопится между черепомъ и вышними оныя покровами. Но какъ оныхъ есть много и одинъ лежитъ на другомъ , то она можетъ скопиться въ различныхъ мѣстахъ. Въ сей водяной болѣзни , которая также и у взрослыхъ непосредственно подъ кожей по всему тѣлу распространяется , равнымъ образомъ распухаетъ и лицо. Рѣка , на головѣ случающаяся , также бываетъ сопряжена съ подкожною водою ою опухолью. Сіе самое случается также въ ость , а иногда и въ зубной боли , въ прошилахъ и въ другихъ головныхъ отъсѣкахъ. Однако въ большей части сихъ болѣзней не столько распухаетъ та часть головы , которая обращена въ волосы. Еслили же она водою бываетъ раздѣлена ; то сіе собственно называется наружною водяною головною болѣзнию ; хотя бы она находилась между сухожильнымъ проплетемъ (Galea arpentotica) и наружною надкостною пластвою черепа (Periosteum) , либо между сею и самымъ черепомъ ; въ которомъ случаѣ натурально опухоль должна быть глубже и тверже. Многіе долговременные и искусные

Прак-

Практики сего вида никогда не видѣли; изъ чего по справедливости заключить можно, что онъ рѣдко случается. Иногда наружная головная водяная болѣзнь примѣчена вмѣстѣ съ внутреннею, и въ такомъ случаѣ она была слѣдствіемъ послѣдней. Но не многие примѣры, въ которыхъ одна только наружная головная водяная болѣзнь описывается, довольно доказывающъ, что ее равнымъ образомъ и взрослые должны опасаться какъ и малолѣтніе.

Водяная болѣзнь такимъ же образомъ начинается и въ головѣ, какъ въ другихъ частяхъ. Мелкіе пузырьки такъ какъ и прочія различной величины впадины, между твердыми и мягкими частями находящіяся, посредствомъ тонкой водяной испарины, безпрестанно изъ кровеносныхъ жилъ исходящей, защищаются бывающъ отъ срастѣнія; равно какъ и самыя твердыя части отъ окръпости. Изъ сего легко можно заключать, что сколько бы ни мало и незначительное чрезъ короткое время накопывалось оной количество; однако, если бы она изъ того мѣста, куда приливается, ни мало не убывала, по сколько бы много чрезъ нѣсколько дней или мѣсяцевъ ее собраться должно. Для отвращенія вреднаго сего слѣдствія премудрый Творецъ устроилъ безчисленное множество всасывающихъ жилъ (*Vasa absorbentia* s. *Vasa lymphatica*), которыя сію жидкость по мѣрѣ того, какъ переполняются, въ себя поглощаютъ, и пакы оную особливими путями приносятъ въ кровь, и такимъ образомъ она ничего больше не производитъ,

дитъ, какъ только смягчаеиъ, сколько нужно, часни нашего тѣла. Напримѣвъ того все то, что находится въ сокахъ лишняго и испорченнаго, относится къ особливымъ для того опредѣленнымъ мѣстамъ. Слѣдовательно, когда сырость въ приливши и испражненн вышесписанной испарной влажнѣ несообразна и велика, но больше оной въ какія нибудь впадины прибываетъ, нежели улетаетъ; то она тамъ собирается подъ видомъ настоящей воды. Такимъ образомъ обыкновенно происходитъ водяная болѣзнь во всѣхъ тѣлахъ частяхъ. Слѣдовательно (слижайшею оной причиною быть могутъ либо потовыя склянки, количества) и способу самой испарной, либо всасывающіе сосуды. Но всего хуже, когда и то и другое къ сему способствуетъ, что обыкновенно бываетъ, когда водяная болѣзнь уже чрезъ нѣсколько времени продолжалась.

Испарина весьма можетъ накапливаться тогда, когда внутреннія и нѣжныя склянки разслабнутъ и столько разширятся, что больше обыкновеннаго выйдутъ изъ нихъ мокроты, а особливо, еслили еще при этомъ разширится и кровь, что можетъ произойти отъ многихъ немаловажныхъ причинъ, кромѣ сего иногда можетъ быть отъ долговременнаго прекращенія испарины на поверхности тѣла, либо отъ всасыванія мокроты изъ влажнаго воздуха; либо отъ излишняго употребленія жидкой пищи и питія. Часто случаются еще вышесказанныя причины влечь и у зародышей, и чаеиельно происходящія не отъ чего иного, какъ отъ того, что
иногда

иногда кровеносныя жилы такъ бываютъ сдавлены, что кровь медленнѣе въ нихъ протекаетъ, либо почти на одномъ мѣстѣ спонилъ, отъ чего не только устья кровеносныхъ сосудовъ расширяются, но и самая кровь внутри тѣла подвержена бываетъ такой же переменѣ, которую мы въ ней примѣчаемъ, когда она выпущена будучи нѣсколько постоятъ на шарѣлкѣ, т. е. водяная часть отъ оной осѣдлается. Слѣдовательно и испарина можетъ быть гуще, такъ что всасывающія жилы малѣйшими своими устьями не въ состояніи бываютъ оную поглощать. Сверхъ того и самыя сѣи отверстія могутъ лишаться сжимательной своей силы, либо мнѣйшія изъ нихъ могутъ быть прижаты, а всасывающіе сосуды иногда бываютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разорваны, хотя то и рѣдко сіе случается. Но тѣмъ чаще причиною сему бываютъ вышеупомянутыя потовыя склянки, которая до тѣхъ поръ существуетъ, пока расширенныя части остаются салбыми. Ибо, пока кожа и слѣдовательно внутреннія части не получаютъ равной крѣпости, отверстія всасывающихъ сосудовъ не могутъ быть ни хорошо открыты, ни довольно приближаются къ испаринѣ, которую они поглощать должны. А между тѣмъ испарина безпрестанно можетъ накапливаться. Для того во всякомъ родѣ водяной болѣзни должно знать и сіе обстоятельство.

Ибо лѣченіе водяной болѣзни всегда требуетъ, чтобы скопившуюся воду какъ можно скорѣе испаряли, и всѣ причины, къ новому оной

накопленію способствующія , прекратить. Къ первому намѣренію обыкновенно мы иногда достигаемъ посредствомъ нѣкихъ лѣкарствъ , которыя либо слабятъ , либо гонятъ мочу , и такимъ образомъ , хотя не прямымъ путемъ , испражняютъ излишнія мокроты ; а иногда посредствомъ прикладыванія нарывныхъ пластырей , приспосовѣнными нарѣзываніями и дланіемъ нѣкоторыхъ отъерснѣй , чрезъ копорыя вода потчасъ изъ своего мѣста вытекаетъ. Другое напропнѣе того требуетъ особеннаго вниманія и всегда состоитъ въ томъ , чтобы смѣсь естественно расширенныя части спянушь и укрѣпить.

Симъ самымъ способомъ должно стараться лѣчить и тѣхъ младенцевъ , у которыхъ вышеупомянутымъ образомъ въ головѣ скопившаяся вода начинаетъ быть примѣтна. Для того должно почаще имъ давать мѣнную кашку (*Elevarium de trana*) съ ревенемъ , либо яаппою ; либо такъ называемую слабительную кашку (*Electuarium lenitivum*) , съ розовымъ сиропомъ , съ Александрійскимъ листомъ слѣанинымъ , смѣшенную на подоліе густаго соку. Можно при томъ давать также слабительное и кормилищъ либо матери , на томъ концѣ , чтобы молоку доставить слабительную силу. Еслили же младенецъ уже нѣсколько постарѣе , то можно для него смѣшивать съ вышеписанными лѣкарствами по нѣскольку грановъ морскаго луку (*Squilla*) , который лучше всѣхъ прочихъ лѣкарствъ скопившіяся мокроты вскорости испражняетъ

ияетъ либо мочею, либо нитомъ, а иногда и
тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Только должно остере-
гаться, чтобъ оный, какъ се часто случает-
ся, не произвелъ рвоты. Ибо хотя оная не столь-
ко въ другихъ случаяхъ, но и въ сѣмъ самомъ
будучи не велика, можетъ принести маленку
великую пользу; однако, еслили будетъ слани-
и долго продолжится, то можетъ причинить
вѣснкій вредъ, потому что мозгъ и тѣло того
уже претерпѣваетъ давленіе, а еще еще нуде
онъ сильной и продолжительной рвоты увеличи-
вается. Когда вода, какъ се иногда случаетъ,
находится въ черепа, то оную можно весьма
скоро истребить посредствомъ тарбываній вдоль
затылка. Оныя же, сколько того требуетъ на-
добность, должно посредствомъ прикладыванія
на нащипанной изъ ветоши прѣдъ дѣйстви-
тельной мази (*Unguentum digastrum*) держать оп-
крытыми, а между тѣмъ голову припарывать
извѣстковою водою, смѣшанною съ небольшимъ
количествомъ винограднаго либо горячаго вина,
или, что лучше, съ карфарнымъ спиртомъ.
Нарывный пластырь иногда се самое можетъ
произвести дѣйствіе.

Еслили же оная накопится внутри черепа,
то ни выписанныя тарбыванія, ни другія ка-
кія либо ошвеція никакого не производятъ
на нѣ находящаеся тамъ водѣ дѣйствія, но
только предскаряють смерть. Для того ни-
когда ихъ въ сѣмъ случаѣ употребить не долж-
но. Они только нарывные пластыри тогда
признаны за полезныя, а особливо отъ Барона
фанъ Свингена, который видѣлъ весьма хорошее
У а ! отъ

опъ оныхъ дѣйствіе въ такихъ случаяхъ, которые по его мнѣнію представляли внутреннюю водяную головную болѣзнь. Онъ велѣлъ сдѣлать девять частей доннаго пластыря (*Euphrasium de meliloto*) съ одною частью нарывнаго и обривши волосы, прикладывать къ младенческой головкѣ. Сей пластырь по два или по три раза въ день былъ перемѣняемъ для того, чтобы опъ онаго болѣе происходило раздраженіе. Опъ чего сдѣлался у больного весьма сильный потъ, и вогнанная внутрь чесотка, опъ которой глаза, трудъ и всѣ чувствительныя жилы страдали, въ скорости высыпала (*).

При

(*) Однаго доказательства г. Добсона и Перси-валля о недействительности въ сей болѣзни нарывныхъ пластырей не должно считать за маловажныя. Но понеже г. Ф. Р. такъ, какъ и многія Англическіе славные Врачи, какъ на пр. г. Фермергиль и Вилсонъ рывши, образомъ и водяную болѣзнь мозговыхъ пустыррей разумѣютъ подъ общимъ именемъ внутренней головной болѣзни (*Hydrocephalus internus*): то я намеренъ здѣсь сообщить новое открытіе о дѣйствіи ршуща надъ скопившагося внутри мозговыхъ пустыррей водою, которое велико сдѣлало приращеніе въ Медицинскій Практикъ. А именно Добсонъ (*Medical and surgical Commentaries Vol. 6. стр. 219.*) надъ четырьмя младенцами, а послѣ него и Персиль (на сказ. м. стр. 224.) надъ собственными дѣтми испытали, что ршуть, употребивъ безълучи снаружи, либо внутрь до полнѣе цѣли большого слюноотеченія, которое и должно скоро прекращать, совершенно съ болѣзнь излѣчивае тѣ. Г. Добсонъ послѣ онаго давалъ Лихорадочную борзу. М.

При всемъ томъ однако наипаче должно
вспариваться, чѣмъ голова по мѣрѣ испражнения
воды сжатовилась меньшею. Но сіе не такъ лег-
ко можно сдѣлать, какъ привести въ сжа-
щеніе мягкія части, скопившеюся водою прежде
растянушыя. Ибо сіи не такъ скоро теряютъ
свою упругость. Напримѣвъ того черепъ въ та-
кой величинѣ, въ которую бываетъ приведенъ,
часть оной часу болѣе опроверженъ, и самъ собою
не иначе можешь суживаться, какъ только по
мѣрѣ того, сколько плѣвы, между костями нахо-
дящаяся, въ самомъ нѣжномъ возрастѣ сіе позво-
ляютъ. Слѣдовательно, когда черепъ однажды
весьма разширится, такъ что кости даже и въ
то время, когда оны уже одна къ другой прика-
савшіяся, большую внутрь составляютъ впадину,
нельзя какова нужна быти для содержанія моз-
га, по уже ничѣмъ сему пособию не можно. Ибо
если въ такоу случаѣ еще остается для во-
ды горъ кие мѣсто, которая, хотя бы болѣе и
не прибавлялась, однако можеть давленіемъ с о-
нымъ мозгу причинять вредъ. Сверхъ того не
можно уже и надѣяться, чѣмъ въ сей болѣзни,
когда она достигнетъ до такой степени, вну-
тренности дѣла, столько могли испражнить
воды, чѣмъ по мѣрѣ того мозгъ въ состояніи
былъ прирѣсавшій, и своею силою оную ча-
сть оной выгонять. Для того послѣдняя сія и
существенная часть лѣченія только иъ началѣ
болѣзни имѣетъ мѣсто. А что она тогда мо-
жетъ принести пользу, то сіе не безъ основанія
зключать можно изъ благоразумнаго оного спо-
соба лѣченія, посредствомъ котораго вышеписан-

ныя наружныя головныя водяныя не большія оны-
хоя благополучно были излечены. Къ онымъ
спереди прикладывали сложенные ветошки, обмо-
ченныя въ горячее вино, либо въ вышеупомяну-
тый составъ, изъ известковой воды и горячаго
вина слабитый, либо въ другое какое либо н-
доброе теплое снадобство, и прикрываемы были
одною толъ дѣтскою шапочкою, которая озна-
ко хороша была записываема, и поному дѣлала
въкоторую нажимку.

Достоинъ примѣчанія на сей случай наблю-
деніе г. Фогеля (*), который описываетъ, что
младенцы отъ сего получали весьма крѣпкій и
цѣлая ушки продолжавшійся сонъ. Однако онъ
сего не пугался, но только жалѣлъ каждые при-
часа ихъ дрекошанымъ разбуживашъ, чтобъ они
нѣсколько пососали, и при томъ насмѣливали
промывательныя, дабы доставить свободное ис-
пращеніе низомъ; отъ чего младенцы совершен-
но выздоравливали. Отъ сего можно ожидать
хорошаго дѣйствія не только въ природныхъ
жолчныхъ опухоляхъ, на спинѣ случающихся,
еслили онѣ не весьма велики, и находятся по-
ниже къ заднему проходу; но и въ разнѣженіи
всего черепа внутреннею головною водяною болѣз-
нью. Однако, какъ выше сказано, вся сила въ
томъ состоитъ, чтобъ болѣзнь была еще въ
своемъ началѣ. Для того всячески должно сна-
раться, примѣчать главнѣйшіе изъ вышеписан-
ныхъ признаковъ, какъ то: Когда младенцу не-
сно-

(*) См. при Beobachtungen und Untersuchungen von
Zachar. Vogel, S. 417. M.

гноссымъ становится вертикальное положеніе, когда онъ великую имѣетъ солидность, и когда разстоянія, между костями черепа находящіяся, увеличиваются. Спашься можеть, что естлибы чаще сіе примѣчали, то бы къ сожалѣнію можно было видѣть, что сія болѣзнь не такъ рѣдко случается, какъ ее описываютъ уже достигшую до шоль жалкой степени, вмѣсто того чинобъ скоропостижно прекратила жизнь больного.

ОТДѢЛЕНІЕ 25.

О плѣвнѣй жабы.

Въ Стокгольмскихъ еженедѣльныхъ реэстрахъ часто упоминаютъ о такнхъ младенцахъ, кои лишились жизни отъ неизвѣстныхъ болѣзней. Но естли бы порядочно ихъ изслѣдовать, то конечно бы можно сыскать между ними одинъ родъ жабы, которой во все у насъ какъ не знала, такъ и теперь не знаюшъ; ибо доселѣ она еще и Шведскаго названія никакого не имѣетъ. (*) Не извѣстно также мнѣ, чинобъ она его имѣла и въ другихъ странахъ кромѣ Шонландіи, въ которой ее называютъ Сгоур (Mottur

V 4

Плак-

(*) Однако теперь на Шведскомъ языкѣ она называется Strufluka. На Нѣмецкомъ языкѣ называлъ ее г. Муррай Nautigte Blaune, а я на Россійской языкѣ ее перевелъ подъ названіемъ Плѣвнѣй жабы, такъ какъ и по-Латини она называется Angina membranasca, Г.

Strangulatorius, Suffocatio Stridula). Слѣдовательно она сполькожѣ должна быть знакома и прочимъ народамъ, какъ и намъ. Но сей самой причинѣ и Врачи весьма рѣдко оубо ней въ своихъ сочиненіяхъ упоминаютъ (*). Но не чуждо имъ се случившееся видѣть, поному что о а въ свѣчѣ началъ споль бываетъ слаба, что родившеи не старающіеся въ скороспн у нихъ трезнать софна, и сверхъ того младенцы не въ соспчнн бываютъ словами изъяснить чувствуемой ими болѣзни. Естли же она достигнетъ высочайшей своей степени; то уже все дѣченіе бывающѣ напрасно, ибо болыне сверхъ чаянїя тогда лишаются жизни. Притомъ родившеи прежде не умѣли начала и приращенїя сей болѣзни обстоятельно разсказать; слѣдовательно Врачи продолженїа оной не могли изслѣдовать и, какъ обыкновенно сіе бывающѣ, умерше оубо оной младенцы не были вскрываемы.

Но напоследокѣ нѣкоторые были сполько разсудившїе, что позволено тѣла своихъ дѣтей, оубо сей болѣзни скончавшихся, вскрывать, и темъ подати случай ее узнать. Первый меня оубо ней увѣдомилъ г. Спрандбергъ, который также

(*) Между Врачами, прежде Шведскихъ о сей болѣзни писавшими, извѣстенъ наипаче Мартинъ Гисн (*Leite medicne* п. 2. in Сметла 1742.), который примѣтилъ ее повольную. Но подробнѣе оубо оной описаніе входинся въ Диссертацїи г. Д. Христъ Фридр. Михася (*de Angina polyposa sine membranae Argent. 1778.*), которая, по причинѣ обстоятельнѣйшаго сей жабы изъясненїа, заслуживаетъ вниманїе. М.

также имѣлъ случай отъ оной умершихъ вскры-
машь. Онъ чрезъ то научился познавать по се-
ей существо. Послѣ того слѣдуя ему, начали при-
мѣчать и узнавать оную равнымъ образомъ и
другіе Врачи нашего Королевства, а что они въ
ней примѣчанія достойнаго нашли, то все вы-
шшій Норкенингскій Снаппфизикъ г. Д. Вилъ
въ своей Диссертаціи, подъ предсѣдательствомъ
пок. Асейбмедика Анривилля въ Упсалѣ 1764 го-
да имъ издѣваемой, вкратцѣ описалъ (*).

Сія лѣба не только въ Стокгольмѣ, но и
въ Упсалѣ, а особливо въ деревняхъ около ея
Расо примѣчена, гдѣ она въ 1761 и 1762 годахъ
такъ была частна и опасна, что въ многихъ до-
махъ всѣ младенцы отъ оной вымерли. Нѣкоторы-
е изъ оныхъ умирали во второй, но болшему
частью въ пятый день. У нихъ со рвоткою мно-
жество выходило мокротъ, а иногда и большіе
куски плѣвы. Тѣ младенцы, которые приходи-
ли къ больнымъ, въ другихъ домахъ находящим-
ся, шотчасъ сею болѣзною заражались.

Въ селѣ Фундбо также много дѣтей отъ
оной умерло, и, какъ я слышалъ отъ г. Д. Бло-
ма, равнымъ образомъ она свирѣпствовала въ Ге-
деморѣ и Сестерѣ. Въ Шотландіи, какъ яству-
ешь изъ написанной имъ неболшой Книжки (An
Inquiry into the nature, cause and cure of the Croup).

У 5

въ

(*) Однако послѣ претяго изданія въ Шведи
подлинника г. Розенштейна г. Архіатеръ В. кѣ
и г. Д. Салмонъ Пуданъ сообщили важныя о
сей лѣбѣ примѣчанія (Смолр. V. Vetensk Acad.
Handl. 1772 стр. 332 и слѣд.) М.

лѣ которой онѣ отчасти собственныя, а отчасти онѣ другихъ писанныхъ описалѣ наблюденія, также онѣ находилась. Я намеренѣ заѣсь описать сѣо бѣлозѣ шнѣ, какѣ она описана въ оныхъ наблюденияхъ и въ вышесписанной Диссертаціи.

Вся оная состоитѣ въ мягкой, толстой и бѣлой плѣвѣ, которая при наступленіи горячки въ дыхательномѣ горлѣ (Larynx) непосредственно подѣ самымѣ началомѣ оного заражается, и иногда распространяется внизѣ въ самую въ пѣву; оная не прилѣпляется къ внутренней поверхности дыхательнаго горла, но обыкновенно такѣ бываетѣ отдѣлена, что по вскрытіи мертвѣго тѣла легко надобѣе въопорѣ стѣла ее вытѣнуть можно. Между сѣю плѣвою и покрывающею внутреннюю поверхность дыхательнаго горла оболочкою сидѣтѣ ещѣ тонкая матерія (*), которая бываетѣ и въ самыхъ въ шнѣхъ дыхательнаго горла и во а глѣхъ. Оная въ водѣ опускается на дно. Въ оной сѣ плѣвѣ не примѣчено никакихъ волоконъ (**). Она не распускается въ составѣ, изѣ.

(*) Изъ чѣго сѣ не всегда случается, что сѣ упѣвержастѣ г. Бекѣ (на сказ. м. стр. 437.) и г. Саломонѣ (тамѣ же стр. 337) М.

(**) Сѣ такѣже несогласно съ наблюдениями г. Саломона (на сказ. см. стр. 337.) и г. Бека (тамѣ же стр. 346); ибо первый примѣтилѣ на ней длинныя полосы или волокны, а второй видѣлѣ на обращенной къ горлу ея поверхности одну онѣ другого отдѣленные кольца, подобныя шнѣмъ, которыя бываюмѣ на верхней оболочкѣ дыхательнаго горла. Но какѣ г. Гуме даже посреде швомѣ самого прилѣпѣнѣшаго разсматриванія сѣго спѣсѣния въ ней не сыскалѣ; то думать должно, что сѣ не всегда случается. М.

изъ теплой воды и молока събѣланномъ. При
всемъ томъ олько легкія въ сей болѣзни быва-
ющіи поврежденія, и не приметно никакихъ
знаковъ нагноенія въ естественной оболочкѣ ды-
хательнаго горла. Младенцы, заразившись сею
болѣзнию, лишаются обыкновенной своей бодрости,
ощущаютъ въ себѣ не большой жаръ и иногда
имѣютъ кашель. Они чувствуютъ пуную боль
въ дыхательномъ горлѣ иъсклько пониже гого-
ви онаго. У некоторыхъ изъ нихъ на передней
части шеи примѣчается не большая опухоль,
которую естъли слегка перепальцъ подавить, то
она иъсколько болитъ. Лицо начинаетъ рссу-
хатъ и краснѣть. Сверхъ сего ни на шеѣ ни въ
горлѣ ничего особливаго примѣнить не можно.
Рѣдко бываетъ несвободное глотаніе: но дыха-
ніе бываетъ тяжкое. Къ сему присоединяется
горячка, съ весьма скорымъ и сильнымъ бѣні-
емъ жилъ соединенная. Весьма сильная мучитъ
жажда. Иногда приключается кашель. Въ сіе
вдругъ ожесточается, и въ скорости бѣненіа жилъ
онадаетъ; хотя бываетъ весьма скоро, однако
помяко и слабо. Дыханіе снзиновится тяжель и
ще, боль исчезаетъ, кашель перестаетъ и
скопоспѣшная слѣдуетъ смирнѣ. Иъкоторые
во все продолженіе болѣзни безцѣлнмъ лежатъ
въ постели: а иъкоторымъ по временамъ быва-
етъ легче, и тогда они въ состояніи бываютъ
ходить. Одинъ маленецъ ходилъ и игралъ въ
торницъ, но не успѣла его мать взять на руки,
какъ онъ умеръ. Ся болѣзнь то имѣетъ въ се-
бѣ особливаго, что больные оного до послѣдняго
своего издыханія остаются при полномъ разумѣ,
имѣютъ необыкновенный голосъ и издаютъ
спран-

странный звукъ, который бываютъ хрипчивъ, шепокъ и похожъ нѣсколько на гласъ молодого нѣпруга. Однако его не можно хорошо словами изъяснить: но всякъ, кто только однажды его слышалъ, не можетъ ошибиться въ сей болѣзни; и сей то самый звукъ, который у иныхъ младенцевъ, когда они кричатъ, кашляютъ либо кого нибудь кличутъ, бываетъ слышенъ, есть самымъ точнымъ и вѣрнымъ признакомъ оной.

Слѣдовательно удобно можно распознать и различить сию болѣзнь отъ другихъ сопостопныхъ съ кашлемъ, хрипчивостью или насморкомъ. Но должно оную еще различить также и отъ другого рода жабы, которая почти было пришла въ забвение, но не за долго предъ симъ многихъ дѣтей въ Англии, Францїи и въ Шведїи лишила жизни. Оную называющъ ларого, превращающуюся въ Ангинозъ огонь (*Mal de Gorge gangreneux, Symplicite pharyngea epidemica*). Ибо въ сей явленная примѣчается на шеѣ опухоль, которая имѣетъ нѣтъ бѣлый, и если не подать скорой помощи больному, превращается въ карывъ и въ Ангинозъ огонь. (Смолр. г Проф. Бергя Föreläsning om de i Sverige gängbare Sjukdomars utöfande, för år 1755. S. 36. до 38.)

Что нѣкая лѣта принадлежитъ къ младенческимъ болѣзнямъ, но сіе довольно явствуетъ изъ того, что доселѣ еще не примѣчено, чтобъ кто либо старше та лѣтъ оной былъ подверженъ.

Г. Д. Гуме думаетъ, что болѣею частью подвержены оной бывающіе младенцы, живущіе возлѣ моря, либо иногда и пребывающіе на матеряхъ и болошистыхъ мѣстахъ. Однако въ нашемъ Королевствѣ примѣчена она и во многихъ такихъ мѣстахъ, которыя имѣли иное положеніе, и, какъ я выше упомянулъ, въ Гедморѣ и Сетерѣ, концы сего города и весьма оплалены отъ моря.

Послѣ никакая наука не терпитъ такъ мало догадокъ, какъ врачеваніе, потому что она имѣетъ предметомъ сохраненіе человеческой жизни; и всѣ ея намѣренія должны основываться на наблюденіяхъ и опытахъ: по я намѣренъ здѣсь сообщить изъ вышеписанныхъ сочиненій примѣры такихъ младенцевъ, которые либо выздоровѣли, либо умерли отъ сей болѣзни. Ибо изъ оныхъ можно видѣть, какимъ образомъ въ оной было поступаемо, какія употреблены были средства, и какія она имѣла слѣдствія, дабы изъ оныхъ можно имѣть некоторое понятіе о незнакомой сей болѣзни.

Случай 1. Когда нѣкотораго младенца, въ 1755 году отъ сей болѣзни умершаго, г. Проф. Мартинъ въ присутствіи г. Спрандберга и фонъ Дарелли вскрылъ: то нашелъ, что въ дыхательномъ горлѣ была почти совсѣмъ оплаленная плѣва, которая послѣ и вытянута была изъ онаго на подобіе пусиатаго шнурка. Внутренняя поверхность оной была плотна и имѣла изобильный цвѣтъ, а наружная въ самомъ верху была нѣсколько красна. Чѣмъ ниже она опускалась въ вѣтви дыхательнаго горла, тѣмъ снѣговѣла

лась бѣже, и внизу въ самыхъ меньшихъ выпя-
вяхъ совсѣмъ была бѣла такъ, какъ яичная
скорлупа. Вездѣ явственно можно было примѣ-
тить, что она была несобственная оболочка
дыхательнаго горла и его выпятившій, и совсѣмъ
новая патва. Легкія были ни мало не поврежде-
ны, и никакого въ нихъ не находилось воз-
женія.

Случай 2. Г. Д. Гуме призванъ былъ къ
одной дѣвѣ 15 мѣсяцовъ, которая была боль-
на сею болѣзнію и жила на ченеврѣхъ мѣли отъ
моря. Въ вечеру передъ шемъ, какъ сказывали
ему, она была слаба и нѣсколько сѣрыхъ обыкно-
веннаго хрипѣла. Но въ то время, когда по утру
прошелъ къ ней сей Врачъ, она имѣла тяжелое
дыханіе, полнѣе и столь скорое бѣженіе лихъ, что
каждую минуту ударяло по 135 разъ. Онъ тотъ
часъ велѣлъ ей 5 унцовъ пустить крови. Послѣ
чего голосъ ея сдѣлался тонкимъ и подобнымъ
пѣнушному пѣнію. Дыханіе стало частое и тя-
желое. Во лбу и въ рукахъ ощущался великій
жаръ. Ноги и руки распухали, однако же были
красны. Но какъ еще и тогда бѣженіе жидъ бы-
ло шварное, то пустили кровь въ другой разъ,
опіъ чего гораздо ей стало легче. Потомъ ве-
лѣлъ ей Докторъ вдыхать въ себя пары изъ
испалой воды, съ небольшимъ количествомъ уку-
су смѣшенной, послѣ чего примѣчено великое
облегченіе болѣзни и высыла на шваръ съ нѣ.
Тогда дано было ей изъ небольшого количества
облой Магнѣзи слаоипсальное, а въ послѣу при-
ложили къ шваръ нарывный пластырь. Хотя на
третій день еще нѣсколько ей стало легче, од-
нако

нако голосъ ея былъ таковъ же какъ и прежде, а дыханіе тяжеле и біеніе жиѣ подъ ое. Въ вечеру приставили ей поѣ подбогательомъ въ точѣ мѣстѣ, гдѣ начинаеиъсѣ дышати дѣное горло, чепыре пѣяницы, по отпазеніи конофыхъ по мѣшо, гдѣ онѣ сосали, припаривали теплую водою съ такимъ успѣхомъ, чтоо чрезъ 4 часа кровь нѣсколько выступати могла. Слѣдующее утро дитѣ выздоровѣло.

Случай 3. Одна дѣвица 8 мѣсяцовъ, которая прежде того была совершенно здорога, нечаянно получила сию болѣзнь. Жительство она имѣла возлѣ большого озера за милою отъ моря. Тогдашѣ приставленны были ей пѣяницы, конофья и выкодали 5 унцойъ крови; послѣ дали рвотное. Потомъ призываѣ будучи къ ней г. Гуме, слысали, чтоо она имѣла вышеупомянутый особенный въ голосѣ звукъ, который былъ примѣненъ тогда, когда она кашляла, громко говорила, либо кричала. Дыханіе ея было частое, а біеніе жиѣ хотя слабое, однако оно ударяло въ минушу 130 разъ. Она имѣла сухой и звонкой кашель, хотя легко могла глотати, однако чувствовала боль въ шеѣ, когда хотѣла повернуть голову. Моча ея была свѣшла и никакой не имѣла осадки. Врачъ вѣлаѣ сдѣлать ей пары изъ теплой воды и укусу, и приложить къ горлу нарывный пластырь. Въ вечеру казалось ей нѣсколько легче и шея спала мягче. Ночь провела она благополучно, и на третій день возвращался прежній ея голосъ; однако когда кашляла, то еще примѣненъ былъ оный въ голосѣ звукъ. Изъ носу начала течь моррота, и въ мочѣ

мочѣ стали примѣтны небольшія волокны. Въ другой разѣ дано было ей рвотное. Въ четвертый день голосѣ еще несовершенно былѣ напуральный. Въ мочѣ начала показываться осадка, которая продолжалась чрезѣ три или четыре дни, въ продолженіи которыхѣ она и выздоровѣла. Особливо было то, что эта болѣзнь по прошествіи 6 мѣсяцовѣ опять возвратилась, только она тогда уже была весьма легка.

Случай 4. Одинѣ двухлѣтній младенецѣ, который за полгода передѣ тѣмѣ былѣ боленѣ ослѣпо, вдругѣ заразился сею болѣзнію, и имѣлѣ въ оной особенный оный въ голосѣ звукѣ. Приставлены были ему кѣ горлу пиявицы и приложенѣ какѣ за уши, такѣ и кѣ самому верху горла нарывчатый пластырь. Когда увидѣлѣ его на четвертый день Д. Гуме, то примѣтилѣ, что дыханіе его было еще тяжелое, примѣтная была въ груди одышка, выписанный въ голосѣ звукѣ, и на передней части шеи находилась опухоль. Бѣненіе жилѣ ударяло въ минутахѣ 140 разѣ. Все обещало худое окончаніе болѣзни. Употреблены были вышеупомянутыя пары, припарки и поставлены кѣ горлу многія пиявицы. На другой день послѣ того младенцу казалось легче, онѣ былѣ веселѣе и самый голосѣ начиналѣ становиться естественнѣе. Въ шестой день бѣненіе жилѣ стало порядочное, голосѣ возвратился обыкновенный и опухоль разошлась.

Случай 5. Часто упоминаемый г. Гуме призванѣ былѣ кѣ одному семилѣтнему мальчику, которой четыре дни уже былѣ боленѣ и жилѣ

у мосту въ Лейптъ. Прошедшею передъ тѣмъ зимою спирадалъ онъ жестокимъ кашлемъ и за б недѣль имѣлъ корь. Онъ часто принималъ слабительныя и былъ довольно здоровъ, выключая только небольшой кашель, который онъ имѣлъ напослѣдокъ получилъ горячку, соединенную съ жаромъ и необыкновеннымъ въ голосъ звукомъ. Въ четвертый день имѣлъ онъ бѣненіе жилъ скорое и нѣсколько полное, однако не имѣющее надлежащей крѣпости. Глотаніе его было свободное, однако, когда говорилъ, либо когда Докторъ перстомъ его горло ощупывалъ, чувствовалъ въ ономъ боль. Лицо было распухшее, жажда сильная и дыханіе тяжелое. Иногда съ кашлемъ выходила мокрота и на губахъ видна была пѣнящаяся слина. Въ мочѣ примѣшна была бѣлая густая осадка. Голова у него не болѣла и рассудокъ не былъ помѣшанъ. Немедленно пуспили ему кровь, въ слѣдующую ночь приставлены были пиявицы и на шею приложенъ нарывный пластырь. Въ слѣдующій день бѣненіе жилъ было гораздо слабѣе, и ударило въ минушу 175 разъ. Дыханіе стало скорѣе, и дитя умерло въ ту же ночь имѣя полный разумъ до послѣдней минушы своей жизни.

По вскрытіи мертвого его тѣла не сыскано въ горлѣ никакого знаку вожженія. Но когда разрѣзано было дыхательное горло, то въ великое Врачъ пришолъ удивленіе, увидѣвъ въ самомъ верху онаго необыкновенную мягкую и толстую плѣву, которая была совѣмъ не приросши, а подъ нею находилась жидкая матерія, похожая на гной. Лежащія подъ оною части бы-

ли красны, однако не можно сказать, чтобъ въ нихъ находилось гнилое вещество. Осматривая далѣе вѣтви дыхательнаго горла, искали въ оныхъ то же самое; однако на два шамъ была мягче, тонѣ и похожая на гной. Въ нихъ содержалось также великое количество гноя, который удобно можно было выдавливать. Впрочемъ самыя легкія были неповреждены и здоровы.

Случай 6. Спусти послѣ того два дни, тонѣ же самый Докторъ призванъ былъ къ сестрѣ вышеупомянутаго мальчика. Она была 5 лѣтъ и жаловалась въ вечеру передъ тѣмъ на тупую боль въ горлѣ. Тотчасъ пущена ей кровь и даванъ былъ сосисавъ изъ Миндерецоваго спирту и ерѣзка, и приложенъ къ горлу нарывный пластырь. Какъ только она начала принимать оный сосисавъ, то безпрестанно была въ поту. Въ то время, когда призванъ былъ къ ней г. Гуме, она уже имѣла особенный оной въ голосѣ звукъ и такъ тяжелое дыханіе, что во время онаго принуждена была приподнимать лопатки. Лицо ея было распухшее и красное, голосъ свободный, бѣшеніе жилъ скорое и крѣпкое, и разумъ неповрежденный. Врачъ велѣлъ тотчасъ прислать къ горлу шавицы, а послѣ того дѣлать къ оному припарку и втягивать въ легкія пары изъ теплой воды и укусу, онѣ чего казалось, что становилось легче: однако въ вечеру сдѣлалось ей хуже, и она не могла долго оставаться въ одинакомъ положеніи. Врачъ произвелъ ей посредствомъ кислотеу морскаго лука рвоту, съ которою вышло великое количество густой мокроты. Потомъ онѣ далъ ей сосисавъ,
сѣ

съ чистою сали프로ю и канфарою сдѣланный. Въ слѣдующій день бьющіяся жилы ударили въ минуту по 152 раза, и она казалась слабѣе. Миндалины не много только были распухшия и покрытыя морщинами. Глоханіе нѣсколько было трудное, и часто приключалась тошнота и позывъ на рвоту. Часно ей хотѣлось пить, однако она не могла много пить за однимъ разомъ. Языкъ былъ бѣлый и нечистъ, дыханіе тяжелае. Она ѣла по нѣскольکو ложекъ хлѣбнаго супу съ виномъ. Наспавлено было ей мягчійшее промывательное, и къ ногамъ прикладывали гусиную шинярку изъ луку. После обѣда все пришло въ худшее состояніе. Онѣ промывательное три раза прослабило. Дыханіе стало тяжелѣе и чаще. Она кидалась на постель и весьма посповала. Бленіе жилъ было слабѣе, и иногда останавливалось. Въ вечеру она скончалась имѣя совершенный разсудокъ до послѣдней минуты своей жизни. Мокрота, безъ кашлю выходящая, была свѣтла, а съ опытомъ испражняемая была густа и желта такъ, какъ гной.

Когда г. Гибсонъ вскрылъ мертвое ея тѣло, то сыскалъ, что железы, на корнѣ языка находящіяся, были распухшия, по рыныя слизию и имбующія отверстія свои (*Ductus excretorii*) весьма разширенныя. Миндалины также были болѣе обыкновеннаго; однако не примѣчено никакого воспаления ни въ оныхъ, ни въ близъ лежащихъ частяхъ. Во кругъ отверстія дыхательнаго горла (*Glottis*) все было покрыто ледяною мокротою. По разрываніи самаго дыхательнаго горла, также никакого въ немъ не сыскано воспаления:

но внутри онаго примѣчена въ самомъ верьху, а особливо со стороны пищепріемнаго канала мягкая плѣва, которая до половины казалась разрѣшена и ошдѣлена. Въ ономъ также находилась матерія, подобная гною. Сверхъ сего нѣкоторые небольшія железки въ началѣ дыхательнаго горла были распухшія. Въ нижней части онаго еще больше было оной материи; однако не сыскано тамъ никакой посторонней плѣвы. Въ началѣ раздѣленія дыхательнаго горла на вѣтви примѣчено великое количество клейкой бѣлой жидкости, которая выходила изъ легкихъ, когда они были сдавливаемы, и казалось, что они ею были наполнены. Желудокъ внутри былъ весьма мягокъ и покрытъ великимъ количествомъ слизи.

Случай 7. Одинъ семилѣтній мальчикъ, который прежде того совершенно былъ здоровъ, и не имѣлъ причины сидѣть въ горницѣ, напослѣдокъ, сдѣлавшись больнымъ, чрезъ четыре дни сряду имѣлъ тяжелое дыханіе, тупую боль въ самомъ верьху дыхательнаго горла и сильную рѣчь. Скорое его бленіе жилъ и тяжелое дыханіе заставили Лѣкаря пустить ему 12 унцвъ крови и дать аммоніакъ (*Gummi ammoniacum*), смѣшенный съ солью оленьяго рога. Въ вечеру призванъ будучи г. Гуме, нашолъ, что бленіе жилъ было скорое и слабое, а дыханіе весьма частое. Младенецъ чувствовалъ еще боль въ верьху дыхательнаго горла; но въ ономъ не примѣчено никакого воспаления. Въ мочѣ была густая осадка, т. е. такая, какова бывастъ у лѣхъ людей, кои имѣютъ въ шдѣ гной, не имѣ-

имѣющій свободнаго выхода. Голосъ былъ слабъ и не слышно было въ ономъ хрипѣнія. Понеже Врачъ примѣтилъ, что смерть приближалась; то просилъ Лѣкаря, чтобъ онъ послѣ вскрылъ мерзвое тѣло и хорошо разсмотрѣлъ дыхательное горло. Въ слѣдствие чего онъ ему объявилъ, что въ легкихъ не было никакого знаку воспаления, но только онъ сыскалъ подъ самымъ отверстіемъ дыхательнаго горла великое количество матеріи, которая каза. ась ему похожею на гной. Врачемъ онъ не примѣнилъ въ ономъ никакой посторонней плѣвы, равно какъ и вътѣри дыхательнаго горла не наполнены были гноемъ.

Случай 8. Одинъ четырехлѣтній мальчикъ имѣлъ кашель и частое дыханіе. Но какъ его болѣзнь похожа была на такъ называемую плѣвную жабу (Стор); то тотчасъ приспавили ему къ горлу пѣявцы, и наслѣдующій день приложили нарывный пластырь. Отъ чего не только казалось бытъ ему легче; но онъ чрезъ цѣлую недѣлю въ горницѣ могъ прохаживаться, только еще нѣсколько кашлялъ. Въ слѣдующее Воскресенье въ первый разъ его Докторъ Гумо увидѣлъ, который сыскалъ, что онъ былъ сипливѣе, нежели какъ обыкновенно случается съ больными сею болѣзнію. бленіе жилъ имѣлъ весьма скорое, дыханіе весьма тяжелое, глотаніе нѣсколько прудное и небольшой сухой кашель. Сіе заставило его думать, что младенецъ боленъ жабою другаго роду (Esquinancie), и велѣлъ приложить къ горлу пѣявцы, употреблять припарку и другія приспойныя лѣкарства. Въ Понедѣльникъ дыханіе было свободнѣе, и казалось,

А а 3

что

что и прочіе припадки уменьшились. Однако во Вторникъ ему опять стало хуже, и онъ умеръ.

По вскрытіи мертвого его тѣла, найдена вышеупомянутая плѣва, которая была бѣла, крива, толста и подъ оною на дюймъ проспиралась гнойная желтоватая и еще не засохшая матерія. Оболочки дыхательнаго горла были дѣлы, однако красны и весьма воспалены. Въ нѣкоторыхъ пузырькахъ легкихъ изходила матерія какъ и въ самомъ дыхательномъ горлѣ.

Случай 9. Одной четырехлѣтней дѣвицѣ, 20 Октября 1763 года, приключился не большой кашель; однако она могла слѣдующій день провесить на открытомъ воздухѣ. Въ вечеру кашель сталъ сильнѣе и сдѣлался насморкъ. Г. Водъ, бывший тамъ дворовымъ Докторомъ, почти въ то же самое время къ ней пришелъ и увидалъ, что она играетъ. Но какъ онъ примѣнилъ, что у нее дыханіе нѣсколько было тяжеле и бѣнѣе жилъ скорое; то не смотря на то, что она по видимому была здорова, пустилъ ей кровь. Въ 21 день сдѣлалось ей хуже — для того онъ велѣлъ приложить къ шеѣ нарывный пластырь, а другой между лопатками; при томъ велѣлъ наспазить промывашельное. 24 Числа пришелъ къ ней Докторъ Гуме и сыскалъ, что дыханіе у нее было частое и бѣнѣе жилъ ударяло въ минуту по 180 разъ. Въ ночь дышались густая осадка. Сказывали, что она плевала матерією, которую родственники ея считали за гной. Изъ дыханія Докторъ заключалъ, что еще больше оной оставалось. Она ѣла и пила свободно. Г. Гуме далъ ей для произведенія рвоты нѣ-
сколь-

сколько морского лулу; однако онъ не произвелъ желаемого дѣйствія. 25 Числа она находилась въ такомъ же состояніи. Докторъ примѣтилъ, что съ кашлемъ выплевываемая мокрота смѣшена была съ гноемъ. Дыханіе было частое и тяжелое. Онъ велѣлъ ей вдыхать въ себя по не многу пары изъ уксусу, и намѣреніи возбудить въ ней кашель, однако оныя не произвели никакого дѣйствія и больная въ вечеру умерла.

Когда вскрыли мертвое ея тѣло, то сѣкали, что дыхательное горло внутрь было покрыто на три дюйма ни же своего начала постороннею плѣвою, которая была отдѣлена, и можно было ее наподобіе сигиода вынуть. Собственные же оболочки дыхательнаго горла были цѣлы и не имѣли на себѣ никакихъ ранъ. Легкія были не повреждены: однако въ лѣвомъ находилось великое количество мацеріи, которая была желта и густа, и въ водѣ на дно садилась. Посторонняя плѣва была плотна, и хотя ее Докторъ два дни мочилъ въ теплой водѣ, съ молокомъ смѣшенной, однако она не растворилась. Не примѣчено въ ней также никакихъ волоконъ.

Все сіе какъ видѣлъ, такъ и описалъ самъ Докторъ Гуме. Но кромѣ сего написалъ онъ еще и четыре наблюденія, которыя ему сообщали другіе Врачи: однако понеже они весьма сходны съ вышеписанными, то я не считаю за нужное опъ слова до слова иль здѣсь описывать: но намѣренъ упомянуть только о томъ, что въ нихъ особливаго примѣчанія достойнаго находишься.

Случай 10. Г. Вардробъ въ своемъ повѣствованіи объ одномъ младенцѣ, который на четвер-

тый день отъ сей болѣзни умеръ, говоритъ, что опухоль, ниже дыхательнаго горла находившаяся, больше была мокротная, нежели воспалительная.

Случай 11. Г. Валфлуръ повѣствуетъ, что одинъ младенецъ, котораго онъ пользовалъ, прежде нежели открылась болѣзнь, чрезъ восемь дней сряду имѣлъ кашль, и что когда онъ послѣ того, какъ пиявицы высосали много изъ шеи крови, пустилъ оную изъ яремной жилы, то примѣшилъ на оной воспалительную кожу. По вскрытіи мертваго его пѣла, показалось ему, что въ дыхательномъ горлѣ было нагноеніе; однако когда онъ прилѣжаніе изслѣдовалъ, то нашолъ, что то была одна только складь, которая цвѣтомъ была похожа на гной и имѣла такой же видъ и твердость, какъ пѣва. Онъ сказываеши такъ же, что сія пѣва въ срединѣ была полще, такъ что казалось въ состояніи заткнути дыхательное горло, и слѣдовательно задушить больного.

Случай 12. Г. Водъ говоритъ, что онъ нашолъ у одного младенца, который на шестнадцатомъ мѣсяцѣ отъ роду сею болѣзнію скончался, въ дыхательномъ горлѣ и въ швахъ онаго великое количество пѣнистой и нѣсколько клейкой мокроты, и что она простиралась вмѣстѣ съ постороннею пѣвою въ самую мѣлчайшія вѣтви дыхательнаго горла и была похожа на гной. Сверхъ того онъ упоминаетъ, что и легкія снаружи нѣсколько были красны.

Случай 13. Послѣ послѣдней Исторіи приключился одной девятилѣтней дѣвицѣ на четвер-

вертый день въ сей болѣзни чрезъ нѣсколько часовъ сряду продолжавшейся кашель, посредствомъ котораго вышелъ кусокъ плѣвы черного цвѣту. Г. Д. Гуме думаетъ, что сіе произошло отъ того, что она была уже суха. Ибо она у прочихъ всегда была бѣла и мягка. Впрочемъ и сіе дитя равнымъ образомъ умерло.

Хотя я уже нѣчто упомянулъ о началѣ сей болѣзни въ нашемъ Королевствѣ: однако, дабы лучше можно было знать, какимъ образомъ она у насъ продолжается, намѣренъ сообщить здѣсь изъ вышеписанной Диссертаціи нѣкоторыя обѣ оной описанія, Упландскимъ и. Провинціальнымъ Докторомъ Галениусомъ Сочинителю присланныя. Первое изъ оныхъ есть слѣдующее:

Случай 14. Одинъ пятилѣтній мальчикъ здороваго сложенія, въ 1762 году Генваря 19 дня, послѣ обѣда вдругъ сдѣлался сонливъ, имѣлъ въ тѣлѣ жаръ и насморкъ, однако безъ кашлю. Въ слѣдующіе два дни иногда онъ прохаживался, а иногда лежалъ въ постелѣ, но всегда при томъ имѣлъ жаръ, еще большую склонность ко сну, рвоту, насморкъ, чихалъ и изъ глазъ не много текли слезы. Въ четвертый день все сіе было въ одинакомъ состояніи, но въ вечеру глотаніе было трудное и примѣтнымъ образомъ увеличилась горячка. Ни мало онъ не могъ уснуть до самаго утра. Въ пятый день горячка не столь была жестока, но затрудненіе въ глотаніи было большее. На языкѣ видна была бѣловатая, плотная, но мягкая плѣва и великое количество мокроты, которая отчасти выходила

со рвотою, а опчасни испражнялась низомъ, и не дала ему ни мало прежде полуночи уснуть. Въ шестой день глотаніе было свободнѣе; однако во время дыханія, которое также тогда было легче, по причинѣ великаго количества находящихся въ дыхательномъ горлѣ мокротъ, безпрестанно продолжалась хрипота. Горячка была почти непримѣтна. Въ вечеру онъ хорошо уснулъ, но ночью не давалъ ему спать частый кашель и съ нимъ выходящія мокроты. Въ седьмой день около полуночи спалъ онъ хрипавѣе и получилъ сухой и пняжелый кашель. Въ вечеру еще и того меньше выходило мокротъ, и кашель былъ весьма безпокойный до пѣхъ поръ, пока не начала выходить густая мокрота. Въ то время глотаніе сдѣлалось свободное, однако онъ весьма крѣпко спалъ и имѣлъ скорое бѣненіе жилъ. Съ полуночи кашель вдругъ почти совсѣмъ остановился, и за пѣмъ воспослѣдовало великое безпокойство. Въ осмизацатый день по утру рано дыханіе сдѣлалось пняжелѣе и скорѣе, бѣненіе жилъ ударяло нѣ минушу отъ 140 до 150 разъ и кашлю не можно было возбудить, либо нѣкоторымъ образомъ произвести испражненіе харкотинны. Для того шоскливостъ нарочито увеличилась, дыханіе сдѣлалось чаще, и въскорости родителн лишились столь любимого ими сего сына. Г. Докторъ во время лѣченія употреблялъ легкія слабительныя, рвотныя, прохладительныя и разрѣшающія мокроту лѣкарства; больной полоскалъ себя часто ротъ прнстойнымъ полосканиемъ, и оное прнпомъ ему влизаемо было посредствомъ насоса въ горло; сверхъ сего онъ при-

принималъ внутрь составъ изъ деревяннаго масла и масла оленьяго рога. Однако все сие было тщетно, и никакимъ образомъ не для было избавить его отъ смерти. По вскрытіи мертвого шла, сыскана въ дыхательномъ горлѣ вышеупомянутой подобная пѣва.

Случай 15. Оного мальчика сестра, которой было оны роду семь лѣтъ, во время продолженія бршной болѣзни находилась совершенно здорова. Никто себѣ не воображалъ, чтооъ она подвержена была равной участи, и для того не старались предостеречь ее отъ сей болѣзни. Однако 4 февраля по утру начала она въ головѣ чувствовать сильную боль, имѣла великую склонность ко сну, на лицѣ выступила краска, явственная приключилась горячка, и засадила ее слезъ въ носу. Послѣ того одинъ разъ ее вывало, въ слѣдующую ночь былъ пошъ и довольный сонъ. На другой день около полудни было ей легче, однако послѣ начинала она, а особливо къ вечеру, жаловаться на головную и зубную боль, и чувствовала въ себѣ сильнѣйшій жаръ. Въ то время языкъ у нее спалъ бѣлъ, нѣсколько разъ начинала ишти изъ носу кровь, однако въ весьма маломъ количествѣ. Дыханіе было соединено съ хрипавостью, хотя бы она дышала носомъ, либо ртомъ. Ночь провела она безпокойно. На третій день по утру почувствовала пошному. языкъ спалъ еще бѣлѣе; въ носу и на краяхъ ноздрей высынала небольшая сынь, которой верхушки были бѣлы, а основанія красны. Два подобные симъ пузырьки также были видны

ны и на верхней губѣ. Горячка днемъ была не примѣтна, но въ вечеру столькожъ была жестока, какъ и прежде. Чѣмъ ближе наступала ночь, тѣмъ глотаніе становилось труднѣе. Въ четвертый день горячка онянь была нѣсколько легче, притомъ не чувствовала она ни головной боли, ни примѣшной трудности въ глотаніи, однако харкотина не выходила свободно. Во рту на языкѣ и на поднебенной завѣсѣ (*Velum palat.*) примѣшенъ былъ черноватый спрунь, языкъ былъ бѣлѣе. Въ вечеру горячка онянь слѣдлась сильнѣе. Съ вливаемымъ въ горло посредствомъ насоса полосканиемъ выходило много мокроты. Однако сонъ, который впрочемъ по видимому приносилъ нѣкоторое ободреніе, былъ безпокоенъ, потому что весьма густая мокрота выходила въ великомъ количествѣ. Кромѣ того выходило и изъ носа много возгтей, отъ чего весьма часто беспокоило ее чиханіе. Въ пятый день пребывала она въ одинакомъ состояніи. Спрунь во рту былъ нѣсколько толстѣе и простирался въ разныя стороны. Въ вечеру чаще она чихала, и по той причинѣ ни мало почини не могла уснуть. Кашель былъ не столь жестокъ; мокрота была свободна, однако не выходила вонъ. Въ шестой день казалась она быть нѣкоторымъ образомъ здоровою, и когда вливали ей въ горло посредствомъ насоса полосканье, то выходило много мокроты. Въ вечеру была слаба и такъ сонлива, что едва могла шворять глаза, однако по причинѣ исходящихъ мокротъ уснуть не могла. Отъ предшествовавшаго кашлю нѣсколько спрунь на поднебенной завѣсѣ ошдѣлился, однако

нако понеже еще въ одномъ мѣсѣхъ крѣпко держался, то она его выплевывать не могла. Въ седьмой день около 10 часовъ опять казалась она бытъ бодрѣе, однако имѣла кашель, чихала и изъ носу текла жидкая мокрота. До самой полуночи не могла она уснуть, опчаспи по причинѣ тяжелаго и съ хрипливостію соединеннаго дыханія, а опчаспи потому, что мокрота такъ была густа и изобильна, что могла больную задушить, которая будучи безпокойна и слаба, не въ состояніи была ее выплевывать. Въ осьмой день опять она была бодрѣе, и иногда удобно могла выплевывать харкошину, и нанослѣдокъ, послѣ нѣскольکو кратнаго повшоренія вливанія въ горло посредствомъ нососца полосканья, вышло нѣсколько кусковъ сгущеннаго величинаю въ полгультена, которые были тверды и толсты, съ одной стороны избѣла сѣры, а съ другою испещренные кровавыми чертами. Послѣ обѣда бѣшеніе жилъ сдѣлалось скорымъ, но было слабое, силы уменьшились и харкошина больше не выходила. Кашель былъ тяжелей и соединенный съ хрипотю, голосъ перемѣнился, мокрота сдѣлалась гуще, дыханіе скорѣе, и она послѣ чиханія, перемежающейся шокливости и великаго безпокойства получила крѣпкій сонъ. Потомъ слабость увеличилась, кашель сталъ меньше и съ полночи совсѣмъ пересталъ. Все то, что она ни пила, причиняло рвоту и выходило назадъ носомъ; однако не смотря на то въ состояніи была она глотать. Въ девятый день по утру рано выплевала она опять нѣскольکو вышеупомянутаго сгущеннаго. Безпокойство и слабость увеличивались, а

ско-

скорое бѣненіе жилъ и дыханіе часъ отъ часу становились чаще. Уже заранѣе выходилъ изъ рта конючій духъ. Моча была свѣтлая и похожая на слабое пиво, однако на дѣѣ спускала бѣлала бѣлую густую осадку. Воздухъ впитывала въ себя ртомъ, а испускала изъ себя нѣмъ. Напоследокъ начала она какъбы удушаться, и въ три часа съ полдня скончалась.

Случай 16. Г. Гибсонъ повѣствуетъ, что одинъ младенецъ благополучно избавился отъ болѣзни чрезъ то, что его рвало великимъ количествомъ гноя, и съ харкошиною выходили болѣшие куски плѣвы.

Случай 17. Г. Раефъ сказывалъ г. Гуме, что одинъ мальчикъ, 5 Августа 1764 года, ночью, т. е. съ 5 на 6 число, получилъ насморкъ съ крипичемъ въ горлѣ, 3 числа имѣлъ нѣжное дыханіе, сильной голосъ и небольшую горячку. Какъ онъ имѣлъ небольшой пошъ, то предписали ему составъ съ Миндереровымъ спиртомъ. Въ девятый день бѣненіе жилъ было скорѣе, однако болѣной ничего не могъ откашлянуть. Для того пущена была ему кровь, назначено промывательное и приложенъ къ шеѣ нарывный пластырь. Въ одиннадцатый день сказывали, что онъ послѣ предшествовавшаго жестокаго кашля выдевалъ кусокъ плѣвы длиною въ два дюйма, которая была плотна и походила на тонкую бѣлую кожу. Въ вечеру явственно можно было примѣнить, что выплевываемая съ кашлемъ мокрота смѣшенна была съ гноемъ. Младенецъ не могъ получить прежняго голоса чрезъ три мѣсяца. —

Не

Не извѣстно, точно ли сію болѣзнь имѣлъ упоми-
наемый Докторомъ Іоганномъ Спарромъ, (Philos-
ophical Transactions N. 495. Art. 6.) мальчикъ. Ему
было десять лѣтъ съ половиною въ то время,
когда приключилась болѣзнь, и онъ часто откаши-
ливалъ кусками плѣву, однако при всемъ томъ
умеръ. Врачи не упоминаютъ, имѣлъ ли онъ та-
кой же сильный голосъ, какой имѣли всѣ выше-
упомянутые мною больные, только сказываютъ,
что онъ при полномъ разсудкѣ скончался и до
самой смерти не имѣлъ бреда.

Случай 18. Въ Фалунѣ въ 1761 году, какъ
меня о семъ увѣдомилъ искусный Лѣкарь, нахо-
дящійся при Рудопныхъ заводахъ, г. Іоганнъ
Якобъ Шульцъ, сія болѣзнь свирѣпствовала. Но
я здѣсь намѣрекъ объ оной предсказать только
такіе случаи, въ которыхъ находилось что ни-
будь особеннаго примѣчанія достойнаго, какъ на
пр. Одна осьмилѣтняя дѣвица жаловалась, что у
нее нѣсколько болитъ горло, однако открылась
въ семъ одной только служанкѣ; родители же
того не примѣтили, что она была больна. Чрезъ
четыре или пять дней послѣ того кушала она
съ весьма хорошимъ аппетитомъ супъ.

Въ самый тотъ же день въ 8 часовъ въ ве-
черу сдѣлалось у нее тяжелое дыханіе, а особли-
во при втягиваніи въ себя воздуха имѣла она
затрудненіе, и получила вышеупомянутый въ го-
лосѣ звукъ. Давали ей пить взаръ изъ бузи-
новыхъ цвѣтѣвъ и принимали съ канфаромъ по-
рошки. Къ шеѣ прикладывали мягчайшую
густую припарку, дышали внутрь речень, при-
кладывали парывный пластырь и употребляли
пар

пары изъ мягчительныхъ нравъ. Слѣдующаго утра давали соль оленьяго рога и послѣ обѣда кисло-медъ простой и кисло-медъ морскаго луку: однако все сіе не пособило. Глопаніе было свободное. Особливаго примѣчанія достойно было то, что больная не имѣла никакой горячки. Біеніе жилъ было неровное и часто останавливалось. Въ слѣдующій день въ 4 часа по утру она умерла. Слѣдовательно болѣзнь ея продолжалась только 3а часа.

На мертвомъ тѣлѣ снаружи на груди надъ третимъ и четвертымъ ребромъ примѣчено было нѣсколько небольшихъ кровавыхъ чертъ; однако какъ въ семъ мѣстѣ, такъ и на шеѣ не было никакой опухоли. Легкія найдены не повреждены. Сзади къ спинѣ они нѣсколько были черноваты и наполнены скопившеюся тамъ кровію. Впрочемъ не примѣчено никакихъ знаковъ воспаления не только въ легкихъ, но и въ дыхательномъ горлѣ. Только оное было покрыто постороннею плввою, которая сверхъ обыкновенія на нѣкоторыхъ мѣстахъ была плотно прикрѣплена. Въ самомъ верху дыхательнаго горла находилось нѣсколько гною, который однако никакого въ себѣ не имѣлъ запаха.

Случай 19. Одна шестилѣтняя дѣвица, которая въ пѣніи имѣла пріятный голосъ, безъ явственной причины слѣбалась хрипливою, однако казалась впрочемъ быть здорова. Спустя нѣсколько дней, т е. 13 Ноября 1761 года, въ вечеру вдругъ получила тяжелое дыханіе, и имѣла особый при выпягиваніи въ себя воздуха въ голосъ звукъ. Тотчасъ пущено было ей изъ ру-

ки четыре унца крови, однако отъ сего не сдѣлалось легче. Упопославали внутрь кисло-медъ, давали слабительное и пары изъ смягчительныхъ травъ; однако безо всякаго успѣха. Горячки никакой не было примѣчево. Бѣсныя жилы иногда останавливались. Моча выходила въ маломъ количествѣ и была такъ свѣтлая, какъ вода. По утрамъ она пила чай и жидкій супъ, но напрошивъ того послѣ обѣда, а особливо въ вечеру не могла она употребить ничего жидкаго, но ѣла одинъ только черствый и сухой. Днемъ она не спала, но развеселялась игрушками. Ночью въ сколько была спокойна, и только малое время подвигалась сномъ. Но какъ она часто выплевывала небольшіе куски пѣны и великое количество мокроты; то звали чина, что она выздорѣла. Однако надежда была тщетная: ибо 21 ноября она сидѣла на рукахъ служанки вдругъ скончалась.

По вскрытіи черпаво тѣла, ничего особеннаго снаружи не примѣчено. Легкія также были въ здоровомъ состояніи. Но въ дыхательномъ горлѣ сыскана вышеупомянутая воспаленная пѣна, которая была ни мало не приросши. А въ самомъ верху дыхательнаго горла и въ вѣшьяхъ оного находилась пѣнистая и изобла желтая мокрота.

Случай 20. Сестра вышеписанной дѣвицы, которой было четыре года, въ то время жила въ деревнѣ: однако ее привезли въ городъ на погребеніе умершей. Она жила въ ономъ нѣсколько дней, а потомъ надвѣвъ на нее другое плашье, опять отвезли въ деревню. На другой день послѣ того.

она сдѣлалась больною, нѣсколько ее рвало, и она приуждена была спать въ постелю. Послѣ этого въ другой разъ ее рвало, и со рвотою вышло нѣсколько крови. Болѣзнь даже продолжалась такимъ же образомъ, какъ выше упомянуто. Не можно было ее заспавишь что нибудь принять, и она умерла бывъ больна 44 часа.

По вскрытіи мертваго ея тѣла, сыскана въ дыхательномъ горлѣ подобная вышесказанной посторонняя плѣва и множество жидкой мокроты какъ въ ономъ, такъ и ея вѣтвяхъ.

Г. Д. Гуме примѣтивъ, что естли оная посторонняя плѣва въ мерныхъ тѣлахъ, опѣ сей болѣзни скончавшихся младенцевъ ни на какомъ другомъ мѣстѣ дыхательнаго горла не находилась: то по крайней мѣрѣ примѣчена она была на той сторонѣ оного, которая обращена къ пищепріемному горлу, гдѣ нѣтъ никакихъ хрящевыхъ колецовъ и большая часть находящагося железъ.

Изъ всего того, что доселѣ сказано, легко можно узнать сію болѣзнь. И такъ, когда младенецъ сдѣлается болѣзнымъ начесть замечать, что у него болишь шея, либо затрудняется тулая боль въ дыхательномъ горлѣ, и будещъ примѣчаться тяжелое дыханіе; то должно прилѣжно изслѣдовать 1) Не свирѣстствуетъ ли въ томъ мѣстѣ сія плѣва? 2) Не мокрая ли и холодная передѣ шбмъ была погода, либо не такая ли еще и продолжался? 3) Не имѣлъ ли не задолго прежде того младенецъ долговременнаго насморку, либо суржвато кашлю, оспы либо кори, и не примѣчались ли у него жару и лѣзды, приномъ не распухло ли у него нѣсколько анги?

Есть

Естьли случается шакковыя обстоятельства; то по справедливости можно заключать о сей болѣзни. Но дабы больше въ себѣ бытъ увѣрену, то 1) Должно осмолрѣть, не примѣчается ли на передней сторонѣ шеи опухоль? 2) А естьли она примѣчена, то слѣдла ее подавнѣ сдѣлывашь, не чувствительна ли она, и не ощущается ли въ ней боль? 3) Изслѣдовать, можетъ ли дитя свободно глоташь? 4) Примѣчать, не тяжелое ли и скорое имѣетъ оно дыханіе? и 5) Бѣе ли дитя въ началѣ болѣзни не скорое ли, крѣпкое и твердое, а по прошествіи нѣсколькихъ дней не скорое ли, мягкое и слабое? 6) Кашель, естьли съхватъ, часнѣ ли, и во время ослепоченія не удушаетъ ли больного? и 7) Голосъ хриплывъ ли, монокъ и синокъ естьли не всегда, то по крайней мѣѣ въ то время, когда дитя хрипитъ, кашляетъ, либо кого нибудь кашлетъ?

По вышеписаннымъ признакамъ легко можно различить сию болѣзнь отъ другихъ, имѣющихъ нѣкоторое съ нею сходство, какъ на пр. Отъ воспалительной жабы (Cynanche), въ которой самая верхняя часть дыхательнаго горла (Larynx) воспаленіемъ бываетъ запяна. Ибо 1) она жаба не однимъ только младенцамъ приключается; 2) соединена бываетъ съ весьма труднымъ глотаніемъ; 3) чувствуется въ оной во горлѣ воспаленіе, которое иногда соединено бываетъ со споль нестерпимую болью, что часто больные, пришедъ отъ того въ отчаяніе, покушаются на свою жизнь; 4) въ воспаленной жабѣ снаружи на шеѣ не примѣчается никакой опухоли.

Изъ всѣхъ вышеписанныхъ наблюдений явствуетъ, что сія болѣзнь происходитъ отъ притеченія мокроты въ дыхательное горло, въ которомъ особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ кольца не имѣютъ въ себѣ хрящей, изъ находящагося тамъ железя отдѣляется великое количество жидкоостей, кои со стороны, имѣющей сообщеніе съ воздухомъ, загустѣваютъ и превращаются въ плѣву, а съ другой, т. е. къ внутренней оболочкѣ дыхательнаго горла не въ состояніи бывающъ приростъ потому, что безреспанно изъ оной выходитъ тонкая испарина, къ видимому ихъ отдѣленію способствующая. Сіе весьма вѣроятнымъ кажется для того, что на собственныхъ оболочкахъ дыхательнаго горла никогда не примѣчно никакихъ ранокъ (*).

Въ семъ иѣмѣ никакой чрезвычайности, что таковыя плѣвы изъ мокроты могутъ заражаться. Мы видимъ одинъ примѣръ подобной плѣвы in *Philosophical Transactions abridged* Р. 3. р. 60, а г. фонъ Галлеръ (*Elementa Physi.* Р. 3. р. 149) и много ихъ описываетъ. Таковыя плѣвы иногда заражались въ мышкахъ и испражнялись

(*) Въ такъ называемой съ Аншономъ огнемъ соединенной Молочницѣ (*Bland-Tisken, Mal de Gorge gangreneux*) часто случается, что внутренняя оболочка дыхательнаго горла либо пищеприемнаго канала опяляется, и съ клыкомъ либо со рвотою воу выходитъ. (Смотри върнѣ замѣчанія изъ сочиненія г. Марто де Грандвиллера подъ заглавіемъ *Description des Maux de Gorge epidemique et gangreneux* въ *Journal de Medecine* 1768. Sept. p. 202.)

лись вонъ заднимъ проходомъ; какъ сіе случилось съ разумнымъ Лейденскимъ Естественной Исторіи Профессоромъ Липсиемъ, который некогда съ прискорбиемъ заключалъ, что изъ него выходить кишки, и до тѣхъ поръ находился въ сей состояніи, пока не пришелъ къ нему другъ его Генріусъ и не впустилъ ему противнаго толку. На другомъ мѣстѣ г. ф. Галаеръ (Р. 7. р. 157.) также много описывалъ такимъ примѣромъ Снегласъ и еще сочиненіе г. Варрена о Полипахъ дыхательнаго горла (*Medical Transactions by the College of Physicians in London. T. 1. (*)*). Подобное сему иногда бываетъ приращеніе мокроты въ мочевомъ пузырь; ибо иногда моча бываетъ весьма густа и клейка, либо въ самомъ пузырь, либо уже выходящая такъ въ стаканъ огусливается, что хотя его и опрокинушь, то она не вытекаетъ вонъ; таковой примѣръ я самъ однажды видѣлъ Г. Алемодъ называетъ сіе приращеніе проспудой (*Catarrhus*) мочевого пузыря.

Хотя причиною сего приращенія мокроты въ дыхательное горло можно считать холодный и влажный воздухъ, однако для чего сіе бываетъ именно въ сѣмъ, а не въ другомъ мѣстѣ, мною я не знаю. На нры, изъ морской воды исходяще,

Б 6 3

такъ

(*) Другой такой случай я нашелъ въ *Comment. nov. Soc. Scient. Göt. T. 4. p. 44.* и слѣдъ съ присоединеніемъ полнаго описанія сихъ Полиповъ. Послѣ того описанія также же случаи г. Вефъ (*Mem. de l'Acad. de Chirurgie T. V. p. 539. 1799.*) и г. Калленсъ (*Acta Societ. Med. Vol. I. p. 76. 1799.*) М.

такъ какъ думаетъ г. Гуме, не можно ли сему подозрѣвать, пошому что сія болѣзнь и въ весьма опдаленныхъ отъ моря мѣстахъ примѣчена.

Пошеже дыхательное горло въ сей болѣзни весьма наполнено бывашъ мѣлопами и пошоринною пѣною, а ошъ сего шакъ суживается, что воздухъ не безъ затрудненія какъ входитъ въ грудь, такъ и изъ оной выходитъ для шого нѣшъ виднаго удивленія, что больные оную имѣющъ тяжела дыханіе, голосъ и въ ономъ звукъ опмѣнные. А какъ кровь при смѣшеніи Грудн не можетъ свободно изъ головы внизъ спускаться; шо изъ шого происходитъ, что лицо бывашъ полное и раздушае.

Что сія болѣзнь заразителна, шо сіе можно видѣшь изъ многихъ наблюдений, о которыхъ выше сего упоминашо, а особливо изъ дванадцатаго и изъ вослѣдовавшаго Случая въ Рабо.

Изъ претѣяго Случая явствуетъ, что и шѣ, которые уже имѣли сію болѣзнь, не исключены бывающъ отъ оной.

Равнымъ образомъ изъ оныхъ наблюдений извѣстно, что у больныхъ шеніе жила въ первые дни обыкновенно бываетъ шорое, швердое и полное, а лицо красное, и пошому въ сіе время приставиваніе пѣвицъ и кровопусканіе бывающъ полезны. Примѣчено также, что часто послѣ смерти вшупренія поверхность дыхательнаго горла была воспалена, и иногда кровь была покрыта воспалительною пѣною (*Corium pleuriticum*), какъ сіе явствуетъ изъ г. Случая. Изъ сего заключаешъ должно, что болѣзнь въ такомъ случаѣ

чаѣ должна бытъ воспалительная и пребутощая исправляющихъ лѣкарствъ. Напротивъ того когда она уже нѣсколько дней продолжалась, то блене жилъ примѣчается скорое, мягкое и слабое, безпокойство увеличивается, силы уменьшаются, мокрота въ дыхательномъ горлѣ накапливается и бываетъ похожа на гной, а понеже она наполняетъ вѣтви онаго, то отъ того происходитъ, что легкія неспособными дѣлаются какъ къ порядѣчному кровообращенію крови, такъ и къ свободному дыханію. Первую степень сей болѣзни называетъ г. Гуме воспалительную (*Stadium inflammatorium*), а послѣднюю съ гноемъ соединенною (*St. purulentum*). Въ первой изъ нихъ есть еще надежда къ выздоровленію больного, а въ послѣдней уже не остается никакой. Въ сей слабительныя бываютъ вредны; а ощущается одного только желаніе, чтобы она пѣва съ великимъ количествомъ мокротъ откашливатма была, хотя по рѣдко и се пособляло. (Смеси между прочимъ Случай 16, 17 и 19.).

Изъ сего явствуетъ, сколь необходимо нужно различать между собою обѣ сіи степени не только въ разсужденіи больного, но и что касается до употребленія лѣкарствъ. Иногда нѣтъ трудно бываетъ различать, въ такомъ случаѣ совѣдуетъ г. Д. Гуме разсмаширивать мочу, иѣтъ ли въ ней бѣлой осадки, похожей на гной. Еслили она примѣчается, то уже началась вѣпоря степень, и слѣдовательно тогда уже весьма мало, либо и во все никакой не остается надежды къ выздоровленію больного, приномъ въ слабительныя лѣкарства въ се время служатъ только къ

ускоренію смерти. Нанпаче должно наблюдать всѣ сіи признаки, когда болѣзнь въ началѣ была легка, и каковы снова возгоразелся, или на подобіе лихорадки начинается. Не смотря на то однако, мало о семъ заботятся, онѣ чего больные незанно остаются безнадежны и умирающіе. (Смотр. Случ. 15.) Родители изъ сего также могутъ заключать, что они непременно обязаны неуосниительно и въ самомъ еще началѣ болѣзни у знающихъ людей въ семъ просить совѣта.

Что касается до лѣкарствъ, то самымъ лучшимъ и надежѣйшимъ изъ нихъ почитається въ сей болѣзни кровопусканіе. Только должно оное употреблять не упуская времени и въ такомъ количествѣ, чтобъ бѣеніе жгуче отъ него сдѣлалось нѣсколько слабе и медлительнее. Если оное опять чрезъ нѣсколько часовъ сдѣлается полно, то кровопусканіе нужно повторить, какъ сіе явствуетъ изъ 2. Случая. Напротивъ того еслии уже наступилъ вторая степень, то крови пускать не должно такъ, какъ онажды то по неоспорожности было сдѣлано. (Случай 5.)

Послѣ кровопусканія должно приставить къ шеѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ лежишь дыхательное горло, пиявцы. Онѣ въ семъ случаѣ такую же приносятъ пользу, какъ и въ колотѣхъ, будучи припущены къ больному боку, либо въ воспаленіи глазъ, когда ихъ припущить возлѣ глазъ.

Послѣ сего должно настоять горячую водую на подобіе чаю бузиновые цвѣты, прилиять ту-
да

да нѣсколько укусу (*) и, обмоча грецкую губку, держа въ передѣ носомъ больнаго, либо приложивъ ему на грудь, дабы онъ могъ вдыхать въ себя исходящія изъ оной пары какъ для того, чѣмъ разбить мокроты, такъ и на пошнѣ лопцѣ, чѣмъ произвести свободное испражненіе хлѣбными.

Понеже нарывный пластырь можетъ уменьшить приливіе мокроты къ дыхательному горлу, отводя ихъ на поверхность кожи: для того должно одинъ либо два дыръ приладить къ замышку, или по сторонамъ шеи. Только не должно оного приладывать на передней частѣ шеи, гдѣ были припухлы пиявцы. Но чѣмъ намъ, сколь великое дѣйствіе оказываетъ дырявый пластырь въ присутствіи злого и ли, въ селѣ, въ жабѣ и въ флаксахъ: потому и въ семъ случаѣ не меншаго онъ него ожиданія для успеха. Однако всегда прежде прикладывая оного должно непременно пустишь кровь и приставить пиявцы.

Но еслили все сіе не помогаетъ; то можно приложить къ горлу шевловатую мягчичельную густую припарку, смѣшенную съ толченою горчицею, которую должно держать до нѣхъ поръ, пока кожа не сдѣлается нѣсколько красною и шароховатою. Послѣ того прикладывать оную при-

Б 6. 5

парку

(*) Г Профессоръ Бернъ въ прошломъ году примѣтилъ, что укусы въ сѣмъ пользуются въ сѣмъ болѣзнь; для того онъ всѣмъ больнымъ малецкамъ нѣхъ обмоченую въ укусу въ сѣмъ, и сверхъ того онымъ сырыми-вать просыпи и наволоку верхней подушки.

парку уже безъ горчины и всякой разѣ, какъ только она просыплетъ, перемешивать. Сосмавить же ее можно изъ трехъ унцовъ просирковыхъ листьевъ и потребнаго количества молока, которыхъ должно на подобіе замазки сварить, и при окончаніи варенія прибавить туда двѣ драхмы сполченой горчицы.


При семъ нужно, чтобъ больной всегда имѣлъ свободное испражненіе низомъ; для того полезно наставлявать промывательныя, либо каждый день давать по малой чайной ложечкѣ слабительной каши (Eleftharist lenitivum), либо по нѣсколько чайныхъ ложечекъ свѣжей каши сладкой просты (Pulra Sanae), либо Эдинбургской бѣлой Магнезии, съ сахаромъ смѣшенной. Сверхъ того можно распушить имѣнно сего нѣсколько маннаго сахару въ жидкой сыворожкѣ и давать пить.

Изъ 6, 17 и 18 Случаевъ можно заключать, что потогонительныя лѣкарства были пробованы, чаятельно въ томъ намѣреніи, чтобы выгнать наружу мокроты: однако отъ сего не произошло никакого успѣху. Равнымъ образомъ не примѣчено, чтобы и рвотныя принесли какое либо облегченіе.

Что же касается до прорѣзыванія дыхательнаго горла (Bronchotomia) и до испражненія харкотинною оной пѣвы, посредствомъ накуриванія перцемъ горчицы больного производимаго, то успѣхъ и пользу оныхъ время и опыты покажутъ.

Изъ годовыхъ рапортовъ, въ Медицинскую Коллегію 1769 года о разныхъ Врачебныхъ матеріяхъ

рѣхъ присланныхъ, мнѣ извѣстно, что нѣкоторые изъ г. Провинціальныхъ Врачей также сію болѣзнь выѣли и описали, а особливо. г. Ассессоръ Вадомъ (стр. 53), г. Д. Бломъ (стр. 9.) и г. Д. Енстремъ (стр. 300.); ихъ наблюденія не менѣе примѣчанія достойны. Но еще остается узнать, для чего дыхательное горло въ сей болѣзни такъ бываетъ нечувствительно, и при томъ опредѣлить точное время, въ которое именно начинается оная пѣва.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 26.

О Чесоткѣ.

Дѣти знатныхъ и достаточныхъ людей рѣдко бываютъ подвержены чесоткѣ; но большею частью она случается въ низкомъ и бѣдномъ состояніи. Первые имѣющъ хороший присмотръ за своими дѣтьми, чистыя сортицы держатъ чисто, и сортицы ихъ столько имѣютъ плаванья, что часто его могутъ мыть и перемывать, при томъ дѣтей содержатъ въ чистотѣ и часто перемываютъ ихъ плечки и прочее вѣсье. Напротивъ того послѣдніе не въ состояніи имѣть такъ частой перемывы, и частыя ихъ недосуги не позволяютъ имъ довольно наблюдать опрятность.

Для того первую причиною чесотки я полагаю неопрятность; а другою считаю заразу, которая не посредствомъ воздуха отъ одного другому сообщается, но пристаетъ либо чрезъ при-
КО-

косновеніе здороваго къ зараженному, либо чрезъ употребленіе его плашья, либо чрезъ допирогиваніе къ оному (*). Еслили кто хотя малую на себѣ имѣя сынь, носимѣ дитя чрезъ нѣсколько времени на рукахъ, то она къ нему приспаетъ: а иногда даже и опѣ того младенца заражается чесоткою, когда оную на себѣ имѣетъ его прачка, либо ея помощница, либо тотъ, кто содралъ у себя его плашье.

Чесотка не состоитъ ни въ испаринѣ, ни во врожденной либо пріобрѣтенной оспротѣ, ни въ селеномъ либо кисломъ качествѣ крови: но единственно зависитъ отъ небольшихъ настькомыхъ, *Акари Сирочесъ* (*Acari Faun. Suec 1191 et 1195.*) по — Лавини называемыхъ, которыя савозъ кожну входящѣ въ шѣло, въ ономъ возрастающѣ, размножающа и оное цараня либо въ немъ пресмыкаясь производящъ зудъ, отъ чего приливаясь въ великомъ количествѣ мокрыши, составляютъ пузырьки, кои будучи расчесаны, либо лишаясь посредствомъ испарины жидкой влаги, покрываются струпомъ. Сіе мѣсто не опѣ одного только воображенія происходишъ, но основано

(*) Въ Америкѣ многие, а особливо что касается до черныхъ людей, имѣющѣ родъ чесотки, съ равами и не большими мясными нагостками соединенной, которая называвшяся *Грибъена Америкала*. Она приспаетъ опѣ одного къ другому либо чрезъ прикосновеніе, либо посредствомъ мухъ, которыя въ ранахъ напивались, садятся на здоровыхъ и къ пупырунгамъ ихъ прикасаются. (См. *Sauvages Notologia method. Т. 3. Р. 2. р. m. 429.*)

вано на самыхъ опытахъ. Августъ Гаупшманнъ, Бономо, Шиббе и пріиче вѣрныя дослѣдныя мужи многократно и въ разныя времена года у чесотныхъ людей различнаго возраста и пола се примѣтили, и находили сихъ насѣкомыхъ на поверхности кожи и въ згноихъ оной, особливо около самыхъ пузырьковъ. Они ихъ брали и разсматривали увеличительными стеклами, послѣ отрисовали и примѣнили, какимъ образомъ они лазили яйцы, скоро и въ безчисленномъ множествѣ расплодятся и нѣсколько дней на человѣческаго тѣла живы были (*).

Изъ сего можно заключить:

1) Для чего чесотка снова заразительна? Для того, что сн насѣкомыя и оны одного происхожденія могутъ переходить отъ одного человека къ другому.

2.) Для чего оны неопытности оная умножается? Для того, что насѣкомыя у неопытныхъ людей въ весьма великомъ количествѣ расплождаются.

3) Для чего дѣти больше нежели взрослые люди бывающъ поджарены ч. сыпавъ? Для того, что ихъ кожа бываетъ мягче и больше въ себѣ имѣетъ сыважинъ (Рон); и следовательно оныя насѣкомыя удобнѣе подъ кожу заплзати могутъ.

4) Для чего сыпь показывается прежде всего на рукахъ? Для того, что мы прежде всего оными

(*) Бономо сихъ насѣкомыхъ весьма хорошо отрисовалъ (Act. Nat. Curiositum App. ad A. 10. Dec. 2. p. 33.). Снесъ сюа также Linnæi Amoen. Acad. Vol. 3. p. 333, et Vol. 5. p. 95. M.

оними прикасаемся къ людямъ и ихъ платью. Напрошивъ того, чтобы она заведла оубо острофы, либо соленого свойства крови; то бы она должна появляться на нѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ великомъ количествѣ выходятъ испарины.

5) Для чего полезно въ чесоткѣ часто мыться, а особливо въ вечеру? Для того, что нѣкою можно сихъ насѣкомыхъ, когда они еще остыгаются въ кожныхъ згилахъ, не давъ имъ подѣ кожную подпоясть, сполоскать. А какъ мы прикасаемся къ вѣдамъ больше днемъ, нежели ночью, то изъ сего явствуетъ, для чего полезнѣе руки мыть въ вечеру, нежели по утру.

6) Для чего чесотка на снуу прятется внутрь, а напрошивъ того, когда человекъ сильнымъ нѣвдоженіемъ себя разорячитъ, оная выиспуетъ? Для того, что симъ насѣкомымъ какъ великій холодъ, такъ и излишняя жара бываетъ несносна.

7) Для чего не безпрестанно въ чесоткѣ чувствуется зудъ? Для того, что насѣкомыя иногда бѣгаютъ и пресмыкаются, а иногда пребываютъ безъ движенія.

8) Для чего чесотка умножается и выиспуетъ на другихъ нѣва частяхъ? Для того, что насѣкомыя перемѣняютъ свое мѣсто и въ великомъ количествѣ располагаются.

9) Для чего чесотка не у всѣхъ случается? Для того, что насѣкомыя не бываютъ въ чело-
вѣкѣ рождены, но извнѣ къ нему приставаны. Равнымъ образомъ не можно сказать, чтобъ любостысливая болѣзнь, оспа, корь либо оудор-
жнѣйшій кашель неминуемыя были болѣзни; ибо
всѣхъ

всякъ отъ нихъ избавишься можешъ, естли только будешъ себя предохранять отъ заразы оныхъ.

10) Для чего зудъ и чесотка пропадаютъ отъ мазанія тѣла лѣкарствами, составленными изъ масла, сѣры, ртуты, свинцу, луку, девисильнаго корня, табаку, цедоу, соли виннаго камня и тому подобнаго? Для того, что отъ оныхъ си насѣкомыя умираютъ, либо уходятъ и скрываются внутрь тѣла. Изъ сего также можно заключать, что весьма опасно лѣчить чесотку одними только наружными лѣкарствами.

11) Для чего чесотка опять скоро возвращается? Для того, что зараза, какъ уже извѣстно, весьма удобно пристаетъ. Сверхъ того извѣстно, что си насѣкомыя чрезъ долгое время могутъ жить въ плашѣ. Слѣдовательно, естли оное послѣ выздоровленія надѣть, то тотчасъ можно опять получить чесотку. Равнымъ образомъ тѣ насѣкомыя, которыя находясь на поверхности кожи, могутъ быть умерщвлены, а направивъ того тѣ, кои глубже спрятались въ шело, чрезъ нѣсколько времени опять могутъ появиться.

12) Для чего одинъ младенецъ, котораго кормилица поудрила музою, какъ извѣствуетъ изъ Примѣчаній г Кавалера фонъ Липсея (*), тотчасъ на ономъ мѣсѣ получилъ чесотку? Для того, что иногда и въ мукѣ си насѣкомыя находящяся.

13)

(*) Смори Диссертацію Exanthemata viva in Apocrit. Acad. Vol. 5. p. 85. M.

13) Для чего чесотка бываетъ заѣе и больше распростирается, когда больной въ оной чешется? Для того, что онъ чесаніе производитъ боль, и насѣкомыя будучи въспровожены, въ большее приходѣтъ движеніе и расплозавшися.

14) Для чего онаяъ чесоточный человекъ дѣлуетъ армию заразить можетъ? Для того, что сіи насѣкомыя въ безчисленномъ множествѣ расплозавшися, а особливо въ швахъ мѣстахъ, гдѣ не можно наблюдать чистоты.

15) Для чего шѣ, кои находятся въ великихъ болѣзняхъ либо шнорьмахъ, столько удобно заражаются чесоткою? Для того, что шуда приобщаются различные люди, въ часѣхъ коихъ нѣтъ ни когда бѣзвоннаго и чесоточнаго, онѣ конхъ заражаются и прочи, сверхъ того въ такъ великомъ многочисленіи не можно было довольно ошачну, равно какъ и перемѣнны въ надлежащія времена лѣанье.

16) Для чего легче лѣчить чесотку лѣтомъ, нежели зимою? Для того, что онѣ зимняго холоду оны насѣкомыя глубже въ шло прячутся, а впрошныя шло прѣпная для нихъ лѣтная пещера гыманиваетъ ихъ на поверхность кожи, и потому удобнѣе вываеъ ихъ тогда испрѣбнѣ. Излишняя шкромта для нихъ несносна, и потому выгоняетъ ихъ вонъ изъ шла.

17) Для чего скорѣе вылѣчиваютъ чесотку Старухи, нежели Врачи? Для того, что сіи больные имѣютъ ошачности и зная; а напрошавъ того оныя тотчасъ приступаютъ къ мазанію

звѣнью шѣла, не предсказывая себѣ опасныхъ слѣдствій, опѣвотанной внутрь чесотки происходящихъ.

Я пробовалъ многія лѣкарства въ чесоткѣ, однако послѣднѣе узналъ, что нѣтъ ни одного изъ нихъ лучшаго и надежнаго кромѣ того, которое всегда и опѣ всѣхъ показываемо было, т. е. сбра какъ внутрь, такъ и снаружи употребляемая. Ибо я совершенно увѣренъ, что оная уониваетъ сихъ насѣкомыхъ. Долгое время примѣчая, что оная, не имѣя впрочемъ никакого запаха, разогрѣвшись теплотою шѣла, издаетъ опѣ себя особый духъ и, будучи внутрь принимая, оный уониваетъ пошу. По сей причинѣ при употребленіи оной золото и серебро, естли большой оне при себѣ имѣетъ, чернѣетъ. Ся самая испарина или опѣ оной исходящій запахъ симъ насѣкомымъ бываетъ противенъ и смертоносенъ. И такъ сіе лѣкарство должно считатьъ противъ чесотки самымъ дѣйствительнѣйшимъ и несомнѣвымъ.

Слѣдовательно приступающіе къ пользованію чесотныхъ младенцевъ, должны наблюдать слѣдующее:

1) Чибѣ горница большого содержания была въ чистотѣ, его плашье хорошо было вымываемо и часто перемѣняемо, и чибѣ кормилица, или сама мать, естли она кормитъ, наблюдала около себя опрятность и никоимъ бы чесотный задишя не принимался.

2) Чибѣ горница всегда была умѣренно тепла.

3) Чтобъ младенцѣ принималъ внутрь мѣлко сполченыхъ и просѣянныхъ сѣрныхъ цвѣтѣвъ въ небольшомъ количествѣ теплаго коровьяго либо кормилицына молока отъ 2 до 10 грановъ или больше, смотря по возрасту больного, по два или по три раза въ день. Если же оныя, какъ то иногда случается, слабѣютъ, то должно ихъ количество уменьшить.

4) А когда отъ сего чесотка въ восемь дней не проходитъ; то должно сдѣлать мазь изъ сѣрныхъ цвѣтѣвъ и прѣсныхъ сливокъ, и мазать оною младенца въ однихъ только ручныхъ и ножныхъ членосоединеніяхъ каждое утро до ихъ поръ, пока совершенно будетъ чесотка излѣчена. А дабы она не была вогнана внутрь; то должно при этомъ продолжать и внутреннее употребленіе сѣрныхъ цвѣтѣвъ. И для той причины совѣтую по ушамъ мазать, что и оныя цвѣты принимаемы бывають днемъ же. И такъ сн насѣкомыя сѣобныхъ спорыи будучи атакo-ваны, непременно должны быть истреблены. Можъно также прежде употребленія сихъ лѣкарствъ дать слабительное, сѣмъ примѣчается, что желудокъ и кишки засорены; въ противномъ же случаѣ оное бываетъ не нужно. Ибо посредствомъ слабительныхъ никогда чесотки излѣчить не можно; развѣ они будутъ дѣйствовать исподоволь, войдутъ въ кровь и будутъ въ себѣ имѣть что либо для сихъ насѣкомыхъ смертоносного.

Если же младенецъ еще такъ малъ, что лѣкарствъ принимать не въ состояніи: то можно его вылѣчить тѣмъ, когда кормилица будетъ принимать въ теплое молоко по два
скру-

скрупула, или по одной драхмѣ въ день сѣрыхъ цвѣтъ. Что сей способъ лечения также действителенъ, то я опытомъ извѣдаю. Когда тыль иногда весьма была сильна, на пр. на ногахъ то я съ холстомъ усѣхомъ прикладывалъ къ оной канусиры драны. Хотя съ начала сѣя сего мало шло, изъ ранъ мазокъ, однако они скоро пересыхали и чесотка проходила. Руки удобно можно заживить, если ихъ дни два почаще мыть взваромъ изъ можжевеловыхъ вѣтвей.

Но какимъ образомъ выдѣляется та чесотка, которую младенцы получаютъ отъ родителей; зараженныхъ любострастною болѣзнію; либо отъ нечистой кормилицы: то о семъ можно читать въ Отдѣленіи о любострастной болѣзни.



ОТДѢЛЕНІЕ 27.

О любострастной болѣзни.

Любострастная болѣзь (Lues Venerea) въ Европѣ въ первой разѣ примѣчена въ 1494 году. Хотя она пренесена сюда Испанцами острова Св. Доминго (Hispaniola) въ то время, когда они, будучи путешественниками Христофоромъ Колумбомъ, открыли Новый Свѣтъ, и возвращаясь отсюда, привезли съ собою сію заразу: однако она сущая уже послѣ того годѣ, во первыхъ во Французской арміи, когда Французскій Король Карлъ VIII. изъ непріятельской арміи велъ съ со-

бою въ Неаполь 80000 плѣнниковъ, появилась. Но она тамъ чрезъ сообщеніе съ зараженными уже отъ Испанскихъ солдатъ женщинами весьма размножилась. Изъ Италіи, Франціи и Испаніи мало по малу начала она распространяться и въ прочихъ странахъ Европы, а потомъ равнымъ образомъ и въ Африканскихъ и Азіятскихъ краяхъ, съ Средиземнымъ моремъ сѣжныхъ; напоследокъ въ Турціи, Персіи и Японіи.

Сначала сія болѣзнь весьма была жестока, и ядъ ея былъ гораздо сильнѣе, нежели какой онъ теперь; ибо многимъ она стоила жизни. Но послѣ свирѣпости ея мало по малу уменьшилась и съ 1610. года не имѣла уже она никакого въ разсужденіи новыхъ припадковъ, какъ прежде того сіе было ей обыкновенно, приращенія. Нынѣ ядъ ея сначала болѣею частью распространяется прежде, нежели войдетъ въ кровь, на наружныхъ плѣхъ частяхъ, а особливо на плѣхъ, которыя покрываются одною только тонкою кожею, какъ на пр. на губахъ, внутри рта и на прочихъ мѣстахъ вѣшнихъ (*). Если бы
сія

(*) Г. Фабръ (*Traite des maladies venereuses* Т. 1. р. 12.) упоминаетъ, что славный Хирургъ Петитъ пишетъ о нѣкоторомъ мужикѣ, который имѣлъ въ прогнившихъ поднебевныхъ костяхъ дыры и по обѣимъ сторонамъ носа слезные свида (Фистулы). Тщешно многіе искусные мужи прилагали свое стараніе о его излѣченіи. Г. Петитъ, видя его болѣзнь, старался уличить, что онъ имѣлъ сообщеніе съ зараженною болѣзнию женщиною, однако онъ

сія болѣзнь въ разсужденіи числа больныхъ и жестокости или припадковъ безпрестанно такимъ же образомъ ослабѣвая : то бы не трудно было ее лѣчить, либо и вовсе излечить.

В ъ 3

При-

сказывалъ, что онъ никакого яду въ себѣ не имѣлъ. Не смотря на то однако, онъ былъ зараженъ Г. Петитъ жалѣлъ мазаться ему ртутною мазью, и къ удивленію всѣхъ возвратилъ ему прежне здоровье. Г. Флюръ самъ призванъ былъ къ одной Госпожѣ 31 года, которая вышла за мужъ на 18 году. По прошествіи семи лѣтъ сдѣлалась у нее жаба, соединенная съ горячкою и бредомъ. По излеченіи оной оспалась въ горлѣ опухоль. однако и она чрезъ три мѣсяца разошлась. Послѣ того она чрезъ цѣлый годъ была здорова. Но напоследокъ цѣлые три года была больна, и часто имѣла по флюсы, по поперемѣнно боль въ груди, въ головѣ и въ желудкѣ. Наконецъ приключился ей поносъ, который продолжался два мѣсяца и не прежде пересталъ, какъ когда воспослѣдовало другое еще хуже прежняго теченіе, съ которымъ однако не сопряжено было никакой боли, кромѣ иногда бывающаго рѣзу въ мазкѣ. Мужъ ея хотя женился и здоровъ, однако прежде своей женитьбы имѣлъ нѣсколько разъ любовнаго болѣзнь, которая худо была лѣчена и вогнана внутрь снимающими лѣкарствами. Онъ также и въ то время былъ здоровъ, однако имѣлъ на шеѣ лишай, изъ которыхъ шелла такая же маперія, которая прежде у него выходила изъ извѣстнаго мѣста. Для того г. Флюръ не требовалъ отъ него никакихъ извѣщеній, но велѣлъ облить имъ мазаться ртутною мазью.

Пристаетъ она обыкновенно чрезъ сообще-
нѣ зараженной осы. Правда, не всегда о-
на потчасъ себя оказываетъ нужными знаками;
однако всегда въ какомъ случаѣ осыныи ея
въ тѣлѣ ея вѣроятностно заключить можно. Ибо
иногда ятъ осы такъ бывающа слаба, что въ
зараженыхъ имъ частяхъ не производятъ
никакой боли, востановленія, рана и почесанія изъ
мочислусъ и тѣмъ же самымъ образомъ и смор-
нашо однако, захвативъ осы въ руку и часто въ
оной чрезъ нѣсколько времени проис-
ходитъ какъ то дѣло случаемъ и бу-
оживающа. А когда въ возмѣтѣ свое дѣло
то прерываетъ дѣло, и тѣмъ дѣло срынуто
любоу, и тѣмъ же образомъ. Впрочемъ можно осы
зараженныя и не вѣдѣть о томъ, если о-
на спитъ съ зараженными частями на одной
поспѣль. Ибо когда зараженныя ночью поспѣ-
дуютъ имѣтѣ на тѣлѣ сыны: то потчасъ отъ
того можно вѣдѣть въ несчастіе. Дослѣдныя вѣ-
роятія (Фабриціи Гилданъ (См. с. Obs 97.)
приводитъ примѣчанія дослѣдныя шаловый п-
мѣръ. Равной опасности человекъ можетъ
подвергнуться, если онъ будетъ носить ушное
мое прежде бѣлымъ платьемъ, либо спавъ
спать на такой простынѣ, на которой не за-
вое время переѣтъ тѣмъ сналъ зараженный. Со-
важъ (Nöbög. Т. 3. Р. 1. р. 84.) повѣствуетъ,
что иконопорокъ Лаваръ въ Монпельерѣ зара-
зился отъ того, что положилъ себѣ подъ го-
лову подушку замаранную сливою чрезъ слино-
печеніе пользовавшаго человека. Тотъ же самый
Гилданъ упоминаетъ, что одна молодѣшная не-
ра-

распространяемая дѣрушка отъ него получила сію бо-
 лѣзнь, что нашла на свои ноги чулки больного,
 мѣла Словомъ, снорить только кому либо
 получить сію болѣзнь, то онъ легко ее другимъ
 уладитъ можно. Цѣлитель Лейбмедикъ Лип-
 дебергъ въ сочиненной имъ Книгѣ о лихорадоч-
 ствахъ сохранилъ (стр. 35) упоминаетъ, что
 одинъ человекъ подушками заразилъ своихъ се-
 сиперъ. А искусный Правникъ (Форестъ) сказыва-
 ваетъ, что одинъ человекъ заразилъ свою жену
 такимъ образомъ. Песаъ него она сообщила
 сію заразу новорожденному своему дитяти, ли-
 шя кормилицы, а кормилица двумъ собствен-
 нымъ своимъ дѣтямъ. Въ Стопотомъ за нѣ-
 сколько лѣтъ предъ симъ въ одномъ честномъ,
 купеческомъ домѣ отъ кормилицы, въ домъ не-
 оснорожно принятой, заразился мужъ, жена,
 шрое дѣтей, служанка и два сидѣльца. Антонъ
 Галлѣй повѣствуетъ, что одна повивальная
 бабка заразилась принимая, младенца отъ зара-
 женной женщины. А Бургезій упоминаетъ объ
 одной повивальной бабкѣ, которая имѣя сію бо-
 лѣзнь, сообщила оную 35 фамиліямъ. Голланд-
 скій Врачъ именемъ Эверхаерсъ въ написанномъ
 имъ въ 1691. году небольшомъ Сочиненіи пишетъ,
 что одна честнаго впрочемъ жившя женщина, по
 обыкновенію своему высасывавшая у роженца
 пиныи, и чрезъ то заразившись неумышленно,
 заразила многихъ какъ женщинъ, такъ и мла-
 денцевъ (*). Подобные симъ примѣры приво-

Вѣ 4

дитѣ.

(*) Снеси сюда подобную Исторію г. Балка, въ
 его Медицинскъ примѣчаніяхъ на стр. 151 и
 слѣд. описанную.

дитъ искусный Докторъ Биагудъ (vond. Nurochondrie. S. 71. 75.)

Когда родители имѣютъ въ себѣ любострастную болѣзнь; то конечно рождаемыя ими дѣти съ оною на свѣтъ происходятъ. Но какъ оной ятъ при зачатии ихъ либо бываетъ въ полноту своей жизни и силъ, либо слабъ и какъ бы замершій, то и действуемъ на нихъ различнымъ образомъ. Ибо когда онъ въ то время находится въ высочайшей своей неспокойности, то онъ жестоко младенцевъ въ утробѣ матерней умерщвляетъ. И потому — то несчастныя таковыя матери всегда производятъ на свѣтъ незрѣлой плоть, либо рожаютъ мершвыхъ младенцевъ. Если же онъ родитъ и живое дитя, то оное бываетъ покрыто ранами и имѣющее въ плече злая чуждое страстное болѣзнь. Запротивъ того если ятъ у родителей не столько действительна, то рождаемый ими младенецъ по видимому кажется здоровъ до шесту годъ, пока не окажется на немъ множество нарывовъ и ранъ. Впрочемъ если онъ въ такомъ случаѣ либо самъ собою остается какъ бы замершій, либо родители прощая всего употребляли и непорочна дѣвства, кои хотя его принесли, однако не могли совсемъ не имѣть: то уже рождаемыя ими дѣти насвою любострастную болѣзнь бываютъ заражены. Но въ такомъ случаѣ сей зѣтъ принимася на себя другой видъ и обнаруживаетъ себя Агнискою немощью, золотухою или другими припадами, кото-

допавшихъ причиною его и не считаютъ. Таковыя младенцы бывающъ малы и слабы, а равнымъ образомъ и рождаемые попоманъ одинъ другого хуже. Смытъ-по спосотомъ весь народъ можетъ переродиться и испортить свое существо (*). Отсюда происходитъ, что нѣкоторые младенцы, отъ сихъ родителей рожденные, имѣютъ различные изъ вышеписанныхъ припадки; а другие напротивъ того во наружности кажутся здоровыми. Сии зачинаются и рождаются въ то время, когда ядъ у ихъ родителей хотя и не вовсе испребленъ, однако хорошею дѣлою, либо лѣкарствами весьма обезпаченъ бываетъ. Но оный на подобіе семени можетъ либо отъ не-воздержанія, либо иногда и самъ собою по времени произрости и сколько увеличиться, что плодъ либо убиваетъ, либо ввергаетъ во гдѣ вышеписанныя несчастія. Отсюда также явствуетъ, для чего нѣкоторые младенцы однихъ и тѣхъ же родителей бывають здоровы, и другие напротивъ того какъ и тѣломъ, такъ и душою немоществующи? Сверхъ сего отсюда вслѣдъ можетъ видѣть, сколь необходимо нужно всякому,

В в з

на-

(*) Ктобъ подумалъ, что разпутныя женщины могутъ причинить болѣе вреда, нежели огонь и мечъ? Однако Король Филиппъ V. принужденъ былъ се испытать, когда Португальская армія стояла около Мадрита, которой почти цѣлая полковина была зараженныхъ солдатъ, въ непріятельскіе дома своевольно съ худымъ намѣреніемъ ходившихъ. (Смолет *Supplément aux Essais historiques sur Paris* p. 75).

намѣревающему вступиши въ супружество, уда-
лившись отъ сего зла, либо по несчастію въ оное
попавши, прежде брака отъ онаго излѣчивашь-
ся. Въ противномъ же случаѣ и самая добродѣ-
тельный и чистая жена, а вмѣстѣ съ нею и все ея
помощество не могутъ изыбгнуть несчастнаго
жребія. Благоразуміе пребудетъ, въ такомъ слу-
чаѣ заготовременно потребовать совѣта у знающихъ
и искусныхъ въ семъ дѣлѣ Врачей, и чистосер-
дечно предъ ними открыться во всѣхъ своихъ
обстоятельствахъ. Еслили кто имѣлъ на дѣ-
тородномъ удѣ шанкръ, но оный вдругъ про-
палъ, либо залеченъ одними только наружны-
ми лѣкарствами, и послѣ того ни въ одномъ па-
ху не было паховика, который бы пришелъ въ
созрѣніе, прорвался и совершенно очищенъ; то
онъ конечно долженъ имѣть въ себѣ зѣ. Рав-
нымъ образомъ естли кто имѣлъ любост-
растную бѣлую грыжу (*Gonorrhoea*), которая ху-
до была пользована, либо слишкомъ долго
продолжалась, либо вдругъ и сама собою отъ
приключившейся горячки прекратилась, либо
преждевременно посредствомъ прожженных лѣ-
карствъ или вальзама Копаивы, либо впрыски-
ваніемъ вяжущихъ лѣкарствъ (*Imediones adstringentes*) остановлена; либо когда у кого отъ сей
же причины паховыя и бедренныя железы нахо-
дятся весьма окрѣпавы: то точно онъ имѣетъ
въ себѣ любострастную болѣзнь, и хотя по на-
ружности кажется здоровъ, однако непременно
пребудетъ самого строгаго лѣченія, не смотря
даже и на то, естли бы онъ противъ совѣсти
и скрывалъ отъ Врача, будучи имъ пользованъ.

дѣйствительное свое состояніе (*). Истину сего сѣдующая Исторія повѣствуетъ:

Нѣкоторый молодой Господинъ, заразившись сею болѣзнію, лѣчился онъ оной посредствомъ производимаго слюноотеченія, и думая, что уже совершенно выздорѣвалъ, женился и имѣлъ отъ своей жены двоихъ здоровыхъ дѣтей. Послѣ сдѣлавшись вдовцомъ, женился вторично на здоровой жнѣ, которая родила ему двухъ совершенно здоровыхъ дочерей. Начавъ болѣть его жена, которая никогда не жаловалась грудью, изъ какой причины началъ часто плавать кровью. Потомъ она родила нѣсколько сыновъ, которые все были нездоровы и имѣли въ себѣ Англическую язву, а одинъ изъ нихъ и на такую болѣзнь. Слѣдовательно слюноотеченіе либострастную болѣзнь утишило только на нѣкоторое время и никакъ ее не обезсилило, что не только первая жена и ея дѣти никакихъ отъ оной припадковъ не

(*) Нѣтъ по незнанію требуютъ помощи у такихъ людей, которые и сами сего не разумѣютъ. Пучому даютъ имъ только облегчающія лѣкарства (Painacea), коими исторгая одни наружные припадки, думаютъ, что уже и вся болѣзнь совершенно выведена не смотря на то однако ядъ оной въ крови оснанился, и рано или поздно либо явственнымъ призоветъ ихъ сей, либо, перемѣнивъ свое свойство, подѣлитъ домъ другихъ болѣзней, онъ сего лѣ испочинка происходящихъ, открывается. Но тогда уже труднѣе бываетъ ихъ лѣчить, нежели прежде, когда еще время и оныя облегчительныя лѣкарства не перемѣнили естественнаго существа яду.

не имѣли, но и вторая равнымъ образомъ сначала имѣла съ своими первыми дѣтьми была заражена. Но послѣ когда обзаведенный ядѣ началъ опашь обживашь, то онѣ того приключилось же не сего Господина кровоплевание, а родившимся онѣ все дѣтямъ выписанные припадки, часто онѣ лютѣйшей болѣзни происходяще, кои одного за другимъ лишили жизни.

Можетъ также младенцевъ заразить сею болѣзнию и онѣ того, когда сосать грудь зараженнѣй кормилицы. Ибо въ такомъ случаѣ никакимъ способомъ не можетъ онѣ избавиться онѣ заразы. Но еще за счастье почитать должно, елики она въ скорости и прежде онлученія онѣ тууды буденѣ примечаетъ. Ибо въ то время можно ее избавить, елики кормилица согласится принимать надлежнѣй дѣтскаго при продолженіи его воздоснѣй. Елики же сіе упущено буденѣ до того, что уже малѣтсѣй болѣе не буденѣ сосать грудь, то болѣзнь можетъ взорениться глубже, и потому болѣе причины затрудненіе въ лѣтении. Для того въ выборѣ кормилицы должно поступать осторожно и прежде принятія сную хорошо разсматривать. По сей причинѣ учрежденная въ Стокгольмѣ, такъ называемая Комора для приему кормилицъ, есть весьма похвальное заведеніе (*). Желаннѣ дол-

(*) Сіе есть новое Медицинское заведеніе, въ разсужденіи котораго прочіе народы должны подражать Шведамъ. Въ сію Комору, являсь желающія опредѣляться въ кормилицы, должны доказывать, что въ шлѣ ихъ никакой не имѣетъ

должно только, чтобъ болѣе имѣ пользоваиель. Впрочемъ, какъ изъ вышеписаннаго явствуетъ, не довольно того, чтобъ осматривать только наружность шѣла принимаемой кормилицы, но должно сверхъ того обстоятельно осведомиться о ея поведеніи и распросить, не жила ли она въ такихъ мѣстахъ, гдѣ бы легко ей можно было заразиться сию болѣзнію. Но у нѣкоторыхъ лю-

ся болѣзни. Отъ сего происходить та выгода, что всякая женщина, имѣющая надзорность въ кормилицѣ, получаетъ одну модель зѣла получивъ, а напроиивъ того всеиъ и емъ женщи-
намъ, кто, въ имѣющѣ въ себѣ лѣтоспра-
снвую, либо другую какую либо болѣзнь, въ кор-
милицы вступать запрещается. Такъ на пр.
во 1764 году изъ 295 женщинъ, въ одну Кон-
шору явившихся, выбрано только 152. И изъ
числа 630 кормилицъ, которыхъ онъ мѣсяца
Марта 1767 года до Государственнаго Сейма
1772 года, (ибо во время Государственнаго
Сейма все Врачи, въ Королевствѣ находящіяся,
подаютъ свои ведомости въ Медицинскую Кол-
легію о Медицинскихъ произшествіяхъ) осма-
тривали, болѣе 200 сыскано болѣныхъ лѣтос-
страстною болѣзнію, сыпью, золотухою, ли-
бо имѣющихъ испорченное молоко, и ихъ вы-
качали. Кажется, что чрезъ сіе лѣтоспра-
стная болѣзнь въ Шотландіи уменьшалась. Въ
Парижѣ примѣру Шотландціи въ послѣдовали и
учредили два Bureau des nourrices, изъ кото-
рыхъ въ одномъ Врачи, а въ другомъ женщи-
на имѣетъ надзоръ. Посредствомъ сихъ
учреждений можно осведомиться о язвахъ
вступающей въ кормилицы, о ея здоровьи, о
добротѣ молока и пробовать, не старое ли оно.
Смотри Detail de la nouvelle direction du Bureau des
nourrices a Paris par т. г. Gardane, М.

людей ядъ любосипрастной болѣзни долго скрывается, а особливо что касается до жирныхъ. Собственное дѣло кормилицы также должно порядочно осматривать: ибо часто дѣти открываютъ собию родъ жизни своихъ родителей.

Но какъ кормилица младенца, такъ равнымъ образомъ и младенецъ кормилицу, если ли онъ имѣетъ въ себѣ любосипрастную болѣзнь, заразить можетъ. Зѣло должно призаветъ еще одно весьма славительное примѣчаніе, а именно, что прежде всего сплыветъ зараженная и возлѣ ее лежащая частіи. Ибо въ причинѣ у младенцевъ, заразившихся отъ кормилицъ, дѣлаются сначала вѣткія раны по рту, а особливо въ горлѣ, и при томъ челюстныя и шейныя железы распухаютъ и зашвердѣваютъ. А напротивъ того еслили младенецъ заразитъ кормилицу, то у нее происходятъ подобныя язвы на щипкахъ и швердѣютъ подмышковыя железы. Если же кто заразился отъ того, что либо спалъ съ больнымъ на одной постелѣ, либо носилъ его наплече: то впервыхъ показывается сія болѣзнь на кожѣ сыпью, нарывами и ранами.

Младенцамъ скорѣе приснаетъ сей ядъ; нежели взрослымъ, можетъ быть для того, что оныхъ кожа бываетъ тонѣ, и следовательно всасывающие ихъ сосуды бывають болѣе ошверсты. По сей причинѣ не должно давать младенцамъ ложки, ножа, вилки, либо стѣкана, который былъ въ употребленіи у зараженнаго. Ибо и отъ сего иногда въ нихъ происходятъ весьма худыя свѣдѣнія. Напротивъ того взрослые рѣдко изнѣмъ образомъ, какъ и посредствомъ воздуха либо дыханія больного заражаются.

У младенцевъ скорѣе также сія болѣзнь обнаруживается, естели ядъ оной у родиль-
лей, а особливо у матери при рожденіи младен-
ца на свѣтъ нѣкоторымъ образомъ былъ въ сво-
ей животи. Но естели оный посредствомъ нѣ-
которыхъ лѣкарствъ приведе-тъ въ слабость; то
сначала не можно узнать, какъ скоро она оп-
крое-тъ. Одна одинадцатилѣтняя дѣвица благо-
получно перенесла прививную оспу, была здоро-
ва и пригожа какъ самая роза. но по прошествіи
нѣсколькихъ мѣсяцовъ открылась у нее врожден-
ная любострастная болѣзнь и появилась опухоль
и нарывы въ шейныхъ железахъ; высыпала на
лбѣ любострастная чесотка, сдѣлалась криво-
лица въ поднебешныхъ костяхъ, началъ печь
носъ гной и появился на лбѣ вѣдкія язвы.
Одна двухлѣтняя дѣвица заразилась отъ служан-
ки чрезъ то, что она ей дѣлала пищу, на лбѣ
которой послѣ сысканы большія язвы и про-
чие несомѣнныя признаки любострастной болѣз-
ни. Заразу на семь лѣтъ не прежде девяти
лѣтъ примѣтны было можно, и она вонервыхъ
открылась погуудами на головѣ (Тіпа). Четырех-
мѣсячное употребленіе ртутнаго спирта (копо-
рый однако не знаю, надлежащимъ ли образомъ
былъ употребляемъ) казалось, будто ее вылѣ-
чило: однако послѣ того годъ спустя приключи-
лась сыпь, хотя и не очень сильная. Сверхъ
того подѣлались вѣдкія раны въ горлѣ, она нача-
ла говорить въ носъ и часто имѣла гинкой го-
ловѣ. Двѣ родныя сестры были заражены одною
кормилицею, которая носъ того, какъ отходила
изъ онаго дома, имѣла носъ. Любострастная

зараза на нихъ открывалась тогда, когда онѣ уже были по 30 году, хотя на одной изъ нихъ и на восьмомъ году примѣтена была сыпь.

Я не отваживаюсь утвердительно сказать, въ чемъ состоятъ любезнѣйшіе ядѣ: въ насѣкомыхъ ли, въ бѣкой ли оспирѣ, или въ гни-досли. Только по извѣстному, что онѣ на томъ мѣстѣ тѣла, гдѣ она вывася его зараза, производятъ рдѣние, жаръ, напряженіе и боль, и послѣдствіе бѣжія раны. Изъ опытовъ лѣкажъ явствуетъ, что онѣ створоживаетъ жидкую часть или пасолу нашей крови, и наипаче имѣетъ свое гнѣздо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся отдѣляющія изъ себя жирную мокроту железы. Равнымъ образомъ примѣнно измѣ, что сей ядѣ есть не летучій, и слѣдовательно не можетъ посредствомъ воздуха переноситъ бытъ съ мѣста на мѣсто, но заражаетъ единственно только чрезъ прикосновение. (Смотри *Astuc. de morbis venereis* p. m. 125.)

Удивительно, что сія болѣзнь у многихъ бываетъ скрытна, и иногда чрезъ нѣсколько лѣтъ сряду, хотя точно извѣстно, что ядѣ ея нѣ шѣвъ находилось и другихъ заражаетъ. Примѣчания достойно на сей случай наблюденіе г. Гуларда (*oeuvres de Chirurgie* T. II. p. 19), который говоритъ, что одна женщина, имѣя на тѣлѣ пушерышки и чирьи, просила у него совѣта. Онъ сдѣлавъ ей нульные вопросы, поговорилъ съ ея мужемъ, который хотя съ виду казался быть здоровъ и свѣжъ; однако болѣе 18 лѣтъ назадъ имѣлъ паховникъ и шанкрѣ. Г. Гулардъ изъ сего заключилъ, что чесотка у его жены про-

приисходитъ отъ любострастной болѣзни. Слѣд-
ствие его мнѣе утвердило. Ибо когда начали
мазать ее ртутною мазью, то ея припадки не
только уменьшались, но напоследокъ и во все
изчезли. Онъ старался также уговорить къ сему
роду лѣченія и ея мужа, дабы опять отъ него
не могла жена заразиться: однако онъ на то не
согласился. Почему жена и вторично отъ него
заразилась, но уже тогда ядъ оный бросился на
грудь и превратилъ ея дни. Мужа никакимъ
образомъ къ лѣченію уговорить было не лезъ
поному, что онъ впрочемъ ни мало не былъ бо-
ленъ такъ, что даже и по смерти своей жены
боле 25 лѣтъ жилъ въ одинакомъ состояніи.

Ядъ любострастной заразы не только долго
можетъ въ швахъ скрываться, прежде нежели
окажетъ себя истинною болѣзнію: но еще мо-
жетъ себя обнаруживать и подъ видомъ дру-
гихъ болѣзней, которыя по видимому ни малѣй-
шаго сообщенія съ любострастною не имѣютъ.
Въ различныхъ сочиненіяхъ Писателей сыскать
можно, что не рѣдко оная подъ маскою головной
боли, воспаления глазъ, слѣпоты, боли въ ушахъ,
глухоты, ранъ въ носу, жабы, молочницы, син-
дипности, кашлю, колотья въ бокахъ, кровопле-
ванія, спѣшенія въ груди, чахотки, кровавого
поносу, боли въ поясницѣ, бѣлой грыжи, сухожар,
медленной лихорадки, слабости въ членахъ,
ломоты, подагры, судорогъ и падучей болѣзни
скрывалась.

Еслили же кто имѣлъ которую нибудь изъ
сихъ болѣзней еще прежде заразы: то она отъ

овой еще пуще ожесточенная. Можно подозре-
вать, что сн прелесть происходила отъ людо-
спасительной зазвѣ въ то время, когда бол. ой
прежде имѣлъ шапокъ, либо людооспасающую
бѣлую грызу и отъ оныхъ не излечился, либо
имѣлъ когда либо сообщеніе съ подлѣ и пельны-
ми и зараженными людьми. Но ссылай сего ли-
бо самъ больной, либо его друзья Врачу не от-
кроишь. то трудно бываешь его лечишь, либо
узнать, что сн есть сальсификомъ людооспаса-
тельной бѣзвѣ (*). Но какимъ образомъ можетъ
добродѣтельная личность, которая ничто худ-

(*) 1. д. бархень мѣлъ сказывало, что случи-
лось ему пользоваться отъ одного двенадцати лѣтъ
юношу, который имѣлъ параличъ поража-
ющую и вѣнѣ оуспѣвающую въ у. закрыщен-
ный на первую спину ротъ и спускающую цѣ-
ку. Онъ универсалъ, что въ сн прозвучало
отъ простуды, приносилъ говорилъ, что у не-
го и тогда въ тоже самое время, когда про-
студился, заболѣло и все приключилось въ ту же
вѣнѣ. Врачу не счелъ бы сего за сальсификомъ людо-
спасительной бѣзвѣ, счелъ бы нечеловѣкомъ,
что ниже таковыя лѣказы были, рѣшала
и зѣть рѣшала. При рѣшала рѣшала въ ту же
увидѣлъ отъ вѣнѣ сн и сн не рѣшала бѣзвѣ
рѣшала; что сн сн сн универсалъ въ мѣнѣ
о приносилъ бѣзвѣ. Тогда бѣзвѣ приносилъ
былъ признавался, что отъ имѣлъ бѣзвѣ людо-
спасающую цѣку, о нѣмъ сн конной бѣ
не приносилъ сн сн. Бѣзвѣ счелъ сн
уносилъ сн сн сн сн, сн и сн сн
рушующий сн сн, и сн сн сн сн сн
шею, сн сн сн сн сн сн сн сн
сн сн сн сн сн сн сн сн

го за собою не знаешь, въ семъ признаться (*)? А еще и много меньше можно сего объяснения ожидать отъ такого младенца, который получалъ сего болязнь отъ родившей, либо кормилицы. Свѣдѣ сего нѣтъ и забываютъ, что они за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ нѣтъ нѣкоторыя признаки двохосердечной болязни, либо не могутъ съ собою вообразить, чтооу она чрезъ такъ долгое время могла вѣтъ изъ себя только хурыхъ свѣдѣній. Иногда о нѣтъ и лѣтъ, и тогда выдѣли убрѣны, чтооу совершенно выздорѣвали: однако они мало о томъ заботились, какого роду было ихъ лѣчение, коженое ли, или только усыпляющее болязнь на нѣсколько времени. Слѣдовательно въ нѣтъ обобщительствѣхъ больше ничего дѣлать. Врачу не осмѣлятся, какъ собственнымъ раченіемъ и нѣтъ лѣдованіемъ въ сей

Г л 2

тем-

(*) Одна чрезвычайно лѣтъ женщина, чрезъ долгое время весьма спирадала, нѣтъ мѣтъ, нѣтъ нѣтъ, соединеннымъ съ лѣтъ болю въ сѣтъ, отъ которой иногда такой пронесходоу аронивной закъ, что она не могла сидѣть у другихъ. Изъ сего поведенія ничего хулого заключить было не можно, и потому она была нѣтъ всемо подозрѣнія. Мужъ ея по нѣтъ лѣтъ казался бытъ здоровъ, и никакого отъ нѣтъ въ сѣтъ лѣтъ объясненія получивъ было не можно. Но лѣтъ нѣтъ нѣкоторыя Вачъ отъ лѣтъ, что онъ за годъ предъ тѣмъ пользовалъ сего (нѣтъ) лѣтъ лѣтъ. Тогда вдругъ нѣтъ сила и лѣтъ. Врачъ не говоря о семъ нѣтъ ни слова, предписалъ ей употреблѣть Вачъ фанъ Свѣтъ (нѣтъ) спиритъ (Spiritus mentalis), и тѣмъ совершенно прекратилъ всѣ ея мученія.

темношѣ настоящую причину изыскивать, и надлежащимъ образомъ располагать свое лѣчение. Какія бы кто ни употреблялѣ лѣкарства, даже хотя бы они и самыя были опборнѣйшія; но еслили неизлѣсна будетѣ причина болѣзни, и еслили они не будутѣ ршущыя; то щещенно будетѣ все его стараніе.

Нѣкоторый Господинъ пятидесяти лѣтъ примѣчалъ въ себѣ болѣе уже шесени лѣтъ чаклоснѣ и оскудѣніе силъ, не имѣя впрочемъ никакой въ шѣлѣ боли. Славные Врачи Сшалъ и Гофманнѣ четыре года щещенно трудилась о возвращеніи его прежняго состоянія. Потомъ повхалѣ онъ въ Парижъ, и въ ономъ былѣ пользованъ щамощными Врачами два года. Напоследокъ искалѣ онъ помощи въ Моншиаіерѣ, но и тамъ прожилъ 8 мѣсяцовъ безо всякой пользы. Тогда пришло на мысль г. Профессору Физесу, что конечно здѣсь кроются нѣкоторые остатки любовшрасшней болѣзни: для того не смотря на то, что больной увѣрилъ, что не щелько ни онъ ни его родители, но даже и кормилица никогда не имѣли сей болѣзни, предписалъ ему молочную діету, и велѣлъ мазаться рпушною мазью, онъ чего имѣлъ такъ удачный успѣхъ, что больной щѣломъ спалъ подонъ и получилъ прежнія силы. (Смощри. *Sauvages Nofol. Method. T. III. P. II. p. 383.*) Одинъ Офидеръ, получивъ въ руку щакую рану, что Лѣкаръ принужденъ былъ ее опилать, по залѣченіи раны, имѣлъ судорги, во время щопныхъ голова въ правую сторону гнулась, и такъ нижняя челюсть придавливаемая была къ верхней, что онъ принужденъ былъ въ зубахъ держать

ласть подождать. Почему опияли ему въ другой разъ нѣсколько олато члена, однако безо всякой пользы; равнымъ образомъ употребляли и другія средства, однако не больше и онѣ того имѣли успѣху. Напоследокъ Докторъ Акмаръ освѣдомился, что онѣ за нѣсколько времени предъ нѣмъ имѣлъ любовнаго пристрастия, и въ оной непорядочно былъ пользованъ. для того уговорилъ его мазаться ртутною мазью, и нѣмъ благополучно прекратилъ его припадки (Смотри *Riveri Obs. 10. Comitia*). Г. Спрандбергъ въ говоренной имъ, при сложении съ себя должности Предсѣдателя въ Королевской Академіи Наукъ, рѣчи (стр. 33) упоминаетъ объ одномъ мужикѣ, который имѣлъ долговременную боль въ сѣдалищной кости, и онѣ оной напоследокъ излечился мазаніемъ ртутною мазью. Онѣ бы и скоро онѣ оной могъ избавиться, если бы заблаговременно во всемъ чистосердечно признался. Въ оной же рѣчи (стр. 32.) онѣ говоритъ объ одномъ молодомъ человѣкѣ, который конечно бы лишился зрѣнія и слуха, если бы наконецъ не убѣдили его признаться въ своемъ пороѣ.

Я упоминаю здѣсь эти примѣры для того, чтобъ показавъ, сколь неблагоуразумно поступилъ бы больной съ Врачемъ, или лучше сказавъ, съ самымъ собою, если бы, будучи въ состояніи се сдѣлать, не открылъ ему своихъ обстоятельство. Но совѣмъ пропавъ тому бываешь съ невинною матерью либо младенцемъ. Ибо въ семъ случаѣ самъ Врачъ всячески долженъ стараться открыть ихъ обстоятельства.

Что касается до младенцевъ, то хотя трудно сыскать на нихъ явные признаки сей болѣзни, еслили она началась у матери не инкрини — однако можно ее заключать изъ того, когда у нихъ примѣняется много пухлыхъ и бѣлыхъ во рту глѣзныхъ разокъ, а особливо на миндалинахъ, языкѣ, нѣдѣе и въ зѣвѣхъ и въ горлѣ, которые или одного мѣста ко другому проспираются, и зѣвѣны на одномъ мѣстѣ, а въ другихъ открываются (*), и напомины дѣланы нѣтъ никакой чуждостью лица на немъ опухолью и изорна выходили въ нѣтъ запахи (**). Должно также разсматривать, нѣтъ ли на нихъ лишавъ, шолудей на головѣ, не штемы ли изъ глазъ

(*) Цыганскими раны всегда появлялись сперва на деснахъ.

(**) Что шолуды (Tinea) у младенцевъ и тогда бываютъ знакомъ бѣлыхъ до сѣнечасной болѣзни родимей, или которой хотя они и пользовались, однако не совершенно вылечились; то ее можно видеть изъ описанной Адмиральтейской Докторомъ Кедеромъ Испоры, которую онъ мнѣ сообщилъ, а именно: Онъ въ Неапольскѣмъ Госпиталѣ, въ которомъ пользуются болѣе шолудами младенцы, нашелъ, что между 400 младенцевъ, 283 были или такихъ родимей рождаемые, которыхъ либо онца либо матери имя уже было записано въ Книгахъ между болѣвыми дѣтскими болѣзнями, и или одной посредникомъ производимаго снотеченія используемыми. Они конечно происходили также или дѣтскими болѣзнями у такихъ дѣтей, которые рождены

глазѣ либо изъ ушей гной, либо не дѣлаются ли часто на губахъ раны. Въ такомъ случаѣ не безразлично можно имѣть подозрѣніе на кормильцу. А сестры еще и иномъ примѣчаютъ у нее и нѣкоторые знаки дѣтской расстройной болѣзни, но не имѣтъ никакого сумнѣнія, что младенецъ опѣ нее заразился; для того.

1) Должно освѣдомляться чрезъ Проповѣдниковъ въ селахъ, либо у кормильцыныхъ знакомыхъ, либо у ея Госюда о ея поведеніи, и спрашивая, въ деревнѣ ли, или въ городѣ, въ чужихъ домахъ, спрашиваяхъ, либо госпитализирована она служила? Не жила ли она въ домахъ, зараженныхъ дѣтской расстройной болѣзью, и не вела ли тамъ расстройной жизни? Все это наводитъ на насъ подозрѣніе, но еще больше въ семъ можно быть увѣрену.

Г р 4

2)

Дѣти опѣ заразились, имѣвшихъ несовершенно излеченную эту болѣзнь, или которые сами нащипываніемъ на себя заразили, либо употребленіемъ груды шолудивыхъ дѣтей заразились. Заразились ихъ только такъ, какъ и самую любуоспирасную болѣзнь. Голова скорѣе всего заживленіемъ опѣ того, когда те мѣши. Свѣтъ новымъ ртутнымъ спиртомъ. Однако естели присемъ не употребляютъ ниушр ртутныхъ лѣкарствъ; то не только они спруны опять появляющіяся, но еще опѣ сего могутъ и опѣшн и опасныя слѣдствія. Тѣ, кто вые въ младенческихъ имѣли шолуду, и опѣ ихъ несовершенно излечивались, вошли въ лѣта, получаютъ золотуху и другія о болѣзны, часто вензѣчимыя болѣзны, потому что оставшійся въ тѣлѣ ядъ любуоспирасной болѣзни перемѣняетъ свое свойство.

2) Когда она имѣетъ лицо и руки изблѣжелыя, глаза онавшіе и блѣдыя и распухшимъ кружкомъ окруженныя; при томъ въ тѣлѣ день ото дня худѣетъ, чисто сираженъ въ сморкомъ либо флюсомъ, сквозь носъ говоритъ и часто безъ явной причины бываешь сиплива; имѣетъ несвободное глотаніе, выдѣлываетъ много слины, либо съ кашлемъ великое количество вонючаго гноя, либо то, что она хочетъ проглотить, носомъ опять вонъ выходитъ, или съ кашлемъ выплевывается, либо въ горлѣ находящаяся гноевая масса и вокругъ себя разбѣдающія раны, тяжесть и слабость въ членахъ, и волосы даже на тѣлѣ опадаютъ.

3) Сверхъ того должно примѣчать, хорошо ли она ночью спитъ, не мучится ли, что ощущаетъ боль въ головѣ, въ спинѣ, въ членахъ, либо въ костяхъ, которая днемъ бываетъ нечувствительна, и ночью не спитъ жестоко, когда больная лежитъ на лавкѣ, а не въ теплой постелѣ.

4) Также должно осмотрѣть, нѣтъ ли у нее опухолей въ пахахъ, подъ мышками, нѣтъ челюсти, либо за ушами? Не находящаяся ли кожная наростки на челѣ, на рукахъ, либо на ногахъ? Либо не имѣетъ ли на туу, или подъ волосами на головѣ ранъ, либо сируньевъ. Либо нѣтъ ли на шеѣ, на груди, на брюхѣ багровыхъ или желтоватыхъ пятенъ, цвѣтомъ на печень похожихъ? Либо не примѣчается ли на тѣлѣ не большихъ, либо иногда и большихъ вѣдкихъ ранъ? Либо не бываешь ли на рукахъ или ногахъ трещины?

5) Напослѣдокъ должно изслѣдовать, нѣтъ ли на шайныхъ удахъ наростковъ, похожихъ на луковки, либо мясные бородавки, либо шанъры въ? Сии иногда бывають малы, а иногда гадки, иногда плоски, а иногда глубоки, но по большей части круглы и имѣють свѣтло-красные края, больше или меньше твердые, а иногда и совсѣмъ мягкіе, внутри бывають бѣлы; а еслили саникомъ бѣды, то нѣсколько чернѣе. Они совсѣмъ другое имѣють свойство, нежели ракъ; равно какъ и начинающіе онимѣнымъ онѣ онаго образомъ, а именно, не большимъ рдѣніемъ и зудомъ, который вдругъ перемѣняется въ боль; послѣ того дѣлается бѣлый струпъ, и по отпаденіи онаго ячеетъ гной. Иногда они представляютъ бородавки, имѣющія на себѣ бѣлыя ранки, испускающія гной, которымъ замазанное положеніе получають желтый цвѣтъ.

6) Нужно также осмотрѣть, нѣтъ ли около задняго прохода, либо въ самомъ ономъ трещинъ, испускающихъ изъ себя гной, либо различного виду наростковъ, похожихъ на луковиды, на выпуклыя гуды, на шолковицу, которые иногда бывають мягкіе, а иногда тверды и мозолеваты.

Впрочемъ не у всякой женщины бывають всѣ сии припадки: но иная изъ нихъ ихъ имѣетъ больше, а другая меньше. Ибо на пр. шѣ, у которыхъ весьма много изъ ранъ течетъ гною, либо съ кашлемъ великое количество выходитъ мокротъ и гною, въ то время рѣдко ночью чув-

спекують въ себѣ боль, либо и никакой не имѣютъ.

Еслили младенцевъ подучитъ сию болѣзнь отъ рознивей; то о я открывающа какъ вышедшими привидѣми, такъ и тѣмъ, что на соскахъ у кормилицы и въ окружности оныхъ прохаживать рѣже и опухать, показывается краснѣе гульдышки, а по опухающей оныхъ дворянъ на нѣкото походя ранки, молоко изъ оныхъ не истекать, какъ бы кровко младенцевъ ни сосалъ, нѣтому что оверсия, въ соскахъ находится, опухолью придавливается. Младенцы, зараженные лютоострастною болѣзнию въ утробѣ матерей, на свѣтъ родятся слабые и сухощавые, нѣкогда бывающъ безжизненны и либо помираютъ, либо чрезъ полгода получаютъ сыръ.

Но изъ всего сего ничего еще съ точностію заключить не можно, еслили не будетъ примѣчено, что сами родители имѣли сию болѣзнь. Сіе же по справедливости можно подозревать, когда мать часто безъ явной причины выкидывала, либо рождала мертвыхъ либо шажихъ дѣтей, которыхъ махичи и полусгнилыми казались, и въ скорости послѣ рожденія на свѣтъ умирали. Можно еще у родителей сую узнавать и по тѣмъ же самымъ припадкамъ, по которымъ мы судимъ о состояніи кормилицы однако, что касается до знающихъ людей, то о семъ должно осматриваться съ болѣею осторожностію, и каждый Врачъ въ такомъ случаѣ долженъ поступить такъ, чтобы не сочли его неучиннымъ и грубіаномъ.

Любострастные раны, во рпу случающіяся, обык оного также онѣ Врачей называюся ракомъ; однако ихъ во все счислѣ за ракъ не можно. Я примѣшадъ, что ихъ не такъ легко распознать, такъ прежде думалъ. Когда онѣ вмѣстѣ съ заперыванемъ показываются на губахъ, изъ устъ, ахъ на шиповкахъ, и часъ онѣ часу болѣе увеличиваются; но ихъ трудно различить онѣ раки, а особливо еслили кто не часто шатовые припадки имѣетъ. Хотя обыкновенно говорятъ, что изъ рака печень много крви, а изъ любострастныхъ ранъ на молодое часто и изъ устъ выступаетъ она въ великомъ количестве. Но опровергнута снгула печень изъ нихъ много крови. Изъ нѣхъ любострастныхъ ранъ, кои-то бываютъ не сальныя, но красныя и сухія, также течетъ кровь, а особливо кгда открываютъ онѣ нѣхъ пришившую корню. Ибо не всею любострастныя раны бываютъ сальною покрытыя, но нѣкоторыя, бѣлыя, черныя и Ангиновыми огнемъ пораженныя. Послѣдняя сн часто счисляютъ за ракъ, а особливо еслили онѣ не на дѣлордныхъ частяхъ бываютъ. Трудно также ихъ различить и по твердости краевъ или самой раны, ибо въ себѣ большая, или меньшая бываетъ разнось. Только то всегда непременно, что ракъ, въ сравненіи съ другими ранами, больше имѣетъ твердости, и что потъ, кто хочетъ совершенно ихъ различить, какъ то такъ и другое должно часто видеть. Изъ сказаннаго то сіе мѣсно, изъ разысканія причинъ и изъ находящихся притомъ обстоятельствъ часто бываетъ

заетъ Врачъ въ состоянн открытъ родъ болѣзни: ибо сіе въ разсужденн леченн необходимо бываетъ нужно, когда зараженнаго мѣста глазами видѣть не можно, на пр. естли рана находилась въ маткѣ. Естли въ пей находилась ракъ, то его трудно излѣчить. а естли любовострастная рана, то часто ртутныя лѣкарствя оную излѣчиваютъ.

Одна двенадцатилѣтняя дѣвица привезена была въ Спонтль для излѣченн имѣвшейся у нее во рту раны, которую даже и самыя Врачи за ракъ почитали. Она была величина въ полшинникъ, и имѣла хотя не твердые, однако неровные, загнутые и возвышенные края; при томъ была нечиста и выпускала изъ себя гной. Снаружи ничего было примѣнить не можно, кромѣ бѣлой опухоли, и весьма распухшихъ какъ на шеѣ, такъ и за ушами жлезъ. Г. Д. Бирхенъ поспѣлъ примѣнить, что то былъ не ракъ, но любовострастная рана, началъ ее пользоваться ртутнымъ спиртомъ, изъ 4 до 6 грановъ сулемы и одного унча горячаго вина сдѣланнмъ, которымъ намачивали свернутую нашинанную изъ ветошки пряжу и прикладывали къ ранѣ, во рту находящейся; опъ чего въ 5 недѣль болѣзная выздорѣла. Рана зажила, края разошлись, и наружная опухоль пропала. Послѣ того употребляла она воутрь ртутныя лѣкарствя, и такимъ образомъ совершенно отъ любовострастной болѣзни излѣчилась. Необходимо нужно сіи язвы, гдѣ бы онѣ ни шѣли ни случились, отъ рака различать. Г. Бирхенъ, который весьма многіе и весьма удачныя въ семъ имѣетъ опыты, мнѣ сообщалъ слѣдующее оныхъ различіе, по сред-

средствомъ котораго онъ многихъ, сколько мнѣ извѣстно, въ худыхъ и двусмысленныхъ обстоятельствахъ находящихся, излѣчивалъ.

Ракъ оказывается въ двоякомъ видѣ: либо онъ разѣдается во кругъ себя десятка чаети, и имѣетъ твердые и заирюемые края; либо вздувается вверхъ и бываетъ помягчатъ. Въ первомъ при оцупываннн ошущается примѣтная твердость какъ внутри, такъ и по краяхъ, которая не успунаетъ давлению перста и не имѣетъ такого свойства, коимъ одарены уругтя шла, но бываетъ такъ груба, какъ камень, и шѣмъ сходствуешъ съ весьма окрылыми железами (Scirrhi). Сей ракъ болышею частію бываетъ круглый, цвѣтомъ изъ шеммакрасный, имѣетъ бѣдые края, которые часто нѣсколько покрывающнся здоровою кожно. Напротивъ шого ракъ шнорого вида, или соединенный съ нарешимъ мясишкомъ (luxigians), имѣетъ особливое свойство онъ прѣлнню. По шружному виду онъ кажется бышь мягкимъ, но ештли его ошупать, то ошущается въ немъ швердость, хотя и не такъ примѣчная, какъ въ первомъ. На немъ не примѣчается никакого возышеннаго края, но онъ самъ весь раздувается, приподымается въ верхъ, распространяется въ ширину, и при корнѣ окружающею его кожною бываетъ какъ бы стянушь, которая однако, по ошрѣзаннн мясишка, находится нмѣдно и имѣетъ на шѣлоторыхъ мѣстахъ выгуклый край. Сей ракъ имѣетъ цвѣтъ изнеммакрасный и бываетъ неровенъ. Болышею частію вых дншъ изъ онго желтый

тый гной, иногда шоклая блкая мокрота (Sanies), а иногда и то и другое вмѣстѣ.

Желтой гной рождается въ околележащей кавинчатой плѣвѣ, которая опѣ прилежновеня къ ней воздуха и опѣ безреспаннаго раздраженія перемѣняется въ пашающій нарыкъ, и своей гной смѣшивающѣ съ пашкою рака; въ прѣдливномѣ же случаѣ опѣ онаго никогда бы не происходило желаннаго гною.

Любострастная члѣ иногда у нѣкоторыхъ жирныхъ людей срывалася чрезъ всю жизнь. Однако же и опѣ шоклыхъ мущинъ могутъ заразиться, и дѣши получая обдѣственное наслаждение.

Сверхъ того скрытая любострастная болѣзнь въ ругѣ можетъ скрыватися и сдѣлавшася онежною, а околело естиван имѣющій въ себѣ отую сверхъ обыкновеннаго начиненѣ дѣлающъ сильное шокдѣвѣние, сдѣлающѣ много пашъ, великое количество употреблѣнъ горячительныхъ наплѣвъ въ и блнѣ грубую пищу, а наипаче весьма много жирнаго.

По сей самой причинѣ оная у деревенскихъ жишелей бывающѣ сильнѣе, глубже въореняющася и часто бывающѣ смертною онежною.

Естиван Врачъ причинѣ долговременной какой либо болѣзни безуспѣшно употреблѣялъ многия, и нѣмѣемѣ дѣлѣвшислѣбныя лѣкарствѣ. то онѣ выдѣлѣнѣ напослѣдокѣ подозрѣванѣ на снѣдѣшую любострастную заразу. А естиван едѣ болѣной приномѣ сдѣлающѣ, что онѣ опѣ ртутныхъ лѣкарствѣ чувствѣющѣ обдѣтченѣ; то весьма основательно должно быти его мнѣнѣе. По сей

при-

жа, такъ и жену не оплатя времени долженъ начать пользоваться. Ибо въ противномъ случаѣ ядъ можетъ перейти въ ту часть тѣла, которая для жизни необходима, и одного изъ нихъ, либо и обоихъ лишитъ жизни.

Цыганскія раны отъ любовнаго влеченія различаются тѣмъ, что окружающіе ихъ бываютъ пѣловата, и имѣютъ на себѣ небольшія изнеженные точки. А еслили подавить на нихъ спрунъ, то можно промѣшнѣ, что онъ мякочъ и поздравитъ. Въ оныхъ обыкновенно нарастаютъ дикое мясо, на телячью печенку походитъ, которое по опизнаніи прочь опять скоро появляется, хотя его и легко испреобавитъ жареными квасцами. Еслили при семъ примѣчаются еще другіе признаки, означашіе въ тѣлѣ сыну, то болѣе отъ нихъ не опасается никакого сумбѣна. Знаки же холодной цыгги суть: бѣлое и разлазное лицо, усмалость въ тѣлѣ и одышка даже и послѣ малѣйшаго тѣлодвиженія, мягкія, ноздреватыя и удобно изъ себя кровь испускающія десны, багровыя, бѣдныя и свиновыи цвѣтъ имѣющія пятна, а особливо на нѣдрахъ (на лицѣ же оныхъ никогда не бываетъ), слабость и боль въ колѣнахъ и проч.

Въ 1735 году призванъ былъ я въспѣтъ покойнымъ Аткаремъ г. Болшеніежаномъ къ одному младенцу, имѣвшему множество на тѣлѣ ранъ, которыя всѣ были салныя. Дитя безпрестанно плакало, и для того родители просили о его излѣченіи. Цвѣтъ ранъ и наружный ихъ видъ заставили насъ подозрѣвать, что оныя происходили отъ любовнаго влеченія. Однако о состояніи родителей никакой

надежной вѣдомости получить мы не могли; для того и османись съ однимъ только подзрѣтымъ Г. Болпенгагенъ, который имѣлъ великое въсемъ свѣтъне и много опытовъ, умѣлъ, такимъ образомъ должно поступивъ съ самого начала въ споль затруднительныхъ обстоятельствъ, для того, посылавъ на самую большую изъ оныхъ нѣсколько мѣлко стерпной сладкой рпути, прикрылъ оную пластыремъ. Пришомъ мнѣ сказалъ, что еснѣли раны происходятъ отъ любовоострастной болѣзни, то спруиъ чрезъ день на оныхъ размячнися; еснѣли же ишѣтъ, то еще нуде увеличнтся. Чшо онъ сказавъ, шо и сбылось. Ибо спруиъ размягчнлся. Для того начали мы матери производншь посредствомъ ртутныхъ лѣкарствъ саинонеченіе, и совѣтывали ей въ шо самое время кормншь свое дншя; и симъ способомъ обонхъ ихъ вылѣчили.

Легче лѣчншь отъ сей болѣзни шѣхъ младенцевъ, которые еще сосунѣ грудь, нежели шѣхъ, которые отъ оной уже оплучены. Вирочемъ шруднѣ врачевашъ шѣхъ, которые съ оною роднлись на свѣшъ, всѣли которые оною заразились отъ кормнлнцы. Чѣмъ ранѣе она опкроешся, и чѣмъ скорѣе будешъ примѣчена, тѣмъ большую можно имѣть надежду о излѣченн больного. Наврошнвъ шо еснѣли ова опкроешся въ 15 или 20 дѣшъ, шо ее шрудно лѣчншь. Въ шакомъ случаѣ для излѣченн больного нужно цѣлый годъ, либо и два года употребляшъ ртутныя лѣкарства и великаго шребу.лнся шернбнн, какъ со стороны больного, такъ и самого Врача.

Большую частью обыкновенно вылѣчивается любострастная болѣзнь, когда она еще не застарѣла. Слѣдовательно чѣмъ меньше прошло времени послѣ заразы, тѣмъ удобнѣе ее можно излечить. Напротивъ того, еслили уже и кости оною заражены; то трудно ее вылѣчить.

Впрочемъ радѣе ее совершенно и со всѣмъ ея корнемъ излечиваютъ потому, что больные, соскучивъ лѣкарствами, поспѣшъ, какъ только ушливуть ихъ мученія и снаружи тѣло спашенью чисто, перестаютъ пользоваться. Для того она либо оная открывается, либо и во всю жизнь безпрерывно продолжается, либо по прошествіи нѣкотораго времени появляется подѣ видомъ сыни, а особливо такъ называемой огни-ками (Herpes). Другая сему причина бывашъ та, что молодые люди не сибють родителейъ открыть болѣзненнаго своего состоянія; и потому не въ состояніи выказываться надлежащимъ лѣкарствомъ, но приудачными находясь употребляютъ только уродующія пріятки лѣкарства до тѣхъ поръ, пока совершенно себя не испортятъ и не останутся иногда неизлѣчимыми. Я вижу здѣсь предсавивъ въ примѣръ одного Кавалера, который имѣлъ на тѣлѣ отъ сей причины происхожденіе лишая, и для того какъ во Франціи, такъ и у насъ употребляетъ ртутныя лѣкарства. Лишай ему ночью причиняли несносный зудъ. Но когда онъ позволилъ себѣ сдѣлать на ногѣ искусственную рану Жанъ фонтансаль; то оны сверхъ чаянія вдругъ пропали. Растворъ же сулемы еще тогда не былъ

въ употребленіи. Когда лишай состоитъ изъ одного только явнн; то можно его всего илѣю поцарапать, дабы тѣмъ привести въ вѣгновѣе, а послѣ задрѣчь такъ, какъ обыкновенную рану.

Чѣмъ чаще кто заражался любострастною болѣзнію, тѣмъ больше спомнѣ труда его вылачннѣ. Сверхъ того чѣмъ долѣ кто лѣчнтся опѣ оной взварами или другими подобными тому усыпншельными лѣкарствами; тѣмъ она болѣше въоренжеться, и болѣше причиняетъ затрудненіе въ излѣченіи.

Тѣ, которые имѣютъ на головѣ костныхъ опухоли (Торн), либо въ горлѣ раны, немедленно должны спараться о излѣченіи; ибо у первыхъ изъ нихъ удобно можетъ въ черепѣ сѣдаться костовѣнца (Caries), опѣ которой удобно могутъ воспослѣдовать судорги и падучая болѣзнь: а у послѣднихъ легко можетъ обезображено быть лицо и оппастъ носъ.

Въ сильной цынгѣ рпушныя лѣкарства пркчнннютъ вредъ; для того оную прежде употребленія оныхъ должно излѣчь, либо по крайней мѣрѣ уменьшить (*). Золотуха, произшедшая опѣ любострастной болѣзни, можетъ быть из-

Д д з

лѣчена

(*) Г. Д Линдѣ сообщаетъ о семъ доспѣйное примѣчаніе наблюдене, описаніе котораго прислалъ ему Докшорѣ Гренгерѣ, а именно: Одинѣ солдатѣ, имѣя вмѣстѣ съ цынгою любострастную болѣзнь, однажды въ вечеру помазася рпушною мазью. Опѣ чего въ слѣдующій уже день открылось савномеченіе. Не смотря на

лѣчена посредствомъ ртутныхъ лѣкарствъ, съспали она не застарѣла; однако для сего много истребуется времени. Желтаница, въ привычку перемѣнившаяся жвѣта, конюсы и судороги, оныя сѣй же причины происходяща, выльчивающія единственно только сими средствами. Но что касаться до родимыхъ, то болѣею частію оны умерши яшѣ мащенцевъ, сепси и другой дѣтъ оныя анатомической болѣзни. Бѣсплодныя оной войдеши въ трудъ и произведеши въ члвчхъ ранъ; то болѣею ошачаетъ безплодность.

Нѣбохотѣи, однады заразились лѣбохотѣсною болѣзною, навсегда ослабѣли въ томъ мѣстѣ, что они оны не исследованъ излечивались, хотя бы они на слѣда оной въ себѣ не имѣли.

Бѣсплодны заразились вновь, либо имѣють давнюю не излеченную сию болѣзнь въ воспалительныхъ болѣзняхъ, то оны ошачаетъ оны анатомическая дѣтъ.

Члвч

то, оны продолжалъ мазаться, прѣдвѣдая ошаченно количество мазѣ чрезъ 10 дней сряду. Но оны шото у него весьма раздухъ ротъ, губы и щѣки. Каждый день оны выплевывалъ много вонючихъ кровавыхъ кусковъ десны. Большая часть зубовъ у него выпалъ, а послѣдніе казались были болѣе, нежели каковы были прежде. Моча его имѣла проливной запахъ, была густа и почва слѣды чѣрна. Частно приключался ему ознобъ, и въ снотѣ худыхъ оны находились обострительныхъ, что на снотѣ его могли вправды, и едва оны могъ чрезъ три мѣсяца въ новой разѣ вступити въ снотѣ должностъ.

Чѣмъ больше остается сія болѣзнь на поверхности шая въ сыни, либо въ ранахъ; шѣмъ менѣе въ болѣзнь оной оной чувствующій боль. Ошело: происходитъ, что имѣющие на од омъ лкомъ либо мѣстѣ асцитую боль, пошчасъ оны оной получаютъ облегченіе, коль скоро при- дачи въ оному сары: мѣ пластинь. Но какъ только коль зажаті, то оная снова и съ рав- ную жестокостію возвращается.

Наконецъ долженъ я приступить къ опи- санію самаго леченія и попервыхъ упомянуть, какими срѣзми только врачевать беременныхъ женщинъ, по несчастію любострастно болѣзнию зараженныхъ, а слѣдовательно и свой плодъ не- миному заразившихъ. Въ семъ случаѣ безъ вся- каго замедленія должно искать помощи. Не должно дожидаться разрѣшенія оны бремени; позирезъ то зародышъ можетъ лишиться жизни, либо родиться на свѣтъ похуегиннымъ и пох- димъ на такую смерть мучоцемъ. Мать при томъ можетъ выкинуть, либо ядъ въ ней м- жетъ произвести такіе опухоли, зашверднѣя, наростки, раны и на костяхъ оугры (Exostoses) что оны не въ состояніи бымы въ разродиться, и слѣдовательно либо младенцъ, либо она сама, либо и оба въсе въ могутъ лишиться жизни. Г. Проф. Дидіеръ (Dufrenoy sur les maladies venereuses p. 84) упоминаетъ такой примѣръ, изъ кото- раго ясно видѣть можно, что какъ мать, такъ и младенецъ долженъ бы былъ умереть, если бы оны въ скорости не предписали ей мазаться ршту- ную мазью; и не спасъ шѣмъ ихъ отъ смерти; хотя то уже нѣсколько и поздно къ леченію при-

ступили; ибо его не прежде окончить могли, какъ только за три недѣли до родовъ. И такъ беременную женщину, сею болѣзнию заразившуюся, прежде должно хорошо пригошовить, и потомъ съ великою осторожностію употребить мазины. Какимъ же образомъ какъ шо, такъ и другое должно дѣлать, я намѣренъ здѣсь описать. Но что сіе безъ малѣйшей опасности можно учинить, то я испыталъ съ весьма хорошимъ успѣхомъ на одной женщинѣ, которая не прежде маѣ о своемъ состояніи оповѣдала, какъ когда уже продолжался шестой мѣсяцъ ея беременности. Она чрезъ шо не только опять получила прежнее свое здоровье, но и родила здорового младенца а когда послѣ того употребилъ такое же лѣченіе и ея мужъ; шо она и многократно благополучно рождала. Гилларъ извѣщалъ такимъ же образомъ одну женщину, ея дѣтя и другого младенца, который еще сосалъ грудь Г. Дессоли (Dissertation sur les maladies venerennes) и Г. Гулардъ (Oeuvres de Chirurgie) описываютъ мажестно плалхъ примѣровъ.

Младенцу, съ люстриною болѣзнію на свѣтъ родившійся, естли онъ еще кажется бодръ, шѣмъ можешъ опѣ оной избавившся, естли мать, кормя его своею грудью, будетъ мазаться рпушною мазью. Но естли она нѣсколько слаба, шо должно сыскать дляя дилити кормицу, и такимъ же образомъ велѣть ей мазаться. Впрочемъ должно се въ такомъ случаѣ о семъ предувѣдомить, дабы родители могли избѣгнуть неприятной и поношительной на нихъ прозбы, такъ какъ сіе однажды случилось во Франціи.

Но

Но монета часто случается, или почти и всегда бываетъ, что отъ сосанія такого младенца соски и шиньки такъ распухаютъ и набухаютъ, что онѣ болѣе не въ состояніи бываютъ сосать: по необходимости требуется искать другого надежнаго средства, а именно, велѣшь кормить младенца козымъ молокомъ. Для того у определенной на то козы шевелъ прежде должно хорошо осиречь и выбришь, потомъ мазать ее ршутною мазью такъ, какъ бы и самого человека. Г. д' Аумонтъ, Валендскій Профессоръ, вылѣчилъ такимъ образомъ младенца въ 35 дней; а г. Аваретъ увѣряетъ, что онѣ и многихъ симъ способомъ пользовалъ.

Самыхъ оплученныхъ уже отъ груди младенцевъ можно пользоваться такимъ же образомъ. Но что касается до достигшихъ уже десятого либо двенадцатаго года; то можно ихъ самыхъ съ приближеніемъ ирисмотрѣ и надлежащею осиреченіемъ мазать, либо давать имъ внутрь г. Пленка ршутнаго сыроиз (*) по чайной ложкѣ по одному или по два раза въ день. Я ниже

Д л 4

отъ

(*) Сей сыроизъ составляется изъ полдрахмы чистой ршуты и полторы драхмы бѣлой камеди, куды приливается полстоловой ложки воды дымянковой (Aqua fumariae). Все это должно въ каменной спупкѣ тереть до шѣхъ поръ, пока ршуть сдѣлается неприимчивою. Послѣ того прилавить сюда 4 столовые ложки фиалковаго сыроизу и одну столовую ложку воды бузиновыхъ цвѣтовъ. Однако лучше сего ршутный расшваръ. Г. Биркенъ вывѣсно оной употребляетъ весьма прятный вку-

объ немъ упомяну и опишу, какимъ образомъ его особливо для дѣтей составлять должно.

Хотя известно мнѣ, что обыкновенно съ большою охотою употребляютъ сладкую ртутъ, ртутную Панацею и другія ртутныя лѣкарства, съ минеральною кислотою приготовленныя, и утверждающіе, что многие пороки ихъ оныхъ излѣчались: однако знаю я и то, что часто сии лѣкарства причиняютъ развѣяніе жидкой, ослепительной поволоки, либо неумѣренное слинотеченіе, которое больного вслѣдствіе въ оное падаетъ, и часто все дѣленіе дѣлаетъ изнурительнымъ. Ибо же сии лѣкарства скорѣе оказываютъ себе дѣйствіе испареніемъ и испаряются при употребленіи; но изъ сего и заключаютъ, что они, по причинѣ производимаго ими слинотеченія, притомъ долѣе вредныимъ мазаніемъ, которое я сподобъ часто събѣдную, имѣющіе преимущество. Однако многократно опять появляющаяся болѣзнь, ежедневныя опыты и многія сочиненія Писателей доказываютъ,

вкусомъ составъ изъ сулемы и чистой живой ртуты, слѣдующимъ образомъ составленный. Возьми перегнанной ртуты двѣ драхмы, сулемы шесть грановъ, сопри въ мраморной ступкѣ; прибавь сюда 10 либо 12 драхмъ порошка бѣлой камеди, и три все вымѣшай. Потомъ прилей при безпрестанномъ треньіи 3 унцовъ чистой розничковой воды, 2 унца сиропа большого просвирипка и 2 унца коричной воды, со спиритомъ либо безъ онаго слѣланной, по различію обстоятельствъ. Но для тѣхъ, которые нежизне имѣютъ вкусъ, можно употребить розовую воду. Сии вещи въ смѣшеніи лучше держатся съ перегнанною водою, нежели съ простогою.

кшѣ, что нѣкоторые и чрезъ нѣсколько разѣ повторенныя снаношеченія не излѣчались; но употребивъ того посредникомъ доли временнаго мазанія совершенно выздоровѣли, которые и оправдали мой доказательство. Бспити бы не воспользовало снаношеченія чрезъ спользуютъ времени и онѣ употребленія сладкой (шунцъ ан-бѣ ршунской Пизанц, чрезъ сколько онаго не съ-звастъ отъ мазанія; то бы и онѣ снѣхъ лѣ-кителѣхъ (яко) можно было ожидать пользы. Для того събинуионѣ събшнзавъ сладкую ршунъ съ желтосурьютъ оо сѣрою (*Sulphur auratum*) и канфаромъ на шѣхъ козетѣ, чтооѣ можно было ее употребити въ дозвѣлюмъ количествѣ пре-жде, нежели она произведетъ снаношеченіе; онѣ чтоо можно ожидать шакотомъ дѣйствія, какъ и онѣ снѣхъ мазанія. Г. Бирхенѣ совершенно вылечилъ такимъ образомъ одного молодого Ка-валера, который долговременно страдалъ пече-ночнымъ печеніемъ (*Ficus hepaticus*), онѣ любострастной болѣзни имѣвшимъ свое начало; ибо онѣ не могъ снѣхъ мазанія, но потчасъ онѣ него получилъ снаношеченіе. Равнымъ обра-зомъ выпользочитъ онѣ и другаго безъ снаноше-ченія сими же илюоямъ, но соединеннымъ съ мазаніемъ.

Сие самое сказать можно п о куреніи кин-варью. Ибо что касается до наружныхъ прии-ковѣ, какъ на пр. до твердыхъ бугровѣхъ и ун-мѣхъ затвердѣній въ ранахъ: то можно о нѣхъ, посредникомъ воронки лѣ большому мѣсту при-пуская дымъ, вылѣчипѣ; но совершенной лѣ о-спрастной болѣзни не лѣзя безъ опасенія онѣмъ

врачевать. Наблюденія, нарочито о семъ родѣ
лечения дѣланыя, и искуснымъ Аспрукомъ об-
стоятельно въ пространномъ его Сопиненти о
любовспрастной болѣзни (спр. 131 — 203) описан-
ныя, довольно се ушверждаютъ.

Леченье болѣзни посредствомъ слинопеченія
(Saiuato) еще у насъ въ великомъ употребле-
нии, однако я желаю бы, чтобъ се во все было
уничтожено. Но 1) съ онымъ сопряжены быва-
ющіе шизелите припадки и 2) великая опасность,
3) оное не надежно, 4) не для всякаго бываетъ
способно, 5) не есть переломъ (Crisis) болѣзни; 6)
безъ оного можно обойтись.

Что съ онымъ бывающіе сопряжены тяже-
лые припадки, то всякъ о семъ можетъ заклю-
чить, что только себя представляющіе, что всег-
да предъ начинаніемъ слинопеченія ощущается
во рту жаръ, железы и на шеѣ и во рту распу-
хаютъ, на деснахъ и языкѣ дѣлаются ранки,
все лицо распухаетъ и часто языкъ такъ увели-
чивается, что не можетъ помѣститься во рту,
но выпучиваясь напередъ зубовъ, и когда боль-
ной пользуясь коронкамъ своимъ зашторивъ ротъ,
то его зубами прикусываетъ, и шмыъ причиня-
етъ себѣ жестокую боль. Для того принужденъ
онъ бывающіе владывать чтонибудь себѣ въ
ротъ промежъ жевательныхъ зубовъ, дабы не
затворялся ротъ. Если же у него выпалъ ка-
кой либо зубъ, то часть языка въ сию ущелину
входитъ и дѣлаетъ ему несносное мучение. Се
ласкаяваясь его шуда класть небольшой кусо-
чекъ пробковаго дерева. Если онъ захочетъ
говорить, то раненый его языкъ припротгиваясь
къ

и въ губамъ весьма болитъ. Сие самое бываетъ, темѣли онъ и спанетъ лишь нѣсколько невялаго супу. Сверхъ того каждую минушу больной принужденъ бываетъ плевать, и поному не можетъ уснуть. Еслили же хотя мало и заснетъ, то часто присутствующие принуждены будить его разбудить, дабы онъ, по причинѣ принадлежащей въ ротъ въ великомъ количествѣ слюны, не задохлся, а напротивъ еслили онъ лежалъ на спинѣ; то ко всему сему можно прибавить еще и то, что десны ошдѣваясь и обькверно выпадаютъ кусками, а больной по награсу исподдевается. Во всемъ сему признается г. Фабъ. (Снеси сюда фанъ Свишена Соммис, Т. I. §. 135.) Правда, еслили бы еще моль сильное саниотеченіе и съ шолкими привадками соединенное случилось уже при окончаніи дѣчія, то бы оно не такъ было не сносно; ибо чрезъ то можно бы надѣяться совершеннаго выздороненія: но понеже оное иногда бываетъ въ то время, когда больной только три или чешыре раза помахется; то ршуть, не оказавъ досвольнаго дѣйствія, выпеклемъ вонъ изъ тѣла, и больной опять чрезъ нѣсколько времени получаетъ также самыя припадки, и поному снова принужденъ бываетъ приниматься за то же дѣчіе.

Что съ сильнымъ саниотеченіемъ соединена бываетъ опасность, то сего никто оспаривать не можетъ. Ибо кому неизвѣстно, что оное причиняетъ горячку, и иногда простой либо кровавый поносъ, кровоизсаваніе, либо друія кровоизеченія? Сверхъ того часто послѣ окончанія дѣчія и послѣ заживленія во рту ранъ, нижняя

челюсть не иѣ состоянїи бываетъ открываться, (что французы Виссе называютъ). Я упоминаю о томъ, что иногда послѣ лѣченїа языкъ приростае къ деснамъ и проч. И такъ не должны ли мы имѣть обращенїа оуѣ сго рода лѣченїа? Правда, неизвѣстно мнѣ, что теперь никто такъ далеко не поступаетъ въ произведенїа снотеченїа: однако кто можетъ удержанъ его въ надлежущихъ границахъ, когда оно уже воспослѣдуетъ?

Что сильное снотеченїе недовольно къ обращенїю иновъ имѣющей открыться солъ и (Residiva); по сѣ ясновенно видѣть можно какъ изъ оушнѣвъ, такъ и изъ доказательствъ. Но извѣстно, что рпу иѣ въ тѣ комъ случай скоро выходитъ изъ шѣа, и болышею частїю въ сосудѣ, въ которой болыной плещѣ, оную сыскивать можно. А оспанокъ оной неспраживается съ каломъ, съ мочою и потомъ. Для того приѣшнѣ можно, что естли болыной во время снотеченїа еще иѣ начѣа лѣченїа подерлитъ чрезъ иѣсколькѣ времени золотую пуговку, то она спановишя блѣдною. Напротивъ того, по продолженїи оуѣа чрезъ иѣсколькѣ времени, не бываетъ сѣй перемѣны, равно какъ и червонецъ не теряетъ болѣе своего цвѣта, естли его положить въ выплываемую болынь иѣ сину, когда уже лѣченїе дошло до положнѣа либо и далѣе. Ибо въ то время рпу иѣ уже въ шѣаѣ не находится. Снотеченїе же не смотря на то продолжается потому, что рпы, во рпу находящяся, остаются въ раздрѣснѣ. Сверхъ того, конеже болыная частъ рпу иѣи при-
но-

носятся ко рту, но мало оной относится къ
нижнимъ губамъ. Слѣдовательно здѣ, со-
державшійся въ трюхѣ и въ нижнихъ губахъ ча-
стихъ, оно сего не можешь испробовать. Извѣ-
стно также, что, когда кто хочешь произвести
слинопеченіе, и мазаніе нѣсколько разъ
сряду одно за другимъ повторяешь, то оныя по-
тѣ происходятъ горяча. А въ оной всегда соуд-
ды такъ бывающія слезны, что ршуть въ оныя
проходить не можешь. Слѣдовательно въ мо-
лодахъ губахъ частыхъ, нѣсколько въ себѣ яду со-
державшахъ, онаго съ собою не выводитъ, а полно-
му болѣзни легко оную послѣ открываешь.

Что слинопеченіе можешь причинить вредъ
беременнымъ женщинамъ, молодымъ дѣвкамъ,
имѣющимъ слабую грудь, весьма уже исхудав-
шимъ, имѣющимъ весьма распухшія шейныя
железы, либо угрызены въ горлѣ раны, подвер-
женнымъ судорамъ, или подучей болѣзни; се-
вель заключить можешь. Но когда ея са-
мыхъ лѣчить можно безъ опасности, посред-
ствомъ умбреннаго и не производяща никакого
слинопеченія мазанія, то для чего лишашь сей
пользы и прочихъ людей?

Что слинопеченіе не есть переломъ бо-
лѣзни (Стѣбъ), то се можно заключить не
только изъ того, что въкогда насмѣщая людо-
спирасная болѣзнь посредствомъ производяго
самимъ собою слинопеченія не излѣчивалась, но и
изъ учевыхъ опытовъ надъ здоровыми людьми;
ибо и оныя опыты мазанія рпуилою мазью полу-
чали точно такое слинопеченіе, какъ и самыя
больныя, которое съ такимъ же соединеніемъ было

запахомъ и происходящими отъ него припадками. Мы не ожидаемъ никакого перелому и тогда, когда прописываемъ лихорадочную корку иъ лихорадки, марциальное вино (*Vinum chalybeatum*) въ слабости желудка, либо ложечную траву и разные кислоты въ дыггѣ.

Но еще и того меньше бываетъ нужно, производить слюнотечение больнымъ любострастною болѣзнию пошому, что многие и безъ оного совершенно выздоровѣли. Съ 1718 году безчисленное множество излѣчилось больныхъ безъ всякаго слюнотечения, и опыты доказываютъ, что оные во время лѣченія нималаго приращенія болѣзни не имѣли, не чувствовали никакихъ худыхъ переменъ, не приходили въ истощеніе силъ, но напротивъ того при продолженіи оного становились полнѣе, и отъ возвращенія болѣзни чрезъ то сдѣлались безопасными. Одну только они съ сѣмъ имѣли невыгоду ту, что должны были довольствоваться только пристойною пищею, и употреблять оную не въ излишнемъ количествѣ, и принуждены были жить воздержно. Впрочемъ могли они выходить, пользоваться сообществомъ и принимать къ себѣ по своему произволению желающихъ посѣщеній друзей. Г. Шакозю, бывшій въ Монпельерѣ Проф. а пошомъ во Франци первымъ Лейбмедикомъ, первый ввелъ въ употребленіе роіъ легкаго сего лѣченія въ любострастной болѣзни въ 1718 году; а г. Гатенотъ, бывшій тамъ же Профессоромъ, оный послѣ въ 1732 году еще лучше, что касается до различныхъ припадковъ, отъ сей болѣзни зависящихъ, исправилъ. Вѣроятно, что оный вездѣ напоследокъ

докъ и отъ всѣхъ будетъ принятъ, а особливо когда изъ опытовъ извѣстно, что онымъ больнымъ съ одинакомъ успѣхомъ можно лѣчить и въ Парижѣ какъ въ Монпелье, а въ Лондонѣ какъ въ Парижѣ, и равнымъ образомъ въ Швеции, какъ въ показанныхъ мѣстахъ. Въ томъ только соспоишь разность, что въ Швеции приговаривать и лѣчить больного должно нѣсколько долѣе, нежели въ другихъ странахъ, и что по окончании лѣченія не такъ скоро больной можетъ выходить изъ открытый воздухъ (*). Причиною сему нашъ климатъ.

Все сіе лѣченіе соспоишь въ томъ (**).

1) Чтобъ ртуть слишкомъ вошла въ тѣло, сколько оной нужно для испреждения яду.

2) Чтобъ она не оставила бытъ прикоснове- нія ни одной капли нашей крови и соковъ.

3) Чтобъ она не оставила бытъ прикоснове- нія ни одной капли нашей крови и соковъ.

4) Не однократно, но нѣсколько разъ.

Послѣ этого должна ртуть нѣсколько време- ни остаться въ нашемъ тѣлѣ, вездѣ имѣть обращеніе, а не тотчасъ изгнана быть вонъ, какъ сіе бываетъ, когда ее мѣшаютъ съ са-
саа-

(*) Однако лѣшомъ и во время продолженія лѣ- ченія больной можетъ прохаживаться. Ибо сіе, по утверждению г. Лейбм Голмана и г. Ассесс. Биркена, весьма способствуетъ къ обращенію сличности.

(**) Съ удовольствіемъ я вижу изъ сочиненія г. Пленка (*Methodus nova et facilis argentum vivum in lue venerea exhibendi* p. 49), что онъ сіе до- казалъ.

слабительными афарезивими, и следовательно она прилагается въ одинъ только кишечникъ, либо смѣшена будучи съ потогонными, съ ислариною испражняеица, либо посредствомъ воспользовавшаго снадобленія, весьма скоро съ онымъ вонъ изъ шѣла выходитъ.

Для того должно

1) Вспирать ршущи довольное количество, оное же въ разсужденіи вѣсу или мѣры смотря по различію возраста, приращенія шѣла, величинны больного и другихъ обстоятельствъ должно быть различно. Чѣмъ рѣже больной мажется, шѣмъ меньше для него потребно мази, и напротивъ того: но шѣмъ лучше и безопаснѣе бываетъ афчеате. Такъ на пр. Г. Раймундъ Трапѣ de maladies, qu'il est dangereux de queir p. 303) изъвѣчалъ одного больного, имѣвшаго, по причинѣ любовострастной болѣзни, въ черепѣ дыру прогнывающую, пиящюу уицами ршущаюу мази въ восемь мѣсяцовъ, считая и самое приращивленіе, ибо дыра онаа заросла, и все окончено благополучно. Но когда прежде того его хотѣли излѣчитьъ скоро; то онъ чуть отъ судорогъ не лишился жизни. Боязли же сей болѣюу, получившій самъ собою сию болѣзнь, принужденъ былъ чрезъ 3 мѣсяцовъ отъ оной афчинься; то ишѣтъ никакого удивленія, что доставивше оную по наслажденію второе или вчетверо больше сего времени на то употребить должны. Для того ишѣкорые, коимъ пособить бы можно, осмѣлются излѣчиваими, единственно только отъ ихъ нетерпѣнія и по причинѣ скоро оконченнаго афченія. Аспрукъ вылѣчилъ двухъ тяжело больныхъ

ныхъ посредствомъ долговременнаго мазанія безъ слинотеченія; изъ коихъ одинъ прежде того перенесъ слинотеченіе два раза, а другой тщетно ожидалъ излеченія по редсвомъ производимаго бакауповымъ деревомъ поту. Одного изъ нихъ мазали по 5, 6, или 7 дней сряду и совершенно вылѣчили въ 6 мѣсяцовъ; а другой который не столько былъ боленъ, выздоровѣлъ въ 3 мѣсяца.

2) Употреблять за однимъ разомъ по немного мази, т. е. по одной, по полторы или по двѣ драхмы.

3) Мазанія не должны быть непрерывны; но должно чрезъ нѣсколько дней сряду мазать и столькожъ времени пережидать, дабы оное того не произошло слинотеченія. Для того шепчась оныя должно оставить, когда скоробудетъ примѣчено, что больной чувствуетъ жаръ или во рту или въ деснахъ, либо оныя у него изкраснѣютъ и нѣсколько распухнутъ. Сте довольно доказываетъ, что ршунъ уже въ кровь вошла.

4) Больнаго шѣло такъ долго и такъ хорошо прежде должно готовить, чтобъ ршунъ послѣ не могла въ ономъ произвести никакихъ припадковъ, не скоро бы принесена была ко рту, но нѣсколько бы времени задерживалась въ шѣлѣ, и мало по малу испарялась изъ онаго испариною, мочею, каломъ и проч.

Приготовление больнаго составляетъ почти самую важную часть лѣченія. Для того смотря по обстоятельствамъ больше или меньше времени на одное должно употребить. Сколь худыя

уаждствія происходятъ отъ недостаточнаго приготовления; се видѣшь можно изъ упоминаемой г. Спрандбергомъ въ вышесказанной его рѣчи (стр. 18) Истории. Но равнымъ образомъ также можно видѣть, сколь и удачно она была вылѣчена послѣ новаго и долговременнаго приготовления. Но понеже шѣла между собою бываютъ различны; по какому изъ нихъ требуется особеннаго приготовления. Вобщемъ сперва должно пустишь, смотря по различію полнокротія больного, больше или меньше крови (стр. 153). На другой день послѣ шѣла дашь слабительное, и, сепѣли весьма засоренъ желудокъ и кишки, чрезъ день, или чрезъ два дни оное повторишь. Пошомъ больной долженъ часто пить либо жидкою разведенную сыворонку, либо воду, смѣшенную съ ~~жидкою~~ жидкою или пияною часпью молока, либо ячнью воду или ячный взваръ съ молокомъ. Ячный ~~жидкою~~ взваръ готовится изъ перловой крупы и изъ корней змѣевиковаго (Scorzonera), цыкорнаго, пырейнаго либо хасимнаго (Targacina), которые должно въ водѣ варить и, снявши съ огня, прибавить туда нѣсколько, смотря по вкусу больного, солодковаго корня (*). Послѣ простудивши и процедивши пить либо одинъ взваръ, либо смѣшенный съ небольшоимъ количествомъ

(*) Прежде претисывали какъ во время приготовления, такъ и во время самаго лѣченія пить взваръ баклаутоваго дерева: однако теперь отъ сей погрѣшности исправились. Но во время приготовления должно разжиживать кровь и твердыя части размягчать, а не высушивать шѣла.

спивомъ молока. Въ разсужденіи пищи весьма должно быть осторожну, не употреблять оной въ излишнемъ количествѣ, либо не есть никакой, которая можетъ разгорячить кровь, либо произвести въ ней испугу. Впрочемъ во время приготовленія весьма бываютъ нужны теплыя ванны, и поному къ употребленію оныхъ больной долженъ и поспать на следующій день послѣ принятія слабительнаго. Онъ долженъ въ оныя садиться, смотря по различію крѣпости силъ, по однажды, либо по два раза въ день, а именно по утру и въ 6 часовъ въ вечеру.

Чѣмъ кшо долѣ можетъ сидѣть въ ваннѣ, тѣмъ лучше, а особливо что касается до худыхъ и сухощавыхъ людей. Беременнымъ женщинамъ я не осмѣливаюсь совѣтовать садиться въ ванны, дабы чрезъ то не причинить имъ вреда. Въ больницѣ зараженныхъ любовострастною болѣзнію, что въ Монипеллерѣ, обыкновенно связываютъ больного въ ванну 18 разъ: однако числа оныхъ для всякаго вообще опредѣлять не можно. Ибо для одного больше, а для другаго меньше ихъ бываетъ нужно. Вышедши изъ ванны каждый разъ больной долженъ пить либо жидкій съ мясомъ вареный бульонъ, либо супъ съ сорачинскимъ пшеномъ. Окончивши же употребленіе ваннъ, должно обстоятельно разсуждать, не надобно ли еще пустить кровь. У насъ большею частію оной не пускаютъ, но только всегда даютъ опять легкое слабительное.

Часто случается врачевать пикихъ больныхъ, которыхъ обстоятельства, либо жестокая мученія не щеряютъ плачь долговременнаго

приготовленія. Ибо иные на пр. уже весьма ослабѣли, у иныхъ находящіяся въ горѣхъ раны угрожающъ оплеченіемъ носа; у иныхъ уже проявляется дѣмъ въ кѣспяхъ, у иныхъ такъ нездорова бываеиъ грудь, что должно опасаться въ легкихъ ранъ и проч. Въ такихъ случаяхъ всякая опсрѣчка опасна. Для того лучше, слѣдуя совѣту г. Проф. Гатенопа, послѣ однодневнаго либо двухдневнаго приготовленія, потчась вѣлѣшь больному попеременно по садиться въ ванну, по мазаться ртутною мазью до тѣхъ поръ, пока жеспокоситъ болѣзни, какъ сіе обыкновенно скоро слѣдуетъ, уменьшится. Помощь на нѣсколько времени мазаніе оспавитъ и приготовлять больного ириснойною иищюю и иишѣмъ, а особливо часто повторенными ваннами такъ, дакъ бы его еще и не мазали (*).

Пища

(*) Г. Гулардъ (на сказ. мѣстѣ стр. 26) вылѣчилъ такимъ образомъ одного Господина, котораго въ молодыхъ лѣтахъ различныя отъ любосприасной болѣзни имѣлъ припадки, и никогда оной совершенно не вылѣчивалъ. Тщесно онъ искалъ въ семъ помощи въ Голландіи, и для того отправился въ Парижъ, дабы тамъ сыскать себѣ пособіе, наипаче въ разужденіи находившейся у него въ самомъ верьху груди, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ключица соединяется съ верхнимъ отросткомъ (Асциумъ) лопатки оухоли. Посредствомъ пластырей привели оную въ нарывъ, изъ котораго выпали нѣкоторые куски ключицы, и послѣ залѣчена рана. Однако больной припомъ не употреблялъ никакихъ лѣкарствъ, могущихъ истребить находящійся въ его крови любо-
стра-

Пища во все время продолженія леченія болѣзни должна быть умеренная и щадящая. Должно остерегаться соленыхъ, кислыхъ, копченыхъ, жирныхъ и швердыхъ вещей. Пряныя кушавья также должны османивать. Напротивъ

Е с з

того

спрастивый ядъ. И такъ возвратясь въ домъ, онъ думалъ, что уже ему нечего было опасаться: однако начала появляться одинъ за другимъ припадки, а именно: лихорадка, кровотечение изъ носу, поносъ, въ разныхъ мѣстахъ сыпь, костныя опухоли на черепѣ, и мало по малу присоединилась къ нимъ и дышга. Почему онъ рѣшился опираться въ Монтекарѣ, для пользованія себя цѣлительными водами. Г. Гулардъ увидѣлъ его съ изумленіемъ, ибо онъ чрезвычайно былъ худъ и блѣденъ, спалъ широкимъ лихорадочнымъ чувствомъ несносную толь во всѣхъ состояніяхъ. Равнымъ образомъ ощущалъ онъ боль и въ своей сыпи и въ костныхъ о улахъ. Когда излѣчена была лихорадка: то воспослѣдовало сильное кровотечение изъ носа, а когда сіе прекратили, то она опять возвратилась. Напослѣдкѣ когда вторично излѣчили лихорадку, то приключился весьма истощающій поносъ, однако и оный равнымъ образомъ былъ прекращенъ. Хотя все сіе считали слѣдствіемъ лихорадочной болѣзни; однако понеже силы больного весьма были истощены; то не возможно было приступить къ надлежащему приготовленію, предъ мазаніемъ употребленному, не смотря на то, что онъ еще имѣлъ здоровую грудь, былъ не старѣе 34 лѣтъ и подавалъ о себѣ хорошую надежду. Для того г. Гулардъ, слѣдуя совѣту г. Тагенонна, велѣлъ боль-

того молоко и съ опымъ приготовленнѣмъ ѣства, суцы изъ соращинскаго ишена, и изъ хлѣба, также изъ перловой крупы бывають полезны. Можно при томъ иногда ѣсть яйца въ смятку, равно какъ и вареный шпинацъ и съ нимъ, либо съ хлѣбомъ вареную похлебку. Люди слабаго и мокротаго сложенія, или истощенные великими испражнениями, могутъ въ маломъ количествѣ кушанъ въ обвѣ вареный съ теляшиною, либо съ курицею супъ, не много жаркого и каше, изъ маса приготовленнаго. Вина, естели нѣтъ опасности отъ поносу, употреблять не должно, но наиротивъ того въ сѣмъ случаѣ оное бываетъ нужно. Не должны также имѣющие склонность къ поносу ѣсть армудовъ, сливъ, печеныхъ яблокъ, изъ оныхъ вареньевъ и иному подобнаго. Ибо сія вещь нужны бывають только въ запорахъ поному, что

больнаго посадить въ ванну на одну только четверть часа, потомъ велѣлъ мазать его ртутною мазью, третью часть ртутни въ себѣ содержащую. И такъ оба сія средства попеременно были употребляемы такимъ образомъ, что больной въ 14 дней 15 разъ сидѣлъ въ ваннѣ и 10 разъ мазался. При томъ давали ему въ пищу супъ, вареный съ пропущенными жирами. Сѣмъ способомъ ятъ любострастной болѣзни такъ былъ приведенъ въ слабость, что больной на послѣдокъ въ состояніи былъ принявъ слабительное и съѣсть 45 разъ въ ванну, въ которой онъ иногда сидѣлъ по цѣлому часу. По окончаніи же употребленія ваннъ, мазали его еще 15 разъ въ 45 дней, и тѣмъ возвратили ему прежнее здоровье, силы и полность.

что когда надлежащимъ образомъ не слабѣтъ, то не возможно уберечься, чтобъ рпушь не стремилась ко рпу.

Знаки, предвѣщающіе наступающее слиношеченіе, состоятъ не только въ жару во рпу, съ рдѣніемъ и небольшою олухолю десенъ сопряженномъ, но и въ запорѣ, въ уменьшенномъ испражненіи мочи, въ рдѣніи лица и въ необыкновенной сонливости. Для того въ семъ случаѣ попеременно должно по давать внутрь по нѣскольку манны либо кассіи, по наснамливая промывательныя и вслѣдъ довольно употребляя пищя.

Рпушная мазь должна быть уже въ готовности. Она же составляется изъ одной части чистой рпуши (3 унц.) и двухъ частей (6 унц.) свиного сала. Рпушь прежде должно въ нѣкоторомъ количествѣ перпенцину тереть до пѣнъ порѣ, пока она станетъ непримѣтною. Потомъ должно оную мало по малу смѣшивать со свинымъ саломъ. Смѣшиваніе и шреніе пребудетъ великаго старанія и труда (*); ибо непремѣнно для сего должно употребить три дня, чтобъ

Е а 4

хоро-

(*) Въ семъ состоитъ не малая важность. Ибо шѣмъ лучше раздѣляется рпушь и соединяется со свинымъ саломъ такъ, что частицы оной послѣ въ крови либо въ слинныхъ железахъ опять соединиться не могутъ. Еслили мазь имѣетъ цвѣтъ изчернаблѣдный, то она еще недовольно терта, и потому скоро производитъ слиношеченіе. Еслили же она имѣетъ свѣтлосиній цвѣтъ, то онаго не бываетъ.

Г.

хорошо ее слѣлать. Ртуть прежде хорошо должно очистишь. Для сего должно на оную налить столько воды, чтобъ она ее покрыть могла, и послѣ деревяннымъ песномъ въ мраморной ступкѣ тереть, или такъ сказать мыть. Нечистую воду вмѣстѣ съ чернымъ порошкомъ или изчернабрымъ, отъ ртути отдѣляющимся, потомъ часъ должно сливать, а потомъ опять наливать чистую; и такимъ образомъ продолжашь тереть до шѣкъ поръ, пока вода больше не будетъ дѣлаться нечистою, и не будетъ примѣнъ о чернотѣ или изчернабромъ порошкѣ. Свиное же сало не должно растапливать, но только сго въ мѣлкіе кусочки изрѣзать и очистишь отъ лѣвъ и жилокъ. Еслили мазь не хорошо смѣшена такъ, что на пр. не каждая оной драхма содержишь въ себѣ половину ртути: то не лзя отъ нее ожидать надлежащаго дѣйствія. Ибо ртуть въ такомъ случаѣ садится въ сосудѣ на дно, а особливо въ лѣвомъ.

Когда

Г. Мешить дѣлалъ сію мазь изъ ртути, опдѣленной отъ киновари. Онъ бралъ оной на пр. одинъ фунтъ и смѣшивалъ сперва въ мраморной ступкѣ съ терпентинномъ; а потомъ прибавлялъ туда несоленое коровье масло. Сие все велѣлъ прилѣжно тереть чрезъ два или три дни, и хорошо смѣшавши, прибавлялъ туда 4 унца расплавленнаго свиного сала; а послѣ просиудивши опять смѣшивалъ. Все равно, которую бы кто ни употреблялъ изъ сихъ двухъ мазей, только помне сѣ содержишь въ себѣ половинную часть ртути, а та третью; то должно знать, какимъ образомъ ихъ употреблять.

Когда все сіе вышеписаннымъ образомъ при-
готовлено, имѣются въ головѣ кости сухіе ишиа-
ные чулки, умѣренно теплая торница и осмо-
трены десны шакъ, какъ и вся внутренность
рта. то мож о прислушать къ мазанію. Вѣра-
мя сего дѣйствія больнои, естли не жарче сего
бываеиъ солнечная теплота, долженъ сплѣсть у
огня. Рѣдко онъ самъ себя бываеиъ въ состоя-
иіи мазать; но для сего попребенъ другой чело-
вѣкъ, кошорый согрѣвъ свою руку, долженъ оное
мазаніе опредѣленную часть до шѣкъ поръ, пока
покрасивеиъ. Въ первый разъ должно, смотря по
сложенію, лѣшамъ и обстоятельству больнато,
втереть одну, полшоры либо двѣ драхмы мази
на верхней части стопы ножной и на всей ногѣ.
Слѣдующіе же два или три дни ожидать;
а потомъ мазать такимъ же образомъ верхнюю
часть другой стопы ножной и самую ногу. Въ
третій разъ сіе самое должно дѣлать на одной
сторонѣ поясницы; а въ четвертый разъ на дру-
гой. Потомъ, естли не примѣчается никакихъ
признаковъ наступающаго слитопеченія, въ пя-
тый разъ должно мазать пахи и подвздохи, а
въ шестой всю спину. Въ седьмой разъ должно
помазать одну руку, а въ осьмой другую. Окон-
чивши же все сіе, должно снова начинать съ шѣкъ
мысли, кошорыя были мазаны въ первый разъ
и продолжашъ мазаніе до шѣкъ поръ, пока Врачи
примѣшашъ, что уже должно оное оставишъ.

Понеже нечувствительное паровъ исхожденіе
есть больше всѣхъ испражнений, и слѣдователь-
но оное весьма можетъ опалекать онъ рта влаж-

ность: для того весьма полезно омывать опѣшѣла послѣ каждаго мазанія на слѣдующій день мыломъ съ водою и не большимъ количествомъ водки все то, что на кожѣ и ея волосахъ прильнувши остается, дабы потовыя скважины и всасывающіе сосуды какъ для испарины, такъ и для свободнаго входу ртутни при имѣющемъ быль мазаніи были открыты. Еслили больного въ сіе время сажать въ ванну; то оѣ опѣ того можетъ приипти въ слабость потому, что она производитъ сильный потъ, а особливо у тѣхъ, которые имѣютъ мягкую кожу, слабое тѣлосложеніе и нездоровый желудокъ. И такъ полезно для тѣхъ, которые льпомъ бывають врачуемы, послѣ мазанія, еслили можно выходить на открытый теплый воздухъ и опираясь умѣренное тѣлодвиженіе.

Тѣ части, которыя больше заражены, должно мазать больше другихъ, а особливо что касается до костныхъ опухолей, либо до тѣхъ частей, въ которыхъ ощущается большая боль. Послѣ каждаго мазанія должно два или три дни переждать, наипаче что касается до младенцевъ, беременныхъ и слабого сложенія людей. Припомъ каждый долженъ послѣ онаго часъ или полшора часа лежать въ постели. Не долженъ также я умолчать и о томъ, что никогда не можно опредѣлить, сколько разъ больной долженъ мазаться. Но лучше сказать, что оное можно оставить тогда, когда не только болѣзнь, но и всѣ происходящіе опѣ оной припадки, еслили только можно сіе сдѣлать, истреблены будутъ

душѣ (*), или лучше сказать, когда Врачъ по времени и употребленной мази, по возрасту больного, по силе болезни и по прекращенію припадковъ, а особливо есѣли во время лѣченія не имѣлъ болей сипнотеченія и поносу, можетъ

(*) Застарѣлыя костныя опухоли, распухшія весьма окрѣпыя паховыя Железы, равно какъ и лишай (Dartres) не всегда можно симъ образомъ излѣчить однако послѣ надлежащаго лѣченія не могутъ уже они произвести никакого вреда. Наружныя раны скорѣе зазѣчиваются, когда прикладываютъ къ онымъ обмоченную въ ртутный спиртъ изъ вешовки нащипанную пряжу. Сие самое бываетъ и съ шанкрами. Но есѣли раны весьма нечисты, то должно еныи сдѣлать покрѣпче. Г. Бирхенъ, о которомъ думаютъ, что онъ первый ввелъ въ употребленіе сей составъ, обыкновенно для сего беретъ 4 грана сулемы и растворяетъ оную въ одномъ унціи горячаго вина. Однако иногда раны такъ бываютъ чувствительны, (какъ о семъ приводитъ примѣчанія дослѣпной примѣръ покойный Д. Гвисардъ), что не могутъ ничего терпѣть. Въ такомъ случаѣ должно ихъ мазать смѣсью несоленыхъ коровьимъ масломъ, либо мазью, изъ смешанной сдѣланною, до тѣхъ поръ, пока мазаніе ртутною мазью внутри возымѣетъ свое дѣйствіе. Любострастная сыпь также скорѣе проходитъ, есѣли онымъ спиртомъ, пенною водою разведеннымъ, больного мыть. Наросѣлки въ заднемъ проходѣ можно излѣчить перевязываніемъ, либо опрѣзываніемъ, есѣли они сами собою во время лѣченія не опадутъ. Посредствомъ куренія киноварью можно разбить застарѣлыя опухоли, есѣли только шо нужно.

желѣ заключить, что уже болѣе се не нужно. Послѣ того больной долженъ вслѣдствіе себя обмытъ мыломъ съ небольшимъ количествомъ водки и теплой воды, нѣсколько разъ принять слабительное, и надо по малу вступитъ въ прежній родъ жизни, только не долженъ преждевременно выходить на открытый воздухъ. Ибо когда одинъ таковой больной прежде, нежели ему было позволено, вышелъ на открытый воздухъ въ тонкомъ шелковомъ платьѣ; но отъ того получилъ такъ жестокую колику, что едва отъ боли не лишился жизни. А другой, котораго посылалъ г. Пешинъ, умеръ отъ того, что тотчасъ послѣ лѣченія въ скрыпнымъ образомъ великое количество нирожнаго. Г. Фасъ, въ упоминаніи оъ одномъ больномъ, который отъ изжоги такой получалъ поносъ, что на силу можно было его выѣчить.

Некоторые имѣютъ такое нѣвѣсложіе, что ржутъ въ нихъ тотчасъ стремится ко рту. Для того послѣ всякаго мазанія никогда не должно останавливать, осмолѣть въ внутренность рта.

О сихъ остаткахъ можно читать пространнѣе Г. Аспрука и Фабра въ вышеписанныхъ Сочиненіяхъ. Впрочемъ необходимо должно испробовать всѣ нѣ наружныя принадлежности, отъ которыхъ чрезъ нѣсколько времени опять возобновиться можетъ болѣзнь. Искус.ый Гилланъ еще въ 1589 году сдѣлавъ се нужное наставленіе и опытами оное утвердилъ. Но еслили се такъ оставить, то конечно больной ранѣ или позже шукъ самую болѣзнь получишь.

рта. Если примѣчено, что въ скорости можеть воспослѣдовать сипнопеченіе, то мазаніе на нѣсколько дней должно оставить, дабы оная опѣ отъ оного можно бысть безопасну. Если же, не смотря на все сіе (хотя и рѣдко сіе случается) оное воспослѣдуетъ: то немедленно должно перемѣнить рубашку, чулки и проспынки, оставшій мази, на кожѣ находящійся, смыть, дать одинъ или два раза слабительное и, если бѣіе жилѣ большой имѣетъ полное и твердое, пустить кровь. Въ Монпельерѣ топчасть употребляютъ теплыя ванны, потому что посредствомъ оныхъ умноженная испарина можеть отнелечь мокроты отъ рта и кишекъ. Если много въ одной горницѣ въ то время употребляютъ сей родъ лѣченія; то получившаго сипнопеченіе топчасть должно перелестъ въ другую. Но въ оной воздухъ наполненъ бываетъ ршущими парами, могущими чрезъ ротъ, посредствомъ дыханія, и чрезъ кожныя скважины входить въ тѣло. По сей самой причинѣ нѣкоторые и иногда не мазавшись въ такихъ горницахъ получали сипнопеченіе.

Сверхъ сего я долженъ еще зѣсь упомянуть о другомъ весьма выходящемъ способѣ лѣченія любосипрастной болѣзни, который какъ въ Англіи, такъ и во Французской арміи въ послѣднюю войну съ великою пользою былъ употребляемъ. Сверхъ того г. Д. Локеръ (*Observations pratiques.*) повѣствуетъ, что онъ въ Венской Госпитали посредствомъ оного вылѣчилъ 4880 человекъ. Г. Д. Гарданъ (*Recherches pratiques, Paris 1770*) весьма ясно доказалъ какъ безвредность, такъ

и весьма хорошее дѣйствіе онаго. Припомъ все то, что объ немъ ни говоришь, ушвердилъ собственными наблюденіями (*). Что до меня касается, то я еще не много надъ онымъ дѣлалъ опытовъ, поному что мало къ тому имѣлъ случаевъ: однако долженъ признаться, что всѣхъ больные, которые по моему совѣту его употребляли, совершенно выздоровѣли. Почему я думаю, что есѣли шолько долго продолжая сѣ лѣченіе; то можно посредствомъ онаго быть безопасну отъ вторичнаго возвращенія болѣзни. По крайней мѣрѣ извѣстно мнѣ, что тѣ больные, конхъ я давно уже, либо не задолго предъ симъ онымъ пользовалъ, еще и понынѣ находясь въ добромъ здоровьѣ. Сей способъ не требуетъ довольноаго приготоуленія; но шолько нужно прежде дать одно или два слабительныя, и въ случаѣ надобности пустишь кровь больному, а особливо, когда онъ полнокровенъ, не пришедъ еще въ слабость и имѣетъ склонность къ воспалительнымъ болѣзнямъ; а есѣли онъ весьма сухъ и худъ, то должно посадить его нѣсколько разъ въ теплую ванну. Опытъ доказываетъ, что можно употребить сѣ лѣкарство для всякаго, не выключая, есѣли шолько оно сдѣлано безъ горячаго вина, и малоалкогольных дѣшей; а припомъ больные и во время лѣченія могутъ отпра-
влять

(*) Самъ г. Фабръ (на сказ. мѣст. стр. 410), который столько похваляетъ слинопеченіе, признается, что сѣ лѣкарство, по примѣру Борона фаяъ Свиншена приготоуленное, весьма хорошо дѣйствуетъ противъ любострастныхъ лишаевъ.

влять свою должность. Только для беременныхъ женщинъ оно нѣсколько сумнительно, пошому что оно гонитъ мѣсячныя кровотеченія; посему естли не пуспиптъ имъ прежде довольнаго количества крови; то оно можеть причинитъ имъ вредъ. Прежде сего не давали его имѣющимъ слабую грудь: однако послѣ многими опытами доказано, что и для сихъ можно оное употреблять безъ всякой опасности. Господину Барону фанъ Свиннену должно приписать честь, что онъ первый ввелъ въ общее употребленіе сіе лекарство (*). Онъ его приимовляешъ слѣдующимъ образомъ:

R. Mercurii sublimati cor-
rosivi in pulverem sub-
tilissime triti gr. XXIV
Spiritus ardentis с fru-
mento ℞iV.

Возьми сулемы, въ са-
мый мѣлкій порошокъ
смертой 24 грана,
Горячаго хлѣбнаго ви-
на 4 фунта.

Digere, subinde agitando,
donec mercurius solutus
fuerit.

Держи въ тепломъ мѣ-
стѣ часно взбалтывая
до тѣхъ поръ, пока
не распустился су-
лема.

D. ad lagnas vitreas.

Слей въ стекляные со-
суды.

Сей растворъ въ нашихъ Аптекахъ назы-
ваютъ рпушвымъ спиртомъ (Spiritus mercurialis).

ВЪ

(*) Изъ Шведскихъ Врачей приписалъ оному великую похвалу еще пок. Лейбмедикъ Аври-
виллѣй въ напечатанной имъ Диссертаціи (de
Spiritu vini mercuriali), съ кошорымъ также
согласуютъ свидѣтельство г. ф. Дарелли
(Soken - Apothek p. 141.) и новѣйшіе рапорты
Провинціальныхъ Врачей. М.

Въ Шя цзи не много пропустили времени безъ испытанія сего Лѣкарства, и я особливо уговорилъ покойнаго Ассессора Эафа, попробовать оное въ Спокогальскомъ Королевскомъ Лазаретѣ. Но мы тотчасъ узнали, что больные, по причинѣ весьма противнаго онаго вкусу, не могутъ его долго употреблять. Для того начали тотчасъ распускать судему въ чистой рѣчной водѣ, стерши оную въ мѣлкой порошокъ въ стеклянной ступкѣ (*). Мы брали оной, смотря по различію положенія больного, по 6, 8, либо и по 12 грановъ, смѣшивали прежде въ ступкѣ съ небольшимъ количествомъ воды и, растворивъ ее въ оной совершенно, вливали въ стеклянный сосудъ, двумя фунтами воды наполненный; посабъ процѣдивши сѣвось цѣльную бумагу прибавляли туда нѣкоторое количество сырому придорожной иглоки и свалтывали все выспѣ. Сие Апшечари называли растворомъ судемы (*Solutio meiscalis*). Онаго давали больнымъ въ первые дни по столовой ложкѣ на каждый пріемъ поутру и въ вечеру въ чайной чашкѣ, обыкновеннымъ количествомъ наполненной; велѣли тотчасъ закипать жидкимъ овсянымъ супомъ, ячною водою, взваромъ сорачинскаго пшена, хлѣбною водою, либо супомъ, со щиплянами варенымъ. Что касается до меня, то я болѣею частью совѣтовалъ для сего употребить взаръ изъ корня Сарсанрелли, смѣшенный съ небольшимъ количествомъ молока. А г. Гарданъ, какъ мнѣ извѣстно, велѣлъ закипать

мало-

(*) Г. Гарданъ беретъ судему съ равнымъ количествомъ въ шашлыкю, и распускаетъ ее послѣ въ перегретой водѣ (отъ 268 и 269.).

молокомъ тѣмъ, которымъ оно не причиняетъ безпокойства, и которые весьма исхудали. Всякъ изъ сего можетъ для себя употребить то, что хочеть, только онъ долженъ пить въ довольномъ количествѣ. Нѣкоторымъ онъ даетъ его въ шоколадѣ. Еслии примѣчается рѣзъ въ животѣ, то должно, не упуская времени, стараться его посредствомъ приспѣлаго питья прекратить. Для тѣхъ, которымъ сие лѣкарство причиняетъ тошному, можно сперва сугему распустиить въ 4 или 5 унцахъ хорошаго горячаго вина, а послѣ прочее дополниить водою. Понеже не у всякаго желудокъ имѣетъ одинакое свойство; то Врача и въ расужденіи онаго особливое долженъ имѣть вниманіе.

Прѣучивши мало по малу желудокъ больного къ сему лѣкарству, можно давать онаго по столовой ложкѣ по утру и въ вечеру; а на послѣдѣ, когда оно не причиняетъ безпокойства, то еще по столовой же ложкѣ и въ полдень. Больше сего безъ совѣта Врача употреблять не должно. Такимъ образомъ поступаемъ мы не только, пока больной по видимому уже здоровымъ, кажется и наружныхъ принадлежѣ болѣе не имѣетъ, но еще и послѣ того пакъ, что на пр. когда употреблено прежде 16 или 20 грановъ, то мы уговориваемъ его, чѣшобъ онъ еще столькожъ употребилъ, дабы можно было надѣяться, что онъ болѣе вознасенъ быть имѣетъ отъ болѣзни. (Снеси сюда г. Гардана сказ. мѣст. стр. 112.) Правда, что трудно больного склонить къ сему, когда онъ видитъ себя здоровымъ; однако

должно ему представить справедливые на те резоны, что онъ иначе не можетъ быть отъ болѣзни безопасенъ. Для того наилучше съ нимъ договориться о семъ прежде, и Врачъ не долженъ приступать къ лѣченію до тѣхъ поръ, пока онъ не обяжется совершенно ему во всемъ повиноваться.

Пищу больной долженъ употреблять и въ семъ родѣ лѣченія таковую, какова предписана въ прѣписи. По одному либо по два раза въ недѣлю долженъ онъ принимать легкое слабительное. Манна либо кассія для сего наилучше. Недостаточнымъ же людямъ можно давать яланый порошокъ, прежде хорошо съ сахаромъ спертый. Изъ опытовъ извѣстно, что съ присоединеніемъ слабительныхъ можно вылѣчивать скорѣе и удачнѣе. Ся предосторожность, какъ я выше упомянулъ, слѣдуетъ также и къ опираціи слияшеченія, потому что сіе лѣкарство само собою умножаетъ испарину и испраженіе мочи. Изобильное пище также къ сему способствуетъ, а слабительное доставляетъ свободное испраженіе низомъ. А когда снѣ при испражняющіе пути открыты, то рѣдко можетъ воспослѣдовать слияшеченіе. Но еслили оное нѣсколько и полагается, какъ о семъ можно заключать изъ вышеписанныхъ признаковъ; то должно на нѣсколько дней оставить употребленіе сего лѣкарства, больше нелѣть пища, и дать одинъ или два раза слабительнаго. Въ теплыхъ странахъ больнымъ позволяютъ, когда теплая и ясная погода, днемъ выходить. Сіе самое позволеніе оныя имѣ-

имѣютъ около обѣда въ лѣтніе мѣсяцы и въ нашей земли. Чѣмъ скорѣе уменьшаются и исчезаютъ припадки, тѣмъ лучше. Если же оное долго остается; то должно умножить количество пріемовъ.

Хотя я уже и упомянулъ о нѣкоторыхъ средствахъ, служащихъ для излѣченія младенцевъ: однако самымъ легчайшимъ и надежнейшимъ можно считать растворъ сулемы. Оную для нихъ можно приготавливать такимъ же образомъ, только вмѣсто 12 грановъ, должно брать по 6. Давать ее имъ должно въ молоко, и молокомъ давать имъ запивать. Сначала они могутъ принимать только по получайной ложкѣ дважды въ день. Младенецъ также долженъ одинъ или два раза въ недѣлю принимать слабительное. Заблаговременно и часто должно осматривать во рту, не приливается ли къ горлу клейкая мокрота (Мусия), могущая задушить младенца, и спараться оную поспѣе посредствомъ слабительнаго, вливаніемъ въ горло посредствомъ насоса полосканья, или другихъ средствъ, ошпуда отвлесть. Сие наставленіе, г. Гардяномъ (сказ. мѣст.) учиненное, весьма бываетъ нужно.

Оба сіи роды лѣченія любострастной болѣзни почитаются наилучшими изъ всехъ доселѣ намъ извѣстныхъ. Однако надежнее всего соединять ихъ обоихъ вмѣстѣ такъ, чтобъ болѣзнь, естли болѣзнь застарѣлая и весьма тяжелая, употреблѣтъ какъ мазаніе, такъ и растворъ

сулемы (*). Больного прежде къ сему дѣшю, крове-
пусканіемъ, слабительными и ваннами хорошо долж-
но приготовить, послѣ того начать употреблять
рѣшворъ и помогать его дѣйствію посредствомъ ма-
занія, остатокъ мази, къ шѣлу прильнувшій, такъ
же должно мыломъ съ водою и водкою смывать. А
дабы не воспослѣдовало единиченія либо поро-
су, то должно поступать по вышенисанному.
Равнымъ образомъ и цыгу, еслили оная сюда
забѣшается, прежде того либо нѣ то же самое
время стараться излѣчить. Часно случается,
что узлы (Ganglia), кистовидца, ломъ въ ко-
стяхъ (**) и зашвердѣлая железы, а особливо
въ пахахъ, онѣ мазанія не вылѣчиваются: а если-
ли употребляютъ съ онымъ рѣшворъ сулемы, то
они проходятъ. Напрощивъ шого примѣчено,
что сыпь, онѣ либосипрастной болѣзни происхо-
дѣлая, не уступаютъ рѣшвору сулемы; а еслили
свонымъ будетъ соединено мазаніе, то она про-
падаетъ.

Врачи

(*) Уже шому нѣсколько лѣтъ назадъ, какъ г.
Проф. фонъ Шулценгеймъ и г. Ассессоръ Вир-
хенъ въ шаковыхъ observationsъ соединя-
ли вмѣсто оба сіи способы. Г. Гарданъ назы-
ваетъ сіе лѣченіе смѣшаннымъ (Transect mixte.)

(**) Ломъ въ костяхъ, не смотря на то, что
какъ онъ, такъ и ихъ надкостная плѣва сы-
ваютъ нечувствительны, происходятъ онѣ
того, что простирающіяся по оной чувстви-
тельны жилы онѣ опухли, въ оной либо въ са-
мыхъ костяхъ находящейся, растягиваются.
(смотри. Götting. Anzeigen 1770. in der Zugabe
N. 34.

Врачи лѣчатъ еще сію болѣзнь другими чинсособами, однако я имѣренъ упомянуть здѣсь только объ одномъ изъ нихъ. Г. Пленкъ (*), Вѣнскій Профессоръ, соединяетъ чистую ршуть съ бѣлою камедью при долговременномъ и безпрестанномъ треніи, и послѣ смѣшиваетъ оную съ водою чистяка (Fumaria) и кермеснымъ сыропомъ, либо дѣляетъ изъ оной посредствомъ приваженія болноголовнаго экстракту (Elixirium Soli) и порошка солодковаго корня пиялуи. Но естли кто хочетъ, чшобъ ршуть оставалась въ смѣшеніи, то онъ долженъ брать болѣе сѣдой камеди, нежели сколько оной предписываетъ г. Пленкъ. Въ противномъ же случаѣ ршуть, по прошествіи одного часа, осѣдетъ на дно сосуда, и лежишь на ономъ въ видѣ желтаго порошка, и смѣшивается съ оснующимися дѣлыми чашницами живой ршунни. Дѣйствіе сего лѣкарства довольно медленно. Для того г. Гарданъ (на сказ. мѣстѣ) совѣтуетъ смѣшивать два фунта онаго съ 7 или 8 унцами чистой воды, въ которой растворено 4 грана сулемы. Послѣ того можно оное употреблять такимъ же образомъ, какъ и растворъ сулемы.

Г. Д. Гервансъ, взявъ полную ложку сиропа, смѣшиваетъ съ онымъ сколько чистой ршунни,

Ж ж 3

сколько

(*) Г. Лейбм. Одедль Пленково лѣкарство въ Штокгольмскомъ Гошпиталѣ испытывалъ, и назвалъ оное полезнымъ. Только болѣею частію еще онаго происходило саниопечение: но можетъ быть шѣ больные принимали прежде ршунниа лѣкарства. (Смотри Kroyl. Vetsenlk. Acad. Handlingar 1770. S. 292.) М.

столько на одинъ прѣемъ больному дать намѣ-
ренъ, и онъ сего ожидаетъ такоюжъ дѣй-
ствія.

Нѣкоторые смѣшиваютъ ртуть съ медомъ.
Г. Николь смѣшиваетъ оную съ швѣсомъ и пе-
чатъ изъ онаго сухари. Описаніе онаго можетъ
рассудить о вѣдѣ дѣйствительнейшій. По сей же
самъ й причинѣ дѣйствительными начинаются
В рваросіи пилюли г. Байроса, и можетъ быть г.
Беллоса: о всемъ семъ можно читать сочиненіе
г. Гардана. Однако я не сомнѣвалъ бы упо-
треблять такъ выхъ лѣкарствъ. Ибо они много
производятъ сильное слиноотеченіе, либо ртуть
испражняется съ каломъ потому, что они обыкно-
венно вызываютъ сонливости съ сластительными лѣ-
карствами. Равнымъ образомъ не согласился бы
я употреблять вкусомъ весьма пріятный г. Кейзе-
ра составъ (Tragez.) о которомъ столь много какъ
и въ записке, такъ и въ опроверженіе писано.
Онъ составляется изъ ртути и уксусу. Г. Кей-
зеръ описаніе онаго взялъ изъ сочиненій славна-
го Химика Марграфа. Сомажъ и другіе многіе
Практики (*) похваляютъ его въ застарѣлой
болѣзни, чему я больше вѣрю, нежели похва-
ламъ великихъ Господъ, отъ которыхъ г. Кей-
зеръ умѣлъ себѣ списать похвалу.

Славный Монпельерскій Профессоръ Велель
смѣшиваетъ ртутную панацею съ небольшимъ
количествомъ шурпешу минеральнаго, и употре-
бля-

(*) Смори Journal de Medecine 1763 Марта,
стр. 263.

лаетъ одну весьма часто вмѣсто Кейзероваго
босшана.

Взвары изъ чапушиискаго корня, (*Radix Chinae*)
сарсапарели, сассафраса, и особливо изъ бакауто-
ваго дерева, такъ же прежде были въ великомъ
употребленіи. Улрихъ фонъ Гутенъ, у котораго
девять лѣтъ лѣчили сию болѣзнь, и который
одинадцать разъ перенесъ сииотеченіе безъ
пользы, вылѣчился взваромъ бакаутоваго дерева,
какъ онъ самъ о семъ повѣствуетъ. Врачъ Кесаря
Карла V утѣраетъ, что онъ симъ взваромъ 3000
несчастныхъ спасъ отъ смерти. Одинъ фран-
цузскій Король, какъ изъ Исторіи видно, излѣ-
чился отъ сей болѣзни взваромъ лапушиковаго
корня (*Bardana*). Докторъ Фелцъ чудеса дѣлалъ
своимъ взваромъ: но умеръ не открывъ никому,
изъ чего оный состоялъ. Я не хочу его порочить,
но тѣмъ большаго поношенія достойны Шарла-
таны, которые обыкновенно знаютъ, какъ об-
манывашь, тайно мѣшая въ свои взвары ртут-
ныя лѣкарства и хвастующъ, будто они сию
болѣзнь вылѣчиваютъ отъими только травами,
хотя главное ихъ дѣйствіе происходитъ отъ
скрытой въ оныхъ ртуты. Ибо известно, что
взваръ бакаутоваго дерева или сарсапарели
часто приноситъ пользу, когда его употребляетъ
такой человекъ, который уже прежде того
нѣсколько разъ перенесъ сииотеченіе. У тако-
выхъ людей яв., какъ обыкновенно говорятъ,
приведъ бывающъ въ движеніе и перемѣненъ въ
особливое свойство, и дѣлается тогда лещучимъ.

Понеже сихъ лѣкарствъ никогда къ намъ не привозили свѣжихъ: для того они у насъ меньше оказываютъ дѣйствительны, нежели въ Америкѣ. Такимъ образомъ два юноши, употребивъ прежде дома много лѣкарствъ, и будучи при всемъ томъ такъ больны, что даже слышны ихъ ночной крикъ и мученія были слышны, принуждены были отправиться въ 1563 году въ Америку, и тамъ изваромъ свѣжаго бакаутового дерева вылечились. (Смотри *parall le des differentes methodes de traiter la maladie venereenne* p. 30) Марсельскій Докторъ Раймондъ, который прежде предписывалъ мазаніе такимъ образомъ употреблять, чтобы отъ него не произошло слюнотеченія, теперь больше совѣдуетъ принимать растворъ сулемы, и рекомендуетъ при концѣ лѣченія своимъ больнымъ употреблять изваръ изъ збоу дерева (Decoction lignorum).

У тѣхъ, которые безъ надлежащаго приготовленія лѣнятся и смѣшенно по по другимъ лѣкарствамъ употребляютъ, ялъ весьма перемѣняется, и ихъ органы сподѣлываются нечувствительными, что почти ничто въ оныхъ не производитъ перемѣны. Однако мы имѣемъ примѣры, что шакоты вылѣчивались индолями, содержащими въ себѣ острую сулему: но какъ она весьма сильно дѣйствуетъ, то должно ихъ употреблять только въ крайней необходимости и подѣ присмотромъ весьма искуснаго чековѣка. Оныя состояющія изъ сулемы, сладкой ршущи, камеди, бакаутового дерева, аммоніаку, порошка Алек-

сандрийскихъ листовъ, зубнаго корня (*Pyrethrum*) и сырону придорожной иголки (*Synuris de spina sergina*). Въ семъ случаѣ весьма похваляютъ ихъ г. Гуйонъ, де ла Сриъ и Фабръ. Сулемы въ нихъ содержится $\frac{1}{28}$ а не $\frac{1}{20}$ часней, какъ утверждалъ г. Аструкъ. Но понеже все ихъ дѣйствіе зависитъ отъ сулемы, то кажется, что растворъ оной, въ большемъ нѣсколько количествѣ употребляемый, ту же можетъ принести пользу (*).

Г. Фабръ еще описываетъ одно лѣкарство, которое ему нѣкогда сообщалъ. Онъ его съ пользою употреблялъ въ такомъ случаѣ, когда

Ж ж 5

ршутъ

(*) Самыя просвѣтлыя пилюли изъ сулемы суть тѣ, которыя извѣстны подъ именемъ Гофманскихъ (*Pilulae magnae Hoffmanni*), и которыя описаны въ сочиненіи Franc. Jacobi Descriptio methodi mercurii corrigendi tunc corrosivique exhibendi, Монаш. 1772. Но справедливѣе можно ихъ въ разсужденіи первѣйшаго изобрѣтателя называть по имени Аглия. Врача Гардинера (*Klauss et Obleru, rhufis. et ineg. T. 3. p. 380 и слѣд. 382.*). Вся важность обоихъ ихъ состоитъ въ томъ, что они растворяющъ въ водѣ сулему, и изъ сего раствору, съ мякишемъ облатъ хлеба смѣшеннаго, дѣлающъ пилюли. Выгода въ семъ та, что нечувствительность бываетъ отъ нихъ неприятный металлическій вкусъ сулемы и при томъ она не вредитъ и непосредственно, такъ какъ растворъ, дѣйствуетъ на желудокъ; сверхъ того оными отвращается тошнота, неприятное чувствованіе, въ желудкѣ бывающее, и рвота, которая столь часто отъ употребленія Свиценоваго и другихъ подобныхъ тому растворовъ приключается. М.

ршуть не дѣйствовала, а особливо противъ опухолей въ коленяхъ, отъ любострастной болѣзни происходящихъ. Оно есть ничто иное, какъ настойка, составленная изъ горячаго вина, колониду, гвоздики, бадяну, шафрану и винокусу ой соли (Tincta flosa tartari). Но особливо примѣльное онаго дѣйствіе сосисоншь только въ шомъ, чѣмъ оно весьма слабитъ.

Не давно предъ симъ разнесся слухъ, что изобрѣшенъ способъ леченья недоснапочныхъ людей простымъ леченствомъ, а именно посредствомъ того растенія, которое и у насъ роетсѣ и называется Болголовъ (Sonit Lina.). Сіе подтвердили опыты славнаго г. Стерка и г. Коллина (Annus medicus 3. p. 331. 291 и 292.). Траву онаго можно употреблять наподобіе чая, въ зварѣ, въ супѣ, класть въ ванны, либо изъ экстракту оной и порошка дѣлать пилюли. Чѣмъ до меня, то я не дѣлааъ надъ симъ растеніемъ никакихъ опытовъ: но только слыщааъ отъ нѣкоторыхъ Врачей изъ моихъ пріятелей, что оно въ осипалкахъ любострастной болѣзни, коихъ ршуть не въ состоянтіи была истребить, хорошее оказываетъ дѣйствіе (*). Въ болѣзняхъ

гор-

(*) Сколь великая въ Швеции примѣчена польза отъ Болголову въ распухшихъ железахъ, въ нѣкоторыхъ уже болѣзняхъ опровергающихъ железь и другихъ тяжкихъ припадкахъ, Чистиледи могутъ видѣть изъ моего повѣствованія, въ Библиотекѣ г. Лейбн. Всегда описаннаго, въ которомъ показана Исторія не только стараго, но и новаго, Стеркомъ изобрѣшеннаго

горла или такъ называемыхъ жабахъ, отъ любосипрастнои болѣзни происходящихъ, Болиголовъ всакое оказывалъ дѣйствіе (*).

Подобную похвалу неупоминчый г. Линней приписываетъ лютиковому экстракту (*Extraktum Asoniæ*), съ сахаромъ въ порошокъ сшертому.

Сей

наго лѣкарства. Я хочу здѣсь сообщить при-
сланное мнѣ чрезъ письмо отъ г. фонъ Розен-
штейна наблюденіе, который говоритъ: „Я
„теперь имѣю новый опытъ, доказывающій
„великую пользу Болиголовнаго экстракта въ
„опредѣнни железъ, съ болыю сопряженномъ,
„а именно: У одной женщины на лѣвой груди
„послѣ ушибу сдѣлалось воспаление, и послѣ
„превратилось въ нарывъ. Гной текъ изъ я-
„ми ранъ, которыя послѣ сами собою закры-
„лись, оспизая по себѣ твердую неровную опу-
„холь величиною въ кулакъ, въ которой иног-
„да чувствуема была сильная боль. Я предни-
„салъ оной иилюди изъ экстракту Болиголова,
„и велѣлъ приложить изъ онаго сдѣланный
„пластырь, отъ чего боль тотчасъ прекрати-
„лась и опухоль мѣло по маалу уменьшилась,
„а напослѣдокъ и вовсе исчезла „ Однако дол-
„женъ я безприсрастно объявить здѣсь и нѣ
„неудачные опыты, на которые жалуются
„г. Кавалеръ фонъ Аксель (*Tal om Nadvändig-
heten och förtägen af de Chirurgiska Handlagens
förkortande i utöfningen. 1767. S. 41.*), и г. Вал-
бомъ (*Medicinal Varkets tilstand i Riket S. 105. и
слѣд.*), который описываетъ вкратцѣ нѣко-
торыя достойныя примѣчаниа примѣры. М.

(*) Разсужденія о семъ г. Коста (*Journal de Me-
dicine 1768. Nov. p. 420. 434.*) и г. Тиссона
(*Aviz au peuple 669*) весьма каженіи мнѣ заслу-
живаютъ вниманіе.

Сей же самый славный Врачъ въ особливомъ своемъ Сочиненіи не давши доказаль, что Ломоносѣ трапа (Flammula Jovis) исцѣляетъ любово-спрастныя раны. Онъ ее даетъ больнымъ на по-добіе чаю, либо взваръ, и посыпаетъ порошкомъ оной раны. Впрочемъ время и опыты, надъ боль-ными въ Гошпишалахъ дѣлаемые, могутъ утвер-дить справедливоснъ приписываемаго оной дѣй-ствія.

Полковый Лѣкарь г. Ассессоръ Сунделінъ великъ все пѣло мытъ ртутнымъ спиртомъ, и шѣмъ врачуетъ застарѣлую любово-спрастную бо-лѣзнь. Что ртуть въ семъ случаѣ входитъ въ кровь, то сіе явственно можно видѣть изъ его второй Исторіи; ибо онъ въ ней упоминаетъ, что больной отъ шѣго получилъ совершенное слинопеченіе (Chirurgiska Handeliger S. 93.).

Я здѣсь упомянулъ многіе способы лѣченія сей болѣзни для того, что она бываетъ весьма различна, и подъ весьма различными видами от-крывается. При томъ различный возрастъ, шѣло-сложеніе и полъ больныхъ требуютъ различнаго роду лѣченія. Новая болѣзнь часто врачуется другими лѣкарствами, нежели застарѣлая. Мно-гіе также она имѣетъ степеніи: сверхъ того одинъ имѣетъ только одну любово-спрастную бо-лѣзнь, а другой вмѣстѣ съ нею и цыngu, либо другую какую нибудь оспироту въ крови. Слѣдо-вательно различныхъ больныхъ не лзя лѣчить одинакимъ образомъ, и пошому не довольно знать одно только какое либо лѣкарство. Одному поль-зу приноситъ одно, а другому другое. Для ит-кеніе-

которыхъ потребно бываетъ соединить вмѣстѣ и многе способы леченія. И такъ опытъ Врача требуетъ знанія и разума, а опытъ болаго совершеннаго повиновенія.


ОТДѢЛЕНІЕ 28.

О головныхъ насѣкомыхъ.

Младенцы получаютъ сихъ насѣкомыхъ такимъ же образомъ, какъ чесотку; и сіи такимъ же образомъ у оныхъ распложаются и умножаются. Только меньшаго труда синопить ихъ истреблять. Мазь, составленная изъ сѣменъ петрушки и несоленого коровьяго масла, потчасъ сихъ насѣкомыхъ истребляетъ, естли только оною нѣсколько разъ голову помазать. Равнымъ образомъ самымъ надежнѣйшимъ и полезнѣйшимъ можно прошивъ сего считашъ средствомъ ежедневное посредствомъ гребня младенческой головки вычесываніе.

К О Н Е Ц Ъ.






Означеніе Отдѣленій,
въ сей Книжѣ содержащихся.

Отдѣленіе			Стан.
1	О кормилицахъ.	- - -	5
2	О запорѣ въ брюхѣ.	- - -	30
3	О выпаденіи заднепроход- ной кишки.	- - -	33
4	О обопрѣлостяхъ.	- - -	34
5	О вѣтренной грыжѣ.	- - -	35
6	О насморкѣ.	- - -	38
7	О рѣзѣ въ животѣ.	- - -	39
8	О трудномъ или тяже- ломъ прорѣзѣ зубовъ.	- - -	45
9	О молочницѣ.	- - -	53
10	О судоргахъ и родимцѣ.	- - -	60
11	О поносѣ.	- - -	84
12	Объ оспѣ.	- - -	121
13	О прививаніи оспы.	- - -	188
14	О жорі.	- - -	259
15	О прививаніи жорі.	- - -	286
16	О горячкѣ съ красными пятнами.	- - -	287
17	О рвотѣ.	- - -	310
18	О кашлѣ.	- - -	329
19	О судоржномъ кашлѣ.	- - -	340
20	О желтяницѣ.	- - -	358
21	О анхорадкѣ.	- - -	377
22	О глассахъ.	- - -	407
23	Объ Англической немочи.	- - -	499
24	О головной водяной бо- лѣзни.	- - -	524
25	О плѣвной жабѣ.	- - -	551
26	О чесоткѣ.	- - -	587
27	О любезнораспѣной болѣзни.	- - -	595
28	О головныхъ насѣкомыхъ.	- - -	609

PC 100 100 100
TO 100 100 100
31229-0



Inches

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Centimetres

Colour Chart #13

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red


Magenta

White

3/Color

Black

DANES
PCTA
1998



нв. 5335

1111

0000

